

مُوسُوعَی عبه عبه عبه عبه موسوعی این المعالی المعالی

عَرَبِي - إنج ليزي - فركني - أُفْي الْي الْمُوتيني









۳۱۰ نَبَتَـَـة - ٤٠ صُورَةِ مُلوِّنة ۵ مَـــلاحِق – ٩ مَسَــارد



مكتبة لبكنات كاشِرْوْنَ

# لتحميل أنواع الكتب راجع: (مُنتَدى إِقْرًا الثَقافِي)

پراي دائلود کتابهای محتلف مراجعه: (منتدی اقرا الثقافی) بردابه زاندنی جوردها کتیب:سهردانی: (مُنتَدی إِقْراً الثَقافِی)

www. iqra.ahlamontada.com



www.igra.ahlamontada.com

للكتب (كوردى, عربي, فارسي)

# هٰذا المُعجَم

- إِنَّه المُعجَم السادس من عِدَّة مَعاجم، تُشكِّل مَجموعة «موسوعة النَّباتات الطِّبِّيَّة».
- فيه مِن المُعجَم ترتيبه وتنظيمه، ومِن الموسوعة وَصْف الحقائق بشرح وافي ومِن زَوايا مُتعدِّدة.
- يُعالِج ٣١٠ موادً فَيَذكر التَّسمِية العربيَّة مع مُقابِلاتها الإنجليزيَّة والفرنسيّة والألمانيّة واللَّاتينيَّة؛ أمَّا الشُّروحات فقد تَوزَّعت على النَّوع والمُركِّبات والخَصائص والاستعمال وطَريقة الاستعمال.
- ذُيِّل المُعجَم بِخَمْسَة مَلاحق للفصائل النَّباتيَّة والمُركِّبات الكيميائيَّة والوَصفات الطِّبِيَّة، والمُصطَلحات الطِّبِيَّة، وبيتِسْعة مَسارد للمُصطلحات العَربيَّة والإنجليزيَّة والفرنسيَّة والألمانيَّة واللاتينيَّة.
- زُوَّد المُعجَم بأرْبعين صورةً مُلوَّنةً، وهي تمتاز بِخَصيصَتَيْن: نُدْرَة بَعْضِها، وأصالتها جميعًا، لِأنَّها حَصيلة عَمَل مَيْدانِيِّ وليست اقتباسًا من أيِّ مُعجَم أو مِن بنوك المعلومات.
- بُذِلَت عِناية كَبيرة في تَحريره وتَشكيله وضَبْطه، مِمّا يَجعل مكتبة لبنان ناشرون تَفخر بأن تُقدِّم إلى العالَم العربيّ مُعجَمًا مُتخصِّصًا في مَوْضوعه، عامًا في أَهْدافه، بِحَيْثُ يَحتاجه العالِم والأستاذ، والطالب والمُثقَّف، ويُلبِّي رغبة الناس في معرفة خصائص النباتات، والاستفادة من استعمالاتها، والابتعاد عن مَضارِّها، في عَصْر شَكَّلت فيه العَوْدَة إلى النباتات، مُباشرةً أو مُداورةً، سِمَةً بارِزةً في مَسيرة العِلْم بعامَّة والطبّ بخاصَّة.

ميشاله جايات

# 

عَرَبِيّ - إنج ليزيّ - فركسيّ - ألمانيّ - لاتِينيّ

( ۳۱۰ نکتنة - ۶۰ صُورَة مُلوّنة ( ۵ مکلاحِق – ۹ مَسَارد

مكتبة لبئنات ناشرون

# فهرس المواو

<b>1</b>	- المعجم
Y09	- ملاحق Appendices/ Appendices
ىلىزى - لاتىنى)	١- الفصائل النَّباتيَّة (عربيّ - فرنسيّ - إنج
تي – عربتي)	٢- المُركِّبات الكيميائيَّة في النَّباتات (فرنس
عربتي)	٣- الوَصْفات الطَّبَيَّة (فرنسيّ - إنجليزيّ -
ن - عربي )	٤- المُصطلحات الطُّبِّيَّة (فرنسيّ - إنجليزيّ
<b>***</b>	٥- بِيوغرافيا (فرنسيّ - عربيّ)
TT0	- مَسارد Glossaires/ Glossaries
<b>TTV</b>	١- مَسرد عربيّ١
۳٥٦	٢- مَسرد إنجليزيّ
٣٦١	٣- مَسرد فرنسيّ
<b>TV</b> T	٤- مُسرد ألمانيّ
٣٧٦	٥- مُسرد لاتينتي٥
<b>TA1</b>	- مُسارد المَلاحق
TAT	١- مَسرد عربيّ
<b>rq</b> a	٢- مَسرد فرنسيّ٢
٤٠١	٣- مَسرد إنجليزيّ
£ • o	٤- مُسرد لاتىنى

مُغريًا جَذَّابًا للعَين، بواسطة بَيَاض بَيْض. طريقة الاستعمال - تُؤخَذ الكمِّية مَرَّة وَاحدة، صباحًا على الرّبق.

٧- أَثْل ، طَرْفاء ، عَدْل

Tamarisk, Tamarisk salt tree (E)

Tamaris (F)

Tamariske (D)

Tamarix gallica (S)

الأثل جنس أشجار أو شُجَيرات من فَصلَة الأثْلِبَّات، فُرَيعاتُها عابلة، أوراقها صغيرة وقشريّة الشَّكْل، أزهارها خُنثويّة ونادرًا ما تكون ثُنائيّة المُسكِن. الأزهار تَحملها قِدّات، تَسُرُز قَبْل أو نعد الأوراق. الكأس والتّاج من ٤، ٥ وأحيانًا ٦ كأستات ويَتَلات. المزور تَنتهي بمنقار طويل الرِّيش منذ القاعدة. إنّ هذا الجنس هو من أصْعَب الأجناس تصنيفًا لاختلاف نظرة عُلماء النّبات إليه اختلافًا كبيرًا. في لُبنان حَوالي ٨ أنواع من الطُّرُ فاء، منها الطُّرُ فاء الفَرنسيّة.

الخصائص والاستعمال - قِشْر الأَثْل له طعم عَقُول وخفيف المَرارة. وهو مُقوِّ قليل الاستعمال كان قد صُنّف في الماضي بين المُشهِّيات والمُبوِّلات. العَرب يَستعملون عصير الأثْل المُركَّز كدواء رَقُوء. القِشرة أعيد تسجيلها في الفرماكوبيا الفرنسيّة عام ١٩٧٥.

إنَّ الأَثْل الجرمانيّ (١) Tamarix germanica L. أي العَرْتَن الجرْمانيّ:

# ١- أَيُوزَام مُسَهِّل، طبّ أَسُود، جَرُوع

#### Apozème purgatif, Médecine noire (F)

أوراق سَنَى مُنَظَّفَة . سُولفات الصُّوديوم .....١٥ رَاوَند مُنْتَخَب ..... تَرَنْجَبِينِ دَمَّاعِ 7. ماء مُقَطِّر غال ..... 17.

نَسكُب الماء الغالى على السَّنَا والرَّاوَنْد؛ بعد نُقاعة نِصفَ ساعة، نُمرِّر مع العصر. نُضيف سُولفات الصُّوديوم والتَّرَنْجَبين؛ نُذَوِّب على نار هادِئة؛ نُمرِّر، نَترك الكلِّ يَبرد ويَتركَّد ومن ثمَّ

إِنَّ الكمِّيَّاتِ المذكورةِ أعلاه يَجِب أَن تُعطى ١٨٠ غرامًا من الأيوزام.

عِدّة كُتُب وَصْفات تُضيف إمّا لَسْمونة حامِض مُقَطَّعة إلى شَرائح، وإمّا عَصير، أو دُهْن أو صِبْغَة اللَّيمون الحامِض. ويُضيف البَعض الآخر التَّمر هندي و الموادّ العطريّة.

بَعضُ الأطبّاء يُروِّق السّائل لكي يُصبح (١) السَّمة للمُؤلَّف.

أثل

Myricaria germanica Desf. له رائحة بَلْسَمِيّة مُستحبَّة. خصائصه الطبِّيّة هي ذاتها خَصائص الأَثْل الفَرنسيّ Tamarix . gallica

إِنَّ بَعض الأنواع، وبنوع خاص الأثل الشَّرقيِّ T. orientalis Forsk أي الشَّر قبي T. articulata Vahl. أي الأثل المفصليّ تعطي زائدة مشابهة لجوزة العَفْص. إِنَّ تَعطي الأثل هذه، التي تُسمّى Takaout في مَراكش، تقع في كِسْرات صغيرة، وماديّة اللَّون البُنِّيّ، كُرَويَّة الحجم ومُحدَّبة، طَحينيّة السَّطح. وهي عَفْصَة دباغيّة وقابضة.

النَّبتة أعلاه، كما الأثْل T. getula، لهما استعمالات في الطِّب الأوروبيّ (نقيع، من السُّوق والأوراق أو الفُروع).

٣- أجِيْرَاتُوم كُوْشَانِيَ ، غَوْلان طُبَاقِيَ ، فَتِيَّة 

 يَوْنُه فَيَّة (١)

Goat blue weed, Bastard blue agrimony, Floss blue flower (E) (Y)

Agérate bleue conyzoïde, Baume conyzoïde, Célestine conyzoïde, Eupatoire bleue conyzoïde (F)<sup>(Y)</sup>

Leber balsam, Blaubalsam, Blauageratum  $(D)^{(r)}$ 

Ageratum conyzoides (S)

الأجيراتوم جنس نباتات عُشبية أو شبه ليفية، حَولية أو مُعمَّرة من قبيلة الغَفْييَات وفصيلة المُركَّبات. أزهارُها أنبوبية، زرقاء، بيضاء، ونادرًا وَردية اللَّون. حَوالى ٣٠ نوعًا في أمريكا الاستوائية والوُسطى. الأجيراتوم الكُوْشانيّ نبات عُشبيّ بَرِّيّ وتَزيينيّ يَعلو حوالى ٨٠سم. أوراقه مُعنَّقة، نصلها قلبيّ القاعدة، بيضيّ الصَّفْحة المالِسة. أزهارُه خَمْلِية بيضيّ الصَّفْحة المالِسة. أزهارُه خَمْلِية البيشرة، زرقاء اللَّون. قُلافاتُها كأسِية الشَّكل، الشَّكل عديدة القنابات الخَطِّية الشَّكل، ازهرارُه يَستمِر من حزيران إلى أواخر تشرين. نبات مُقْتَحِم يَغزو المَزروعات، ويَشتهر بخصائصه الطبيَّة في كاليدونيا الجديدة.

الخصائص - يَشتهر على أنّه شافٍ للجُرح، رَقوء، مُنشِّط، طارد للحُمّى.

الاستعمال - يُستعمل في كاليدونيا الجديدة لضماد المَلْخ والتواء المَفْصِل

<sup>(</sup>١) التَّسمية العربيَّة الأولى والثالثة للمُؤلِّف.

<sup>(</sup>Y) التَّسمات للمُؤلِّف.

<sup>(</sup>٣) التَّسمية الألمانيَّة الثَّانية والثالثة للمُؤلِّف.

والرَّضِّ والكَدْمَة والصَّاخَة والقُروح، والقُرحات، وضد كَسَل المَجرى الهَضميّ، وضدّ الدِّيسنتيريا والتَّعقيبة، كما يُستعمَل كنبات رَقوء.

٤- أخيليا سَهُ داء Black milfoil (E) Achillée noire, Millefeuille noire, Génépi en deuil (F) Trauergarbe (D) Achillea atrata (S)

نَبات بَرِّي مُعمَّر من فَصِيلة المُركَّبات يَعلو من ١٥ إلى ٣٠سم. أوراقُه سِنانيّة، مَرْطاء البَشَرة، مُسنَّنة الحوافي. أزهارُه قُرصِيّة كثيفة التَّجميع حِنْطيّة الكأس. ازهرارُه من تمّوز إلى أيلول. يَرغبُ في التُّربة الكِلسية.

الخصائص - يَشتهر استعماله في جبال الألب ضد التهاب الرِّئة، وضد الاسهال . . .

٥- أخيليا مُنْعشَة، أخيليا عَذْيَة، يَعَشُر إن، قَيْصُوم جَبَلتي Lavender cotton (E) Achillée suave, Garde-robe, Aurone femelle, Santoline (F) Cypressengarbe (D) Achillea fragrantissima (S)

نَبات لُبناني مُعمّر من فصِيلة المُركّبات يَعلو من ٥٠ إلى ١٠٠سم، ذات أرُومة ليفيّة. أوراقُه غير مُقسّمة، مُتطاولة خَطِّية أو بَيضويّة، مِنْشاريّة التَّسنين، شبه مُنفرجة، طولُها ٢ إلى ١٠ملم وعرضُها ١ إلى ٤ملم، وهي

لِبْدِيّة أو مُستمرطة. رُؤيساتُه عديدة؛ أخ ي أعذاقُها تَعرض من ١ إلى ٣سم، سُوَيْقاتُها مَعدومة أو قد يَبلغ طولها حتّى ٦ ملم. قلافاتُه مُتطاولة بَيضية الشَّكل العَريض، طولُها ٤ إلى ٦ ملم وعرضُها ٢,٥ إلى ٥ ملم. القنابات مُتطاولة، مُنفرجة، لِبُديّة. اللَّسَيْنات مَعدومة، أزهار الأسطوانة من ٣٠ إلى ٦٠ زُهَيْرَة. ازهرارُه من أيّار إلى آب، في الأراضي الجافّة والفّيَافي والصَّحراء.

> لا نُستبعد أن يَتحلّى هذا النَّوع الذَّكيّ الرّائحة بالخصائص الطّبّة المُمَيّزة، أو أنّه نُشارك الأخيليا المشكنّة (١) A. moschata wulf بعض أو كافّة خصائصها. تحليلُه المِخبري وتجربتُه مَ غو بان جدًّا.

> ٦- أخِيليا نَبِيْلَة، أخِيليا أَيِنْقَة (٢)، أخِيليا Showy milfoil (E) Achillée noble, Millefeuille noble, Achillière élégante (F) Edelgarbe, Edle garben (D) Achillea nobilis (S)

> نَبات تَزييني وطبِّي مُعمَّر من فصِيلة المُركَّبات جميل الشَّكل والأزهار، يَعلو من ۲۰ إلى ٨٠سم. أزهارُه عديدة الألوان منها الأسض والأصفر والوردي والأحمر. ازهرارُه من أوائل تموز إلى أواخر آب. يَجود في جميع الأتربة الزِّر اعبّة .

<sup>(</sup>١) التَّسمة للمُؤلِّف.

<sup>(</sup>٢) التَّسمتان للمُؤلِّف.

الخصائص - أكثر ما يُعرف كطاردٍ للحُمّى.

٧- أخِيليا وِيلْهَلْم، أَخِيليا صُوْفِيَّة، أَخِيليا
 مُتَوَّرَة (١)

Wilhelm's milfoil, Woolly milfoil (E)
Achillée de Wilhelm, Achillée laineuse,
Achillée arrondie (F)

Wilhelmgarbe, Wolligergarbe (D)
Achillea Wilhelmsii, Achillea eriocarpa,
Achillea santolina, Achillea krascheninnikovii, Achillea teretifolia (S)

نَبات بَرِّى لُبناني مُعمَّر من فَصِيلة المُركّبات يَعلو من ١٠ إلى ٣٥سم. سُوقُه أسْطوانيّة غير مُثَلَّمة. أوراقُه صُوفيّة زَعبة، مُستمرَطّة في غالب الأحيان، طول السّاقِيّة منها ١,٥ إلى ٤سم وعرضها ٠,١ إلى ٣,٠سم، وهي ريشية التَشْريح، سَكَماتُها مُتراكبة بعض الشيء، طولها حوالي ملم واحد، ذات ٣ فصوص مُستديرة أو مِسماريّة الشَّكل، صغيرة الأسنان، العُليا تبلغ ارتفاع الأعداق. الرُّؤيسات من ٥ إلى ٤٠ في أعـذاق عـرضـهـا ١,٥ إلـي ٥,٥سم، وسُوَيْقات من ١ إلى ٤ملم. القُلافات عريضة الشَّكل البّيضيّ أو نصف دائرية قطرها ٢,٥ إلى ٥ ملم. القُنَّايات سِنانيَّة أو مُتطاولة، مُنفرجة أو شبه حادة، ضَيِّقة الهامش الشَّقَّاف، قصيرة الكساء اللِّبديّ. اللَّسَينات ٣ إلى ٥، فاتحة اللُّون الأصفر، طولها ١ إلى

(١) كلِّ التَّسميات للمُؤلِّف ما عدا اللاتينيَّة.

1,0ملم، أزهار الأسطوانة 10 إلى ٢٥ زُهَيْرَة. الازهرار من نيسان إلى تمّوز.

نَبات طبِّي يَفتقر إلى التَّحليل والتَّجرِبة.

٨- أَخْيُوْن مَعْرُوف، حَشِيْشَة الأَفْعَى، إِثْرِيْطَشِيَة

Viper's bugloss, Snake flower, Blue weed (E)

Vipérine, Vipérine commune, Dragon, Herbe à la couleuvre, Herbe aux vipères (F) Gemeiner natterkopf, Viperblume (D) Echium vulgare (S)

نَبات مُحُول أو مُعَمَّر من فَصِيلَة الحِمْحِمِيَّات. جَذره مِغْزَلتي الشَّكْل. سوقه مُنتصبة، حَريريّة المَظهر، مُزَرِكَشة بأوبار صُلْبَة، مُرَقَّشة بنُقط سوداء، تَعلو حتّى المتر. أوراقه السُّفلي كاملة، سِنائِية الشَّكل، مَكْسُوَّة بالأوبار، العُليا لاطئة، مَزْمومة القاعدة. أزهاره حمراء، زُرْقاء، ونادرًا بيضاء اللُّون، عُثْكُولِيّة التَّجميع الهَرَميّ الشَّكْل العَقْرَبيّ السَّنَمات. التَّاجَ قِمعيّ الشَّكْل، خُماسيّ الفُصوص. الأسدية خمسة. التَّمرة خَشِنة، ذات سَفًا ومُؤلِّفة من أربع أكَنات. نَبات يَشيع في أنحاء أوروبًا في الأراضي البُور وجوانب الطّرقات والسُّهولُ، ولكنّه لم يَرِد ذكره في فلورا لبنان بالرَّغم من أنّها تَذكُر سِتّة أنواع أخرى تَنتشِر في كافَّة المناطق اللّبنانيّة، مِمَّا قَد يُلفِت إلى احتمال اشتراكها مع الأخيون الأوروبي ببعض المركبات والخصائص والاستعمال.

المُركِّبات - لُعاب، كُونْسُولِسين وهو قِلَويد أصفر اللَّون عديم الشَّكْل، نيتراتات مُختلِفة، مَوادَّ عَفْصِيَّة، مِينُوغلوسِّين وهو قِلَويد يُستَخرَج أيضًا

الخصائص - مُنَقِّية، مُبَوِّلة، مُعرِّقة، مُلطِّفة، دافِعة للسُّعال، مُليِّنة، شافية للجُرح، صِباغِيّة، مأكولة وهي فَتيَّة قبل كسائها الوَبْرِيّ.

من لسان الكَلْب المَخْزَني.

الاستعمال - الرُّؤوس المُزهِرة، الأوراق، الجذور، نُقاعَة، عَصير، مَسحوق، نبيذ، صِبغة كُحوليّة. سُعال، داحوس، دُمَّل، جروح.

طريقة الاستعمال - مُسحوق الرّؤوس المُزهِرة المُجفَّفة بمقدار مِلْعَقة صغيرة تُؤخَذ ثلاث مَرّات في اليوم مع بعض المُربّى أو العسل أو سوى ذلك. نُقاعة مِلْعَقة من الرَّؤوس المُزهِرة المُجفَّفة في فِنجان ماء غالٍ يُغطّى عشر دقائق ويُؤخّذ ثلاثة فناجين في اليوم. نَبيذ يُحضَّر بنقع ٥٠ غرامًا من الرَّؤوس المُزهِرة المُجفَّفة في ليتر نبيذ أبيض لمدَّة عشرة أيّام، يُصفِّي ويُعْصَر ويُؤخذ منه ٣ إلى ٤ أكواب صغيرة في اليوم. لمعالجة الالتهابات، نُقاعة الرّؤوس المُزْهِرة تُستعمَل في غَسيل وحقَن وكمادات على الأماكن المُصابَة. الرّؤوس المُزهِرة الطازجة الغضه المفرومة توضع كمادات على الدّاحوس والدَّمامِل. الأوراق الفَتية تُؤكل في السَّلطات. عَصير النّبات يُستعمل في مُستحضرات

التَّجميل لخصائصه المُليِّنة للبَشَرة. أمَّا الجُذور فتُستعمَل للصَّباغ الأحمر.

# ٩- أَرْطَماسِيا صِينِيَّة، شِيْح صِينيَ Chineese wormwood (E)

Armoise de Chine (F)

ارغ

Chinesische beifuss (D)

Artemisia chineasis (S)

نَبات طبِّي من فَصِيلة المُركَّبات. أورَد هَالَّر عَبات النَّ مُوق الشَّيْح تُحرَق لِكَيّ الأعضاء المُؤلِمة عند المُصابين بالنَّقْرِس في اليابان. وذُكر أنّ الألْياف القُطنيَّة المَوجُودة في أوراق الشِّيح الصِّيني تُستعمَل في الصِّين للهدف عينه. كذلك في فرنسا تُستخدم لتَحضير آنية الكيّ الفُضالةُ الزَّعبية التي تَحصل من جراء الشَّيح أوراق الشَّيح السَّائع.

أرْغَمُون المَكْسِيك<sup>(۲)</sup>، تَشْمِيْزَج،
 خَشْخاشِيَّة

Devil's fig, Prickly poppy, Yellow thistle (E)

Argémone, Pavot du Mexique, Figuier infernale, Chardon bénit des Antilles, Pavot épineux (F)

Doppelklappen, Stachelmohn (D) Argemone Mexicana (S)

نَبات حَوْليّ أَمْرَط بَحريّ اللَّون من فَصِيلة الخَشْخاشِيَّات، يَعلو من ٤٠ إلى ٨٠سم. ساقُه مُورِقة، سَرْحَة أو تَحمل بَعض الأوبار أو الإبر المُنبسِطة

<sup>(</sup>١) كلِّ النَّسميات للمُؤلِّف ما عدا اللاتينيَّة.

<sup>(</sup>٢) التَّسعية لإدوار غالب.

المُتفرِّقة. أوراقُه من ٨ إلى ٢٠سم، كثيرة التَّقطيع، بَيضاء التَّعرِيق، مُسنَّنة السَّكَمات، تَنتهي كما الأسنان بإبرة. أزهارُه فَردِيَّة، بَراعمها شِبه كُرَويَّة، ثُلاثيَّة القُرون الشَّائكة التي تَطول نَحو ٨ملم. التَّاج من ٣ إلى ٢سم. البَتلات ٢، صَفراء أو بُرتُقالِيّة، بَيضوِيَّة الشَّكل المُنْقلِب، مُستديرة الرّأس. الثَّمرة عُلَيْبة مَكْسُوَّة بالإبَر. الأرْغَمون لم يَعُد يُستعمَل.

الخصائص - الأوراق والثّمار مُنوِّمَة. البُزور مُسَهِّلة قَويَّة ومُقيِّئة.

مُلاحظة - نَبات أَمْريكيّ أُدْخِل إلى أوروبًا حَوالى ١٥٩٢ وزُرع في حدائقها للزّينة. دُعيَ في بادئ الأمْر Papaver للزّينة. دُعيَ في بادئ الأمْر spinosum أي خَشْخاش شائِك، وهو يَبت طَوعيًّا في المكسيك والأنْتيل وفي عَدد كبير من بلاد أمريكا الاسْتِوائيَّة كما ينبتُ طَوعيًّا في لُبنان، جاء عنه في ينبتُ طَوعيًّا في لُبنان، جاء عنه في أنواع الأرْغَمون: يُستخرَج من سُوقها أنواع الأرْغَمون: يُستخرَج من سُوقها عُصارة لَبنيّة لَزِجة كاوِيَة صَفراء اللَّون تُستعمَل في الطّبّ لمُعالجة بعض الأمراض الجلديّة.

١١- أَرْغُوت، دابِرَة، مِهْماز الجَوْدَر

Ergot (E)

Ergots (F)

Mutterkorn (D)

Secale cornutum (S)

مِطحنة. وهو يُعطي رائحةً بارزة جدًّا عندما يَتِمّ سَحقه في مَحلول البُوتاس؛ وإذا بُلِّلَ بالأثير وعُولج بنُقطةٍ واحدة من حامِض سُولفوريك 4204 فإنَّه يَتلوَّن بالأحمر أو البَنفسجيّ. ويكون لَونُه رَماديًّا مُسودًّا. وكان يُشار إلى ذلك المَسحوق في الماضي بأسماء: Poudre obstétricale, Pulvis parturiens, Pulvis

إنّ الشّيلَم المُؤَرْغَت لا يُؤثِّر سِوى بقدر ما يكون سليمًا ويكون قد حُصد وجُمع في فترة نُضجه المُلائمة (خلال تمّوز). يُصبح الأرْغُوت بسرعة عُرضةً لفَتْك الحَشرات؛ ومن الواجب حِفظُه في مكان جافّ. وقد نُصِح لحفظه باتباع طريقة اخرى مُخلف على شَيْلَم مُؤرْغَت. ولكِنّ تقضي بوضع الزّئبق في قَعْر الأوعية التي تَحتوي على شَيْلَم مُؤرْغَت. ولكِنّ الأفضل يَبقى حِفظه في غِلاف جاف المؤونة كلّ سنة. ويُورد الكودكس في جدًّا، وإبعاد كلّ حَبَّة فاسِدة، وتَجديد المؤونة كلّ سنة. ويُورد الكودكس في المَراطين التي يُحفظ فيها.

سام - جدول Toxique - Tableau A إِنَّ أَرْغُوتات الأنواع الأخرى من النُّجيليّات، وخاصّة أَرْغُوت الخَرْطال، يُمكن استخدامُها لاستخراج القِلَوِيدات (كودكس).

الخصائص والاستعمال - أرْغُوت الشَّيلَم هو «مُقَبِّض - عُروق»، يَرفع

إنّ مُسحوق أرْغُوت الشّيلَم يَجب أن يُحضَّر فَورًا، إمّا في هاون أو في

التَّوتُّر الشِّريانيّ ويُبطئ النَّبْض مع جعله مُنتظمًا. يُستعمَل الأرْغُوت: أوّلًا -كدواء مُنبِّه مُهيِّج للرَّحم؛ ثانيًا -لمُحاربة النَّزيفات الرَّحمِيّة وسواها؛ ثالثًا - في الاندفاقات المُختلِفة، مِثال سَيلان المَهْبل، سَيلانات مَنُويَّة، إلخ؛ رابعًا -كمقوِّ وعائق في حالات اتساع القَلْب الذَّاتِيّ العِلَّة Idiopathique، وتَصلُّب الشِّريان أو ضَعْف الصُّمَيْمَات الوَتينِيّة (الأورُطِيَّة) Valvules aortiques. المُسحوق، المُستخلَصات، والقِلويدات يَجِب ألَّا تُعطى عند الولادة، أثناء العملية، ولكن بعد الخلاص الكامل، وفقط ضد النَّزيفات، إذ إنَّ الأرْغُوت، بتستبه الانقباضات أو الانكماشات الرَّحِمِيّة، فإنّه يُنسِّر بذلك الاحتفاظ بالبقايا وتَحقينها. استعمال الأرْغُوت لفترة طويلة، أو استعمال أنواع طُحين مُؤرغَتَه يُؤدِّي إلى ظواهر تَسمُّم دَابريّ أو ما يُسمَّى إرْغوتيَّة.

يَبْدأ التَّسمُّم بالتَّقيُّوات، العَطَش الشَّديد، أو بالمَغْصات، والتَّلَعُّب، وفَقْد الوَعي، والدَّوخات، والدُّوارات، والـتَّنَمُ لات، والاختلاجات، والتَّشنُّجات، إلخ.

المعالجة: مُقَيِّنات، مُسهِّلات قَويّة، يُود إيودوريِّ، كلورال، بُنِّ، حقَن تَحْجِلديَّة من الأثير.

طريقة الاستعمال - مَسحوق (في القِبَالة)، جُرعة عاديَّة: ٠,٥٠ غرام لجرعة واحدة؛ مقادير قُصوى: غرام

واحد لكل جُرعة، ٥غ لكل ٢٤ ساعة؛ المعالجة الوَلَاديَّة (عن طريق الفَم): أولاد من ٣٠ شهرًا إلى ١٥ سنة، ٢٠,٠٥غ لكل سنة من العمر.

أرو

مُستخلَص أو إِرْغُوتِيْن: غرام واحد للجُرعة، حتّى ٣غ لكلّ ٢٤ ساعة (بالفَم)؛ مَقادير قُصوى (كودكس): غرام واحد للجُرعة، ٥غ لكلّ ٢٤ ساعة.

مُستخلَص مائع Fluide (تَحتَ الجلد): مَقادير عاديّة: غرام واحد للجرعة، حتّى ٣ غرامات لكلّ ٢٤ ساعة؛ مَقادير قُصوى: غرام واحد للجُرعة، ٥غ لكلّ ٢٤ ساعة. المُعالجة الوَلاديّة (عن طريق الفَم): من ٣٠ شهرًا إلى ١٥ سنة. مُستخلَص مائع شهرًا إلى ١٥ سنة. مُستخلَص مائع (كودكس).

إِنَّ هٰذه المُستحضَرات الثَّلاث كانت في كودكس ١٩٤٩. لم تَعُد مُسجَّلة في الإصدارات اللَّاحِقة.

١٢- أرُورُوت الغِيّان(١)

#### Arrow-root de Guyane (F)

يُنْتَج هذا الأروروت، الذي يُسمّى أيضًا دقيق الإنْيام، من ريزومات أنواع عديدة من جنس إنْيام Dioscorea، وهي أنواع من فَصِيلَة الدِّيُوسْقُورِيَّات تَنمو في البُلدان الاستوائِيَّة. نَخُص مِنها بالذِّكر ما يلى:

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

أرو

- إِنْيام مُجَنَّح (١)

- إِنْيام مَأْكُولُ<sup>(۱)</sup> Dioscorea sativa

- إِنْيام شائِك (۱) Dioscorea aculeata

- إِنْيام أَمْرَط (١٠) Dioscorea glabra إِنَّ هٰذَا الدَّقِيق الجميل اللَّون الأبيض، مُؤلَّف من حُبوب مُختلِفة الأشكال، وتكون غالبًا بَيضويّة أو إهْليلجيّة وأحيانًا

مُثَلَّتُهُ الشَّكل.

ويُشار بهذا الاسم أيضًا إلى دَقيق المَوز الَّذي يُستخرَج من مَوْز الجَنَّة المَوْز الجَنَّة (المَوْزيَّات. وهو دقيق يَتمثَّل على شَكْل مَسحوق ساطِع اللَّون الأبيض، ومُؤلَّف من حُبوب مُستطيلة عمومًا، مِغْزليَّة الشَّكل، فاصُوليَّة الشَّكل، قنِّينَّة الشَّكل أو هِراويَّة الشَّكل.

ملاحظة - لمزيد من المعلومات التَّفْصِيليّة، أطلُب دراسة أرُورُوت (في المُعْجَم الثالث، صفحة ٢، رقم ٨).

#### ۱۳ - أرُورُوت كوِيْنزلانْد<sup>(۱)</sup> Arrow-root de Queensland (F)

تُطلَق أسماء أرُوروت غال الجَنوبيَّة الجديدة، أو دَقيق الطُّولُومان، أو دَقيق كُلِّ الشُّهور، على مَواد نَشويَّة تُستخرَج من ريزومات أنواع عديدة من جنس قَنَا ومن فَصِيلة القَنوِيَّات أي المارْزُوانيَّات، منها:

۰۱ قَنَا مَأْكُول Canna edulis، وهو

نَبات يَعلو حَتِّى المِترين. أزهارُه فاتحة اللَّون البُرتقاليِّ الأحمر.

۲°- قَنَا قُرمُزِيَّة (Canna coccineæ)، وهو نَبات يَعلو حوالى ١٥٠سم؛ أزهارُه قُرْمُزِيَّة اللَّون الأحمر.

٣٠- قَنَاهِنْدي، أو الهند Canna indica،
 نَبات يَعلو حوالى ١٥٠سم؛ أزهارُه فاتِحة اللَّون الأصفر والأحمر القُرمُزِيِّ.

. Canna Achiras (٢) قَنَا أَشِيْراس - ٤

المُواصَفات - يكون دَقيق هذه الأنواع أبيض اللَّون المُطَلَّس؛ ويَبدو تحت المجهر مُؤلَّفًا من حُبوب مُماثِلة لحبوب البَطاطا؛ إلَّا أنَّها تكون عمومًا أكبر منها حَجمًا وتحمِلُ عَددًا كبيرًا جدًّا من الخطوط المُتراكِزة.

- لمزيد من المَعلومات التَّفصِيليَّة، أطلب دراسة أرُورُوت الأُحادِيَّة.

## ۱٤- أَسْتَر إِيزُوأَمِيليُودهيدريك، يُودور الأَمِيْل (Ester isoamyliodhydrique (F)

 $C_5H_{11} I = 198,03.$ 

سائل عديم اللَّون، رائحته مُؤثْيرة. كثافته حَوالى ١,٥٠، يَغلي عند نحو ١٤٥ سغ. يُستعمَل في استنشاقات ضِد الزُّلَة القَلبيّة Dyspnée cardiaque (هوشارد)؛ يُعطَى نَقيًّا أو مُشتركًا مع خُمْس (١/٥) وزنه من الكلوروفورم، بالمقادير ذاتها، وبالأشكال ذاتها (أمبولات) التى تُعطى لنيتريْت الأميْل.

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

١٥- أستر برومهيدريك، أثير برومهيدريك، أثير

Ester bromhydrique, Ether bromhydrique (1937), Bromure d'éthyle (F)

 $C_2H_5Br = 109.$ 

التَّحضير -

برومور البُوتاسيوم المُتبلُّر .....١٢٠غ حامِض كبريتيك مَخزَنتي .....١٢٠غ كحول ٩٥ درجة ....٧٠غ نَسكُب الكحول في حَوْقَلَة أو حَوْجَلَة ونُضيف إليه الحامض الكبريتيك رويدًا رويدًا. بَعد التَّبريد نُضيف، بمقادير صغيرة، برومور البوتاسيوم، مع إعادة تَبريد الحَوْقَلة دائمًا. نَترك المَوادّ تَتَفَاعَلُ وَمَن ثُمَّ نُقَطِّر فِي حَمَّامُ رَمُّلُ عِند حَوالي ١٢٥°سغ. نَخُضَ أو نُحرِّك القُطارة مع محلول من البوتاس بنسبة ٥ بالمئة؛ نُصَفِّق، ومن ثمَّ نَغسلها بمقدار ٣ أو ٤ مَرّات حجمها من الماء ونتلقى الأثير البرومهيدريكي على كلورور الكلسيوم المُنصهر. بَعد مُضيّ ٢٤ ساعة، نُضيف عُشر الكمِّية (١/١٠) زَيت لَوز حُلو ونُقَطِّر بحرارة يَجِب ألَّا تَتَعَدَّى ٣٩°سغ.

المُوَاصفات - إنّ برومور الأثيل المَقيّ الّذي المَخزَنيّ هو برومور الأثيل النَّقيّ الّذي يُضاف إليه واحد بالمئة كحول أثيليّ صِرْف (١٩٣٧). وهو سائل عديم اللَّون، رائحته مُؤثْيرَة واضحة. كثافته عند ٢٠°سغ تكون ١,٤٥٥ إلى ١,٤٥٥؛

نُقطة غليانه ٣٧°سغ. لا يَذوب بالماء، يَذوب بالكحول أو الأثير. وهو مُتعادَل مع دَوَّار المَحلُول. غير قابل للفَساد عندما يَكون نَقيًّا، يَتلوَّن في الضَّوء إذا كان حاويًا على يُودور الأثيُّل.

ا س ت

الحفظ - في قارورة جَيِّدة القَفْل وبمعزل عن الضَّوء.

الخصائص والاستعمال - في استنشاقات، برومور الأثيل هو مُنوِّم - مُبنِّج؛ فَقْد الوَعي والوَعْي يَتُواليان بسرعة (خلال ۱ إلى ٣ دقائق) وفي الوقت ذاته لفَقْد حساسِية الأغْشية المُخاطِيَّة الأنْفِيَة، والبَلْعوميّة، والحَنجريّة الشُعَبيّة الكامل، العام، لا يَحدث إلّا بعد ٦ إلى الكامل، العام، لا يَحدث إلّا بعد ٦ إلى العَضَليّ ولا يَترافق إلّا مُتأخِّرًا بالانحلال العَضَليّ (غير الكامل في غالب الأحيان). من مَساوئه أنّه يُحدِث إفرازًا مُفرِطًا (تَعرُق، لُعَابيّة أي رِيَالَة Ptyalisme (تَعرُق، لُعَابيّة أي رِيَالَة Ptyalisme الرَّئة والكلة (المقادير المُرتفِعة قد تُؤدِّي الله البُوال الزُّلاليّ).

كمُبَنِّج عام، يلائم خاصة في العَمليّات القصيرة (اقتلاع سِنّ، نامِيَات شَبْغُدّيّة Végétations adénoïdes) أو للحصول بسرعة على بَنْج يُمكن مُتابَعته بالكلوروفورم. وعلى عكس هذا الأخير، فإنّه لا يُحدِث لا إثارة وَبَنْجِيَّة (٢) Préanesthésique، ولا إثارة

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

ا س ت

البَشَرة أو الأغشية المُخاطيّة (فلا يُعرِّض إِذًا إلى خَطر الإغماء الحُنْجرِيّ Syncope laryngo- (réflexe

ويُنصَح به بنوع خاصّ، كمُبَنِّج مُوضِعيّ، في عدد من العَمليّات الصَّغيرة: خراجات، نامِيات، ظُفْر غارِز، إلخ. وهو يَسمح باستعمال المَيْسَم النّارِيّ أي الكاوِية بينما يُتابَع ذَرُه موضعيًّا بالوقت نفسه.

لم يَعُد مُستعملًا.

تَضاد الاستطباب - يُمنع استعماله كُمُبَنِّج عام عِند العَصَبِيِّن، والمَقْلُوبين، (مَرْضى (مَرضى القَلْب)، والبرايتِيِّن (۱) (مَرْضى داء برايت، وهو التهاب الكلية المُزمِن)، وكما هو على كلّ حال الكلوروفورم.

طريقة الاستعمال - استنشاقات: من الى ١٥ غرامًا للتَّبنيج: ٠,٢٠ إلى ٠,٤٠ غرام كدواء مُضاد للتَّشَنُّج. في جَروعات كُحوليّة: ٢ إلى ٤ غرامات ضِد الآلام المِعَويّة.

ملاحظة – عَدم الإشراك بين برومور الأثيل وبرومور الأثيلان.

إنّ ما كان يُدعى في الماضي Somnoforme كان مَزيجًا من برومور الأثيل الأثيل (٥غ.)، ومن كلورور الأثيل (٢٠غ.)، ومن كلورور المثيل (٣٥غ.)، يُستعمَل للبَنْج.

۱٦- أشتر متيل سالِسيليك، سالِسيلات المتيل، حامض غلطاري Ester méthylsalicylique, Salicylate de méthyle, Acide gaulthérique (F)

> $C_8H_8O_3$  ou OH.(2)  $C_6H_4$ .CO.OCH<sub>3</sub>.(1) = 151,1.

يُوجَد سَالِسيلات المَتيل في دُهْن الغُلْطارِيَة الكَنَدِيّة الّذي يُشكّل فيه حَوالى تِسعة أعشاره.

يُوجد مُرَكَبًا بحالة هيتروسيد، في قِيشرة البَتُولا Betula lenta، وفي البَنفسج البَرِّي، البَنفسج البَرِّي، وبعض أنواع البُولُوغالِن. ويُوجد في دُهن ملكة المُروج، وفي دُهن الكُوكا، ودُهن سَنْط العَنْبَر وأنواع أخرى من السَّظ، وفي الشّاي، وبمقادير أضعف، في دُهن المِسْك الرُّوحي، واليَلانج في يَلانج، والفَيْجَن، إلخ...

إنّ الحامض الغُلْطاريّ هو أقدم الأسترات السّالِسيليكيَّة المعروفة، اكتشفه يروكْتَر وقام بدراسته كاهُور.

التَّحضير - ١° يُمكن استخراجه من دُهْن الغُلْطارِيَة الكَنَديّة بتقطيره وجمع ما يَمرّ عند ٢٢٤ سغ. ٢° يُحضَّر بمعالجة الكحول المتيليك بواسطة كلورور السالِسيل: C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>.OH.CO.Cl، أو بأسْترة هذا الكحول بالذّات (٥٠ جزءًا) بواسطة حامِض سالِسيليك (٥٠ جزءًا) بوجود حامِض سُولفوريك (٥٠ جزءًا): نُسخَن حامِض سُولفوريك (٢٥ جزءًا): نُسخَن في المُبرِّد الصّاعد لِمدّة ٣٥ ساعة؛ ومن ثم نُضيف ٢٠٠ جزء ماء ومن ثُم نُصفَق

<sup>(</sup>١) التَّسمة للمُؤلِّف.

سالسيلات المتيل الذي نَغسله ونُقطِّره على كلورور الكلسيوم.

المُواصَفات - سالِسيلات المَتيل سائل عديم اللَّون، رائحته قَويّة وثابتة جدًّا، كثافته ١,١٨٢ إلى ١,١٨٧. يَغلي عند ٢٢٠ سغ. قليل الذَّوبان في الماء، ذَوَّاب جدًّا في الكحول وفي الأثير، إذا جُمِّد بالبرد، يَنصهر عند ٩,٤ سغ دون الصَّفر؛ وهو مُتَعادِل مع الكواشف المُلةَ نة.

الحفظ - في قارورات مُقفلَة.

الخصائص والاستعمال - سريع الامتصاص من البَشرة بحالة أبْخِرة؟ ينزول بواسطة البول خاصة بحالة حامِض سالِسيلبَوْلِيْك (١)، الّذي يُمكن تَحرِّى وجوده بعد نِصف ساعة من وضعه. يُحتَفَظ به فقط للاستعمال الخارجي: وهو دواء مُزيل للألم مَوضعي، غير مُهيِّج، يُفيد ضِدَّ الرّوماتيزم المَفْصِليّ الحادّ، وضدّ نَوْبَة النِّقْرس، واللَّمْباغو، والإجْل أي ألَّم العُنق، والدّمامل، أوجاع الخاصِرة، المَغْص الكَبدي، ذات الخُصْيَة التَّعقيبيَّة، أي التهاب الخُصية Orchite، إلخ. نَمسح ٢ إلى ٣ غرامات على المنطقة المُؤلِمة، نُكرِّر ٢ إلى ٣ مَرّات في اليوم؛ مجموع ١٠ غرامات على الأكثر في ٢٤ ساعة؛ ونُغطِّي المكان المَمسُوح بقماش عازل للماء، نُثَبِّتُه

بشريط من الفلانيلَّة (تلافي شَدَّ أس الضّماد، وإلَّا قد نُحدِث تَهيُّجًا).

نَستعملُه أيضًا في مَرُوخات في محاليل زَيتيّة بنسبة ١ إلى ٢ بالمئة (يمكن استعمال هذه المحاليل ذاتها في حقّن إحْليليّة) أو في مَراهم بنسبة ٣ إلى ١٠٪، كما يُمكننا إصلاح رائحة السّالِسيلات بإضافة دُهْن الخُزَامي إلى تلك المُستحضرات.

# ١٧ - أَسْطر اغالُوس إكْرِيتيّ (١)

Cretan astragal (E) Astragale de Crète (F) Cretisch astragel (D) Astragalus creticus (S)

نَبات طبِّي من فَصِيْلَة القَرْنِيَّات، كان مُسَجَّلًا في دستور أدوية ١٨١٨ إلى جانب أسطراغالوس الكُثيراء Tragacantha والأسطراغالوس القصير السُّويَة A. cecapus والأسطراغالوس العَيد والأسطراغالوس الفَرنسيّة الحديثة إدراجُه في الفَرْماكوبيا الفَرنسيّة الحديثة عام ١٩٧٥. كذلك أُعيد تَسجيل جَذر التَّوع Cecapus في الفَرْماكوبيا.

الخصائص والاستعمال - يُنْتِج هذا النَّوع نَتْحًا طبَيًّا ويُعطي صمغ الكُثيراء. - اطلُب صمغ الكُثيراء، في المُعجم النَّاني، صفحة ١٥٩، رقم ١٩٣.

 <sup>(</sup>١) التَّسمية العربيَّة والإنجليزيَّة والألمانيَّة للمُؤلِّف.

Cotylet (F) Nabelkraut (D)

Cotyledon, Umbilicus (S)

جنس نَباتات مُعَمَّرة لَحميّة الوَرق من فَصيلَة المُخَلِّدات، أرومتها دَرَنِيّة أو ريزُوميّة، تَتقارَب من أنواع الخَلّود أو العَمِيرِ . أوراقُها القاعديّة مُعَنَّقة ، شبه دائرية، مَوْطاء، قُطرها يَتَخطّى السّنتمترين. الأوراق السّاقِيّة أضيَق منها اللُّون. أوراقُه من ٦ إلى ١٢ زوجًا من بكثير. أزهارها خُماسيّة الأجزاء Pentamères عَديدة، عُنقُوديّة أو عُثكُوليّة التَّجميع الهاميّ. كان مِنها في أَقْر اللَّهِ عان التَّاليان:

٢٠ - أَشْرَانِ أَصْفَرِ ، سُرَّة النُّرْتُغال ، طُغْلُق مُنْتَصِبُ(١)، القِسِّيْسِ، ودْنه، زَلائف المُلُه ك

Yellow navelwort, Venus's navelwort, Kidneywort, Navelwort (E) Cotylet jaune, Cotylet du Portugal, Nom-

bril de Vénus, Cotyle, Cotylédon (F) Gelber nabelkraut, Venusnabelkraut (D) Cotyledon lusitanica, Cotyledon lutea, Umbilicus erectus, Cotyledon umbilicus-Veneris (S)

نَياتِ مُعَمَّر مِن فَصِيلةِ المَخَلَّداتِ، ساقُه مُنتَصِبَة، بَسِيطة، غَليظة بعض الشَّيء، تَعلو من ٢٠ إلى ٦٠سم. أوراقُه القاعدية دائرية دَلْتاوية، قَلْبية، مُتَلَوِّية مُفَرَّضة، قد يَبلغ قُطْرُها ٧سم.

۱۸ - أَسْطِر اغَالُوسِ كُنْيْر اء، حَلُوسِيا، ۱۹ - أَشْرَان، سُرَّة، طُغْلُق (Cotyledon (E)

أسرط

Gum-tragacanth plant, Goat's thorn (E) Astragale adragant, Adragant, Tragacanthe (F)

Adragant, Bocksdistel (D) Astragalus tragacantha, Astragalus massiliensis (S)

نَبات مُعمَّر لِيفي القاعِدة من فصيلة القَرْنِيَّات يَعلو من ٢٠ إلى ٣٠سم على شكل أدغال كثيفة وشائكة جدًّا، مُبْيَضَّة الوريقات الكاملة، الزّائلة، الوريقة الهامِيّة تُصبِح رأسًا شائكًا جدًّا. الأزهار بَيضاء اللُّون، في عناقيد إبطيّة الارتكاز، عَلَّمُها مُتطاول وَزُوْرَقُها مُنفرِج. الأسدية دِيَادِلْف أَى ثُنائيّة الضُّمَّة. الكأس أنبويتة، خُماستة الأسنان. الثَّمرة قَرْن ذات دَرْزَة سُفلي مَثْنيَّة إلى الدّاخل على شكل نصف حاجز.

الخصائص والاستعمال - يُستخرَج منه جَوهر فَعَّال يُستعمَل ضدّ الحُمَّبات أُخَصُّها المُعاودة والبردية. كان هذا النَّوع مُسجَّلًا في دستور ١٨١٨ وأُعيد تَسجيلُه في الفَرْ ماكوبيا الفَرنسيّة عام ۱۹۷٥ مع النَّوع Astragalus cecapus

- اطلُب صمغ الكُثيراء، في المُعجم الثَّاني، صفحة ١٥٩، رقم ١٩٣.

<sup>(</sup>١) التَّسمات الثَّلاثة للمُؤلِّف.

#### ۲۲- إِشْقِيل بَحْرِي، قَضِيْب الرَّيِ Scille (F)

(راجع دراسته في المُعجَم الأُوَّل).

الخصائص - يَعمل الإشقيل كمقوِّ للقَلْب ومُبوِّل معًا (قد يتم البُوال أيضًا، وبشكل ثانوي، من عمل السِلُّوتوكسِيْن على القَلْب). إنّ تأثيرات الإشقيل تُذكِّر إذًا بعمل الدِّيجيتال؛ غير أنّها أقل حِدَّة منه وتَعمل وفق إواليّة مُختلِفة بَعض الشَّيء.

الإشقيل يُبالغ في كافّة الإفرازات، بما فيها الإفرازات الشُّعَبِيَّة. مَقاديره المُعتدِلة خاصّة إذا طال أمد الاستعمال، تُحدِث في بعض الأحيان ظواهر تَهَيُّج في المَعدة (غَنَيان، تَقَيُّو)، والأمعاء (مَعْص) والكلية؛ استعماله إذًا مُضاد للاستطباب في حالات الإصابات المَعدية والأمْعائية والكلوية.

الاستعمال - يُستعمَل بنوع خاص كمُبوِّل ومُقوِّ للقَلْب، في مُعالجة الاستقاءات القَلبيَّة خلال فترات تَعليق المُعالجة الدِّيجيتاليَّة؛ يُعطى أيضًا كمُقَشَّع في معالجة البرونشيتات والشُّهاق. لذكرى التاريخ.

#### خطِر - الجدول Dangereux - Tableau C

طريقة الاستعمال - الاشقيل ومُستحضراتُه لم تعد تُستعمَل. مَسحوق الإشقيل كودكس ١٩٤٩. مقادير اعتياديّة: ١٩٤٠غ للجُرعة الواحدة وحتّى ١٠٥٠غ لكلّ ٢٤ ساعة، مَحلولة مع

أوراقُه السّاقيّة مُتناقِصة Décroissante فَصيرة الأعْناق. أزهارُه عَديدة، مُنتصِبة فَصيرة الأعْناق. أزهارُه عَديدة، مُنتصِبة نَوعًا ما، عُنقُودِيَّة التَّجميع السُّنْبُليِّ الشَّكل الكثيف المُتَفرِّع القاعِدة أحيانًا. القُنّابات ضيِّقة الشَّكل السِّنانيّ، كامِلة أو مُستَّنة. الكأسِيّات خَطِّيَّة سِنانِيّة. التّاج أنبوبي طوله ٩ إلى ١٥ ملم، التّاج أنبوبي طوله ٩ إلى ١٥ ملم، زاهي اللّون الأصْفر، يُصبح مُحمرًّا بالتَّجفيف. ازهراره خلال أيّار وحزيران في الأحراج.

كان مُسجَّلًا في دستور ١٨١٨ وأُعيد تسجيلُه في دستور أدوية ١٩٧٥. وكان يُنْصَح به في الماضي ضِدّ الصَّرْع، وذُكر أنَّ عصيره يُثير الشَّهوة الجِنسيّة، ويُدرِّ البَوْل.

٢١ - أَشْرَان سُرِّي، سُرَّة الأرْض، آذان القِسِيس، خُبْز القاق

Navelwort, Pennywort (E)
Cotylédon ombiliqué, Gobelets, Nombril
de Vénus, Cotylet, Cotylédon (F)
Gemeines nabelkraut (D)
Cotyledon umbilicus (S)

نَبات من فصيلة المُخَلَّدات يَكثُر في الجبال بين الصَّخور. شِمراخُه يَعلو من ١٥ إلى ٤٠سم. ازهرارُه عُنقوديّ مُنتصِب. أزهارُه مُتدلِّية فُستُقيّة اللَّون الأخضر الذي يَعلوه مُواج وَرديّ. ازهراره يَستمرّ من أيّار إلى تَموز. كان يُنصَح به ضِدّ الصَّرْع وذُكر أنّ عَصيره يُثير الشَّهوة الجِنسِيّة ويُدرّ البَوْل. أعيد تسجيله في دستور الأدْوية الفرنسيّ عام ١٩٧٥.

لَكْتُوز لتخفيف العمل المُهيِّج؛ مِقدار أقصى (كودكس) ٠,٥٠غ لمرَّة واحدة وغرام واحد لكلّ ٢٤ ساعة (بالغون). المقادير الوَلَّادِيَّة: من ٣٠ شهرًا إلى ١٥ سنة: ١٠,٠ إلى ٢٠,٠غ لكلّ سنة من العُمر. مُستخلص كحوليّ (كودكس 19٤٩): ٥٠,٠ إلى ٣٠,٠غ؛ حَدّ أقصى (كودكس): ٢٠,٠ لجُرعة واحدة و٠٥,٠غ لكلّ على ١٤٠٠٠، العُمر.

خطِر - الجدول Dangereux - Tableau C صِبْغَة (كودكس ٤٩) خُماسِيّة ؟ ٥٦ نُقطة تُساوى غرامًا واحدًا.

المقادير العاديّة: غرامان لدُفعة واحدة و٦ غرامات لكلّ ٢٤ ساعة (كودكس)؛ للأولاد من ٢ إلى ٥ نقاط لكلّ سنة من العُمر فوق ٣ سنوات (الامتناع دون ذلك).

خطِر - جدول Dangereux - Tableau C

نَبيذ الإشقيل المُركَّب (نَبيذ المحَبّة المُر المُر المُبوّل)؛ ٢٠ غرامًا من هذا النَّبيذ تُساوي حوالى ٧ سنتغ من الإشقيل: ٢٠ إلى ١٠٠ غرام في اليوم؛ أولاد: ٢ إلى ٤ غرامات لكل سنة من العُمر.

نبيذ الإشقيل (كودكس ١٨٨٤) بمقدار ٢٠ غرامًا من بَصَل الإشقيل لكلّ ١٠٠٠ ملل من النبيذ؛ ٢٠ غرامًا تُساوي ١,٢٠ غرامًا ولي ٢٠ غرامًا في اليوم؛ أولاد: غرامان لكلّ سنة من العُمر.

الأعانية الثانية

غرام إشقيل في ٩٨٠ غرام خَلَّ أبيض زائد ٢٠ غرام حامِض أَسَتيك مُتَبلِّر، يُستخدَم لتحضير المُعَسَّل الإشقيليّ (كودكس ١٩٣٧) (خَلَّ إشقيليّ ٥٠٠غ. عَسَل ٢٠٠٠غ.) يُعطى منه ٥ إلى ٥٠ غرامًا في جَرُوعات للبالغين.

نَبيذ تروسُّو (كودكس ١٩٤٩) من الدَّيجيتال والإشقيل، الَّذي يُقابل كلَّ ٢٠غ منه حَوالى ٢٠,١٠غ من الدِّيجيتال و٥١,٠٠غ من الإشقيل؛ مَقاديره الاعتياديّة ٢٠ غرامًا للجُرعة الواحدة، ٥٠ غرامًا لكلّ ٢٤ ساعة (بالغون).

#### نظام الجدول Régime du Tableau A

يَشْتَرِك الإشقيل في الكثير من الأحيان مع الدِّيجيتال والسَّقَمونيا (بيلولات لانْسَرُو، دستور ١٩٤٩)، ومع الكالومَل، وكمُقَشِّع مع الكبريت ومع القِرْمِز.

لجأ مارُلِيْتًا إلى خصائص الإشقيل الغَض الطّازج المُهيِّجة لكي يُحضِّر ورقة مُحمِّرة للبَشرة وذلك بتغطيس أوراق عاديّة غير مُصَمَّغة في عُصارة الإشقيل أو صِبْغَته المُركَّزة وهو طازج.

في وُرْتَنْبرغ نَبات مهده الكاب من فصيلة الزَّنْبَقِيَّات اسمه لَبَن الطَّيْر الإَشْقِيلانِيِّ (۱): Ornithogalum scilloides الإشقيلاني البَلَد في المحالات التي يُستعمَل فيها الإشقيل الحالات الّتي يُستعمَل فيها الإشقيل ذاتها، حتى أنّه يُعتبَر هناك تِرياق لجميع الأمراض.

خَلِّ الإشقيل (كودكس ١٩٣٧)، ١٠٠ (١) التَّسمية للمُؤلِّف.

أفل

 ٢٣- إشْنَان القلى، قلى، أبُو قابس، سلفًا لعدَّة ساعات بملح بَحري، أو مَطبُوخة حيث تُحَضَّر كالفاصوليا الخضراء أو اللُّوبياء. كانوا يستعملونه استعمال الصّائون ويستخرجون منه بالحريق والتَّرميد مِلح القَلي. نَبات هامّ

٢٤ - أُفْلُوس غارى، رَبَاطِيَّة غارِيَّة Laurestine, Wild baie tree, Wayfaring tree (E) Viorne tin, Laurier tin (F)

لاستثمار الأتربة والأوحال المالحة.

Lorbeerschlinge (D)

Viburnum tinus (S)

جَنْبَة ليفِيَّة مُعَمَّرة من فَصِيلَة الخَمانِيَّات تَعلو ٥ أمتار. أوراقُها دائمة، بَيضاويَّة الشُّكُل المُستطيل، كاملة، تَحمل أوبارًا على صفحاتها السُّفلي. الأذَّنات غير مَوجودة. أزهارها بيضاء اللُّون بسنَمات عِذْقِيَّة التَّجميع، قُطْر الزُّهرة ٥ ملم، تاجها خُماسيّ الفُصوص. ثلاث سمات لاطئة. مآبر دقيقة، كُرويّة الشُّكْل، بَيضاء اللّون، بارزة. الثُّمرة عُنيبة بيضاويّة الشُّكّل، وحيدة البزرة بالإخفاق، مُمَرَّكَة بثلم طُولِي، مُزْرَقَة اللّون الأسود عند نُضجها. ازهراره في آذار ونيسان في المناطق اللَّمنانيَّة الدَّغِلة الحُرجيَّة.

المُرَكِّبات - يَحتوي هٰذا الأُفْلُوس على جَوْهَر مُتَبلِّر تركيبُه الكيميائي C<sub>6</sub>H<sub>13</sub>O<sub>5</sub>، غير مُحَلَل كيماوي، يَنصهر عند ۱۸۱ °سغ، مُتَجازئ الكور سيتُول، عزله كلّ مِن البروفسور هارسّاي ويوارو

Glasswort, Saltwort, Marsh samphire (E) Salicorne, Salicorne herbacé, Salicorne d'Europe, Haricot de mer (F) Echtes glasschmalz, Salzkraut (D) Salicornia europæa, Salicornia herbacea (S)

نَبَات حَولي أَمْرَط مُنتَصِب خالِ من الأوراق من فَصِيلَة السَّوْمَقِيَّات يَعلو من ١٥ إلى ٤٠ سم. ساقُه فَرديّة، مُنتصبة، مَفصليّة، لَحميّة، مأكولة وهي فَتِيَّة، مُتفرِّعة القاعدة. طول سنابله الزَّهريَّة من ٨ إلى ٥٠ملم، ذات ٥ إلى ١٥ شُدْفَة زَهْريَّة. أزهارُه غير بارزة تمامًا، مُثْلَثَة، شبه مُتساوِيَة، في جَثُوات جانبيّة الارتكاز، براعمها الجانبيّة تكون مُلاصِقة للقاعدة فقط، البرعم الوَسَطِّي يَصل إلى ثلاثة أرباع الشُّدْفَة، غِلافاتها بَيضويّة الشُّكُل. سَداة واحدة عادةً، صَفراء اللُّون، بارزة المآبر. البزرة رَماديّة، مُنتصِبة، دقيقة الأوبار الزَّغَبيّة. يَرغب الملاحات والأراضى المالحة على السُّواحل المُتوسِّطيَّة والأطلَسيُّ.

المُرَكِّبات - فيتامِين «ث»، يُود، بروم، . . .

الخصائص - مُضادّ لداء الحَفَر، مُنَظِّم للغُدَّة الصَّمَّاء.

الاستعمال - حالات فَقْر الدّم، اضطر ابات غددية.

طريقة الاستعمال - سَلَطة، تُغطَّى

عام ١٩٣٦ وأطلقا عليه اسم Viburnitol.

نقيع أوراقه مُسهِّل.

٢٥ - إكسيرات Elixir (E) Élixirs (F) Heiltrank (D)

١- إكسير سَوْلَعِي طارد للحُمّى، إكسير ريكامييه

سَوْلُع ..... ٠٦.....٢ غ ۽ ع

٤ ١٥٠ رُوم

كحول ٨٠ درجة ....٢٠ غ

نَمرُث لمدّة ٢٤ ساعة. نُصفّى ونَحلّ في ماء التَّصفية:

سُولفات الكينا ..... ٢ غ

بخصائصه الطّبيّة عينها. سولفوريك. نُضيف أخيرًا:

لُودانُم سِيدِنْهَام .....غ

المقادير - مِلْعَقة صغيرة للأولاد ومِلْعَقة كبيرة للبالغين. ضِدّ الحُمّيات المُقلِعَة، العَصيَّة، وضِدّ مُختلِف آلام الأعصاب الوَجهيّة وعِرْق النّسا. إذا أضَفنا ٤ غرامات كولْشِسِيْن يُصبح لهذا الإكسير صالح جدًّا لمُحارَبة الرّوماتزم.

إنّ إكسير إيقَنْجاليسْتا الطّارد للحُمّى هو مَزيج مِن صِبغَة السَّوْلَع ومن شَراب الكينا السُّكّري.

## ٢- إكْسير طارد للدُّود

الخصائص - عُنيباته مُسهِّلة عنيفة. جَلَبَة ..... مُحمودُة .....١٥٠ غ صَمْع الصَّنوبر ....٨غ قِنْديد (ماء حياة) ..... نُمرِّر بَعد مُضيّ ٥ أيّام من المَرْث.

 ٢٦- أَكُونِيْت مُوَشَّم، أَكُونِيْت مُبَرْقَش (١) Variegated aconite (E) Aconit panaché, Aconit bigarré (F) Buntakonit (D) Aconitum variegatum (S)

مِن أنواع الأكُونيت الصَّيفِيَّة من فَصِيلة الحَوْذانِيَّات يَعلو ١٨٠سم. أزهارُه إلى اللُّون الأزْرَق البَنفسجيّ الَّتي تَنقلِب إلى الأزرق، يَتميَّز عن قاتِل النَّمر بساقه الطُّريَّة والمُتَفرِّعة، وهو يَنتشر مثله في الأماكن ذاتها تقريبًا، ويَتحلّى

يُؤخذ العَقّار من الجذور، Aconiti tubera في الفَرْماكوبيات المَخْزَنيّة، الّتي تُجْمَع أثناء الازهرار، وكذلك يُؤخذ من الأوراق تبعًا لبعض المؤلِّفين. إنَّ خصائص الأكونيت العلاجية والفر ماكولوجية تختلف تبعًا لمُختلِف الطُّرُق الَّتِي تَجْتَمِع فيها قِلَويداتها، لذلك يُفَضّل الكلام عن عمل العَقّار كَكُلّ بَدلًا منه عن إحدى موادِّه بشكل خاصّ. وفي كلّ حال إنّ سُمِّيَّة الأكونيت العالية جدًّا

<sup>(</sup>١) كلّ التَّسميات للمُؤلِّف ما عدا التَّسمية العربيَّة الأولى والتَّسمية اللاتينيَّة.

تَستوجب استعماله بحذر كبير جدًّا ٢٨- أَلْبيزيَة غِدِّيَّة (١) وبإشرافٍ طبِّيّ في كلّ حين.

٧٧- آلامِيَّة مُضَلِّعَة (١)، زَهْرَة الآلام

Quadrangular passion flower (E) Barbadine, Passiflore à tige carrée (F) Viereckigpassionsblume (D) Passiflora quadrangularis (S)

نَبات لِيفيّ عارش مُعمّر من فَصِيلَة الآلامِيّات(١). سَاقُه مُربّعة الزُّوايا، مُجنَّحة. أوراقُه سيطة، يَنضويّة الشَّكْل القَلبي، مُستدِقة الطّرف، مُعنّقة، مُزوّدة بأذَنتين عَريضتَيْن. أزهارُه عِطريّة، كبرة جدًّا، مُزنَّرة، وَرديّة إلى أرجُوانيّة اللُّون الوردي من صفحاتِها العُليا، مُستضّة الصَّفحات السُّفلي، خيوطُها بَيضاء وبَنفسجيّة. الثَّمرة مأكولة، كبيرة جدًّا مُتطاولة، طولُها ٢٥سم، قطرُها ١٥ سم. مَهدُه أمريكا الجَنوبيّة. يَتكاثر بسهولة بالبُزور والعُقل والتَّدْريخ.

الخصائص والاستعمال - الثَّمرة: لُبابها جيلاتيني، أبيض وسُكّري الطّعم، يَحضُن البُزور ويُوجَد في وسط فَجُوة الثَّمرة، وهو لُباب لذيذ جدًّا إذا أُضف إليه السُّكِّرِ. كذلك يُؤكلِ اللَّتِ مَطبوخًا إذا جُمِعت الثِّمار قَبْل نُضجها.

الجُذور سامّة تَشتهر على أنّها مُخدّرة شديدة الفِعْل.

Albizzia glandulosa (S) شُجَرة صغيرة من فصيلة القَرْيْتَات الفراشِيَّة تُشكل مجموعات صغيرة جدًّا في بعض مناطق كاليدونيا الجديدة.

أوراقُها غَنيَّة جدًّا بقِلُويْدات لم تُحدُّد

Glandular albizzia (E) Albizzie glanduleuse (F)

Drüsenalbizziabaum (D)

٧٩ - أَلْبِيْزِيَة مُتَثْبَبِّكَة الثَّمار (١)

طبيعتُها حتى اليَوم.

Intertwine fruit albizzia (E) Albizzie à fruits entrelacés (F) Verflochtenfrücht albizzia (D) Albizzia streptocarpa (S)

شُجَرة شائِعة في بعض غابات كاليدونيا من فَصِيلة القَرْنِيَّاتِ الفَراشِبَّة. أوراقُها غَنيّة جدًّا بقِلَويْدات لم تُحدّد طبيعتُها حتى النوم.

#### ٣٠- أَلْغ بَحْرَى Algues marines (F)

تُصنّف الألْغيّات البَح يّة حاليًّا كما

أ- أَلُّغ أَخْضَر Chlorophyceae (E) Chlorophycées, Algues vertes (F) Chlorophyceae (S)

من أجناسها: قُوشيبرا، أدُوغُونيوم(٢)،

<sup>(</sup>١) التَّسمية لإدوار غالب.

<sup>(</sup>٢) التَّسمية العربيَّة الثانية والتُّسميتان الإنجليزيَّة و الألمانيَّة للمُؤلِّف.

<sup>(</sup>١) كلِّ التَّسميات للمُؤلِّف ما عدا اللاتينيَّة.

<sup>(</sup>٢) التَّسمتان للمُؤلِّف.

Rhodophyceae (E) ج- اَلْغ أَحْمَر Floridées, Algues rouges, Rhodophycées (F) Rhodophyceae (S)

- كاراغاهين (المُعجَم الأوَّل، صفحة (١٤٠) أي قُندروس مُنْقَبِض (١٠)، وهو الحزاز الَّذي يُستعمَل كَمُجمِّد أو مُختِّر في التَّغذِية (مُجَمَّدات غِذائية، مُحلِّيات) كما يُستعمَل مُخلِّيات، ثَرائِد، مُربَّيات) كما يُستعمَل منذ زمن طويل كلُعاب في المُستحضرات الصَّدليّة...

- حَزاز کُورسیکا.

- الجاليديُوم (١) الذي يُعطي الأغار أغار وهو مُخثِّر مُجمِّد يُستعمَل في الصِّناعات الغِذائيَّة وفي الصَّيدليَّة.

- الرُّودِينانيا (١) Rhodynenia . . .

د- أَلْغ أَزْرَق (Cyanophyceae (E) رَوِّق (Cyanophyceae (F) (S)

مُلاحَظة: جاء في المَوسوعة في عُلوم الطَّبيعة: ﴿ أَلْغ ، أَلغِيَّات ، خُثّ ، خُثِيَّات . رُتْبَة من المَشرِيَّات عديدة الفصائل والأجناس والأنواع . سَمَّاها مَجْمَع مِصر الطَّحالب في حين أنّ كلمة طَحالِب تُعبِّر عن (Mousses) عن (Mousses) وقد سَمَّاها الأمير مُصطفى الشَّهابيّ أُشْنَة بينما الأُشْنَة هي (Usnée) كما ذَكرها الأمير نفسه . لذلك نَعتمد

Phaeophyceae (E) ب- أَلْغ بُنِّي Phéophycées, Algues brunes (F) Phaeophyceae (S)

وهي الأكْثَر استعمالًا، منها:

- فَوْقَسِيّات: فَوْقَس أَسْقُوفِيلُن (٢)، فَوْقَس حُويْصِلِيّ (المُعجَم الأوَّل، صفحة ١٢٧)، فَوْقَس قَرْنِيّ (٢)، وهي واسِعة الانتشار على شواطئ بَحر المانش الفرنسيّة والأطلنتيك. بعضُها يَدخل في الحِمْية الغِذائِيّة لَدى بعض شعوب الشَّرق الأقصى.

- لامِيناريّات: لامينارية سُكّريّة (المُعجَم الثاني، صفحة ٢٢١)، لامينارِيَة كُلُوسْتون (المُعجَم الثاني، صفحة ٢٢٣)، لامينارية مُتلُوِّية (المعجم الثالث، صفحة ١٩٨)، وهي أنواع يأكلها الصينيون وينسبون إليها خَصَائص طبيَّة ناعِظة. لُعابُها الغَنيّ يسمخ باستخراج مادة غروانية تدعى أَلْجِينِ تُستخدَم في تَحضير الأَلْجِينات وهي مُخَثِّرات أو مُكَثِّفات تُستعمَل في التَّغذِية (كريمات، فُرنِيّات فَوْريّة Flans، فطائر) وفي الصِّناعة (صناعة الغَرْل، البَرنيق، العَوازل الكَهْرِبائيّة . . . ) . من هذه الفَصيلة أيضًا الفَوْقَس العائِم (١) Varech nageur أو عِنَب البّحر الّذي يَكثُر في بَحر السَّرغَس

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

<sup>(</sup>١) التَّسمية لإدوار غالب.

<sup>(</sup>٢) التَّسمية للمُؤلِّف.

كلمة ألْغ وخُتْ.

يَخْتلِف تَركيب الألْغ تبعًا لفَترات السَّنَة. وما سَيُذكر أَدْناه ليس إلّا التَّركِيب الوسطيّ العامّ. أمّا لمزيد من التَّفاصيل فنلجأ إلى الدِّراسات الأُحادِيّة الخاصّة الّتي تتَعلَّق بهذا النَّوع أو ذاك.

الألْغِيّات تَغْترِف من البَحر الجَواهر التِي تَتَركَّب منها وتُكَثِّفها بنسبٍ تَختلِف باخيلاف الأنواع، تمامًا كما تَفعَل النَّباتات الأرْضيّة الّتي تَمْتَص من التُّربة العَناصر الّتي تُلائم طبيعتها. الألْغِيّات هي مُكَدِّسات الضَّرُوريَّات إلى جانِب مُركِّباتٍ أخرى كبيرة بحيث لُقبَّت وعن حق بمُكثِّف ماء البحر.

يَحتوي الألْغ ٨٠٪ وأكثر من وَزنِه على جُبَيْلة تبَيَّن أنّها مُدهِشة الغِنَى بالمَعادِن والأملاح المَعدِنيّة والقيتامينات والسَكاكِر والهَيُوليّات والمَواد الدُّهْنِيَّة والمَواد المُرْدِية (أنتي بيوتيك)... وتُوجد كاقَة هذه المَواد بنسب مُختلِفة، في النّبات المُجقَف المَسحوق والمُعَد للاستعماليْنِ الدَّخليّ والخارجيّ، باختلاف المُصنَّعين الّذين يَلجأون، كلَّ بطُرقه الخاصّة، إلى جَمْع الألْغ وتَجفيفه المَاكِبة وتَصنِيعه. أمّا المُركِّبات فهي التّالية بشكل عامّ:

١- مَعادِن وافرة (٢٤ إلى ٢٥٪)
 وضَروريّات بكمِّيّة هائِلة: - اليُود الذي
 تَحتوي منه بعضُ الألْغات أكثر بكثيرٍ
 من ماء البحر، ٤٠٠ إلى ٠٫٥ وحتى ١٪

من وزنها الجاف، بَينما يَحتوي منه ماء البحر على أقل من ٢ ملغ في كلّ ليتر. – البروم، ولكن بشكل مَعكوس إذ إنّ الألْغ يَحتوي منه أقلّ بكثير ممّا يَحتوي الماء، أي ١٠٠ إلى ١٠٠ ملغ من البروم في كلّ ليتر. – مَغنازيوم، بُوتاسيوم، صُوديوم، كُلسيوم، حَديد، ألمنيوم، مَنْغانيز، فُوسفور، كَبريت، كلُور، نُحاس، فُوسفور، كَبريت، كلُور، نُحاس، نيكل، صَوّان، قصدير، رُوبيديوم، بيزمُوت، زَرْنيخ، إثْمِد، لِيثيوم، بُور، بيزمُوت، زَرْنيخ، إثْمِد، لِيثيوم، بُور، بيرونسيوم، ساريوم، تيتان، ڤناديوم، رُخُون، كرپُتُن...

٣- حَوامِض أمِينِيَة: حامِض غُلُوتامِيك، سِسْتيْن، مَثْيُونين، لُوسِين، قالِين، لُوسِين، قالِين، ليزين، ليزين، حامِض أَسْپَارْتيك. . .

٤- مَواد سُكَّرية: مَنِّيتُول، أَلْغُولُوز،
 لامينارين... ومَواد دَسِمة.

٥- كلوروفيل أي يخضور، مُرَكَّب عُضوي - مَغْنازي يَسمَح للألْغ

الغ

بامتِصاص الطّاقة الضَّوئيّة لكي يُفَبْرِك المَوادِّ التي يُمكِن للحَيوانات من تَمثُّلها. وقد يَترافق هذا الكلوروفيل أحيانًا مع خضاباتٍ أخرى مُختلِفة، منها البُنِّي، والأزرق، والأحمر... التي لها العمل نفسه.

7- مَواد لُعابية، خاصة في أنواع الفَوْقَس، والقُنْدروس أي الكاراغاهين: ٧٠ إلى ٧٥٪، والجاليديوم الّذي يُعطي الأغار أغار. إنّ هذه الأجسام هي غَنية بمختلف المَعادِن كالبُوتاسيوم والكلسيوم والمَعْنازيوم والصُّوديوم، إلخ.

٧- مَواد مُرْدِية أي أنْتي بيوتيك. الكلُوريل الشائع (۱) Chlorella vulgaris والكلوريل Chlorella pyrenoidosa (من الأَلْغِيّات الخضر الوحيدة الخَليّة) تُنَّتِج الكلورَلْين: Chlorelline الفَعّال على المُكَوَّرَة العُنْقُودِيّة المُذَهَّبة، وعلى المُكَوَّرَة العُنْقُودِيّة الاحْتراريّة؛ أمّا النَّوع بُوَالِيَة طَحْلاء (١) Buellia canescens فَتُعطى الدِيپْلُويسِيْن. أنواعٌ عديدة من الحَزازَ Lichens تُعطي مَوادَّ مُرْدِية. أمَّا بَعض أنواع الكلاذُونِيَة (١) Cladonia وحزاز إسلندة فتعطي الحامض الأَشْنيّ. . ويَعتقِد بعضُ العُلماء أنّ وجود الألُّغ المِجْهريّ في ماء البحر هو الّذي يُكسِب هذا الماء خصائصه المُسِدة للبكت ما وخصائصه اللائمة.

٨- سَلُّولُوز من ٦ إلى ١٢٪، وهي

كمِّية ضَعيفة جدًّا بالنِّسبة لمجموع المُركِّبات الأخرى. يَنْجُم عن ذلك غِنَى الأُنْغِيَّات المُنْهِل بالجَواهر الفَعّالَة.

- أُطلُب الخَصائص والاستِعمال (في المُعجَم الخامس، ص٢٦).

## ٣١- أَلْوَة الحَبَشة، أَلْوَة أَنِيْقَة (١)

Abyssinian aloe, Elegant aloe (E) Aloès d'Érythrée, Aloès élégant (F) Abessinischaloë, Schmuckaloë (D) Aloë abyssinca, Aloë camperi, Aloë elegans, Aloë peacockii (S)

نَبات نَجمي من فَصِيلَة الزَّنْبَقِيَّات يَعلو من ٢٠ إلى ٢٥سم. أوراقُه ضُمَّة كثيفة، حُسامِيّة الشَّكل، مُتَلوِّية مُسنَّنة، فاتحة اللَّون الأخضر، أسنائها مُحمرَّة اللَّون. ازهرارُه مُتَفرِّع، في عُنقود كثيف. أزهارُه صَفراء، من شُباط إلى نيسان. وهو من الأنواع الرَّئيسِيَّة التي تَهُمّ العَطَّار. عُصارة الأوراق تُركَّز وتُجفَّف.

المُركِّبات - العُصارة تَحتوي على عددٍ كبير من المَواد الأنْتراسانيكيّة Anthraceniques ، وعلى زَيت دُهنيّ، ومَواد راتِنجيّة .

الخصائص والاستعمال - الألْوة بمقادير خَفيفة هي مُقوِّية مُرَّة، مُنشِّطة للشَّهيَّة، مُدرَّة للصَّفراء؛ بمقادير أقوى تُصبِح مُسهِّلة، إلّا أنّه يَجب الحَذَر من احتمال التَّعوُّد أو الإدمان عند الّذي يَتعاطاها.

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

<sup>(</sup>١) كل التَّسميات للمُؤلِّف ما عدا الفرنسيَّة الأولى، والتَّسميات اللاتينيَّة.

الألْوَة من الخارج تُعالِج التهابات الأَدْمَة أو تَقَرُّحات البَشرة. وهي تَتَميَّز بعملٍ مُثَبِّتٍ للبكتيريا والجراثيم Bactériostatique.

(۱) مَرُوس عَقْرَبِيّ، كُورُونِيلًا عَقْرَبِيّة (۲۳ امْرُوس عَقْرَبِيّة (۲۳ Scorpioïd coronilla (E)
Coronille scorpioïde (F)
Skorpionkronwicke (D)
Coronilla scorpioides, Ornithopus scor-

pioides (S)

نبات حَوْلِيّ أَمْرَط بَحرِيّ اللّون من فَصِيلَة القَرْنِيَّات الفَراشِيَّة يَعلو من ١٠ الله السّوق الباقية مُنبسِطة. أَذَناتُه مُتَجِدة السّوق الباقية مُنبسِطة. أَذَناتُه مُتَجِدة بواحدة، صغيرة، مُقابلة للأوراق. أوراقُه مُؤلَّفة من ثلاث وُريقات لَحميَّة، مُنفاوِتة جدًّا، اثنتان جانبيَّتان صغيرتان، مُنفوجة، مُنفرِجة، مُنفرِجة، صغيرة السُّويْقة أطول أو أقصر بقليل فرديَّة أحيانًا، بيضاوِيَّة، مُنفرِجة، صغيرة من تلك الورقة، تَحمل ٢ إلى ٤ زَهرات من تلك الورقة، تَحمل ٢ إلى ٤ زَهرات صفراء اللَّون، صغيرة، ٥ ملم كحد صفراء اللَّون، صغيرة، ٥ ملم كحد شبه مضغوطة، رُباعيّة الزَّوايا، بالكاد شبه مضغوطة، رُباعيّة الزَّوايا، بالكاد تضيق بين البزور. بزوره شديدة المرارة.

المُركِّبات - هيتروسيد غير أزوتيّ يُدعى كُورُونيلِّين عَزَلهُ عام ١٩٨٨ كلُّ من شلاغْدَنْهُوفَّن وراب ونُصِح به لمُعالجة الإصابات القَلبيَّة، جَوهر

عِطريّ يُذكِّر برائحة الكُومارين. من السنزرة عَزَل تانْرِيه عام ٩٣٣ مادَّة الكُورُوفيلُّوسِيد وهي هيتروسيد مُتَبلِّر لا يَنْشَطِر بالاسْتِحْلاب ولكنّه يَنْشَطِر بسائل الأسْپَرْجِيلُوس فَيُعطي بذلك كُورُونيليجانِيْن. البزور تَحتوي أيضًا على ٤ إلى ٥٪ من الزَّيت.

الخصائص - الكُورُونيلِّين هو مَزيج عِدَّة هيتروسيدات مُقوِّية للقَلْب.

طريقة الاستعمال - من ٠,٢٠ إلى ٢,٠ غرام كُورُونِيلِّين في اليوم. المُستخلَص بمقدار ٢,٠١ غرام والصِّبْغة بمقدار غرام واحد إلى غرامين في اليوم.

۳۳- أنْدروبُوغُن أَهْلَب (۱<sup>°)</sup>، بُوركيبَة Andropogon hérissé, Andropogon hirsute (F) Andropogon hirtus, Hyparrhenia hirta, Andropogon hirtus var. pubescens (S)

نَبات مُعمَّر من فَصِيلَة النَّجيلِيَّات وَصَباتُه مَرْطاء، مُنتصبة، تَعلو من ٤٠ إلى ١٢٠سم. نِصالُه خَطِّيَة الشَّكل الضَّيِّق، بَحرِيّة اللَّون ما عدا قواعدها، غالبًا ما تكون مُهَدَّبة الحَواشي الخَشِنة. غثاكلُه من ١٠ إلى ٣٠سم، مُؤلَّفة من طَبقة واحدة إلى أربع طبقات من الفُروع الفَردِيَّة أو الثُّنائيَّة الثُّلاثيّة التَّجميع، فُريعاتُه تَنتهي بعُنقودَيْن سُنْبُلِيَّيَ الشَّكل. أقسام وزُنَيْدات هٰذه العَناقيد طويلة الأوبار على أحد وُجوهها. السُّنَيْبلات الأوبار على أحد وُجوهها. السُّنَيْبلات لاطِئة خَطيَّة مُتطاوِلة يَبلغ طولُها حَوالى لاطِئة خَطيَّة مُتطاوِلة يَبلغ طولُها حَوالى

 <sup>(</sup>١) كل التَّسميات للمُؤلِّف ما عدا التَّسميات اللّاتينيَّة.

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

٥ملم، غالبًا ما تكون مُحْمَرَّة اللَّون. ٣٥- أنيلين، فانيلامين، النَّيْل، فانيل العُصْفات مُتساوية، السُّفلي منها ذات ١١-٩ عرقًا، العُليا ثُلاثية العُروق، طويلة الأهداب. السُّنَيْبلات المُزنَّدة ذَكريّة. الضَّرْب الزَّغِب var. pubescens أوراقُه أَضْيَق وعُثكولُه أقلّ تَفرُّعًا، وهو الغالب الانتشار في الشَّرق الأوسط.

> الخصائص - ذَكَر الدّكتور يُوكف أنّ لِنقيع الجُذور خصائص مُبوِّلَة يلجأ إليها التَّدَاوي الشَّعبيِّ التُّونِسيِّ.

> ٣٤- أنِيْسُون فلُورِيدا النَّجْمِي، بَدْيان Florida star anis tree (E) Badianier de Floride (F) Florida sternanisbaum, Florida badianenbaum (D) Illicium floridanum (S)

> شُجَيْرة من فصلة المَغْنُولِتات تَعلو من ١٣٠ إلى ١٦٠سم. أوراقُها دائمة، سِنانيّة الشَّكل، حادَّة الرّأس. أزهارُها عديدة، مُتدلِّية، نُنِّيَّة اللُّون الأحمر، قويَّة الرّائحة، تُذكِّر برائحة الكُزْيَرَة، تُنَوِّر من نيسان إلى أتار. ثمارها نَجميّة الشَّكل، عَذْبة الرّائحة، سامّة. وهو من الأنواع المُستعملة في الولايات المُتَّحدة الأمريكيّة.

مُلاحَظة - إنّ ما يُسمّى «هَاوْفُوش» Haofoch هي قِشْرة برائحة البَدْيان يُقدِّرها الأَنَّامِيُّون Annamites جدًّا ضد المَغْص والديسنتبريا.

 $C_6H_5-NH_2 = 93.1$ 

حَصَل عَليه أَنْفَر دُربَن Unverdorben لأوَّل مرَّة عام ١٨٢٦ في قُطارَة النِّيْلَة (Anil) كُلْمة بُرْتُغاليّة تَعنى نِيْلَة Anil). رُونْج Runge كَشف عن وُجودِه في قَطِران الفَحْم الحَجريّ. وهو يُوجد كذلك في الزُّيُوت الحاصِلة من تَقطير المَوادّ الحَيوانيّة، وبنوع خاصّ في زيت دِيبًل الحَيوانيّ إلى جانب البيرُول. وقد يُوجد الأنيلين أيضًا في بَعض الفُطور، كالهُرْنُوع النِّيليّ Boletus cyanescens والهُرْنُوع الخَبيث Boletus luridus، وهما فطران يتلون لحمهما الداخلي باللُّون الأزرَق بمُلامَسة الهواء. يُحضُّر الأنيلين صناعيًا بكمِّيات كبيرة بهدف صنع المواد المُلوِّنة الاصطناعية.

المُواصَفات - الأنيلين النَّقي هو سائل زَيتيّ، عَديم اللُّون، يَتَبلّر عند ٨°سغ دون الصِّفر، يَغلى عند ١٨٣,٥ "سغ، كثافته ١,٠٢٦، يَذوب في مِقدار ٣١ جزءًا من الماء عند ١٢ سغ، يَذُوبِ جِدًّا في الكحول، الأثير، وفي الكَرْبُورات الهيدروجينية. وهو يُحلِّ الفُوسفور، والكبريت، والكافور، والنَّيْلَة. خَفيف القِلُويّة على ورق دَوّار المحلول. وإذا كان غير نقى فإنه يصطبغ باللون الأسمر بمُلامَسة الهواء ويترَنْنج (١) Se résinifier.

أمُو نياك Aniline (E) Aniline, Phénylamine (F)

<sup>(</sup>١) التَّسمة للمُؤلِّف.

المَواد المُؤكسِدَة تُحوِّله إلى كِينُون دُولِم المَواد المُؤكسِدَة تُحوِّله إلى كِينُون دُولِم دُولِم من ثمّ إلى أخضر فأزرق فبنفسجيّ فإلى أسود الأنيلين. مع الكلوروفورم والقِلَى يُعطي الفَنِيل كَرْبِيْلامين CN-C<sub>6</sub>H<sub>5</sub> ذو الرّائحة المُنَفَّة.

السُّمِّيَة - الأنيلين وأملاحُه سامّة جدًّا. ويُترجَم تَسمُّم العُمّال الَّذين يَتعرَّضُون لأبخرته بالخَذَل والشَّلَل النّاقص Parésie والقُشَعْريرات والارتعاشات واليَرَقان الخفيف والارتعاشات واليَرَقان الخفيف البَحْمُوريّة.

الاستعمال - الأنيلين، كما هو، غير مستعمل طبيًّا. وكان بُولاي Bolley ينصح بالماء الأنيليّ أحيانًا كترياق ضِدّ الكلور. إلّ أنّ بَعض مُشتقّاته وبَعض المَوادّ المُلوّنة المُشتقَّة منه شائعة الاستعمال، مِثال: أسِيتالِنيد، فيناسِتِين...

### اِهْلِيْلَج لَوْزِيّ، لَوْز هِنْدِيّ Indian almond tree, Country almond (E) Badamier, Amandier des Indes (F) Catappenbaum (D)

Terminalia catappa (S)

الإهليلَج جنس أشجار أو شُجَيرات من فصيلَة الإهليلَجِيّات مَنْبتُها الهند وجاوا والأنْتيل وسَرَنْدِيب والسّنغال. سُوقُها مُنتصِبة، أغصانُها فرعاء، قُشورها مَلساء، أوراقُها دائمة، مُتعاقِبة، مُعنَّقة، كاملة، مِلْعَقِيَّة الشَّكل، قاتمة اللَّون

الأخضر. أزهارُها ضُمِّية أو سُنبُليّة التَّجميع، إبطيّة الارتكاز، خضراء أو بيضاء اللّون، صغيرة القدّ. ثمارُها لَوزيّة لُبِيّة عَجميّة. الإهليلَج اللَّوزيِّ شَجَرة كبيرة مَهدها ماليزيا وآسيا الاستوائيّة، أزهارها بيضاء، تَشيع زراعتُها في الحدائق. لوزتُها زَيتيّة مأكولة.

المُركِّبات - لوزة مأكولة تُعطي زيتًا يُدعى الزَّيت الهنديِّ.

الخصائص - قابضة، طاردة للحُمّى، مُضادّة للإسهال، مُعرِّقة، نافعة للمعدة والأمعاء، مُضادّة للرّوماتيزم، نافعة للكَد.

الاستعمال - الأوراق والقُشور والثِّمار قابضة، طاردة للحُمّى، مُضادَّة للإسهال. بالإضافة إلى ذلك، الأوراق مُعرِّقة ومُضادَّة للرّوماتيزم؛ كما أنّها تُستعمَل لمُعالَجة بعض إصابات المعِدة والأمعاء وبعض الإصابات الكَبديّة.

# ٣٧- أوراشيت مُنْتَصِب (١)

Uréchite dressée (F) Urechites suberecta (S)

نَبات من فَصِيلَة الدِّفْلِيَّات يَنبت في الجماييك.

يَقُولُ سُتُوكُمان إِنَّ أُوراقه تَحتوي على هيتروسيد قابل للتَّبلُّر يُدعى أوراشِيتين، يَحمل كالدِّيجيتال، وعملى أوراشُوتُوكُسين.

1 و ر

<sup>(</sup>١) التَّسميتان العربيَّة والفرنسيَّة للمُؤلِّف.

1 و ز

الأوراشيتين سامٌ؛ فهو يُحدِث تَقيُّوات، وضَعفًا عَضَليًّا، وتَباطؤًا في القَلْب وعدم انتظام في خَفَقانه. الأوراشوتوكسين هو سمّ القَلْب ولكنّه أقلّ سُمِّية من الأوراشيتين، ومع ذلك فإنّ عمله قليل الاختلاف عنه.

# ۳۸ أوزارا، يُوزارا (۱۱)

جَنْبَة مهدها أفريقيا الشَّرقيَّة نُسِبَت في يَعمل أيضًا كمُقوِّ للقَلْبَ بواسطة أوّل الأمر إلى نَوع Diacoma anomala الأُوزارِيْن كريْن الامر إلى نَوع Diacoma anomala الأُوزارِيْن المُركَبات، ومن ثمّ نُسِبت مُتبلِّر عزله هانيِّغ، جانِيْنُه (Génine) قد اليوم إلى جنس شِقْدَة أي Gomphocarpus يكون مُتَجازِئ الجَيتُوكْسِي جانين ومنه نَوع Xyomalabium undulatum، أو

إلى جنس كلوروكُودُن (۱) Chlorocodon من فَصِيلَة الصُّقْلابِيَّات.

إنّ لهذا العَقّار يُستعمَل في الطّبّ كَمُضادٌ للدِّيسنتيريا وكمُضادٌ للإسهال، بالرِّغم من أنّه يَتَحلّى بخصائص مُقوِّية للقَلْب. مُستخلَصه يَزيد حَظْرَبَة الأمعاء ويُوقف تَقلُّصاتها؛ ويُقلِّص أو يُقبِّض الرَّحِم ويَرفع التَّوتُّر الشِّريانيّ. كما أنّه يَعمل أيضًا كمُقوِّ للقَلْب بواسطة الأوزارِيْن كما أنه الأوزارِيْن كما مُتبلًر عزله هانيّغ، جانيْنُه (Génine) قد يكون مُتجازِئ الجَيتُوكْسِي جانين يكون مُتجازِئ الجَيتُوكْسِي جانين Gitoxygénine

رائحة البّنفسج.

تتَحَلّى لهذه القِشرة، حسب ريمون هاميت، بخصائص سَمْپَاتيكوليتيك مُماثِلة لخصائص الكينا.



Pao-Pereira (E) (۱) عَاوْبِيرِيْرَ ا Pao-Pereira (F) Geissospermum vellozii, Pereira (S)

الباوبيريرا هو لحاء طارد للحُمَّى من شَجَرة من فَصِيلَة الدِّفْلِيَّات باسقة جدًّا تَبت على الجبال في عِدَّة مُقاطعات من البرازيل. قِشرة سميكة ومُتشقِّقة بغير انتظام، مُرَّة الطَّعم، تُستعمَل ضِدَّ الحُمَّيات المُقلِعة، في البرازيل عامّة وفي ريو دي جنيرو خاصّة، في نقيع ٣٠ بالألف.

عام ۱۸۷۷ استخرج منها بُوشْفُونتان قِلَویدًا عدیم الشَّکُل، بُنِّیِ اللَّون الأصفر، أُطلق علیه اسم جَایْسُوسْپَرْمِیْن الأصفر، أُطلق علیه اسم جَایْسُوسْپَرْمِیْن والمحصر المحصر المحصر المحصر المحصر المحصر المحصر المحصر المحصر اللَّون، وهی مادّة تَرافق مع مادّة تُدعی الشّکل، مُخضَرَّة اللَّون الأبیض، قلیلة النَّوبان فی الماء، تَذوب فی الکحول، والذی یُکسِبه الحامِض السّولفوریك والذی یُکسِبه الحامِض السّولفوریك

(١) التَّسمة للمُؤلِّف.

٤٠ بَبَاظ زراعي، كَرِيْكَة بَبّايا، دَبّاء الهند، عَجور أَفْرِيقي، عِنَب هِنْدي

الهند، عجور افريقيّ، عنب هنديّ Papaya, Papaw apple, Melon tree (E) Papayer, Arbre de melon, Figuier des îles, Figuiers des nègres (F) Papayabaum, Melonenbaum (D) Carica papaya, Papaya carica (S)

شَجَرة ثُنائيّة المَسكن مَهدها ماليزيا من فَصِيلَة البَبَّايَاوِيَّات تَنتشر عن طريق الزِّراعة في مُعظم المناطق الاستوائيّة. وهي تَنجح جيِّدًا في لُبنان. عَصير ثمارها اللَبنيّ أُعيد تسجيله في الفَرْ ماكوبيا الفَرنسيّة الحديثة.

المُركِّبات والخصائص - تَحتوي الثَّمرة، ككل أقسام النَّبات، على لَبَن مُبْيَض اللَّون، بإمكانه أن يَجمد بالتَّبخير. إنّ هٰذا اللَّبن يَحصل من شبكة نامية جدًّا من لاثِيَات أي مُحَلببات مُسْاهَدة مُتلاحِمة مُتواصِلة مع بعضها، تمكن مُشاهَدتها في الثَّمار، وفي القِشرة واللَّب والأعناق والعُروق الوَرقية.

كذلك أثبت غينيار، عام ١٨٩٤، وجود خلايا فيها ميروزين Myrosine في مُختلِف أعضاء النَّبات، وخلايا أخرى تَحتوي على ميروزينات البُوتاسيوم أو على هيتروسيد مُكَبْرَت مُماثل:

ں ں ا

الكاريسين. إنّ الخميرة والهيتروسيد، وبفضل تَفاعُل مُتبادَل، يُعطيان دُهنًا رائحته لاذِعة مَرَدُها إلى وجود السانَقُول.

بالإضافة إلى ذلك، إنّ الأوراق والثّمار وبُزورها تَحتوي على قِلَوِيْد يُدعى كَيْرايين Capraïne، اكتشفه غريشوف عام ١٨٩١، ومن ثمّ درسه قان رُون؛ وهو قِلَويد لا يَذوب في الماء، ينصهر عند ١٢١°سغ، قابِل للتّبلّر، يَذوب في مُعظم الحالات العُضويَة، ومَوهوبٌ بعمل مُبْطئ على القلّب.

وقد أشار قوكلان منذ العام ۱۸۰۲ إلى وجود جواهر مُنتْرَجَة في اللَّبن؛ ووجد فيه ويتْماك، عام ۱۸۹۸، خميرة حالة للهَيُولينات Protéolytique دعاها بيكُولْت پَاپَايُوتين، ومن ثمَّ دَعاها وُوْرْتز وبوشوت، عام ۱۸۷۰، پَاپَايين.

وقد أشار هؤلاء إلى تَنقِية الخميرة وتكريرها بواسطة تركيز اللَّبَن، ترسيبًا بالكحول، وإعادة حلِّ بالماء ومن ثُمَّ تَجفيفًا. يُمكِننا اليوم الحصول على پاپايين مُنقَّى وفَعّال جدًّا بواسطة المَيْز. يُعزل كذلك من شَجَرة البَبَاظ ما يُدعى (Chymopapaine).

٤١- بَخُور مَرْيَم، سِيكلامَن فَارِسيّ، سُكَع، زَهْر المسيح، عَرْطَنِيْتَا، بُقْلامُس، وَلْف، خُبْر المَشايخ، رِكْفَة، يُرْبُع

Persan cyclamen (E)

Cyclamen de Perse, Cyclamen à larges feuilles (F)

Persisch cyclamenveilchen (D)

Cyclamen persicum, C.hederæfolium, C.latifolium, C. macrophyllum, C. pyrolæfolium, C. punicum (S)

دَرَنَة مُعَمَّرة من فَصِيلَة الرَّبيعِيَّات قَليلة العُمُق أو ظاهرة فَوق التُّربة أحيانًا، فاتحة اللُّون، واضحة الشُّكل المُستدير، قد تُرسِل عَشرات الأزهار. أوراقها بيضاوية المُحيط الدّائري، قَلبيّة القاعدة، مُخَفَّفة الرَّأس إلى مُثلَّث شِبه حادّ أحيانًا، وهي لا تَظهر إلّا بعد بروز الأزهار الأولى. حافتها في انحناء مُتَتالِ قليل التَّموُّج واضح التَّسْنِينِ. صَفحة الأوراق العُليا خضراء اللُّون تَتَخلَّلها بُقعٌ فاتحة؛ الصَّفحة السُّفلي قاتمة اللُّون الأرجوانيّ. قياسات الأوراق مُختلِفة قد تَطول ١٢سم وتعرض ١٠سم. الشَّماريخ مُنتصِبة تَعلو من ١٠ إلى ٣٠سم أو أكثر. التّاج أيضًا مُختلِف القياسات، فصوصه سنتمتران بشكل عام، أو من ١ إلى ٣سم بشكل خاص، سنانية إهليلجية لونها إلى الأبيض الناصع فالوردي فالأرجوانيّ القاتم، مع بُقعة قاتمة على عُنُقها. الثَّمرة غير مُحاطَة بلَوْلَبات الشِّمراخ كما هو الحال في سِيكلامَن لُبنان والقُصّ. يُزهِر من تشرين الأوّل إلى أيّار.

اَنْرْتِيمُو (۱) البرازيل، بَرْباتيماو البرازيل، بَرْباتيماو البرازيل، المودد (۱۳ المودد) المودد (۱۳ المودد المود

Pithecolobium anareinotemo (S)

عام ١٩٧٥ أُعيد إلى الفَرْماكوبيا الفَرنسيّة إدْراجُ قِشرة بَرْباتيماو البرازيل، بالإضافَة إلى قُشور الإنْغا الأخرى.

الخصائص والاستعمال - قُسُور الإنغا يَستعملُها البرازيليُّون لصَبْغ الجلد، وكذلك لتَنْقيص وتصغير الفَتْقات، ولـمُعالَجة حالات النَّزيف، والإسهالات، وسَيلان المَهْبِل، إلخ. العاهِرات والمُومِسات يَستعمِلْن نَقيع القِشرة المَغليّة لتَثبيت لُحومِهنّ وتَقويتها؛ إنّ هٰذه الخاصّة الأخيرة أكسَبَت القِشرة اسم قِشرة الشَّباب أكسَبَت القِشرة اسم قِشرة العُذْرِيّة Écorce de virginité

الله بَرُواق أَبْيَض ، سَرِيْش أَبْيَض – ٤٣ White asphodel, White king's rod (E) Asphodèle blanc, Poireau de chien (F) Weisserkaïseraffodill, Weisserkaïserscepter (D) Asphodelus albus (S)

نَبات بَرِّي من فَصِيلَة الزَّنْبَقِيَّات يَتَميَّز بسُوقه الزَّهْرِيَّة غير المُتفرِّعة (بَعضُ الفروع القاعديّة القصيرة أحيانًا) وبسنابله البسيطة، المُتراصّة، الكبيرة

الأزهار البيضاء. بَتَلاتُه يَبلغ طولها برو سسم، بيضاء اللَّون، بُنِّيَة العُروق. سسم، بيضاء اللَّون البُنِّي، تَحمل أزهارًا سِنانيّة. الثَّمرة كبيرة طولها م، اسم جُذورُه ضُمّات مُتدرِّنة. يَرغب الأماكن الجافّة والمُروج والأدغال والرَّاوبي.

الخصائص - مُبَوِّل، مُليِّن، مُضادَّ للنَّزلات، شافٍ للجُرح، مُضادَّ للقُرحات والتَّنفُط وطَفْح البَشَرة والحُمامي والطَّفْح الوَرديّ.

طريقة الاستعمال - مُسحوق الدَّرنات المُجفِّفة، نصف مِلْعَقة إلى مِلْعَقة صغيرة، ٢ إلى ٣ مَرّات في اليوم، مع شراب ما. نَقيع ٥٠ غرام دَرنات مُجفَّفة ومُكسَّرة في ليتر ماء يُغلى دقائق ويُغطَّى ربع ساعة ويُؤخَذ منه ٥ إلى ٦ فَناجين صغيرة خلال النَّهار. صِبْغة كحُوليّة يُؤخَذ منها ١٥ إلى ٢٠ نُقْطَة، ٣ مَرّات في اليوم مع قليل من الماء. من الخارج نقيع ١٠٠ غرام من الدَّرنات المُجفَّفة في ليتر ماء يُغلى دقائق ويُستخدَم في كمادات وغسيل القُرحات والحُمامي والطَّفْح الوردي المُتَسبِّب عن الشَّمس والتَّنفُط والطُّفْح الوَرديّ وسواه من المشاكل الجِلديّة بشكل عامّ. مُستحضراتُه تُمنَع عن المُصابين بالتهاب المَعِدة والأمعاء وعن مَرْضَى الكلية. درناتُه كانت تُؤكّل تعد طبخها.

<sup>(</sup>١) التَّسميتان للمُؤلَّف.

. . .

(۱) آرُواق ناسُورِيّ، سَرِيْش ناسوريّ Fistulous asphodel, King's rod fistulosous (E)

Asphodèle fistuleux, Bâton royal fistuleux (F)

Fistelartig Kaïseraffodill, Fistelartig kaïserscepter (D)

Asphodelus fistulosus (S)

نَبات مُعمَّر أو مُحول أحيانًا من فَصِيلة الزَّنْبَقِيَّات. أرُومتُه شِبه دَرنِيّة وبُضمّات ريزُومِيَّة عمومًا؛ جُذورُه ضُمِّية، أسطوانية، غليظة. أوراقُه خَطِّية، في ضُمَّة كثيفة، نِصف أسطوانيّة، شِبه ثُلاثيَّة الزُّوايا، مُحزَّزة مُنتصبة. ساقُه الزَّهريّة وحيدةٌ عادةً في كلّ ضُمَّة من الأوراق، تَعلو ٣٠سم، هزيلة، مالِسة، ناسُورية. الازهرار في عُثكول فروعه مُتطاوِلة، مُنسطة - مُنتصة. قُنّاباتُه رقيقة وشفّافة، عرقُها أخضر اللُّون. الأزهار نهاريّة تَنْغَلِق مُتأخِّرة في اللّيل. غِلاف الزَّهرة أبيض إلى الأبيض المُتَورِّد، يُزيِّنه شريط أخضر أو أرجُواني. الأسدية سِتّة أقصر من الغِلاف، غير مُتساوية تمامًا. الثَّمرة عُلَيْبَة شِيه كُرُويَّة.

الاستعمال - درنات البَرْوَق عمومًا تُؤكَل بَعد سَلْقِها بالماء والمِلح. كما أنّه بالإمكان استخدامُها لصُنْع الكُحول أو في تَغذِية الخَنازير.

10- برومهیدرات الکُونین، برومهیدرات السیکوتین، برومهیدرات الکُونیسِین Bromhydrate de conine, Bromhydrate de cicutine, Bromhydrate de conicine (F)

 $C_8H_{17}N$ , HBr = 208,1.

التّحضير - الكُونِين هو أحد قِلَوِيْدات الشُوكران. نُحضِّر برومهيدرات الكُونين كما يَلي: نَحُل ١٠٠ غرامات من السّيكوتين في ١٠٠ غرام أثير مَخْزَنيّ، نُوصِل إلى عُمْق القُمْقُم أو القارورة الحاوِية هذا المحلول، والمُحاطَة بالماء البارد، مَجرًى من حامِض البرومهيدريك الغازيّ الجافّ. إنّ البرومهيدرات التي لا تذوب بالأثير تَرْشُب على شكل بلّورات تذوب بالأثير تَرْشُب على شكل بلّورات في مِحَمِّ فاتر، بَعد أن نَعسلها بالأثير. في مِحَمِّ فاتر، بَعد أن نَعسلها بالأثير. التّبخير الطّوعيّ لمحلولها المائيّ المُشْبَع على البارد، وبالحرارة العاديّة السّائدة.

التأثيرات العِلاجِيّة - مَوْضِعيًّا يَكُونَ السَّيكوتين مُهيِّج جدًّا ويُمكِنه إحداث النَّخَر Sphacèle، أي المَوت المَوضعيّ الذي يَحُلِّ بالنَّسيج الحَيِّ.

من الدّاخل يَعمل السِّيكوتين بَشلّ أطراف الأعْصاب المُحرِّكة على طريقة الكُورار، إلّا أنّه لا يُوفِّر الأعْصاب المُبْهَمَة Les pneumogastriques، كما يفعل هذا الأخير.

مَقاديرُه الخَفيفة تُسبِّب الخَدَر والخَبَل والذُّهول Engourdissement المَصحوب بالتَّرَنُّح والتَّمايُل Titubation، وتَخَوُّر عُشْر ۱/۱۰ إلى خَمْسة أعْشار ۱/۱۰ من الملّغرام عن طَريق الفَم.

ب ز ر

سام - جدول Toxique - Tableau A

٤٦ - برُوميلايِيْن، اكْستراناز Bromélaïne (F)

البروميلايين هي خَمائر مُحَلْمِئَة (أي تُحلِّل الهَيُولينات بالماء) Protéolytique، مُضادّة للالتهابات تُستخرَج من الأناناس مُضادّة للالتهابات تُستخرَج من الأناناس البرُوْمَالِيَّات أو الأنناسِيَّات. تُعرَض هٰذه الخمائر على شكل مَضغوطات مُلَبَّسة تَحتوي كلّ منها على ٥٠٠٠٠ وِحْدة رُوق.

الخصائص - تَقليل وإنقاص الأوديما الالتهابيّ.

المقادير - بالغون: ٣ مَضغوطات، ٣ مَرّات في اليوم.

أولاد: من ٣٠ شهرًا إلى ١٥ سنة: نِصف المقدار.

البَر اغِيْث، حَشِيْشَة البَر اغِيْث، حَشِيْشَة البَر اغِيْث، حَشِيْشَة البَر اغِيْث، حَشِيْشَة البَر اغِيْث البَر اغِيْث Plantain neyllium Psyllium Psyllium

Plantain psyllium, Psyllium, Psyllium vrai, Psyllion, Pucière, Pulicaire, Herbe aux puces (F)

Flohwegerich (D)

Plantago psyllium, Plantago afra L. 1762. (S)

نَبات حَوليّ زَغَبيّ غِدِّيّ، أَقَلُه في قسمه العُلوي، من فَصِيلَة الحَمَلِيَّات. قَدُّه ونُمُوُّه

السّاقَيْن، واضطرابات النَّظر، وتَوسُّع البُوبو Mydriase، بمقادير مُرتَفِعة يُحدِث إفراطًا في الارتكاسات Réflexes وردود الفعل اللّاإراديّة، ورَجْفات، ونتور الحرارة Hypothermie (أي نُزول حرارة الجسم إلى ما دون الحرارة الطبيعيَّة) مع إحساس ببرد جَليديّ، ومع الحفاظ على الذَّكاء (مَوْت سُقراط)؛ يُباغِت المَوْت فجأة بالاخْتِناق المُتسبِّب عن شَلَل العَضَلات التَّنفُسيَّة، حَيث يَكمُن فَعالية التَّنفُس الاصْطناعيّ تَكمُن فَعالية التَّنفُس الاصْطناعيّ للمُقاوَمة ضِد تَأثيرات هٰذا السَّم.

السِّيكوتين مُجْفِر (مُفْقِد شَهْوَة الجماع)؛ وهو يُفرِط الإفرازات البَوْليَّة والشُّعَبيَّة.

المقادير - تُعطَى البرومهيدرات بمقدار نِصف سَنتغرام إلى سَنتغرامين، في جَروعات أو أفضل في حُقَنٍ تَحْجِلديّة (زَرْقَة تَحتَ الجِلد) كدواء مُضاد للتَّشْهُ ، ضِد الرَّبُو، الشُّهاق، التَّقلُص العَضليّ Tics المُؤلِم الّذي يُصيب الوجه، التهاب الحنجرة الصَّرصَرِيّ، الأَبح: Laryngite .

المقادير القُصوى، عن طريق الفَم: ٠,٠٢ غرام لكلّ ٢٠,٠ عرام للجرعة و٠,١٠ غرام لكلّ ٢٤ ساعة (للبالغين).

الأولاد بعد ٥ سنوات مُكْتَمِلة: من

يَختلفان جدًّا تبعًا لمنبته، وهو مُتفرّع منذ القاعدة بشكل شبه دائم. مجموعات الأراضى النِّصف جافّة أو الجافّة تَتكوّن من أفراد صغيرة جدًّا، ٥ إلى ١٠سم، سُوقها قصيرة، نائمة مُنتصبة، أوراقها قليلة العدد تحت الازهرارات. أمّا مجموعات الأراضى الخَصْبة، وبنوع خاص قبائل المنطقة السّاحليّة، فتَتَكوَّن من نَبتات نامية جدًّا، ٢٠ إلى ٤٠سم، فروعها كثيفة الأوراق، تحمِل على قواعدها فُرَيْعات عقيمة، وتَحمل أعلى من ذلك بقليل حُزْمات من الأوراق المضمومة بواسطة ورقتين بدائيتين مُتقابلتين قد تَبلغ وتَتَخطّى ٣سم. أوراقه خَطِّيَّة مِلْوَقيَّة، زَغَبيَّة، مُسنَّنة الحافة بشكل خفيف أحيانًا. سنابل بيضاوية، تكون مُضمومة بورقة إبطية واحدة، أو تكون كلّها كثيفة التَّجميع على رأس الفُروع تقريبًا، تحملها سُويقات هزيلة نَحيلة خَشِنة، زَغَبِيَّة غِدِّيّة. القُنابات دقيقة، لاصقة على الكأس، بَيضاويّة سِنانيّة، حادّة أو مُستدقّة الرّأس. فصوص الكأس مُستدقّة الطّرف. فُصوص التّاج حادّة، سِنانيّة.

أَمَرة عُشْبَة البراغيث - هي حُقَيْق Pyxide يَنفتح بواسطة شَقَين دائريَّين، ويحتوي على بزرتين لامِعتين، مُلساوَين، مُجَلَّلتين باللَّون البُنِّي المُسود، ومُمركَّين على ظهريهما بخط وسطيّ طوليّ، فاتح، مُبيَض اللَّون، غائر على الوجه الآخر. وهما بذلك

تشابهان البُرغوث، ممّا جَعل اسم النَّبات العلميّ Psyllium، من اليُونانيَّة Psulla، وكافّة أسمائه الشّائعة الأخرى تَعني البرغوث. إنّ تلك البُزور، الَّتي تُدعى بَزْر قَطونا، تَتَوافَر في مَراكِش، وجَنُوب إيطاليا، وعلى كافّة مُحيط البحر المُتوسِّط.

هناك نَبات آخر مُشابه جدًّا لِعُشبة البَراغيث، اقترحنا له اسم: لسان حَمَل الرِّمال.

تَركيب البزرة - إنّ بِزر قَطُونا الحقيقيّ يُشبه بِزر قَطُونا الرِّمال بشكل مَحسوس ويكون أفتح لونًا منه، وأضيق بقليل، وتكون بزرته مُستعرضة في أحد طرفيها. انخفاضها البَطْنيّ يُشكِّل خطًّا مُبيض اللَّون، ويَقع ثَلْمُها العَرَضيّ في نحو الثَّلث الأسفل على مستوى القسم المُنتفِخ. تَتألَّف طَحْرَة بِزرة قَطونا الحَقيقيّة من ثلاث سافات خِليويّة:

١٠- بَشَرة مُؤلَّفة من عناصر كبيرة،
 تَحتوي على ١٠ إلى ١٢٪ من اللُعاب
 الَّذي يَنتفِخ بمُلامَسة الماء ويُستعمَل
 أحيانًا في القَطْرات العَينيَّة؛

٢°- خلايا السّافة الحَشْويّة الثّانية
 تكون صغيرة ومُفَلطَحة؛

٣٠- خلايا الطَّحْرَة الدَّاخليَّة تَكون أكبر بقليل وتَحتوي على خضاب بُنِّي اللَّون. ويُلاحظ في خلايا السُّويْداء وجود حُبوب من الأكرون ومواد دسمة. إذا ابتُلعت البزور تَعمَل كمُسهًل

ميكانيكيّ بفضل ذلك اللُعاب الَّذي تُقابل نسبته ١٠ إلى ١٢٪ من مُجمل وَزن البزرة.

المُركِّبات - لُعاب (۱۰-۱۲٪)، صَمْغ، زَيت، أوكوبوسيد، ضَرُوريَّات، أملاح البوتاسيوم.

الخصائص - مُلَطِّف، مُليِّن، مُسهِّل ميكانيكيّ.

الاستعمال - حُروق، إمساك، إسهال، قرحة.

طريقة الاستعمال - نقيع، مَرْث، بزور كاملة. البزور تُنظِّم سَيْر عمل الأمعاء، وهو عمل عرفه الأطبّاء المصريّون لأكثر من ألف سنة قَبْل الميلاد. يُحضَّر من البزور أقنعة تجميليّة مُلطَّفة بسبب مُحتواها اللُّعابيّ الهام. نقيع البزور أو مَرْثها بالماء يُعطي لُوسيونًا (غسولًا) مُلطَفًا غَنيًا باللَّعاب يُفيد العَينين السَّوداوين أو بالقاتمتين المُرْهَقَتين، كما يُفيد في البخفون.

يُستخرَج من البُزور كذلك صَمْغ يُستخدَم في تَجهيزات الأقمشة والمُوْصَلِّي من صَقْل وتَنشِيَة وسوى ذلك. إذا خُلِطت مع بُزور أخرى تُشكل عَلفًا جيِّدًا لعصافير المَطِيْرَة. كما تُزرع عُشبة البَراغيث بمساحات واسعة لتأمين الحاجات الصَّيدليّة.

ثَنُونَا الرِّمَالَ، عُشْبَةُ البَرَاغِيْث - الرَّمَالَ عُشْبَةُ البَرَاغِيْث - الرَّمْلِيَّة (۱) Sand's flea-wort (E)

Plantain des sables, Pucière des sables, Psyllium des sables (F)

Sandflohwegerich (D)

Plantago arenaria waldst. et kit. (S)

ب ز ر

إنّ بزر قَطُونا الرِّ مال هو نَوع من لِسان الحَمَل من فَصِيلَة الحَمَلِيَّات مُتقارب جدًّا من عُشبة البراغيث؛ وهو أكثر ازهرارًا منه، وينبت من إسبانيا إلى ألمانيا، كما يُوجد أيضًا في إيطاليا. يُعطى هٰذا النَّوع بزورًا تُدعى: «بزر قَطُونا البروڤنْسِيّ الأسودة: «Psyllium noir de Provence»: الأسود وهو الأكثر جودةً، ويزورًا تُدعى: «يزر قَطُونا الإيطاليّ الأسود" Psyllium noir» «d'Italie». إنَّ بزر قَطُونا الحقيقيّ وبزر قَطُونا الرِّمال، بنوعَيْه أعلاه، هي بُزور مَخزَنيّة، تُستبدَل أحيانًا ببزور أخرى بقصد الغش، مشال «بزر قطونا الوَرديِّ»: «Psyllium rose» وهي بُنزور لُعابيَّة جدًّا تُستخرَج من النَّوع: (Plantago Ispaghula Roxb. Plantago ovata Forsk.)

وتَحتوي على ٢٥ إلى ٣٠٪ من اللَّعاب. كما يُمكن أيضًا استعمال بُزور لسان الحمل السِّنانيّ للغاية نفسها، ويُطلَق عليها اسم: «بزر قَطُونا الألمانيّ الأشْقر»: Psyllium «blond» وهي بُزور فقيرة باللَّعاب الّذي تَحتوى منه ٦ إلى ٨٪.

المُواصَفات - إنّ بُزور قَطُونا الرِّمال

<sup>(</sup>١) كلّ التَّسميات للمُؤلِّف ما عدا اللاتينية.

ب س ك

تَطول نحو ٢ إلى ٣ ملم، وأكثر ما يصل عرضها إلى ١ أو ١,٥ ملم؛ يَختلف لَونها من البُنِّيّ الفاتح إلى البُنِّيّ المُسود من دون أن تَبلغ صراحة اللَّون الأسود التامّ. نُشاهد نَحو قسمها الوسطيّ ثَلْمًا على عَرضيًّا ظاهرًا لونه أفتح؛ أمّا على وجهها البَطنيّ فَتَكون مَحفورة على شكل قارَب أو زورق.

مُلاحَظة - للخصائص والاستعمال، اطلب بزر قطونا أي عُشبة البراغيث (في هذا المُعجَم رقم ٤٧).

#### 19 - بسكويت طارد للدّيدان Biscuits vermifuges (F)

تحتوي كلّ بسكويتة على ٠,١٥غ. من البزور المُضادَّة، يُعطى مِنها واحدة صاحًا وأخرى مساءً للأولاد.

### بسكويت سْتُورَاي طارِد للدّيدان:

۱٫۳ غ	كالو مل
٤٢,٦	زَنْجَبيل
٤ غ	جَلَبَة
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	سُكِّر
	زُنْحَفْر، أي كديتور

الزِّنبق ....ما يكفي للتَّلوين يُضاف الشَّراب السُّكَّريِّ البَسيط،

ويُصنع منها ١٠ بسكويتات.

بسكويت طارد للديدان بالكَالُومِل:

كالومِل صِرْف عجينة بسكويت جامدة مسكميَّة كافية لتحضير ألْف بسكويتة، كلّ واحِدة تحتوي على ٣٠٠ غرام من الكالومل أي الزِّئبق الحُلُو. بسكويتة واحِدة لوللإ عُمره من ٤ إلى ٨ سنوات؛ نِصف بسكويتة لولد عُمره من ٢ إلى ٤ سنوات.

بهدف الحصول على بسكويت أخفّ وزنًا، يَعمد صانعو الحَلوى إلى أن يُضيفوا إلى عجينتهم أحيانًا المعكرونة، كربونات الأمونيوم. إنّ الكالومل الذي يُضاف إلى عجين كهذا قد يَتَفكَّك، وتُصبح البسكوتات المُحضَّرة منه سوداء اللَّهن.

#### • ه- بَطْباط نِیْلیِ ، شَبَطباط ، نِیْلَة صینِیّة Persicaire indigotier (F) Polygonum tinctorium (S)

نَبات عُشبي مُعَمَّر من فَصِيلَة البَطْبَاطِيَّات مَهده الشَّرْق الأقصى. يَحتوي على أنْدِيكان (مادّة مَوجودة في وَرَق النِّيْل)، وهو مُولِّد النَّيْلة. يُستعمَل في مَهده كنَبات صِبغيّ. زُرع في فرنسا للغَرض عينه.

٥١ - بَلاذُر غَرْبِيّ، أَكَاجُو

Cashew-nut tree, Bean of Malacca (E)
Anacardier occidental, Anacardier à
pommes, Acajou, Caju, Noyer d'acajou,
Pomme d'acajou, Acajou à pommes (F)
Nierenbaum, Acajoubaum (D)
Anacardium occidental, Cassuvium pomiferum (S)

نَباتان يُطلَق عَليهما الاسمُ الفرنسيّ Acajou، وهُما الماهُون أو أكاجو الأثاث Swietenia mahogoni من فصيلة الزِّنْزَلَخْتِيَّات، والبَلاذُر الغَربيّ من فَصِيلَة البُطْمِيّات وقَبيلة البَلاذُريّات. شَجَرة استوائية، مُنبسِطة التّاج والهامة تَعلو حتّى ١٢ مترًا. أوراقُها تسبطة، جلدية، مُستَديرة ومُفَرَّضة الأطراف. بَعضُ أزهارها يَحمل الأعضاء الذَّكريّة، وتَكون أزهارُها الأخرى خُنثَويّة ذات عشر أسدية ومبيض واحد وحيد الحُجرة. الثَّمَرة مُستهجِّنَة الشَّكل، وهي كناية عن جَوزة بُنِّيَّة اللُّون المُرْمَد، تَلتصِق إلى ما يُشبه الإجاصة وما هو عريض ولامع، أي ما يُسمّى «تُفّاحة الأكاجو» أو «الكاجو». والكاجو هو بالواقع قرص ثُمَريّ عريض وتارّ. يَتمّ تحميص «الجُوزات» بهدف استخراج لوزاتها المأكولة.

"تُفّاح" الكاجو يُخمَّر في بَعض البُلدان ويُقطَّر منه مَشروب كُحوليّ مُستَحبّ الطَّعم. ويَتمّ الحُصول على "صمغ الكاجو" Gomme d'acajou بحزِّ جِذْع شَجَرة البَلاذُر الغَربيّ؛ وهو صمغ له

الكثير من مظهر الكَهْرَمان الأصفر بلا الكورباء). لا يذوب بكامله في الماء، وهو بالتّالي غير مُستعمَل. تُفّاح الكاجو يعرف أيضًا بجوز الكاجو وكستناء الكاجو وبكلاذر الغرب. مَهدُ الشَّجرة أمريكا الاستوائيّة، تَأَقْلَمت في الهند وفي أفريقيا الشَّرقيّة، وهي تُزرَع اليوم بمساحاتٍ شاسعة.

#### ٥٢ - بَلَّان غَيَّارِدُوت (١)

#### Pimprenelle Gaillardot (F) Poterium gaillardoti (S)

جَذر مُعَمِّر مُخشوشِب من فَصِيلَة الوَرْدِيَّات. وُريقات أوراقه عميقة وقويّة التَّسنين. سُوقه إمّا مُنتصِبة أو صاعدة، تعلو من ١٠ إلى ٣٠سم. ازهراره عُثكوليّ طويل، غالبًا مُتقرِّع. الثَّمرة صغيرة، إهليلجيّة - مُربَّعة الزَّوايا، بيضاء الحَوافي، غير مُنتظِمة الأثلام، غير مُثاللة.

نَوع مُحدَّد ومَحصور التَّواجد، يُزهر من أيّار إلى تمّوز، على الصّخور وفي الأماكن الحُرجيَّة.

٥٣- بَلَّان مُنْدَمِج

Pimprenelle compacte (F) Poterium compactum (S)

ريزوم غَليظ مُعمَّر مُخشَوشِب من فَصِيلَة الوَرْدِيَّات، يُنتِج فُروعًا مُتراصَّة

<sup>(</sup>١) التَّسمية العربيَّة والتَّسمية الفرنسيَّة للمُؤلِّف.

<sup>(</sup>٢) التَّسمية الفرنسيَّة للمُؤلِّف.

ب ار

مُندمِجة تُشكّل باقات صغيرة كثيفة كاسِية. نَبات أَجْرَد، ما عدا وَبْرات مُتفرِّقة على السّاق والأوراق. الأوراق صغيرة مُتجمِّعة في القاعدة بفروخ عقيمة وعلى أسفل السّوق الزَّهريّة. كل هذه الأوراق عميقة التَّسنُن. الأوراق السّاقيّة من الله إلى ٤، يَتضاءل نُموُها تَدريجيًّا، العُليا لاطئة، مُؤلَّفة من سَيْر أو سَيْرَين خَطِّيَّين، وهي حادة. رُؤيسات من أزهار ذَكريّة مَرْطاء، المُخصِبة منها من أزهار ذَكريّة مَرْطاء، المُخصِبة منها قُطنيّة جدًّا. الثَّمرة رُباعيّة الزَّوايا تقريبًا

نَوع يَستوطِن لُبنان، يُزهر في حزيران وتمّوز، ويرغب الأماكن الحُثّيّة الرَّطْبة والأراضي العَادِمة الكلس في الجبال.

Balsam (E) بلاسِم - و بالاسِم Baumes (F)

Balsam (D)

بَلْسَم خَلِّي مُكَوْفَر

Daume acetique	campme
٤ غ	صابُون حَيَوانتي
٠٠٠٠ غ	ثير أَسَتِيك
، ونُضيف:	نُذوِّب في حَمَّام مريم

إنّ لهذا البَلْسم هو تَبسيط لبلسم سانشيز. أمّا بُوشارْدَا فيُعيد لهذا

المُستحضَر باسم بَلْسم خَلَيِّ مُكُوفَر ولكن بفارقٍ واحدٍ هو أنّه يُضيف إليه القليل من زيت كَبْش القَرَنْفُل الطَّيَّار.

الاستعمال - تَمسيدات الرّوماتيزم وعِرْق النّسا بمقدار ٤ إلى ٨ غرامات.

Baume acoustique	بَلْسَم سَمْعِيّ
	عَصير بَصَل .
۴ غ	بَلْسَم ترانكيل
٥غ	بَلْسَم السِرو
مطَى في الطَّرَش النَّزْلي	
اة). پارِس يُعطي تركيبة	
دواء تايلور ضدّ الطّرَشُ زيت اللّوز الحُلو ٥٠٠غ،	
يت اللور الحلو العام المرابع ا	-
مْعيّ يَبدو أنّه مُركّب	
	بالطَّريقة ذاتها

### بَلْسَم شِيرُون ، بَلْسَم لُوزان

Baume de Chiron
زَيت زَيتُوننون
تَرْ بَشْتِين٦٠ غ
شَمْع أصفر ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
شِنْجار١٥
نَغلي مَعًا، نُمرِّر ونُضيف:
بَلْسَم البيرو١٠

الخصائص والاستعمال - لائم يُستعمَل بنوع خاص في مُعالَجة تَشقُق

نُحرِّك حتى التَّبريد التَّام.

صابون حَيوانيّ أو صابون مَرسيليا نُذوّبه في حرارة لطيفة في:

الاستعمال - كانت لِهذا المُستحضر خُطوة كُبرى في لُوزان في القرن التّاسع عشر، لاستعماله تمسيدًا ضدّ تَضخُم الغُدَّة الدَّرقيَّة أي السَّلَعَة.

#### بَلْسَم مُضاد للهِستيريا

#### Baume antihystérique

حِلْتِيت١٢. غ
أَلْوَة ٤ غ
أُشَّق ٤ غ
إفراز القُنْدُس٢ غ
أَسْفَلْت ع غ
لُودائم ٤ غ
أفيون٢غ
زيت فَيْجَن طَيّارزيت فَيْجَن طَيّار
زيت جَوز الطِّيبزيت جَوز الطِّيب
زيت الأبْسَنْتزيت الأبْسَنْت
زيت السّبينَة زيت السّبينَة

التَّدي، والشَّرَث والخَصَر. كان يُباع في صابون حَيوانيّ أو صابون علب صغيرة من القصدير.

بَلْسَم عَيْنِيّ تَّهُ فَمْن تَّعْنِيّ بَلْسَم الْحَياة هُوفْمَن تَعْنَى بَالْسَم الْحَياة هُوفْمَن تَعْنَا الْحَياة هُوفْمَن بَاللَّهِ اللَّهِ الْحَياة هُوفْمَن بَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ا

يُطلَق اسم «مَرهم عَينيّ» أيضًا على مَرهم سان إِيْڤ.

#### بَلْسَم غُولارد، بَلْسَم سَكْب

Baume de Goulard, Baume de Saturne

نُسخِّن كمِّيَّة مَطلوبَة من دُهن التَّربَنْتِين، ونُضيف إليها رُويدًا رُويدًا أستات الرَّصاص المَسحوق كمِّيَّة كافية، مع تَحريك مُستمِر فيذوب مُعظَمه ويبقى القليل غير مُذوَّب؛ نُريح ومن ثمّ نُصفَّق السّائل وهو لم يزل ساخنًا.

الاستعمال - ضماد القُرحات القارضَة.

بَلْسَم ماثيودي، بَلْسَم يُودُورِي، مُجَمَّدة ضِد السَّلَعَة

Baume hydriodaté, Baume ioduré, Baume contre le goitre

نُذوِّب. من جهة أخرى، نأخذ:

ب ن ج

الله مَاكُوْرَة، طَماطم، قُوْطَة –٥٦ Tomato, Love apple (E)
Tomate, Pomme d'amour, Pomme d'or (F)
Tomaten, Kirschentomaten (D)
Lycopersicum esculentum, Solanum lycopersicum (S)

نَبات عُشبيّ زِراعيّ بَقْليّ من فَصِيلَة البَاذِنْجانِيّات. مهده أميركا الجَنوبيّة حَيث كان الهنود في الماضي يُكثِرون من زراعته. عَرَفتْه فرنسا في البداية كنبات تَزيينيّ ولم تَنتشر زراعته فيها كنبات بَقْليّ إلّا خلال القرن التّاسع عشر. أنواعه وضُروبه كثيرة العدد، مَأكولة الثّمار المُختلِفة والأشكال والأحجام والألوان.

المُركِّبات - ماء ۹۰ بالمئة، غلوسيدات ٤٪، پروتيدات ١٪، لِبِّيدات ٣٠٪، حَوامِض عُضويّة: تُفّاحيّ، يَخْتك، لَيمونيّ. . كلسيوم، فوسفور، مَغْنازيوم، بوتاسيوم، كبريت، وعدد وافر من الضَّرُوريّات: زِنْك، نُحاس، حديد، بُور، يُود، . . فيتامينات: «أ»، «ب١»، «ب١»، «ش»، «پ

الخصائص - طاقية، مُمَعدِنة، مُوازِنة خِلْيوية، مُشَهِّية، مُنعِشة، مُضادَّة لداء خِلْيوية، مُضادَّة للعَدْوى، مُزيلة للسُّموم، مُقَلِّية لأنواع الدَّم الكثيرة الحُموضة، مُبوِّلة، حالَّة بَوْليّة، مُزيلة للأوريا، تُسهِّل التَّغَيُّط بواسطة قِشرتها وبُزورها، تُسهِّل هَضْم النَّشَويّات والمُعَجَنات.

الخصائص والاستعمال - مُهيِّج، مُضادِّ للهستيريا. يُوضَع تحت الأَنْف وتُمسَّد به المنطقة السُّرِيَّة، في حال نَوبات الهستيريا. يُحفَظ في عُلَب من القصدير.

٥٥- بَنْج المَغْرِب، بُثَيْنَة

Jusquiame d'Atlas (F) Hyoscyamus Falezlez (S)

بَجَلَة عُشبيَّة مُعَمَّرة من فَصِيلَة البَاذِنْجَانِيَّات غَليظة السّاق المُنتصِبة. البَاذِنْجَانِيَّات غَليظة السّاق المُنتصِبة. تَعلو نحو ٥٠سم. فروعها كثيرة. أوراقُها لَحميّة مُتوسِّطة القَدّ زَباء النَّصْل. أزهارها قصيرة الزِّنادات، مُبيَضَّة اللَّون الفُستُقيّ مُوشَّحة بالأحمر الأرجُوانيّ.

الخصائص والاستعمال - نوع صحراوي في أقصى الجنوب الجزائري، استُعمل لتسميم أعضاء بعثة فلاترز Flatters. يبدو أنّ أوراقه وأزهاره تَحتوي على أكثر من الله من القِلَوِيْدات. (اطلب بنج أسود في المُعجَم الأوّل، صفحة ٢٥، رقم ٤٢).

سام - جدول Toxique - Tableau A

ب ن ز

الاستعمال - حالات الوَهْن، فَقد الشَّهيَّة، تَسمُّمات مُزمِنة، كَظَّة الدَّم، حالات احتقانيّة، زيادة لُزوجة الدَّم، تَصلُّب الشَّرايين، إصابات وعائيّة، داء المَفاصل، نِقْرس، رُوماتيزم، تَنَتْرُج الدّم، رُمال بَوْليّ، رُمال صَفراويّ، إمساك، التهاب المعى، حالات التهابيّة إمساك، التهاب المعى، حالات التهابيّة في الخيوط أو الأعصاب الهَضميّة، ومن الخارج: حَبّ الشَّباب، وَخْز ومن الخارج: حَبّ الشَّباب، وَخْز الحَشْرات.

طُرُق الاستعمال - الطُرق الدّاخليّة، استهلاك البندورة في السّلطات. عصير البندورة، بمقدار ٣ أكواب في اليوم لمدَّة ٣ أسابيع، شهر، يُمكن مزجه، بمقادير مُتساوِية مع عصير الكَرَفْس للمَعدنَة وفَقْر الدّم. أمّا من الخارج، تلبيخ حَبّ الشَّباب بواسطة شرحات البندورة، ومن ثمّ تلبيخها في اليوم التّالي بأوراق الحُمَّيضة المُفرفَكَة. نترك الأمور تَتفاعل، كلّ مرَّة، لمدَّة نِصف ساعة ونُنهي بعدها بغسل بالماء البارد.

لُوسيون لاتِقاء حَبِّ الشَّباب: كحول ٩٠ درجة ٤٠ غرامًا، غليسترين ٢٨ درجة بُوميه غرام واحد، عصير بَندورة ١٠٠ غرام.

لعقص الحشرات، يُفرَك المكان بأوراق البَندورة الغَضَّة المُفرفَكَة.

مُلاحَظات - \* البندورة لا تحتوي على أوكسالات ولكن على جسم شبيه بالكُورتيزون؛ لذلك فهي تُناسب المُصابين بالرّوماتيزم والنّقْرس.

\* يجب عدم تحضير السَّلطات قَبْل موعدها بعدَّة ساعات لأنّ ذلك يُفقِد البَندورة قِسمًا من خصائصها المُغَذِّية.

لإزالة بُقع الحبر عن القُماش
 الأبيض، نَفركه بعصير البندورة.

\* أوراق البَندورة تُبعِد الزَّلاقط أو الباعوض إذا علَّقناها في الغرف.

#### ۰۵ - بَنْزُوَات اللَّيْتيوم ، بَنْزُوَات اللِّيتِيْن Benzoate de lithium, Benzoate de lithine (F)

 $C_6H_5$ .  $CO_2li = 128$ .

ذَكر دستور ١٨٨٤ طريقة تَحضيره التّالية:

نَضَع في وعاء تَبخير من الصِّينيّ ٣٠غ من كَرْبُونات اللِّيتيوم و٢٧٠ غرام ماء ؟ نُسخِّن ونُضيف، من دون أن نَنْتَظر ذَوَبان الملح الكامل، ٢٠٠غ من حامِض البَنْزُويك، رويدًا رويدًا. عندما يَتوقَّف الفَوران، نُركِّز ونترك المُستحضر يَتبلَّر وهو يَبرد. نُصفِّق ونُجفِّف البِلُّورات في الهواء الطَّلْق على وَرَق تَصفِية أبيض. إنْ بَنْزُوات اللَّيتيوم تُعادِل ٤٠٤٥ أجزاء من اللَّيتيوم، و٧٩٥,٣٠ جزءًا من حامِض البَنْزَويك بالمِئة.

المُواصَفات - مَسحوق بِلَّوريَ أبيضٍ، عَديم اللَّون، خَفيف الطَّعم السُّكريِّ والمُملَّح. يَذوب في ٣,٥ أجزاء من الماء عند ١٥°سغ، ٢,٥ جزآن من الماء الغالي وفي ١٠ أجزاء كحول ٩٠ درجة. Violet, Sweet violet, March flower (E)
Violette, Violette odorante, Violette de
mars, Violette des haies, Fleur de
mars, Violier commun (F)
Veilchen, März-veilchen (D)
Viola odorata (S)

نَبات برِّي عُشبي مُعَمَّر خفيف الزَّغَب من فَصِيلَة الْبَنَفْسَجِيَّات يَعلو من ١٠ إلى ١٥ سم. وهو عَديم السُّوق الهَوائيّة، رُواكبه طويلة، مُتَجذِّرة، مُورقة. أوراقه ضُمِّيّة التَّجميع، طويلة الأعناق، البالغة منها بَيضويّة الشَّكل القَلْبيّ، الباقية مُستديرة الشُّكُل الكلوي. أذَّناته سِنانيّة، حادة، كاملة أو قصيرة التّشريم. طول الورقة ٤سم، حَوافيها مُفَرَّضة. الأزهار قاتمة اللُّون البِّنفْسجيّ طولها ٢سم، فَرِدِيّة على زناد جَذري أطول من الأوراق بقليل أو مُساو لها، خُماسية الكأسيّات المُنفرجة، خُماسِيّة البَتَلات: بَتَلتان عُلُويَّتان مُنتَصِبتان، بَتَلتان جانبتان، تتلة سفلي مُشرومة ومهمازيَّة. رائحة الزَّهرة عَذْبَة مُستحَبَّة. الأقسام المُستعمَلَة هي الأزهار والأوراق والجَذْر والبزور التي تُجَفَّف لوحدها. النّبات مُحدّد المَواقِع، يُزهر من شباط إلى أيّار ويرغب الأحراج والمواقع الرَّطْية .

المُرَكِّبات - حامِض صَفْصافي بشكل سالسيلات المتيل الذي لا يُوجد مُسبقًا في النَّبات ولكنّه يَتكوَّن فيه عند هَرْسِه بتأثير خميرة تَذوب في هيتروسيد، إذا رُمِّد بَنْزُوات اللَّيتيوم يُعطي فُضالَة من كَربُونات اللَّيتيوم مع إنتاج كمِّيَّة صغيرة من اللَّيتيْن. إذا رُطِّبَت الفُضالَة بحامِض كلورهيدريك، فإنها تُلوِّن باللَّون الأحمر القِرْمِزيِّ شُعْلَةً أو لَهَبًا عَديم اللَّون.

مَحلولُه المائيّ يَتحلّى بتَفاعُلات المَنْزُواتات. المِلح اللِّيتيوم وبتَفاعُلات البَنْزُواتات. المِلح المَخْزَنِيّ يَجب أن يَحتوي كحلًّ أدنى على ٩٩ بالمئة من بَنْزُوات اللِّيتيوم المُوافِقة ٩٤,٤١ من حامِض البَنْزويك.

الحفظ - بمعزل عن الهواء.

الخصائص والاستعمال - استُعمِل كحالً ومُذيبٍ للحامِض البَوْليك والبَوْليك والبَوْليت، في النَّقْرِس وفي الرُّمال البَوليّ. مَقاديره ٢٥,٠٥غ إلى ٥٠,٠٠غ للجُرعة الواحدة، ٥٠,٠٠غ إلى غرامين لكلّ ٢٤ ساعة. للأولاد: ٢٠,٠٠غ لكلّ سنة من العُمر. (إنَّ هذه المقادير هي التي كانت مُتَّعة في مُعالَجة النَّقْرِس).

مُنذ عِدَّة سَنوات، استُعمِل البَنْزُوات بهدف إعطاء اللِّيتيوم في مُعالجة بَعض العُصابات. في مَضغوطات من ٢٥٠ ملغ.

خطر - جدول Dangereux - Tableau C

فَيُولِين، زيت دُهني، فيتامين «ث»، لُعاب، صَمْع (الأزهار)، فيُولاماتِين (الرِّيزوم)، مادَّة صِباغِيّة تجعل الحوامض حمراء والقِلى خضراء.

الخصائص - الأزهار: مُلَيِّنة، مُقشَّعة، مُعَرِّقة، مُسَكَّنة. الجذور أو الرِّيزوم: مُقَشَّعة، مُقَيِّئة (بمقادير قَويَّة)، مُسهَّلة قويَّة. نَبات مُسجَّل في دستور أدوية ١٩٧٢.

الاستعمال - برونشيت، سُعال، التهابات المَجرى الهَضميّ والمجاري البَوْليّة، حُمَّيات طَفْحِيّة، قُرحة المَعِدَة أو العَفَج، ذُبحات، تَشقُّقات، عسر هضم، تَسمُّم، عُيون، في نُقاعة، مُستخلص سائل، صِبغَة، شَراب. تَشقُّقات الثَّدى في استعمال خارجيّ.

طريقة الاستعمال - نُقاعة مِلْعَقة مُتوسَّطة من الأزهار في فِنجان ماء غالٍ يُعطَّى عشر دقائق ويؤخَذ ٢ إلى ٤ فناجين في اليوم. أزهار البَنَفْسَج هي فناجين في اليوم. أزهار البَنَفْسَج هي نقيع مِلْعَقة صغيرة من الجذور في مِقدار فِنجان ماء يُعلى ٥ دقائق. مُقَشِّع ؟ ٣ إلى فنجان ماء يُعلى ٥ دقائق. مُقَشِّع ؟ ٣ إلى عصير الأوراق بمقدار ٥٠ غرامًا هو مُسهِّل قويّ. مسحوق الجذور من ١ مُسهِّل قويّ. مسحوق الجذور من ١ إلى ٥ غرامات: مُقيِّى . جَرُوع مُقَشِّع من ٥ غرامات جذور بَنَفْسج لكل ١٥٠ غرام ماء تُعلى ربع ساعة ، تُمرّر وتُضاف من ٥ غرام شراب أزهار بَنفْسج ، يُؤخَذ منه مِلْعَقَة كبيرة كل ساعتين مَرَّة .

نَغلي حتّى قِوام الشَّراب. يُؤخَذ منه ٣٠ إلى ٥٠ غرامًا في اليوم.

الأوراق المسلوقة بالماء تُوضَع لَصُوقات ضِد تَشَقُقات الثَّدي. أو الأوراق الغَضَّة الطَّازجة المَسحوقة أو المهروسة.

#### 9 - بَهْرَمانَة مارِدَة، قُنَّب مَكْسِيْكِيّ Agave géante, Agave fétide, Fourcrée gigantesque, Chanvre mexicain (F) Furcræa gigantea, Agave fætida (S)

جَذْر مُتَدرِّن، مُعمَّر من فصِيلة النَّرْجِسِيَّات مَهدُه البرازيل. ضُمَّة أوراقه تبلغ المتر. أوراقه من ٤٠ إلى ٥٠ في ضُمَّة كثيفة، سِنانيَّة، يَبلغ طولها المِترين، قليلة أو عديمة الشوْك على حَوافيها. الشِّمراخ الزَّهريّ يَعلو ١٠ أمتار. أزهارُه مُخضَرَّة اللَّون الخَارجيّ، أمتار. أزهارُه مُخضَرَّة اللَّون الخَارجيّ، لَبَيْتِة اللَّون الأبيض الدّاخليّ. بُصَيْلات. أوراقُه تَشتهر بجودة ومَتانة ألْيَافها الصِّناعِيَّة، وهي تُعطي خِيْطان الحَصّادة السِّناعِيَّة، وهي تُعطي خِيْطان الحَصّادة ضرب شريط أوراقِه الوَسطيّ زُبْديّ ضرب شريط أوراقِه الوَسطيّ زُبْديّ اللَّون. يُقطع الشَّمْراخ بعد الازهرار حتى لا يَموت النَّبات.

الخصائص والاستعمال - تَشتهِر جُذورُها في كاليدونيا الجديدة على أنّها

ب و د

شافية للجرح ومُنقِّية. أوراقُها تُشكِّل صابونًا نَباتيًّا (وجود صابُونِين في مُركِّباتها). أوراقُها وثمارُها سَامَّة للأسماك Ichtyotoxiques.

#### ٦٠ - بُوْرَات الصُّوديُوم، بُوْرَق Borate de sodium, Borax, Chrysocolle (F)

 $B_4O_7Na_2$ ,  $10H_2O = 381,43$ .

يُوجَد البُوْرَق مَحلولًا في مياه مُختلِف البُحيْرات الهنديّة، وفي التِّيبت (تِسُوطُبُوُو)، في كاليفورنيا، إلخ حَيث كان يُسحَب فيما مَضى، وهو ما كان يُعرف بالبُوْرَق الخام أو تِنْكال Tinkal. يُعرف بالبُوْرَق الخام أو تِنْكال Tinkal. وكان يُباع بعد تَنقيته باسم بُوْرَق مُكرَّر. أمّا اليَوم فإنّ البُوْرَق يُحضَّر اصطناعيًّا من الصُّود والحامِض البُوريك. إنّ البُوْرَق المَحْزَنيّ الّذي يحوي ١٠ جُزَيئات من المَاء كالماء 10H<sub>2</sub>O، هو الملح المُتَعادل للحامِض الثُنائيّ القاعدة التترابوريك للحامِض الثُنائيّ القاعدة التترابوريك

الاستعمال - البُوْرَق اللّامائي المُنصهِر يَذوب في الأوكْسيدات المَعدِنيّة مُتَّخذًا ألوانًا تختلِف باختلاف طبيعة الأوكْسيد؛ إنّ لهذه الخاصّة تُستخدَم في مَجال الكيمياء التَّحليليَّة، وفي تَلحيم المعادن التَّمينة، ومن هُنا السمه «لاصِق اللَّهب» Chrysocolle.

الخصائص والاستعمال - يُستعمَل البُوْرَق في الطِّب كمطهِّر ضعيف: في غرغرات ومَضْمَضات ضِد الذُّبحات، والتهابات غِشاء الفم، والقُلاع

بأشكاله؛ ويُستعمَل في مَحلول لِغَسْل الإصابات الجلديّة المُلتهبة (أكزيمات، حُمامَى، طَفْح وَرْدِيّ)، أو في مراهم. ويُستعمَل من الدّاخل بمقدار غرام إلى لا غرامات، في أقراص، أو جَرُوعات كدواء حالّ للحامِض البَوْليك؛ وكذلك يُستعمَل ضِدّ الصَّرْع، والشَّلَل الرُّعاشيّ أو الهَازّ، وفي التهابات المَعِدة التَّقرُّحيَّة، وحالات عُسر الهَضم التَّقرُّحيَّة، وحالات عُسر الهَضم العَصبيَّة. استعماله الدّاخليّ الطَّويل قد يُحدِث الإسهال والطَّفْحات اللَّعَامية.

يُمكن حَقن بُورات الصُّوديوم ضمن الوريد. ويُستعمَل أيضًا كمُعقَّم ومُضاد لتَأكْسُد أَدُوات الجراحة الّتي تُوضع في مَحلول بنسبة ٢٪ من بُوْرات الصُّوديوم يُمكنه أن يُعقَّم في قِدرٍ ضاغطة أي مِحَمّ حتى درجة ١٣٠ سغ من دون تأكْسُد.

التَّضادَات - الحوامِض القَويّة؛ الامتناع عن بيكربونات الصّوديوم مع الغليسرين المُبَوْرَق(١) Boratée لأنّه حامِض.

أشكال الاستعمال - دَواء غالينوس الشَّمْعي، كُولدْكريم، مَضْمَضة ببورات الصُّوديوم، تَغَرْغُر ببورات الصَّوديوم، أشكال أقراص من بُورات الصُّوديوم، أشكال بُورات الصُّوديوم الأكثر استعمالًا هي القَطْرات العَيْنية.

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

في ضمادات ضد الحُروق. أمّا سوقه بول وأوراقه فتشكّل مادة أوّليّة مُمتازة لتحضير العَجينة الّتي يُصنَع منها الورق.

> ٦٢- بُوْلُوغَالِن قيرجينيا، بُوْلِيْغَالا سَنِيْغَا، جَذر ذات الأجراس، جَذر الكرو تال(١)

> Rattlesnake milk-wort, Crotalus milkweed (E)

> Polygale de Virginie, Senega, Racine de serpent à sonnettes (F)

> Klapperschlange weissen kreuzblume (D) Polygala senega (S)

> جَنْبة صغيرة من فَصِيلَة البُولُوغالنِيّات تَعلو من ٨٠ إلى ١٥٠سم. فروعها فَناء، زَباء. أوراقها مُستطيلة. أزهارها قِرمزيّة اللُّون، تَتَفتُّح من نيسان إلى أيلول. أرومتها وجذرها مُسجَّلان في دستور أدوية ١٩٦٥؛ أمّا جذرها فقط ففي الإصدار العاشر للفرماكوبيا.

> الأرومة تَنْتَفِخ في قسمها العُلويّ إلى كُتلة مَمْسوخة الشَّكل العِقْدي، عليها بقايا فُروع هَوائيّة هزيلة وبَراعم. تتكامل هذه الأرومة بواسطة الجذر يحصر المعنى، وهو جذر وتَدِيّ، طوله من ٨ إلى ١٠سم وقطره من ٥ إلى ٧ملم مع القليل من التَّقرُّعات. لَونه رَمادي، مُصفر أو مُحمر؛ وهو دقيق، مُتَلَوِّ، يَتميَّز بعِرقِ بارز يخترقه طوليًّا بكامله.

٦١- بُوْط عَرِيْض الوَرَق، دَادى، برْكِيَّة، عصوية المناقع

Cat's-tail, Great reed-mace, Marschpestle (E)

Typha à larges feuilles, Masse, Massette, Chandelle, Quenouille d'eau, Roseau de la passion, Canne de jonc (F) Breiter rohrkolben (D)

Typha latifolia (S)

نَبات مائي مُعَمَّر خالِ من العِقَد من فَصِيلَة البُوْطِيَّات أو البرْكِيَّات يَعلو ١,٥٠ إلى مترين. أوراقه طويلة، خضراء، مُسْتَبحِرة اللَّون، عَرضها ٧ إلى ١٦ ملم، تساوي أو تتخطَّى الشِّمراخ الزُّهريُّ. السُّنبِلة الذَّكرية والسُّنبِلة الأنثوية مُلاصِقتان، نادرًا مُتباعِدتان قليلًا، وهما مُتساويتا الطُّول عادة، أزهارهما عديدة جدًّا، مُتراصَّة إلى بعضها بطريقة تَجعلها كالدَّبُّوسة أو الهراوة الأسطوانية، المُخملية المَظهر. السُّويقات مبسوطة. السِّمات مائلة، بُنِّية اللُّون الأسود، تُساوى الأوبار أو تتخطَّاها. السُّنيلة الذُّكريّة أو القِدَّة بُنِّية اللّون، القِدَّة الأنثويّة أبْهَت لَونًا. الازهرار والإثمار في الرَّبيع والصَّيف.

الخصائص والاستعمال - النَّوامي الفَتية يأكلها القُوزاق على غرار الهَلْيُون، ومن هنا تَسميتها Asperges des Cosaques . الرِّيزوم، وهو نَشويّ المادَّة، يُستهلك في تَغذية الكَلْمُوك Kalmouks. ويَحلُّ غُبار الطُّلع في بَعض البُّلدان مَحلُّ الخُدْريّة. زَغَب البُوط مُجِّد في الماضي

<sup>(</sup>١) التَّسميات العربيَّة للمُؤلِّف ما عدا التَّسمية الأولى والتَّسميتان الإنجليزيَّتان والتَّسمية الألمانيَّة للمُ لِنَّف.

Bael tree (E) Bela (F) Bhelbaum (D)

Aegle marmelos (S)

البيلا أو سَفَرْجَلَة البَنْغال هي ثَمرة الإيْغل والبُلِّ وسَفَرْجَل البَنْغال؛ وهي شَجَرة زراعية من فصيلة السُّذابيَّات مُتوسِّطة الارتفاع والحَجم، كثيرة الأفْناد والأفْنان، وهي مُنتشِرة جدًّا في شِبه الجَزيرة الهنديّة حيث تُزرع غالبًا على مَقرّبة من المَعابد. ثمارُها مُستديرة بحجم البُرتُقال لَحميَّة عِطريَّة جدًّا لُبابيّة لُعابيّة جدًّا لُبُّها زَكي الرّائحة يُربّب. عصيرها حامِض مزّ. قِشر الثِّمار قابض يُستخرَج منه مادّة صِباغيّة صفراء اللّون. تَحتوي الثَّمرة على عدَّة بُزور وتُصبِح صُلْبَة جدًّا عندما تَجفّ وهي تُشكِّل نَوعًا من الترياق الذي يَشفى جميع الأمراض بالنِّسبة للهُنود. أمَّا أزهارُ الشَّجرة وأوراقُها فلها مَنافع طبِّيَّة مَعروفة من الصِّينيِّين والهُنود.

الخصائص - مُضادّة للدّيسنتيريا، مُضادّة للإسهال، شافية للبرونشيت، شافية للرَّبُو.

الاستعمال - يُستعمِلُها الهُنود جدًّا في مُعالجة الدّيسنتيريا والإسهال، ويُؤكِّدون أنَّ نُقاعة أوراق الشَّجرة تَشفي الرَّبُو والبرونشيت. ويستعمل الهُنود عَصير البيلا ضد الهواء الأصفر (الكوليرا).

رائحته مُغْثِية خفيفة، مُهَيِّجة، وطعمه ٦٣- بِيْلا، سَفَرْجَلَةُ البَنْغال(١) حُلُو في البداية يُصبح حامزًا ومُرًّا.

> المُرَكِّبات - يَحتوي الجذر على سناجين أو سناغين (بوليغالين أي حامِض بوليغاليك) يُنتمى إلى مجموعة الصَّابُونِينات. وعلى ٨٠٪ من السَّكاكر، زَيت دُهني مُركّب من سالسيلات وڤاليريانات المَتيل مع قليل من حامِض سالِسيليك حُرّ يَحصل نتيجة انشطار لهيتروسيد لم يُعزل بعد.

> يُوجَد مع لهذا الجذر في الأسواق جذر الجنْسَن، وفي بَعض الأحيان جَذْر عِرْق ذَهَب برازيليّ غير أصليّ Ionidium Ipecacuanha H.Bn. من البَنفسجيّات، يُضاف إليه بقصد الغِشّ، ونَجد معه حتّى جَذْر صِرْم الدِّيك، وعلى الأكثر حوالى ٢٠٪ من الفُروع الهوائية لبولوغالن فرجينيا نفسه.

> الخصائص وطريقة الاستعمال -مُقشِّع ومُدرّ العَرَق الغَزير بجرعة خفيفة، ويُمَيِّع الإفرازات ويُيسِّر التَّقَشُّع؛ وهو ماسِط ومُقَيِّئ بجرعة قوية. يُحضّر منه نُقاعة بنسبة ١٠. ٪، ومسحوق، ومُستخلَص، وشَراب سُكّرى مُسجّل في كتاب الوَصْفات الفَرنسيّ الوَطنيّ لعام ١٩٧٤، وصِبغة. مِقدار المُسحوق ٠,٥٠ إلى ٢غ.، كمُقَشِّع؛ من ٢ إلى ٦ غرامات كمُقيِّع.

<sup>(</sup>١) التَّسميتان للمُؤلِّف.

شادر، **پيل** 

طُرُق الاستعمال - الثَّمرة المُجفَّفة التي تَحُلِّ مكان البيْلا في الفَرْماكوبيا الإنجليزيَّة هي بيْلا رمْفِيُوس<sup>(۱)</sup> Bela de الإنجليزيَّة هي بيْلا رمْفِيُوس<sup>(1)</sup> Rumphius التي تُسمّى عِلميًّا Rumphius وتُستبدَل أيضًا في بَعض cydonium الأحيان بشمرة نَوع آخر من فَصِيلَة السُّذابيّات هي: فِيرْونيا الفِيْل<sup>(۱)</sup> أو السُّذابيّات هي: فِيرْونيا الفِيْل (۱) أو يُفرونيا الفِيْل (۱) أو يُفرونيا الفِيْل (۱) أو تُفاح الفِيْل (والمُونيا الفِيْل (۱) أو تُفاح الفِيْل (والمُونيا الفِيْل (۱) أو تُفاح الفِيْل (۱) أو تُفاح الفِيْل (والمُونيا الفِيْل (۱) أو تُفاح الفِيْل (۱)

أمّا المَقادير فمن ٤ إلى ٨ غرامات من المُستخلّص المائع.

مُلاحَظة - وَردَت البيْلا في أحد المراجع المَحليَّة على أنها ثَمَرة «الأَيْكل» وهو نَوع من الفَصِيلَة النَّارنجيّة، كما وَرد في المرجع عينه أنّ «الفِيرُونِيَة» هي جنس أشجار من فَصِيلَة اللَّرتُقَالِيَّات.

۱۹۶ - پِیْلُوکَرْبِیْن وأملاحه Pilocarpine et ses sels (F)

# نيترات الپيلُوكَرْبين $C_{11}H_{16}O_2N_2$ , $NO_3H = 271,3$

التَّحضير - نُنْهِك أوراق الجابُورَنْدي وقِشرته المَسحوقة سَلفًا، في كحول ٨٠ درجة مُضافًا إليه ٨ غرامات حامِض كلورهيدريك في اللَّيتر. نُقطَّر لكي نَفصل الكحول ونُركِّز الفُضَالة حتّى قِوام المُستخلص المائع. نَستعيد المُستخلَص بقليل من الماء، نُصفي، نُضيف إلى

المحلول زيادة خفيفة من النُشادر، نَستخرج الپيلوكرْبين من هذا المَزيج بخضّه مع الكلوروفورم. نَخضّ السَّوائل الكلوروفورميّة مع الماء الّذي نُضيف إليه الحمض النّيتريك على مَهْل حتّى تَفاعل حامِض خفيف؛ نَفصل، بالتَّصفيق، محلول نيترات الپيلوكرْبين المائيّ الّذي حَصَل كما سبق ونبخره في حمّام مريم بعد التَّصفية. ننقي نيترات الپيلوكربين أخيرًا بتَبَلُّرات عديدة في كحول غالٍ درجته ٩٠ كحوليَّة (كودكس كموليَّة (كودكس كما).

المُواصَفات - يَحتوي نيترات الپيلوكَرْبين على ٧٧٪ من الپيلوكَرْبين وعلى ٧٣٪ من الپيلوكَرْبين وعلى ٣٣٪ من نيترات الأمونياك NO3H. ويَكون في مَوْشُورات مُستطِيلة، جالسة، لامائيّة، عديمة اللَّون، لامِعة، غير قابلة للتَّلَف في الهواء، تَنصهِر بين ١٧٤ و١٧٩ سغ وتَتَفكَّك في الوقت عينه. يَذوب في ٨ أجزاء ماء بارد، وفي ١٥ جزءًا فقط كحول ٩٠ درجة عند ٢٠ سغ أو في ٢٠ جزء كحول ٩٠ درجة عند ٢٠ سغ. إنّه مُيامِن.

الحفظ - في قارورة مُقفَلَة بمعزل عن الضّوء.

سام - الجدول Toxique - Tableau A طريقة الاستعمال - بالفَم أو تَحت الجلد، مَقاديره الاعتياديّة هي ٥ملغ للجُرعة الواحدة (بالغون). مَقاديره

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

ب ي ل

القُصوى بالفِّم: ٠,٠٢غ للجُرعة الواحدة، ٠,٠٥غ لكلُّ ٢٤ ساعة.

إنّ سُولفات البيلوكَرْبين، وأسيتاته، وفُوسفاته، الّتي يَتمّ الحصول عليها بإشباع مُباشر لهذه القاعدة، هي أملاح غير مُستعمَلَة تقريبًا.

٦٥- بيلولات Pilules (F)

#### بيلولات أرْمَنِيّة

كُوبَايُو مُبَخَّر في حَمَّام مريم إلى

قِوام اللَّزْقَة ....٣٢ غ مغنازيا مَحروقة ..... غ كَبابَة ..... بَلْعَةَ أَرْمينيا (طين) .....

نُضيف المغنازيا إلى الكُوبايُو المُجمَّع؛ بيلولات البلّادون المُركَّبة نُضيف الباقي ونُحضِّر بَلْعات (كُرات) من ٠,٤٠ غرام. كان يُعطى منها في الماضي من ٥ إلى ٢٠ في اليوم في حال الإصابة بالتَّعقيبة. إنَّ لهذه البيلُولاتَ تُذَكِّر ببَلْعَات أرْمينيا الّتي وَضعها شارل ألبير .

### بيلولات أو خَشَب الكوباهو بالماتيكو

١٠٠غ		كُوباهو
٥ غ		دُهْن الماتيكو
كمِّيَّة كافية		مَغنازيا
	بَلْعة تُغَطّى بال	
ت الحادَّة	. في السّيلانا	لطريقة راكان
	•	7 * 11

#### بيلولات بَرْ كلورور الحديد

بركلورور حديد سائل عند ٣٠ سغ ... ٥ غ مسحوق هامد ....كمِّيَّة كافية نُحضِّر ۱۰۰ بيلولة، تحتوى الواحدة على ٢٥ ملغ من البركلورور الجافّ.

#### بيلُولات بزُبدة الكاكاو (لانسلوت)

زُبدة كاكاو .....ه غ شَراب الصَّمْغ .....٥ غ سُكِّر مُسحوق ....كمِّيَّة كافية نُقسِّم إلى بيلولات أو إلى بَلْعَات. كان يُنصَح بها في الماضي في الألم القَلْبيِّ وفي كثير من الحالات الَّتي لم يكن فيها تَحمُّل زَيت كَبد المُوريه مُمكنًا.

مُستخلَص عصير البلادون المُنَقِّي ١٠٠٠ غ مُرّ ..... مُرّ عِرْق الذَّهَبِ ..... غ نُحضِّر ٣٦ بيلولة. كانت تُستعمَل في الرَّبُو .

#### بيلو لات حَديديّة

سُولفُور الحديد الجافّ ....١٢٥ غ مُستخلَص الهنْدَب ٢,٥٠... غ جَنْطيانا مَسحوقة .....١٥٠ غ مُعَلَّبِ الوَرْد .....١ غ لصُنع ٣٠ بيلُولة يُؤخَذ منها ٢ إلى ٦ في اليوم. ضِدّ اليَرَقان.

بيلُولات زُرْنيخات الحديد	بيلُولات خَشَب أو جَرابات الكُوباهُو
زَرْنيخات الحديد ١٥٠٠٠ غ	والبَيْسِين والبيزموت
مُستخلَص حشيشة الدِّينار٤ غ	كوباهو كوباهو
خُبَّيْزة مَسحوقة ع غ	يَيْسِين مُتَعادِل٠٠٠ غ
شَراب زَهْر البُرتُقال	تُحت نيترات البيزموت١٢٠ غ
السُّكَّرِيِّكمِّيَّة كافية	مَغنازيا مَحروقة١٨٠ غ
لمقدار ٤٨ بيلولة؛ واحدة في اليوم.	نُحضِّر كُتلة لصُنع ٦٠٠٠ بَلْعَة نكسوها
ضِدّ القُوباء.	بالجيلاتين. بالجيلاتين.
بيلُولات زَرْنيخيّة (بازان)	مَقاديرها من ١٥ إلى ١٨ في اليوم.
زَرنيخات الحديد	
مُستخلَص الحُلوة مُرّة ١ غ	بيلُولات الدِّيجيتال والسَّقَمونيا والعُنْصُل،
تَحضير ٢٠ بيلولة.	بيلُولات مُبَوَّلة مُدِرَّة للسّوائل
بيلُولات زَرْنيخيّة مُركّبة (وِلْسُن)	عُنْصُل مَسحوق٥ غ
	ديجيتال٥ غ
زُرْنيخات الصوديوم غ عُود الأنبياء مَسحوق غ	راتنج سَقَمُونيا المكسيك ٣غ
كبريت الإثمد المُذَهّب ١,٢٥ غ	عَسَل أبيضكمِّيَّة كافية
لُعاب كمِّيَّة كافية	لصُنع ۱۰۰ بيلُولة (دستور ۱۹۶۹).
لتحضير ٢٤ بيلولة. واحدة في اليوم	كلُّ بيلوُّلة تُحتوي على ٠,٠٥ غرام من
في إصابات البَشَرة العَصِيَّة.	مَسحوق العُنْصُل و٢,٠٣٠ غرام من
بِيلُولات زِئبَقِيَّة مُسهِّلة قَويَّة، بيلُولات	مُسحوق السَّقَمُونيا. بُوشاردا يُشير إلى هٰذه البيلُولات على أنّها عِلاج مُمتاز في
بيلولات زِنبقِيه مسهله قويه، بيلولات بَلُوسْت	حالات الاسْتِسقاء، ١ إلى ٦ في اليوم.
بوت زئبق غ	Régime du Tableau A et C نظام الجدولين
عَسَل ٢٠ غ	معام الجدولين Regime du Tableau A et
نُطفئ الزِّنبَق تمامًا مع قليل من الأَلْوَة	بيلُولات ذَوّابَة (بورداش)
أدناه؛ عند ذلك نُضيف:	أَلْوَة، كَالُومَل، صابون طبِّي بأجزاء
ألْوَة أَلْوَة	مُتساوية .
سَقَمُونيا٢٠غ	

ب ي ل

٤٥

مِسْك وعَنْبر، من كلّ واحد ١٠٠ دَرَاخمة	راوَنْد
دقيق الحِنطة دَرَاخمة	بَهَار أسود، فِلْفِل أسود١٠ غ
تُشكِّل كُتلة مع عصير اللَّيمون والماء	نُحضِّر بيلُولات من ١,٢٠ غرام
نُقسمها إلى بيلُولات بحجم حَبَّة	(دستور ۱۸۸٤).
الحمّص.	كلّ بيلُولة تَحتوي على ٠,٠٥غ زِئبَق،
بيلُولات ضِدّ البرونشيت المُزْمِن	٠,٠٥غ أَلْوَة، ١٧ ملغ سَقَمونيا.
مُستخلص العُنْصُل ١٠٦٠ إلى ١,٦٠ غ	واحدة إلى ٤ بيلُولات في الأمراض
صَمْغ أَمُّونياك٢غ	السِّفْلسِيَّة والقُوبائيَّة. لذكرى التاريخ.
كلورهيدرات المُورفين٠٠٠٠ غ	بيلُولات مَشهورة بَقيت تركيبتها سِرِّيّة
لصنع ۲۰ بيلُولة، من ۲ إلى ٤ في	عند الطّبيب الجَرّاح بَلُوسْت نفسه لمدّة
اليوم. يُضاف إليها أحيانًا القليل من	طويلة، ومن ثمّ احتفظت بسرِّيَّتها عند
بَلْسَم تُولُو وتُدَخْرَج في مَسحوق	عائلته. إنّ بيلُولات بَرْبَرُونس وبيلُولات رونو
السَّوْسَن .	
	او دو دو دو النابولية لم تك سوى اسكال
4	أو رونُودُو النّابُولِيّة لم تكن سوى أشكال من بيلُولات بَلّوسْت.
بيلُولات خِدَ السَّرطان	من بيلُولات بَلُّوسْت.
بيلُولات ضِدّ السَّرطان صابون طبِّي٤ غ	من بيلُولات بَلَوسْت. زِئْبَق أونصة
بيلُولات ضِدّ السَّرطان صابون طبِّي ٤ غ صَمْغ أمُّونياك ٢ غ	من بیلُولات بَلّوسْت. زِئبَق أونصة سُكّر غروس
بیلُولات ضِد السَّرطان         صابون طبِّي       ٤ غ         صَمْغ أمُّونياك       ٢ غ         يُودُور الحديد       ١ غ	من بيلُولات بَلُوسْت.  زِئْبَق ا أونصة  سُكِّر ا غروس  Diagrède
بیلُولات ضِد السَّرطان         صابون طبِّي       ٤ غ         صَمْغ أمُّونياك       ٢ غ         يُودُور الحديد       ١ غ         برومور الحديد       ٠,٥٠٠ غ	من بيلُولات بَلُوسْت.  زِئْبَق ١ أُونصة  سُكّر ١ غروس  Diagrède  جَلَب ١ أُونصة
بیلولات ضِد السَّرطان         صابون طبّی       ٤ غ         صَمْغ أمُّونياك       ٢ غ         يُودُور الحديد       ١ غ         برومور الحديد       ٠,٥٠ غ         مُستخلَص الشَّوكَران       ١,٥٠ غ	من بيلُولات بَلُوسْت. زِئْبَق ١ أُونصة سُكّر ١ غروس صُكّر ١ غروس Diagrède جَلَب ١ أُونصة جُلَب ١ أُونصة نُشكِّل كُتلة مع كمِّية كافية من النَّبيذ
بيلُولات ضِدّ السَّرطان صابون طبِّي	من بيلُولات بَلُوسْت.  زِئْبَق ١ أُونصة  سُكّر ١ غروس  Diagrède  جَلَب ١ أُونصة
بيلُولات ضِد السَّرطان صابون طبِّي غ غ صَمْغ أمُّونياك	من بيلُولات بَلُوسْت.  زِئْبَق ١ أُونصة  سُكّر ١ غروس  مُكّر ١ غروس  Diagrède  جَلَب ١ أُونصة  جَلَب ١ أُونصة  نُشكِّل كُتلة مع كمِّية كافية من النَّبيذ  الأبيض ونُقَسِّمها إلى بيلُولات وزن
بيلُولات ضِد السَّرطان صابون طبِّي	من بيلُولات بَلُوسْت.  زِئْبَق ١ أُونصة  سُكُر ١ غروس  سُكُر ١ غروس  Diagrède  جَلَب ١ أُونصة  جَلَب ١ أُونصة  بُشُكُل كُتلة مع كمِّية كافية من النَّبيذ  الأبيض ونُقَسِّمها إلى بيلُولات وزن  الواحِدة ٤ حَبَّات (بُوميه).
بيلُولات ضِد السَّرطان صابون طبِّي	من بيلُولات بَلُوسْت.  زِئْبَق ١ أُونصة  سُكُر ١ غروس الخروس عُرِّبُوس المُونصة  Diagrède المُونصة المُنسكُل كُتلة مع كمِّية كافية من النَّبيذ نُشكِّل كُتلة مع كمِّية كافية من النَّبيذ الأبيض ونُقَسِّمها إلى بيلُولات وزن الواحِدة ٤ حَبَّات (بُوميه).  الواحِدة ٤ حَبَّات (بُوميه).  إنّ تركيبة أميرال الأتراك الكبير برُبروس، التي وهبها إلى الملك فرنسوا الأول، والذي كان بحاجة ماسة إليها،
بيلُولات ضِد السَّرطان صابون طبِّي	من بيلُولات بَلُوسْت.  زِئْبَق ١ أُونصة  سُكُر ١ غروس الْعَروس الْعَروس الْعَروس الْعَروس الْعَروس الْعَروس الْعَروس الْعَروس الْعَروس الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَروب الْعَروب الْعَروب الْعَروب الْعَروب الْعَروب الْعَروب الله الله الله الله الكبير الواحِدة ٤ حَبّات (بُوميه).  الأول تركيبة أميرال الأتراك الكبير الْمَروس، الّتي وهبها إلى الملك فرنسوا الأول، والّذي كان بحاجة ماسة إليها، الأول، والّذي كان بحاجة ماسة إليها، هي التّالية:
بيلُولات ضِد السَّرطان صابون طبِّي	من بيلُولات بَلُوسْت.  زِئْبَق ١ أُونصة  سُكُر ١ غروس الخروس عُرِّبُوس المُونصة  Diagrède المُونصة المُنسكُل كُتلة مع كمِّية كافية من النَّبيذ نُشكِّل كُتلة مع كمِّية كافية من النَّبيذ الأبيض ونُقَسِّمها إلى بيلُولات وزن الواحِدة ٤ حَبَّات (بُوميه).  الواحِدة ٤ حَبَّات (بُوميه).  إنّ تركيبة أميرال الأتراك الكبير برُبروس، التي وهبها إلى الملك فرنسوا الأول، والذي كان بحاجة ماسة إليها،

Diagrède مُستخلَص الأفْيُون ...... گرَاخمة مُستخلَص الأفْيُون ...... Diagrède

ب ي ل

اقترح بوشاردا هذه البيلولات لكي تَحُلّ مَحَلّ بيلولات لارتينغ الّتي كان يُعزى لها كذلك التَّركيب التالي: مُستخلَص الحَنْظَلِ المُركَّبِ ٢٠ غرامًا، مستخلص بزور السورنجان المائي الكُحوليّ ١ غرام؛ ونَقيع الدِّيجيتال ١

نُحضِّر بيلولات من ١٥،١٥ غرام.

إنّ البيلولات أعلاه كانت تُعطى بمقدار ١ إلى ٦ حتى حُصول الإسهال القَوِيّ للمَعِدة. وكان يُفَضَّل في بعض الأحيان استبدال غرام مستخلص الأفيون بمقدار عَشْر غرامات من سُولفات الكينا.

### بيلُولات ضِدّ النَّقْرِس (لومازورييه) سُولفات الكينا ..... ٥٠,٠ غ مسحوق ديجيتال ......... ٠,٢٥ غ مُسحوق جَذر البلّادُون .....وق جَذر مُستخلص خس السَّم .....كمِّيَّة كافية مُسحوق سْترال Strahl .....كمِّيَّة كافية نُحضِّر ٢٠ بيلولة. تُؤخَذ خلال يومين، كلِّ بيلولتين معًا، وعند النُّوبات العَنيفة، وخلال ٤ أيّام عندما تُصبح

### بيلُولات طاردة للحُمّى (مارك) ناردين .....۸غ سُولفُور الحديد ..... ٤ غ عَسل .....كُمِّيَّة كافية

النَّوبات أقلّ كثافة.

نُحضّر ٨ بَلْعات يُؤخَذ منها واحدة كلّ ساعتين تَفْصِلان النَّوبات.

ب ي ل

### بيلُولات طاردة للحُمّى (مَايْتْزنْجَر)

كَربُونات البُوتاسيوم ..... ٤ غ كَربُونات الأمُونياك .... ٤ مِلح نَباتي ..... ع غ كبريت الإثمِد المُذَهّب ٢....٢ غ مُستخلِّص نَفَل الماء .....٤ غ مُستخلص الأبْسنت ..... ٤ غ مُستخلَص البَقدونس .....كمِّيَّة كافية نُحضِّر كُتلَة نُقسِّمها إلى بيلُولات من ١٥,٥٠ غرام.

#### بيلُولات فرانك، حُبُوب الدّكتور فرانك الصِّحَّنَّة

أَلْوَة .....١٠٠٠ غ جَلُب ..... شراب الأبْسَنْت .....كمِّيَّة كافية نُحضِّهِ سِلُولاتِ مِن ١٠١٠ غرام مُفَضَّضة. مقاديرها ١ إلى ١٢ بيلُولة في مِلْعَقة حَساء أو شورباء، حسب الغاية المُسهِّلة المَطلوبة. كانت تُذَوَّب أحيانًا في حُقَنِ شَرجيَّة.

وحسب زَعْم غِيْبُورت، إنَّ خُبُوب الدّكتور فرانك الصِّحِّيَّة لم تكن بالواقع مُركّبة سوى من الألْوَة ومن عَصير السُّوس المُذوَّبة على السّاخن والمُبَخِّرة

ب ي ل

حتّى القِوام البيلُوليّ. ويُدخِل إليها البعضُ الآخر مِرَّة الثَّور، مُقَيِّئ، إلخ.

كانت لهذه البيلُولات تُباع في عُلَب أو في أنْصاف عُلب (عُلَب نِصفيّة).

ويبدو أنّ ما كان يُسمّى «مُقوِّي أودان – روڤيير المُسْهِل» أو «إكسير أودان – روڤيير المُقوِّي المُسَهِّل» كان نَتيجة مُعالجة مَواد بيلولات فرانك بماء الحياة.

#### بيلُولات كَربُونات حديدي، بيلُولات قالبه

نُذوِّب السولفات على السّاخن في كمِّية كافية من الماء الخالي من الهواء بالغليان والمُحلِّي سَلفًا بمقدار ١/٢٠ من وزنه من السُّكر. نُذوِّب الكَربونات بالطَّريقة ذاتها. نُصفِّي المحلوليْن، كلِّ علي حِدة؛ نَجمعهما في زُجاجة، نَخضُها، ونَتركها للرّاحة؛ نُصفِّق السّائل الّذي يَطفو فُضالَة پروتوكربونات الحديد الّتي تَشكَّلت، ونضع مكانه كمِّية جديدة من الماء الخالي من الهواء والمُسكَّر.

نتابع عمليّات الغسيل هكذا حتى يُصبح الماء لا يَحُلّ معه لا سُولفات الحديد ولا كربونات الصُّوديوم؛ عند ذلك نَرمي الرّواسب على قماشة مرصوصة ومُشرَّبة بشراب السُّكَر. نعصرها بقوَّة ونَمزُجها مع العسل ومع شكر اللَّبن (الحليب). نُركِّز المَزيج بسرعة في حَمّام مريم حتى القِوام البيلوليّ. نَمزُج ٣ أجزاء من هذه المادّة مع جزء واحد من مَسحوق السّوس ونصنع بيلولات من ٥٠,٠٠٤ نَضَعُها في

قارورة مُقفلَة جيِّدًا.

كلّ بيلُولَة تَحتوي بشكل مَحسوس على ٠,٠٣ غرام من الحديد.

يُمكن تَفْضيض لهذه البيلُولات أو دَحْرَجَتها في مسحوق الحديد المُسَمَّق.

إنّ بيلُولات قالّيه Vallet تُحفَظ لمدَّة طويلة من دون أن تَتَفَوْأَكْسَد. وهي بيلُولات كانت تَشتهر على ما يبدو بفعاليتها الكبيرة ضِدّ اليَرقان.

(تَركيبة مُماثلة لبيلُولات بلود).

المقادير: من ٢ إلى ١٠ بيلولات في اليوم. دستور أدوية ١٩٣٧.

## بيلُولات الكُوباهو والكَبابَة والتَّربَنْتين

 کبابَة
 ۹۰

 تَرْبَنْتين مَطبوخ
 ۲٤ غ

 کُوباهو
 ۲٤ غ

لتحضير ١٠٨ بَلْعَات نُعَلِّفها بالجيلاتين.

يُؤخَذ منها ٤ إلى ٣٠ في اليوم مع رَفْع المِقدار تَدريجيًّا. يجب ألا تُعطى إلَّا بعد مرور ٢٥ أو ٣٠ يومًا على الاقتحام التَّعقيبيّ.

إذا أضفنا ٠,٠٥ غرام إلى كلّ بَلْعَة من كُتلة بيلُولات ثاليه، نَحصَل على بَلْعات أو بيلُولات الكُوباهو، الكَبَابَة والتَّرْبَنْتين الحديديّة الّتي وَضعها بُوش؛ يُؤخَذ منها ٤ إلى ١٦ في اليوم عند الأفراد المُصابين بفقد القُوّة والوَهْن.

ب ي ل

ب ي ن اعرامات ماء مُقطَّر مُعَسَّل بشكل خفف.

نُبخِّر في البداية بسرعة، ومن ثمّ في النِّهاية على مَهْل، حتّى يَنقص النِّتاج إلى ١٠٠ غرام. نُضيف كمِّية كافية من الصَّلْصال Kaolin لكى نُشكّل كُتلة مُتجانِسة. نُقسِّم الكُتلة إلى ١٠٠٠ بيلُولَة نُدَحْرجها في مَسحوق الحديد. نُعرِّض السِلُولات لحرارة لطيفة. نُحضِّر من جهة ثانية مَحلولًا من السَّنْدَرُوس (زَرْنیخ أحمر) ۲٫۵۰غ. ومن بَلْسَم تُولُو ١غ (إنَّ فُضالة شَراب بَلْسَم تُولُو قد تصلح لهذا الغرض) في ٢٥ غرام أثير، نَصِبٌ لهذه الصِّبغة في وعاء تَبخير حيث تكون فيه البيلُولات (مُجزَّأة) ونجعل الوعاء يدور بحركة مُتناسِقة لكي تَتَرطَّب من الخارج ونُسهِّل تَبخُّر الأثير. أخيرًا، عندما تبدأ البيلُولات بالالتصاق، نُفرغها في قوالب للعجين، مع الانتباه إلى فصل البيلولات التي تلتصق فيما بينها. نتركها في الهواء الطّلق لمدّة ٢٤ ساعة، ونُنهي التَّجفيف إذا لزم الأمر في مِحَمّ حرارته • ٤ °سغ. بَعد التَّجفيف نَضع البيلُولات

### بيلُولات يُودُور الرَّصاص

۲۰۰۰ غ		الرَّصاص	يُودُور
ة كافية	کمَّتَّ	الهَ رُد	مُعَلَّب

في قارورات زُجاجيّة نُقفلها جيّدًا. كلّ بيلُولَة تَحتوى على ٠,٠٥ غرام من

اليُودُور الحديدي (دستور ١٩٣٧).

نُحضِّر ١٤٤ بيلُولَة. داء الخَنازير، الأورام الجَرَذِيّة.

#### بيلُولات يُودُور الزِّئبق

### بيلُولات يُودور الكلورور الزَّئبقيّ

### ٦٦- بَيُّوت<sup>(۱)</sup>، صَبَّار وِلْيَمْز<sup>(۲)</sup>

Peyoti (E)

Peyote, Cactus LSD (F)

Echinocactus Williamsii, Echinocactus Lewinii, Anhalonium Williamsii, Anhalonium Lewinii, Lophophora Williamsii (S)

نَبات مَكسيكيّ صغير مُقدَّس وحيد الجنس والنَّوع من فَصِيلَة الصَّبَّارِيَّات. وهو من أنْدَر أنواع الصَّبَّار الخالية من الأشواك. يَعلو من ١٥ إلى ٢٠سم. ساقُه سَرْحَة أسطوانيّة تَنتهي بأرْسوسة

<sup>(</sup>١) التُّسمية لإدوار غالب.

<sup>(</sup>٢) التَّسمية للمُؤلِّف.

غليظة يَرْمَعِيّة تَعلوها صُفوف من التُّعْلول المُفلطَحَة. تَحمل كلّ دَرَنة مُستديرة وقليلة البُزور، ضُمَّة من الأوبار الصُّوفيّة. أزهاره صغيرة فَرديّة بَيضاء أو وَرديّة اللَّون، تُنْتِج عددًا هائلًا من البُزور حتى بطريقة التَّغبير المُباشر.

إنّ تكثير لهذا النبات بالبزور سَهل للغاية ولكنّ إفراخ البذار يكون بَطيئًا. جذره الوَتَديّ الشَّكْل المَخروطيّ اللَّفْتيّ، يُشكِّل تحت التُّراب مَخْزونًا من الغذاء والماء. كما أنّ كاقة أعضاء النبات المَطمورة تَكون رَخْوة ولَحْميَّة، مِمّا يُوجب زِراعته في تُربة خَوّارة جدًّا وجيدة التَّهوئة.

المُركِّبات - دَرَس كيمياء البَيّوت، وبِنوع خاص في ألمانيا والنَّمسا، كلّ من لَوِيْن، هَفْتَر، سبيث، الذين وصفوا و قِلَوِيْدات فيه على الأقلّ: مَزْقَالِيْن دريالاردريش دريالاردريس دريالاردريس دريالاردريس دريالاردريالاردريالاردريالاردريالاردريالاردريالاردريالارديالاردرالاردرالاردريالاردرالاردرالاردريالاردرالاردريالاردرالاردريالاردريالاردريالاردرالاردريالاردرالا

إلخ. البَيُّوتُلين هو القِلَوِيْد الأكثر وَفرة؛ وهو، كالأنهالامين واللُّوفُوفُورين، إلخ يَحتوي على نَواة إيزوكينولاييكيّة. المَزْقالين والأنْهالين بُنْيَتُهما أبسط.

ب ي و

الخصائص والاستعمال - تُعْزى إلى المَوْ قالين عمومًا خاصِّية إحداث رؤى مُلَوَّنَة. أعطى المُستخلَص العامّ (Panpeyote) بجرعات قدرها ۰٫۰۵ غرام مُكرَّرة. إنَّه يُحدِث غالبًا حالة غَثَيانيّة. استعمل البيوتلين بشكل كلورهيدرات كمُنوِّم مُخدِّر ومُسَكِّن، بجرعات قدرها ٠٠,٠١ إلى ٢٠,٠٣ في اليوم، في بعض الإصابات العَقْليّة. إنّ إدمان المُخدِّرات السّامّة الحديث أعاد الضّوء على هذه المواد الّتي تُسجّل اليوم على الجدول B منذ العام ١٩٦٦، كمواد مُهَلُوسَة. وكان مَضْغ دَوائر صَغيرة من النّبات يسمح لأهل البلاد أن يَتَصدُّوا للتَّعَب والعَطَش؛ كما كان يُزوِّدهم بهَلْوَسات مَرْ ئيّة عجسة و نادرة.



Tayuya (E)

Tayuya, Tayuia (F) Tayuya (D)

Trianosperma tayuya, Bryonia tayuyia (S)

٦٧ - تَأْيُوْ يا (١)

إِنَّ كَلَّمَةُ تَايُويا هِي تَسمية شُعبيَّةً. عُلَّماء فيه بوفرة عالية جدًّا. الطّبيعة البر ازيليّون غير مُتّفقون على النّبات الَّذي يُنسَب إليه هذا الاسم، وهو في كلَّ حال نَمات من فَصِيلَة القَرْعِبَّات يُشير مارسيوس إلى نبات يتحلّى بخصائص مُقبِّنة ماسِطة يُدعى Trianosperma tayuya؛ بينما نَجد في مَعْشَبة مُتْحَف باريس نَموذجًا نَباتيًّا مُدَوَّنًا باسم عِلميّ . Bryonia Tayuia Vellozo : هه

> جَنْبَة سَرْعِيّة، بَرِّيَّة في الغابات أو في حُقول البُنِّ في الغالب؛ أوراقها مُسنَّنة، ثَمرتُها ثُلاثيَّة الفُصوص تَحتوى على حَوالِي ١٢ بزرة؛ جَذرها مُتطاول لِفتيّ الشُّكُل.

> الخصائص والاستعمال - كافّة أقسام النَّبات مُرَّة الطَّعم، مُسهِّلة قَويّة، وحالّة مُصرِّفة، تُحدِث عملًا خاصًا جدًّا على الجهاز اللُّمْفاوي. الجذر هو القسم

الأساسيّ الّذي يُستعمل في مُعالجة السِّفلِس، في نُقاعة أو في صِبغة كُحولية. جَذر تايُويا ١؛ كحول ٣؛ تُؤخَذ الصِّبغة بمقادر خفيفة بدءًا بنُقطة واحدة، نَر فعها تَدريجيًّا حتى ١٥ نُقطة. يُحضَّر كذلك لَصُو قات مُصرِّفة من المسحوق.

المُ كِّمات - عَزَل مارتان من التايُويا: راتنج أخضر اللُّون، مادَّة دَسِمة ومادّة استخراجية بُنِّيَّة اللَّون، مُرَّة جدًّا وعطريّة جدًّا، عَفْص، نَشاء، زَبت طَبّار، مَغنيزيا، ألُومين، كلس، حديد، يوتاس، لِنْف. الموادّ المعدنيّة تُوجد

قام دو جاردان بإجراء تجارب على هذه المادّة المُبَجَّلَة جدًّا من قِبَل الأطبّاء البرازيليِّين، في مُعالجة السِّفلِس، و الاستسقاء، و الانسدادات الحَسُّويّة، والنِّقْرس، والصَّرْع، إلخ.

وصل التايويا إلى أوروبا في شرائح مُدَوَّرة مُجفَّفة سمكها ٣ملم وقُطرها ٤ ملم، مُصفرَّة اللَّون ومُشِعّة البناء الدّاخليّ كما هو الحال في جُذور الفاشيرة.

Nicotiana, Tobacco (E) بَنْغ نَبَاكُم -٦٨ Nocotiane, Tabac, Tabac commun, Tabac de la Havane, Pétun, Herbe à la reine, Herbe du grand-prieur, Herbe de Ste-Croix, Herbe à tous les maux (F) Tabak (D)

Nicotiana tabacum (S)

نَبات حَولي من فَصِيلَة الباذِنْجانِيَّات،

ت ب غ

أوراقُه كبيرة مُتطاوِلة سِنانيّة، مُستدِقَّة الرِّأس؛ أزهاره وَرديّة، تَزْيينيّة، في عُثكول واسع؛ التّاج قِمعيّ الشَّكْل، مُنْتفِخ العُنُق، ذات سَكَمات مُنبسِطة، مُنْتفِخ العُنُق، ذات سَكَمات مُنبسِطة، قويّة، وأنبوب من ٢ إلى ٨سم؛ ساقُه قويّة، بَسيطة، تَعلو من ١,٥ إلى ٨ر٥م. يُنتِج تَبْغ التَّدخين. مهدُه أمريكا الاستوائيّة. رائحة النَّبات الغَضَ مُخَدِّرة، طعمه مُرّ ومُغثٍ، رائحة التَّبغ الجاف المُميَّزة تَتنامى خِلال العَمليّات التي يَخضع لها.

من أمريكا، دَخل إلى إسبانيا أوَّلاً، عام ١٥٦٠. اسمه العلميّ Nicotiana هو اسم السَّفير الفَرنسيّ جان نِيكوت، سفير الملك فرانسوا النَّاني إلى إسبانيا؛ وهو اللَّذي كان أوّل من أتى بالنَّبتة إلى فرنسا عام ١٥٦٠ وكرَّم بها الملكة كاترين دو مَديسيس.

المُركبات - يَحتوي النَّبغ على ٢ إلى ١٠٪ من قِلَوِيد قَوِيّ يَدين له بخصائصه، الا وهو النَيكوتين ٢٠٥٨ الَذي اكتشفه بُوستلى ورَايْمَنَ عام ١٨٠٩. يَتمّ الحُصول على هذا الجَوهر بتقطير التَّبغ مع الماء المُقلَّى بالبُوتاس الكاوي، ومُعادَلة الهيدرولة الحاصِلة بواسطة حامِض سُولفوريك، وبالتَّبخير حتّى قوام المُستخلص الذي تُنهكه بالكحول، ونُبخَره من جديد، ونُقطر المُستخلص ونبخره من جديد، ونُقطر المُستخلص الذي تُنهكه بالكحول، ومن ثمّ نُحرِّك النَّاج المُقطَّر مع الأثير؛ ومن ثمّ نُحرِّك النَّاج المُقطَّر مع الأثير؛ يَتبقى مادَّة زَيتية

القِوام شبه عديمة اللَّون، طَيَّارة، رائحتها وطعمها تَبَّغِيّان إلى أقصى حدّ: نيكوتين شبه نَقيّ.

المُواصَفات - النِّيكُوتين هو سائل زَيتي، عَديم اللَّون، كثافته ١,٠٠٩ عند ١٥°سغ، ولكنّه يَميل رويدًا رويدًا إلى اللَّون القاتم إذا تعَرَّض للهواء. طعمه حامِز ولاهب؛ يَغلي عند ٢٤٧°سغ ويَنشُ أبخرة مُهيَّجة؛ ذَوّاب جدًّا في الماء، والكحول، والأثير، والزُّيوت الدَّسِمة. وهو سَم عَنيف. تَختلِف نسبته في التُّبوغ المَروعة من ١ إلى ٨٪.

إنّ التَّبَغ يُعطي بتقطيره مع الماء مادّة مُضطَّربة تَشكَّل فيها بِلَّورات نيكوتيانيْن أي كافور التَّبغ. ويَنسُب البَعض عِطر التَّبغ إلى هذه المادّة؛ أمّا بالنِّسبة للبعض الآخر، فقد يَكون العِطر مردُّه إلى قِلَوِيد طيّار، أكثر سُمِّية من النِّكوتين: كُولِّيدين C<sub>8</sub>H<sub>11</sub>N.

كذلك تَحتوي ورقة التَّبغ على حامِض نيكوتيانيك وهو حَصيلة أكْسَدة النِّكوتين، وعلى سُكَّر مُحَلِّل كيميائي، حامِض تَباكو - تَنِّيك مُشابه لحامِض الكافيه - تانيك، وعلى صابُونُوسيدات وأملاح بوتاسيوم (٥ إلى ١٠٪).

ولقد استخرج آخرون من التَّبغ (۱۹۰۱–۱۹۰۷) قِلُویْدات ثانویّة مُختلِفة، غیر مُؤکْسَجَة، وزنها الذَّرِیِّ آخف بقلیل من وَزن النِّیکوتین: نیکوتایین، نیکوتیمین (مُتجازِئ النِّیکوتین)، نُور – نیکوتین،

ت رب تريمتيلامين، ن - متيل بيرُّولين.

الخصائص - النَّكوتين، مادّة مُخدّرة - حامِزة قَويّة جدًّا، لا تُستعمَل قَطْعًا سوى من الخارج. نُقاعة أوراق مُجفَّفة بمقدار ١٠ بالألف في الماء، أُعطِيَت في حُقَن شَرْجِيّة ضِد الأقْصُور الدُّوديّ الشَّكل (عَمليّة خَطِرة). كما استُعمل التَّبغ أيضًا في لُوسيونات ضِدّ الجَرَب، والقَرَع، والنَّقْرس، إلخ.

79 - تُرْبُد، أَثْمَان تُرْبُد Turbith, Turbith végétal (F) Turbith (D) Convolvulus turpethum, Ipomæa turpethum (S)

التُّرُّبُد هو عَقّار من سِيْلان وماليزيا من فَصِيلَة اللَّبْلابِيَّات؛ وهو يتألُّف من أرومة النَّبات الرِّيزوماتيَّة ومن جذورها، ويَقع في قِطع مُتفاوِتة الطُّول، قُطرها ١ إلى ٣ سم، مُتَلوِّية على ذاتها في غالب الأحيان. القِشرة قد تكون مُنَظَّفة من طبقتها اللِّيفيّة؛ رَماديّ إلى مُحمّر اللُّون، مُمرَّك بأثلام طُوليَّة عميقة. تُبْرِزُ المنطقة القِشْريّة، على المَقْطَع العَرَضي، خُزمات نَجَخْشبية -Libéro ligneux غير طبيعيّة، مُنعزلة ومُتطاولة تَماسِّيًّا، تُعرف من لونها الأبيض المُرمَدّ و من المَسامّ الوعائيّة التي تَثقُب سطحها. في قاعدة السوق وفي الرِّيزوم يَتَقطَّع الجسم اللِّيفي السَّميك عمومًا بشعاعين جُمّاريّين عَريضين مِسْمارتي الشَّكل وغير كاملين؛ وهو جسم يُحيط بلُبّ ظاهر.

وتكون شُعاعات الجسم اللِّيفيّ الجُمَّارِيَّة في الجذر أكثر عددًا، وغير كاملة أيضًا؛ لا يُوجد لُت (دستور أدوية).

المُرَكِّمات - يتألَّف تُرْبُد الصَّيادِلة عمومًا من ٦٣ إلى ٧٥٪ ريزومات، ٢٢ إلى ٣٠٪ جذور، ١٪ سوق. طعمه حامز ومُغثِ. يَحتوى على ٧ إلى ٨٪ من الرّاتنج الّذي يَذوب في الأثير، ٢٪ ترباتين وهو هيتروسيد يذوب بالكحول ويتألُّف الرّاتنج من رَامْنُوسيد: ألْفا -ترباتين ومن أوزيد Oside آخر، بيتا -ترباتين نَفصله بالأثير.

التُّرْباتين يَتحوَّل بفعل القِلَى إلى حامض تُرْباتيك. تَشطُره الحوامض المُخفِّفة إلى حامِض إيزوبُوتِيريك، تُرْباتُول، وغلوكوز.

التُّرْبُد المَخزنيّ يجب أن يحتوي على ٧٪ من الرّاتنج كحدّ أدنى، ١٪ من كسرات السّاق القاعديّة كحد أقصى.

الخصائص - مُسهِّل عَنيف، نادرًا ما يُستعمَل.

الاستعمال - يَدخل في تركيب صِبغة الجَلَب المُركَّبة.

طريقة الاستعمال - مَقادير الصَّمْغ تُعطَى كما ذُكِر في مَقال الجَلَب المُتصَبِّع في هذا المُعجَم.

٧٠- تَمْر هِنْدَى، حَوْمَر، حُمَر

ت م ر

الخصائص - مُسهِّل لطيف، مُدِرِّ للصَّفراء، طارد للدود.

الاستعمال - لُبّ الثّمار، مَعجون عَسَليّ، شراب سُكَّريّ، أوراق، أزهار، قشور. إمساك عاديّ خاصّة عند الكبدو صفراويّين، إسهال مُزمِن. اللّبّ مع السُّكَر يُمدَّد ويُحَلّ بالماء يُصبح مشروب التَّمر هِنديّ المُنعِش.

طريقة الاستعمال - نُقاعة ٢٠ غرامًا في ليتر ماء غالٍ يُؤخَذ منه كُوبان في اليوم. مُستخلَص التَّمْر هِنديّ من ٣ إلى ١٥ غرامًا في نِصف كُوب ماء يُحلّى بالسُّكَر. مُرَبَّى الكودكس يُؤخَذ منه ٢٥ إلى ٥٠ غرامًا للبالغ، وغرامان لكلّ سنة من العُمْر للأولاد دون الثالثة. إنَّ المُستحضر الصَّيْدليّ المُسمّى تَمارِين المُستحضر الصَّيْدليّ المُسمّى تَمارِين لبّ ثِمار التَّمر هنديّ وسَنامَكيّ والكُرْبَرة والسُّوس.

مُلاحظات - الشَّجَرة مهدها مِصْر ومنها انتقلت إلى الهند الشَّرقيَّة والأنتيل. لُبُ ثمارها أعيد تسجيله في الفرماكوبيا عام ١٩٧٥. أمّا لتحضير التَّمْر هِندي فنفتح القُرون ونأخذ منها اللَّب مع البزور ونضعها طبقاتٍ في بَراميل نَسكب فوقها شرابًا سُكَريًا يَتَسَرَّب إلى قَعرها. يُغلَى اللُّب في يَتَسَرَّب إلى قَعرها. يُغلَى اللُّب في الاسوداد، وهذا ما يُفسر وجود النُحاس في هذه المادة. يَصل اللُّب إلى أوروبًا في من أو بقا و آسا وأم يكا.

Tamarind tree, Tamarinde (E)

Tamarinier, Tamarin (F)

Tamarindenbaum (D)

Tamarindus indica, Tamarindus officinalis (S)

شَجَرة مُثمِرة كبيرة دائمة الإيراق الكشف جدًّا من فصيلة القَرْنِيَّات العَنْدَمِيَّة تَعلو من ١٠ إلى ٢٥ مترًا. جذعها مُتفرِّعة من أسفلها، لحاؤها مُتَشقِّق وحَرْشَفيّ. أوراقها مُزدوجة التَّرتيب الرِّيشيّ، مُتعاقبة، كثيفة جدًّا، ورريقاتها مُعنَّقة، مُستطيلة، مُستديرة الرّأس، كامِلة، مَرْطاء. أزهاره عُنقُودِيّة التَّجميع الهامي، رُباعيّة الكأسيّات، خُماسيّة البَتَلات البُرتقاليّة اللّون الأصفر. الثَّمرة قَرْن بُنِّيِّ اللَّون المُسوَدّ، مُفَلطَح، مُنحنِ كالسَّيفّ، مُتَذلِّ، طُوله من ٧ إلى ٢٥ سم وعرضه من ١,٢٥ إلى ٥,٧سم، غير مُنفَتِح، لُبُّه ليفي مُصفَرّ اللُّون وهو الَّذي يُشكِّل ما يُسمَّى «تَمْر هِنديّ، يحتوي على بزور مُستديرة يَتحدَّب عندها القَرْن من الخارج. تُجمع الثِّمار عند تمام نضجها.

المُرَكِّبات - إنّ تَمر هندي الصَّيدليّات هو اللَّب الخام الذي أعيد تَسجيله في الإصدار التّاسع للفرماكوبيا الفرنسيَّة عام ١٩٧٥. حوامِض عُضويَّة: حامِض تُفّاحيّ، حامِض ليمونيّ، حامِض دُرديّ الخَمر، غلوسيدات، سُكَر، لَقُولوز، يَكْتين.

ت م ر

يقع تَمْر الأسواق في عجينة مُسودَّة و اللَّون، مُتماسكة، تحتوي على البزور ال وبَعض البَقايا النّباتيّة، رائحتها خَمْريّة، و طعمها مُحمض وحُلُو. العجينة الجيِّدة ال تجفّ بمرور الزَّمن، أمّا العجينة السَّيِّئة ح فَتَتَعَفِّن. هناك تَمْر أحمر اللَّون ذكره ج لامري وكان الصّنف الوحيد الذي ب يُستعمَل في إنكلترة في ذلك الوقت، يُ

وهو بالتّالي أكثر حَلاوة وألّد طعمًا من التّمر الأسود، ومصدره البرازيل. ويُحضَّر التّمر في بعض المناطق المِصريّة في قوالب يَزن الواحد منها حَوالى ٢٠٠ إلى ٣٠٠ غرام، قوامها جامد جدًّا، يَتوسَّطها ثقب يسمح بجمعها وتعليقها للحفظ، وهو صنف يُشكِّل قسمًا من مؤونة القوافل الغِذائيّة.

ث م ر

مُنْقَلِب (٣٠٪)، مادَّة مُرّة (جُونيپارين)، بَكتين، مَوادِّ هَيُوليناتِيَّة، سَلُولوز، حامِض نَمليِّ وخَلِّيِّ وتُفَّاحيٍّ، مَوادِّ مَعدِنيَة (٥٪).

الخصائص والاستعمال - إذا نُقِعت صَنَوبرات العَرْعَر في الماء الغالي فإنّها تُبدِي التَّخمُّر وتُعطي "نَبيذ العَرعر" الذي يُعطي بالتَّقطير قِنديد أو ماء حَياة حَبّ العَرعر، أو ما يُسمِّيه الأَلمان بكل بَساطة: العَرْعَر (راتافيا العَرْعَر).

إنّ استعمالها يُكسِب البَول رائحة البَنَفْسَج. إنّ المُستخلَص أو الرُّبّ يُدعى «تِرياق الألمان»؛ وهو يُستعمَل بمقدار غرام واحد إلى عشرة؛ أكثر ما يُستخدَم في طبّ الخَيْل؛ الثَّمار ذاتها تُستعمَل في مُمُدِرّ للصَّفراء ومُبوِّل؛ المُستخلَص كُمُدِرّ للصَّفراء ومُبوِّل؛ المُستخلَص كمُدِرّ للصَّفراء ومُبوِّل؛ المُستخلَص (دستور أدوية ١٨٨٤)، بمقادير ٥٠٠٠غ، مر كَبات نبيذ تروشُو. تُستعمَل كذلك في مُركِّبات نبيذ تروشُو. تُستعمَل كذلك في تبخيرات، كمُهيَّجة، وكمُضادَّة للرُّوماتيزم. أمّا الزَّيت الدُّهنيّ فبمقدار للرُّوماتيزم. أمّا الزَّيت الدُّهنيّ فبمقدار إلى ١٠ نقاط؛ والهيدرولة من ١٠ إلى ١٠ غرام.

مُلاحظة - يُستعمَل من العرعر الشّائع الشِّمار، الخَشَب، الأوراق، الزَّيت الدُّهني الحاصل من تَقطير الشَّمار البُخاريّ، الأغصان والفُروع المُورِقة. وكان خَشبُه الرّاتِنجيّ الصُّلْب المُتراصّ يُعتبَر مُعرِّقًا ومُضادًّا للسّفلِس كعود



#### Genièvre (F) فَمَرَة العَرْعَر الشّائع -٧١ Wacholder strauch (D)

إِنَّ ثمار العَرْعَرِ، الَّتِي تُسمَّى عِنْبِيَّات عن خطأ، إنّما هي صَنَوْ بَرَاتٌ رَخْوَة أو أَكُواز رَخُوة Malacônes لَحمتَة، كُرُويَّة، مُؤلَّفة من ٣ حَراشِف مُلتجِمة، تَحتوي على عصير لُبَابِيّ مُخْضَر اللَّون البُنِّي، عِطري جدًّا، طعمه حُلو، وتَحتوى على ٣ بزور قاسية، بَيضيّة الشَّكْلِ المُنعكِس، مُزَوَّاة، مَحفورة بغَمّازات مُزَيَّنة بحُوَيْصَلات (قُرَيْبَات) مَملوءة بزيت طيّار قَبْل نُضج الثِّمار، ولكنّه زَيت يَتَرَتْنَج: Résinifier عند النُّضج. ذلك يَعني أنّه للحصول على الزَّيتَ الطيّار، يَجب جَمع الثِّمار غير النّاضجة، وأمّا لتَحضير المُستخلّص، وعلى عكس ما تقدُّم، يَجب الانتظار حتّى تُصبح الثِّمار ناضجة، وحتى تُجمع مُجفّفة كما يَحصل ذلك في

المُرَكِّبات - صَنَوْبَرات العَرْعَر إذًا، تَحتوي على: زَيت طَيَّار (حَوالى ١٪)، راتِنج (١٠٪)، شَمْع، عَفْص، سُكَّر ثم ر الأنبياء تمامًا. وتَشتهِر رؤوس الفُروع وتَشتهر أرْمدتها على أنّها مُدِرَّة قَويّة المُزهِرة والأوراق على أنّها مُسهِّلة، للسَّوائل.

نَبيذ السُّورنجان ....٣٠٠ غ

نُقاعة بابُونج .....نابونج

ماء الكَرَز الغاريّ .....٥غ

شراب بسيط ..... فيراب بسيط

يُؤخَذ بالمِلْعَقة، كلّ ساعتين مَرّة.

جَرُوع السُّوْرَ نْجان

#### Looch, Lok (F)

٧٢- جَروعات

#### جَرُوع أسِتات الأمُونيوم (كتاب الوصفات الوطنيّ ١٩٧٤)

مَحلول أستات الأمُونيوم .....٦غ بَنْزُوات الصُوديوم .....٥ غ شَراب بَلْسَم تُولُو .....٣٥٠غ شَراب عِرْق الذَّهَب المُركَّب ٣٥.... ع ماء مُنقِّى كمِّيّة كافية لمقدار ١٥٠٠٠ ملل نُذوِّب البَنْزُوات في قسم من الماء، نُضيف محلول الرستات، نَمزُج كلّ مَرَّة، في سَيَلان التَّعقيبة. ونُصفّى. نُضيف الشّرابات، نُكمل، نَمزُج. مُقشِّع. بالغون: حتّى ٥ ملاعق كبيرة لكل ٢٤ ساعة.

#### جَرُوع تَرْبَنْتيني ضِد التّينيا، جَرُوع لُوڤاشييه ضد الدُّودة الوَحيدة

ناب الم	زَيتِ خروع
١٥	دُهن تَرْبَئْتين
٤٦٠	ماء نَعْنَع
	شَراب السُّكَّر .
٠١٠	صَمْغ عَربيّ

#### جَرُوع شُوپّار البَلْسَميّ، جَرُوع بَلْسَم الكو باهو

بَلْسَم كُوباهو .....٥٥ غ کحول ۸۰ درجة ..... شَراب تُولُو .....٥٠ غ ماء النَّعنع ..... حامِض نيتريك مُكَحْلَل .....٥ غ دستور ۱۸۸٤.

٣ إلى ٦ ملاعِق في اليوم، مع الخَضّ

إنّ طعم لهذا المُستحضر بَشِع جدًّا. لذلك يُنصَح بشطف الأنْف عند أخذه لكي لا يُسْتَشعر طعمه؛ ومن ثمّ يُعطَى عدد من مُحَلِّيات النَّعنع بَعد ابتلاعِه.

كان كاديت يَستبدِل شَراب التّولُو بشراب كُزْبَرة البير ويُضيف ماء زَهْر البُرتُقال. إذا استُبدِل الكحول بمِقدار ١٥ غرام صَمْع عرَبيّ مَسحوق، وأفضل، بصفار بَيضة نَهرُس معه الكُوباهو أوّلًا، نَحصَل على جَرُوع شُوپّار أو جَرُوع الكُوباهو المُستحلَب.

جَرُوع ضِدّ عِرْق النَّسا (شنایْدَر)	لقد استَبدَل بَارِيْزَل شراب التَّولُو ومياه
دُهن تَربَئْتين۸غ	النَّعنع وزَهْر الْبُرتُقالُ بالقَطْرَانُ، لأنَّه
صَمْغ عَربيّ مَسحوق٨غ	يُقَنِّع رائحة الكُوباهو وطعمه، واقتراح
	شُوپّار المُعدَّل كالتَّاليِّ:
ماء النَّعنع الجُعْديّ١٢٥ غ	كُوباهوكُوباهو
سُكّر ١٥	شَراب القَطْران٣٠غ
شَرابِ النَّعنع المُفَلْفَل٣٠ غ	
مِلْعَقتان، ٣ مَرّات في اليوم. ويَجعل	كَربونات الصُوديوم ٢ غ
مُؤلِّف هٰذا الجَروع المَريضَ يَفْرِكُ	ماء النَّعنع١٢٥ غ
الأجزاء المريضة بالمَرُوخِ التّالي: دُهْن	أثير سُولفوريك غ
تَرْبَنْتين ١ جزء؛ مَرُوخ طَيّار مُكَوفَر ٢	نُذوِّب الكربونات في الهيدرولة،
جزء.	نُضيف الكُوباهو، نُحرِّك ونُضيف باقي
جَرُوع ضِدْ النَّزْلَة، جَرُوع مُقَشِّع	الموادّ. يُصبح الكُوباهو بذلك مُستحلبًا.
مُستحضَر العُنْصُل العَسَليّ ٥٠ غ	جَرُوع ضِدَ التَّشَنُّج، جَرُوع مُؤَثْيَر
إكسير مُهدِّئا	شراب زَهْر البُرتُقال٣٠ غ
روح الخُزامي المُركَّب١٢ غ	_
ماء النَّعنع المُقطَّر كمِّيَة كافية	ماء الزَّيزفون٩٠ غ
قاطِع مُمتاز . Excellent incisif	ماء زَهْر البُرتُقال٣٠غ
3 6	أثير سُولفوريك غ
جَرُوع ضِدَ النَّشاط	استَبدَل دستور ١٨٨٤ غرامَي الأثير
نُقاعة أوراق بُرتُقال ٢٠٠ غ	بأربع غرامات من ليكور هُوفمان.
صَمْغ كُثَيراء٢ غ	إنَّ الجَروع المُضادِّ للتَّشَنُّج المُؤَفِّين
إِنْمِد مُدِرّ العَرَق الغَزير٣ غ	كان يُحضَّر بإضافة ٠٨٠غ من لُودانُم
شَراب بسيط	سِيدِنْهام إلى الجَروع أعلاه.
شَراب دیاکود۲۰	جَرُوع ضِدّ زُلال البَوْل
جَرُوع الكُودايين وبَلْسَم تُولُو	حامِض غَلَّيكع
	شَراب بِسيط ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ماء الكَرَز الغاريّ٢غ	ماء مُقطَّر
شَراب بَلْسَم تُولُو ع	يُؤخَذ خلال النَّهار .

يُقال إنّه صالح لتَسهيل طرد الأغشية الخاطئة.	ماء مُطهِّر مُنقَّى كمِّيَّة
جَرُوع مُضاد للتَّعقية ماء كُوباهُو المُقطَّر ٢٠٠٠غ ماء لكَرَز الغاري المُقطَّر ١٠٠٠غ شَراب بسيط كمِّيَّة كافية يُعطى خلال يَوم أو يومين للمرضى الله الذين بإمكانهم أن يَتَحمَّلوا دواء الكُوباهو والكَبَابَة الأَقْيُونيّ.	كافية ل
جَرُوع مُضاد للرَّبُو (كوربوت) جَذْر الرَّاسَن	مَغنازيا مَحروقة ٤ غ ماء النَّعنع ٩٠ شَراب قِشر البُرتُقال ١٥
نُضيف :	جَرُوع ماص
خلّ العُنْصُل)خلّ العُنْصُل	راوَنْد غ کَربونات صُودیوم۲ غ
خلّ العُنْصُل) ٢١ غ شَراب بُولُوغالِن ڤرجينيا ٣٠ غ جَرُوع مُطهِّر مُكَوْفَر إنْجبار فرجينية ٨ غ	راوَنْد غ کَربونات صُودیوم۲ غ
خلّ العُنْصُل)	راوَنْد

ج ر و

جَرُوع مُقَيِّى	نُذُوِّبِ الكافورِ في الصَّبغةِ.
شَراب عِرْق الذَّهَب ٢٠٠٠ غ ماء زَهْر البُرتُقال ٢٠٠٠ غ جَرُوع مُقَيَّا أَو مُنَمَّد مُقَيِّى ٢٠٠٠ غ مُقَيِّا أَو مُنَمَّد مُقَيِّى ٢٠٠٠ غ مُقَيِّى ١٣٠٠ غ مُقَيِّى ١٣٠٠ غ مُقَاعة أوراق بُرتُقال ٢٠٠٠ غ مِلْعَقة كلّ ساعتين في الرَّقص العَصبي مِلْعَقة كلّ ساعتين في الرَّقص العَصبي وخاصَة في حالات التهاب الرِّئة، في وخاصَة في حالات التهاب الرِّئة، في جَرُوع الدّكتور لويس، يُستبدَل شَراب السُّكُر بشراب دياكود. إنّ جَرُوع المُضاد للنَّشاط له التَّركيبة المُضاد للنَّشاط له التَّركيبة	
جَرُوع مُقَيًّا أَو مُثَمَّد مُقَيِّى	شَراب عِرْق الذَّهَب ٣٠٠٠٠٠٠٠
نُقاعة أوراق بُرتَقال ١٢٥ غ مِلْعَقة كلّ ساعتين في الرَّقص العَصَبيّ وخاصَّة في حالات التهاب الرِّئة، في جَرُوع الدّكتور لويس، يُستبدَل شراب السُّكر بشراب دياكود. إنّ جَرُوع المُضاد للنَّشاط له التَّركيبة	جَرُوع مُقَيَّأُ أَو مُثَمَّد
وخاصَّة في حالات التهاب الرِّئة، في جَرُوع الدِّكتور لويس، يُستبدَل شَراب السُّكَر بشراب دياكود. إنَّ جَرُوع لمقالد المُضاد للنَّشاط له التَّركيبة	نُقاعة أوراق بُرتُقال١٢٥ غ
السُّكَّر بشراب دياكود. إنَّ جَرُوعِ Laënnec المُضادَ للنَّشاط له التَّركيبة	وخاصَّة في حالات التهاب الرِّئة، في
	السُّكَّر بشراب دياكود. إنَّ جَرُوعِ Laënnec المُضادِّ للنَّشاط له التَّركيبة

### جَرُوع مُقَيِّئ مُسهِّل قُوي

۱٫۰ غ	مُقَيِّى
١٥	
٠٥٠ غ	ماء ساخن
اماه ١ دقيقة كأية	ه ۲ عاد ، تفور

٧٣- جَلَب مُتَصَبِّع، جَلَب تَمْپِيْكُو(١) Jalap digité, Jalap de tampico (F) Ipomœa simulans (S)

نَبات من فَصيلَة اللَّبْلابِيَّات يَأْتِي من

(١) التَّسمتان للمُؤلِّف.

سيير اغُوردا في المكسيك. يَحتوى هذا العَقّار، وجذور أنواع الجَلَب الأخرى، على راتنج (راتنج الجَلب)، حوالي ١٥٪، وهو ما يدين له بخصائصه المُسهِّلة القَويّة. يَتمّ الحُصول على هٰذا الرّاتِنج باتِّباع طريقة دستور ١٩٠٨ الّتي تَقضى باستنزاف مسحوق الجَلب الخُشِن (١٠٠٠ جزء) بالكحول ٩٠ درجة في راؤوق حتى الحصول على ٣٠٠٠ غرام من السّائل. نُخفِّض هذه الكمِّيَّة إلى ٤٠٠ غرام بالتَّقطير ونَسْكُب النِّتاج الحاصل في ليترين ماء مُقطّر غال. بَعد فترة من الرّاحة، نُصفِّق الرّاتِنج ونَغسله بالماء الغالي، على أن نُوقِف ذلك عندما يُصبح ماء الغَسيل عَديم اللُّون؛ نُوزِّع الرّاتنج في صُحون ونُجفِّفه في المِحمِّ عند حَوالي ٤٥° سغ. إنَّ الراتنج الَّذي يَحصل بهذه الطِّريقة يَكون بُنِّيِّ اللَّون؛ للحُصول عليه أبيض اللُّون نَحُلُّه في الكحول بوجود فَحْم حَيَوانيّ؛ نُصفِّي، نُقطِّر ونُرَسِّب الرّاتِنج بواسطة الماء الغالي.

المُواصَفات - يَكُون راتِنج الجَلَب المُتَكَتِّل فَتُوتًا، لامع المِكْسَر، يَذوب بكلّ النِّسَب في الكحول والقِلَي، ويَــذوب جُــزئيًا فــى الأثـيـر، والكلوروفورم، وفي سُولفور الكربون.

إنّ الرَّاتِنج الّذي يُستخرَج من جَلَب تَمْييكُو، الّذي دَعاه سييرغاتِس باسم تَمْييسِيْن، يَنصهر عند ١٣٠° سغ، يَذوب في الأثير، عديم اللُّون والطُّعم

والرّائحة، ويَتميَّز عن الجَلَيين بتركيبه. وهو يُعطي بتأثير القِلَى الحامِض ال تَمْييسِيْك؛ الأملاح المَعدنيّة المَحلولة المُخفَّفة تَشطُره إلى سُكَّر وإلى حامِض تَمْسكُه لك.

مُرَكِّبات راتِنج الجَلَب - يَتألُّف راتنج الجَلَب من هيتروسيدين هُما: ال كُونقُولْقُولِيْن وال جَلَيِيْن. الكونڤولڤولين يَذُوبِ في الكحول، لا يذوب في الأثير. حامض الكلورهيدريك يشطره إلى غلوكوز وإلى حامض كُونِهُ ولينوليك Acide convolvulinolique. وهو يُشكِّل حَوالي سبعة أعشار ٧/١٠ الرَّاتِنج. الجَلَپين يَذُوبِ فِي الأثيرِ والكحول. وهو يَنْحَلُّ في القِلَى الَّتي تُحوِّله إلى حامِض جَلَيبُك. يُشكَل الجَلَيين حَوالى ثلاثة أعشار ٣/١٠ الرّاتنج. يَجِب عدم الخلط بين الجَلَيين المذكور أعلاه وبين الجَلَيين الإنكليزيّ الّذي ليس سِوى راتِنج الجَلَب المُزال لَونُه.

الخصائص - إنّ النّتاج المَخزنيّ يجب أن يَحتوي على ١٠٪ كحدّ أدنى من الرّاتِنج. الجَلَب هُو مُسهِّل قَويّ فَعّال، ولكنّ تأثيره للأسف غير ثابت، ذلك أنّ الرّاتنج لا يكون دائمًا بالنسبة ذاتها في كمِّية مُعيَّنة من المسحوق. يُستخدَم لتحضير صِبغَة الجَلَب (دستور 1984).

طريقة الاستعمال – مقادير المُسحوق الاعتياديّة للبالغين ٠,٥٠ إلى غرام واحد

للجرعة؛ نُقاعة بنسبة ٥ بالمئة؛ مُستخلَص ١,٢٥ إلى ١غ (دستور ١٩٣٧)؛ صِبغَة مُركَّبة: مقادير اعتياديّة، ١٠ إلى ٣٠ غرامًا للجُرعة الواحدة ولكل ٢٤ ساعة.

ج ن س

المقادير الولادية: من صفر شهر إلى ٣٠ شهرًا الامتناع عنه؛ من ٣٠ شهرًا إلى ١٥ سنة، الامتناع عنه (دستور ١٩٦٥).

إِنّ مُستخلَص الجَلَب المائيّ، الّذي يُستعمَل قليلًا جدًّا، يَبدو أنَّه مُبوِّل فقط. أمّا الرَّاتِنج، الّذي هو مُسهِّل جيِّد، ولكنَّه قَويّ، فيُعطى بمقدار ١٠٠٠ إلى ٠,٥٠ غرام، إمّا مَدقوقًا مع السُّكَر، أو في بيلولات، أو في مُستَحلَبات.

ائیض (جذر) ، کُوْرِي سَن ائیْض (جذر) ، کُوْرِي سَن Vhite ginseng root (E)
Ginseng blanc (Racine de), Cori - sen (F)
Weissergensangwurzel (D)
Panax ginseng (S)

الجِنْسن الصِّينِيّ الحَقيقيِّ هو نَبات من فَصِيلَة الأرَالِيَّات. جَذرُه صغير مِغْزَليّ الشَّكُل، يَتَفَرَّع غالبًا إلى شكل أَفْخاذ الإنسان. رائحته وطعمه عِطريّان. يكون الجَذر الّذي يُجمَع من بلاد التَّتار ومَنشوريا والدّاوْري أصفر اللَّون، مَظهره كالكَهْرَمان الأصفر؛ أمّا الجذر الّذي يُجمع من كوريا، ومن الصّين واليابان فَيكون مُبيض اللَّون، ويُسمّى واليابان فَيكون مُبيض اللَّون، ويُسمّى كُوري سن Cori-sen. إنّ الجَذر الأول يُعتبر أَفْعَل من النّاني، ويُستخدم جَذر يُستخدم جَذر

ج ن س

النَنْزِي غالبًا لغشُّه.

ونَظرًا للاهتمام الكبير الّذي يَنصبٌ على الجِنْسَن مُنذ عِدَّة سنوات، فلقد صَدَرت عنه دراسة عِلميَّة مُفصَّلة عام ١٩٨٠ تُحدِّد مُواصَفات الجَدر المُجفَّف للجِنْسَن الأبيض.

المُواصَفات - رائحته عِطريّة خَفيفة، طعمه حُلو، ومن ثمّ حامِز وخفيف المَرارة. في مَخازن الأدوية، يَقعُ الجَدر المَغْزليّ أو الأسْطوانيّ الشَّكْل، في قِطع ضَعيفة الثِّقل النَّوعيّ، شكلُها مُختلِف يَتفرَّع نوعًا ما تبعًا لعُمر النَّبات والمُعالجات التي اتُبعت في التَّجفيف.

بَشَرتُه الخارجيَّة فاتحة اللَّون الأصفر، مُتَجعِّدة طوليًّا مع نُدْبات الجُذَيْرات. فِلِّينُه لا يَتقشَّر بسهولة. الجذر هَش وقَصِف، قصير المكسر. يُظهِر مَقطعُه العَرضيّ مِنطقةً قِشريّة مُهمّة صفراء اللَّون ومنطقة جُمَّارِيَّة (لُبِّيَّة) كذلك صفراء اللَّون. دقيقة التَّجعيد. إنّ فحص

مَقْطَع عَرَضيّ حَديث في الجذر في الأشِعَة فَوْق البَنَفسجيَّة عند ٣٦٠ملم يُظهِر استشعاعًا أزرق اللّون في المنطقة القِشْريَّة ومنطقة اللَّبِ.

الفحص المجهري - إنّ المَقْطَع العرضيّ لجَذر الجنْسَن الأبيض يُظهر تَحت المجهر عددًا كبيرًا من الأقنية الفارزة المُنَظَّمة بطبقات مُتراكِزة. الخَشَب السَّلُولُوزِيِّ في الأنسجة الخَشبِيَّة بكامله يَتألَّف من «أوعية مُتَخشِّبةً "Trachéides (١) قصيرة، مُنعزلة أو مُتَجمِّعة في كُتَلِ صغيرة. ويُرى لُبُّ ضَعيف القطر. إنّ كُلّ الأنسجة الحَشَويّة تَحتوي على حُبوب من النَّشَاء، وتُعطي استشعاعًا أزرق اللَّون إذا فُحِصت في الضُّوء فَوق البَّنفسجيّ. كما تُلاحَظ أيضًا بعض التّلاصُقات البلوريّة Macles من أوكسالات الكلسيوم المَوجودة في مُجْمَل الأنسِجة أو في القِسم المركزي من الجَذْر فقط.

#### ه رُجُذْر) Gentiane Jaune (Racine de), Racine de la Grande Gentiane (F) Gentiana Lutea (S)

إنّ القِسم الوحيد المُستعمَل في الجَنطيانا الصَّفراء هو جَدرها المُسجَّل في في الإصدار التّاسع للفَرْماكوبيا. وهو جَدر يُجمَع في الرَّبيع، في سويسرا، بورغونيه، جُورَا، قُوج، أوْقُرنيه حَيث

<sup>(</sup>١) التُّــمية للمُؤلَّف.

يَشيع وجوده جدًّا على ارتفاع ٨٠٠ إلى ٢٠٠٠ متر عن سطح البحر.

المُواصَفات - يَكون هٰذا الجذر في مخازن الأدوية في قطع غير مُنتظمة الأشكال، طولها من ٥ إلى ١٠سم وقطرها من سم واحد إلى ثلاث، وهي قطع مَلْويّة على ذاتها؛ سطحها الخارجيّ مُحْمرٌ اللُّون البُنِّيّ، مُمرَّك بتجاعيد طُوليّة مُتوسِّطة العُمُق؛ لهذه التّجاعيد تَتقطّع بأثلام حَوْقِيّة. وتُلاحَظ على السّطح نُدُّبات تُشير إمّا إلى فُروع السَّنة الحاليَّة أو السَّنوات الفائتة، وإمّا إلى التَّفرُعات الثَّانويَّة للجذر. إن لهذا الجَذر الكَسُور وهو جاف، يُصبح مع الوَقت لَدْنًا طريًّا. ويَكون سَطح مِكْسَرِه مُحْمر اللُّون الأصفر السَّويّ تَقريبًا. ويَفصل القِشرة عن الجسم اللِّيفيّ خطّ قُلْبِيّ Cambiale أَقْتَم لَونًا من سواه. ويَكُون الجسم اللِّيفيّ مَسامِيًّا، مُشَعَّعًا بَعض الشَّيء. رائحة لهذا الجَذر قويَّة وطعمه مُرّ حدًّا.

مَسحوق الجَدْر فاتح اللَّون البُنِّي، يَحتوي على جَوهر مُلوَّن بالأصفر البِلَّوري (جَنْطيزان، جَنْطيانان، جَنْطيانين)، وعلى جَوهر عِطريّ غير ثابت، وعلى مادَّة زَيتيّة مُخْضرَّة اللَّون، وصَمْغ، حامِض پَكتيك، زَيت طيّار، جَوهر مُرّ قابل للتَّبلُر (جَنْطيوبيكرِيْن)، تركيبه 1/2 H2O و1/2 H2O، هيتروسيد يَنشطِر إلى غلوكوز وإلى جَنطيوجانين يمكلومسة الحوامِض.

وعَزَل تانْرِيه من مُستخلَص الجَنطيانا هيتروسيدين آخرين: جَنْطياماريْن تركيبه هيتروسيدين آخرين: جَنْطياماريْن تركيبه المراه التي قام بدراسة مُفصَّلة لها علماء آخرون.

لهذا، ولا نَجد في جَذر الجنطيانا لا نشاء ولا أوكسالات الكلسيوم.

(۱) جَيُوم كَنَدِيّ، جَيُوم مُنْتَصِب (۲۸ حَيُوم كَنَدِيّ، جَيُوم مُنْتَصِب (E)
Canadian avens, Prickly avens (E)
Benoîte de Canada, Benoîte dressée (F)
Canadischer Gebenedeite, Steifgebenedeite (D)
Geum canadense, Geum strictum (S)

الجَيُوم جنس نَباتات مُعمَّرة لِيفيّة رِيزُومِيَّة أو رِئْدِيَّة من فَصِيلَة الوَرْدِيَّات. أوراقُها رِيشيّة التَّفصيص، فُصوصُها غير مُتساوِية، الهاميُّ مِنها أكبر قَدًّا بشكل عام. أزهارُها فَرديّة أو في أعْذاقٍ مُرتخية. الكأس دائمة، قصيرة الأنبوب، خُماسيّة الفُصوص. كُؤيس خُماسيّ الفُصوص الأصغر قدًّا. البَتلات مُن ٥ إلى ٧، مُستديرة الشَّكْل البَيضيّ. الأسدية عديدة. القلم مُبَنَّق. الكَرابِل مُوبِرة، وحيدة البزرة، مُرتَّبة في رأس كُرويّ الشَّكْل، تَستطيل بسَفًا أَمْرَط أو

<sup>(</sup>١) كلّ النَّسميات للمُؤلِّف ما عدا اللاتينيَّة.

رِيشيّ. مِنها في لبنان نَوعان: المُبارَك الخصائص - الجَيُوم الكَنديّ يُستعمَل في أمريكا الشّماليّة كَمُقرٍّ قابض.



#### Acide urique (F) ٧٧- حامض يَوْلِيْك

#### C5H4N4O3

اكتَشفه في آنِ واحد، عام ١٧٧٦، كلَّ مِن Scheele وبَرْغَمَنَّ في الحَصَي الحُويْصَليّة وفي البَول الإنساني، ومن هنا اسمه المُر ادف ac. lithique الَّذي أُطلِق عليه في أوَّل الأمر . عِند الإنسان، يَبدو أنَّه نِهايَة تَقَهِقُر القَواعِد المُسْتقَّة من اليُوريْن؛ عِند العصافير الَّتي تَفرزه بوفرةٍ كبيرة، يَحصل عن تَفْتيت و تَفكيك الهَبُولينات.

الخصائص والاستعمال - الحامِض البَوْليك قَليل الاستعمال في التَّداوي. ومع ذلك فقد استُعمِل في محاليل مائية لمعالجة السيلانات المهبلية والتهابات المَهْبِلِ العَصِيَّةِ وفي حقَّن في الخُراجات الباردة. مَحاليلُه الزَّيتية وُصِفَت في مُعالجة البرونشيتات القَيْحِيّة المُزمِنة في حقَن تَحْجِلْدِيّة: ١,١٥ غرام في الملل.

#### ٧٨ - حامِض غلُوتامِيك، ڤيتامين الذَّكاء Acide glutamique (F)

 $C_5H_9NO_4 = 147,13$ 

أميني تستعملُه الأنسِجة العَصَبِيّة حام والخلايا الدِّماغيّة مُباشرة. سُمّى ڤيتامين الَّذَّكَاءُ وأُعْطَى في حالات التَّعب أو في عَدَم انتظام عَملَ الخَليَّة العَصبيَّة. قُوَّتُهُ الدُّورانِيَّة هي مُيامِنَة بالرُّغم من أنّه يَمتلك الشَّكل المُياسِر. يَتَصعَّد عند ۲۰۰°سغ ويَتحَلَّل عند ۲٤٧ -٢٤٩°سغ. يَذُوب في الماء، لا يَذُوب في الكحول المتيليكيّ وفي الكحول الأتيليكي.

> يُعْطَى كمنشط للعمل الفِكري، الإرهاق والإعْياء والإجهاد، التَّحضيرات للامتحان، اضْطرابات الذَّاكرة، بمقدار ٢ إلى ٦ غرامات في اليوم؛ وفي حالات التَّسْبيخ الكَبديّة (غَيبوبة عميقة) لأنّه يَلعبُ دُور المُزيل للسُّموم تجاه غاز الأمُونياك؛ ويُعْطَى كَحام عَصبيّ في المُعالجات الَّتي تَتمّ بواسِطةً الأيزونيازِيد وفي شُهور الحَبَل الأخيرة.

> تكون الجرعة للأولاد من غرام واحد إلى ٥ غرامات في اليوم، التَّعُب المدرسي، للأولاد المُتَخلّفين. منه أدوية مُلَبَّسة لوحده أو مُشتركة من الفيتامين B6.

#### ۷۹ حامِض کِینِیْك (F) Acide quinique

C7H12O6,OH2 ou

 $C_6H_7(OH)4$ .  $CO_2H$ ,  $H_2O = 210,1$ .

اكتَشَفه هُوفْمان عام ١٧٩٠ في أنواع الكينا، ويُوجد أيضًا في البُنّ، الحامض الغلُوتامِيك هو حامض والسِّنْدِيان، والدَّرْدار، والقِمام الآسي،

والعَشْقَة، إلخ.

المُواصفات - يَقع هذا الحامِض في مَوْشُورات مُعَيَّنِيّة الشَّكل تَذوب في ٢,٥ جزء من الماء البارد، قليل الذَّوبان في الكحول، وأقل ذَوبانًا في الأثير؛ محلولُه المائيّ مُياسِر؛ يَنصهر عند ١٦٢ سغ بفقدان مائه التَّبَلُرِيّ ويَتَفكَك عند حوالي ٢٠٠ سغ إلى كِينِين عند حوالي ٢٠٠ سغ إلى كِينِين وبيروكاتشِين، وحامِض بَنْزَويك، وبيروكاتشِين، وحامِض بَنْزَويك،

المؤكْسِدَات تُحوِّله إلى كِينُون.

مُشْتَقّات عديدة من حامِض الكينيك، منها ما يُستعمَل في مُعالجة النَّقْرِس، ومنها ما يُستعمَل ضدّ الاسْتِهْياء النَوْليك، ذُكِر أَنَّها لم تَعُد مُسْتَغَلَّة.

٨٠ حامض لَيْمُونِيك، حامض اللَّيْمون،
 حامض الحامض

Acide citrique, Acide du citron, Citrate normal, Pentanoldioïque - méthyloïque (F)

 $C_6H_8O_7 = 192,1$  : الماء الماء أحادي الماء:

 $C_6H_8O_7$ ,  $H_2O = 210,1$ 

وَرد في الإصدار التّاسع للفَرْماكوبيا الفَرنسيّة حامِض اللّيمون اللّامائيّ وحامِض اللّيمون الأُحادِيّ الماء. وكان هذا الأخير حتّى العام ١٩٦٥ وحده المَخزَنيّ.

ولهذا الحامِض، يَدِيْن اللَّيمون

الحامِض، والبُرتُفال، والأثرُج والنَّارَنْج والنَّارَنْج وغيرها من فصِيلة البُرتُقاليّات، وكذلك الكِشْمِش، والكَرز، والفَرَمْبواز، والقِمام الآسيّ، وعددٌ كبيرٌ من الثِّمار سواها، تَدِين له بحموضتها. ولقد اكتشفه Scheele عام ۱۷۸٤.

يُمكِن الحُصول على الحامِض اللَّيمونيك من تلك الثَّمار، ولكنّه يُستخرَج بنوع خاصّ من اللَّيمون المُروَّق الحامِض. نُشْبع عَصير اللَّيمون المُروَّق بالتَّخمير، على السّاخن، بالطَّبشور؛ ومن تَفَكُّك سِيترات الكلسيوم بواسطة الحامِض الكَبْريتيك المُخفِّف، ويَتمّ الحُصول على حامِض اللَّيمون بالتَّبلُر بعد فَصْل سُولفات الكلسيوم.

ولقد اقتُرِح، عام ١٩٣٠، الاسْتِخراج المُباشر لحامِض اللَّيمون بدءًا من عَصير الحامِض المُركَّز بشكل دَبِق، بواسطة الأَسِتُون الَّذي لا يَحلِّ القذارات.

ويَتم الحُصول عليه أيضًا بالاصْطِناع البيوكيميائي باللَّجوء إلى عمل بَعض الفُطور الخَمائِريّ على مُختلَف الموادّ السُّكَريّة، بوجود الكلس وزيادةٍ من الهواء، وذلك عند حوالى ٣٥٠ سغ، وتبعًا للمُعادَلة التَّالِية:

 $C_6H_{12}O_6 + 3O = C_6H_8O_7 + 2OH_2.$ 

المُواصَفات - يَقع هذا الحامِض في بلَّورات كَبيرة الحجم نِصْف شَفّافة، حموضَتها قَويّة، لكنّها مُستحبّة؛ عَديمة الرّائحة، تَذوب في الكحول (١,٥ جزع كحول)؛ في الغليسرين، جزأين؛ قَليلة

ح ب ق

من الخارج، للشَّرَث والخَصَر.

المقادير - من ٢ إلى ٦ غرامات في اليوم، في لَيْموناضات، شَرابات سُكَّريّة، جَرُوعات.

٨١- حَبَق عَذْب الرّائِحة، حَبَق عَذْب مُتَشَحِّر (١)

Sweet scented basil, Arborescent scented basil (E)

Basilic suave, Basilic en arbre (F) Süsses basilienkraut, Süssbaumartig basilienkraut (D)

Ocimum suave (S)

نَبات لِيفِيّ مُعمَّر من فَضِيلة الشَّفَوِيَّات يَعلو من ٧٠ إلى ١٠٠ سم. عَذْب الرّائحة. أوراقُه مُوبرة، قُطنيّة الكساء وهي فَتيّة. أزهارُه بَيضاء أو إلى اللَّيلكيّ. مَهدُه بلاد الحَبَشَة. تَصلُح زراعتُه في كافّة المَناطق الحارّة. يَشترِك مع الحَبَق الظَّريف بالاسم الفَرنسيّ مُعشجِر».

مَبَق وَبِر، حَبَق قَرَنْفُلِيّ، حَماحِم، رَيْحَان قَرَنْفُلِيّ، فَرَنْجَمَشْك، فَرَنْجَمُسْك Soft haired basil (E) Basilic velu (F) Feldwürze, Haarigbasilienkraut (D) Ocimum pilosum (S)

نَبات عُشبي حَوْليّ أو مُحوِل من فَصِيلَة الشَّفَوِيَّات يَعلو من ١٥ إلى

الذّوبان في الأثير المَخْزَنيّ، ٤٤ جزءًا؟ تَذوب في ٢,١ جزء من الماء عند ١٥ سغ. إذا سُخِّن الحامِض يُصبِح مُتَزَهِّرًا Efflorescent اعتبارًا من حَرارة ٥٧ سغ ويَفْقِد ماء تَبَلُّرِه قَبْل درجة ١٣٥ سغ؛ حامِض اللّيمون اللّامائيّ ينصهِر عند ١٥٣ سغ؛ يَتَفكَّك قَبْل ١٧٣ سغ، إلى ماء وإلى حامِض أكُونسك.

يَشتعِل بحرارة مُرتفِعة ويَحترِق من دُون أن يَترك فُضالة.

الحفظ - يُحفظ حامِض اللَّيمون المُتبلِّر من دُون أن يَفسد، ولكنَّ مُذابَته يُمكنُها، مع الوقت، أن تُقْتَحَم من العُفُونات وتَحتوي عندئذٍ على الحامِض الخَلِّيِّ.

الخصائص والاستعمال - سيترات الحديد المَغْنازيوم المُجفَّفَة، سِيترات الحديد الأمُونياكيّ. لَيْموناضَة حامِضيّة - مغنازِيّة. جَروع غازيّ رقم ٢. شَراب سُكَّريّ من حامِض اللَّيمون. مُذابَة مَحقونَة (قابلة لكي تُحْقَن) من سُولفات السترِكنين المُركَّبة. (كودكس ١٩٦٥ وسوابقه).

يُستعمَل في مَشروبات مُحْمَضة أثناء الأمراض الحُمِّية؛ وكدواء تبرياق للسُّموم القِلَوِيَّة؛ وكدواء مُضاد لداء الحَفَر يَحل مَحَل اللَّيمون الحامِض؛ وفي مَحلول مُرَكَز كدواء وقائي من التهاب المُلتَحِمة التَّعْقِيبيّ ومن أمراض أعْيُن المَواليد الجُدُد.

 <sup>(</sup>١) كل التَّسميات للمُؤلِّف ما عدا التَّسمية الفرنسيَّة الثانية والتَّسمية اللاتينيّة.

٤٠سم. ساقُه مُربَّعة. أوراقُه مُتقابِلة، كامِلة، مُعنَّقة، لَسِنة، سِنانيّة، مُستدِقّة الطَّرف، مُوبِرة النَّصْل، باهِتة اللَّون الأخضر، فَوّاحَة العَرْف المُستحَب. الإحضر، فَوّاحَة العَرْف المُستحَب. ازهرارُه سُنبليّ التَّجميع، هاميّ الارتكاز. أزهارُه ليلكيّة أو وَرديّة اللَّون. ازهرارُه يَستمرّ من حزيران إلى أيلول.

مُلاحَظة - مُركِّبات هذا النَّوع وخَصائصه غير مُتوفِّرة، ولكنّه من المُفيد مُراجَعة دِراسة الحَبَق المَعروف (في المُعجَم الخامس، صفحة ٦٥، رقم ٧٤).

٨٣- حَدِيْد (التَّداوي بال)، عِلْمُ المُداواة الحَدِيديّة (Thérapeutique martiale (F)

مُورِسَ التَّداوي بالحديد مُنذ أُعْتَق الأَزْمنة كَمُجدِّد للقُوّة. وبعد أن استُعمِل الحديد المَعدِنيّ (ماء مَسامير، حديد مُخْتَزَل) ومن ثمّ الأملاح الحديديّة (سُولفات، أوكسالات، فُومارات، إلخ.) أو الأملاح الحَديديكيّة (سيترات، هيدروكسيد)، يُنصَح اليوم، إضافة إلى بَعض الأملاح الحَديديّة، بإعطاء مُركّبات يكون فيها الحديد مَكتومًا ومُستَتِرًا.

المُواصفات العِلاجية - يُمكن تَقسيم الأدوية الحديدية الله الله مُجموعتَين:

- تلك الّتي لا يَتدخَّل فيها الحديد إلّا ضِمن مُركَّبات أخرى (ڤيتامينات، ضَروريَّات، مُستخلَصات كَبِدِيَّة، إلخ.) والّتي يُمكن وضعها بين مُجدِّدات الفُوَّة، مُضادِّات الوَهْن، إلخ.

- تلك الّتي يكون فيها الحديد، أقله مُسيطرًا، إن لم يكن وحيدًا، والّتي تُخصَّص لمُعالجة حالات فَقْر الدّم. إن هذه الفِئة بالذّات هي الوحيدة الّتي سَنُوليها الاهتمام.

الهدف الأساسيّ هو فَقْر الدّم «الـمُنْقِص الصّبْغ» Нуроснготе والمُنْقِص الحديد في المَصْل الدَّموِيّ والمُنْقِص الحديد في المَصْل الدَّموِيّ . Hyposidérémique أن طريقة التَّداوي تَرتكِز بشكل أساسيّ على نِسبة اليَحْمُور . نُعالج بهذه الطَّريقة حالات فَقْر الدّم الّتي تَلي النَّزيفات والعَمليّات، والّتي تَنتُج عن عَدوى، وعن عمليّة استِئصال المَعِدة، كما نعالج بها بعض حالات التَّسمُّم ؛ حالات فَقْر الدّم المُنقِصة للصّبْغ في الحَبَل والرِّضاعة ؛ حالات فَقْر الدّم الطَّفَيْليّة (ملاريا، مَرض البَقيريّ، صَفَر، مَلْقُويَة).

إنّ امتصاص الحديد يَتمّ على مُستوى العَفْج، لذلك فإنّ الأشكال الفَمّية يَجب أن تَأخذ ذلك بعين الاعتبار عند انتخاب المُستحضر الطّبّيّ. الأشكال الّتي تُعطَى خارج نطاق المَجرى الهَضميّ تَسمحُ بامتصاصٍ أسرع وأهمّ فيكون امتصاص الجسم لها بقدر ما تكون نسبة اليَحْمُور فقرة به.

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

لكن الأشكال الفَمِّية تكون في أكثر الأحيان غير مُستحبَّة الابتلاع، تُحدِث رَدَّات فِعلِ هَضميّة، بينما تُجبِر الأشكال المَزروقة على اتِّخاذ بَعض الحِيطات في طريقة الاستعمال.

طريقة الاستعمال - حديد (فُومارات، غلوكونات، أوكسالات) المقادير الاعتيادية للبالغين عن طريق الفم ١٠,٠٠غ إلى ٢٤,٠٠غ لجرعة واحدة، حتى غرامين لكل ٢٤ ساعة.

تَضادَ الاستِطباب - لكلّ المُعالَجات الحديديّة: حالات فَقْر الدّم الزّائدة للحديد في المَصْل الدَّمويّ للجديد في المَصْل الدَّمويّ Hypersidérémie، وحالات شحن الجسم الزّائد من الحديد: Hémochromatoses

# Lichens odorants (F) حَزَازَ عِطْرِيّ - ٨٤ Evernia (S)

نَجد باسم طُحْلُب السِّنديان، في الغابات والأحراج وبنوع خاص في غابات الأطْلَس المَراكشيّ، نَوعين من الحَزاز من جنس "خَمِيْر" Evernia، يُستعمَلان لتَثبيت العُطور:

خَمِیْر الخَوْخ (۱) خَمِیْر الخَوْخ اللّٰ اللّٰذِي أكثر ما نَجده على أشجار السِّندیان، والزَّان، والخَوخ؛ خَمِیْر السِّندیان، والزّان، والخَوخ؛ خَمِیْر الطّحِیْن (۱) Evernia furfuracea الّذي ينمو على أشجار الأرْز وأشجار أُخرى

من الصَّنَوْبَرِيَّات. ولَعلَّ لهذا النَّوع عزا الأخير هو ما يُسمَّى كذلك «خمير آذار» (اطلبه في المُعجَم الخامس، صفحة ٧٩، رقم ٩٠).

تَستخرِج الصِّناعة من هذين النَّوعين زَيتًا دُهنيًّا دَسِمًا وأسْتيرات فينوليكيّة سائلة: أفرنيات الأنيْل وأفرنيات المَتِيْل. إنّ أنواعًا أخرى من الحَزاز أيضًا تَجد لها في صِناعة العُطور دَورًا مُماثلًا، إمّا كمادة أساسيّة أو كمادة مُساندة.

# ۱۵۰ حَزاز مَأْكُول، حَزاز الْمَنّ Lichen comestible (F) Lecanora esculenta, Lecanora affinis (S)

إِنَّ الحَزازِ المَأْكُولِ الّذِي دَعاه بِالآسِ Lichen esculentus Parmelia أي شَحْمة الأرض السَمَأْكُولة (مرادفها: Parmelia)، والحَزازِ الحَلِيْف (المحكرانِ الحَلِيْف اللهَ للهَ اللهَ المَنْ الدِي سَقَط من السَّماء في يُشكِّلانِ المَنّ الَّذِي سَقَط من السَّماء في يُشكِّلانِ المَنّ الَّذِي سَقَط من السَّماء في بلاد العَجَم وأرمينيا وفي الصَّحراء. وهو ماذَّة تقع في كُريَّات صَغيرة، يَبلُغ قُطرها من ١٠ إلى ٢٥ملم، مُرْمَدَّة اللَّون من ١٠ إلى ٢٥ملم، مُرْمَدَّة اللَّون لأعابية، ولكنها خالية من النَّشاء وفيها لكعابية، ولكنها خالية من النَّشاء وفيها الكثير من أوقصالات الكلسيوم. المُريَّات عام ١٨٢٨، ١٨٤٥، إلىخ. (مَنُّ العبرانيِّن، دكتور أوْرُورْك).

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

Bouillons médicinaux (F)

٦ بزّاقات	بزّاق
١/٢ قلب	قَلْب خروف
١٢٥	رِئة عجل
۱۵۰۰ غرام ماء حتّی نَخْسَر	نَطبُخ في ثُلث الكمِّيَّة.

# Lavements (F)

 ٨ بلحات أرْغُوتين إيڤون Yvon ١غ ٤ ٢ · ·

# ١ قبضة حُقْنَة بالنُّخالَة

٤٦٠ ٤ ٦٢٠ نَغلى بضعة دقائق ونُمرِّر مع الكَبْس.

حُقْنَة التَّيْغ

تَبْغ بَحريّ اللَّون<sup>(١)</sup> جافّ ماء غالِ

نُحضِّه نُقاعة، نُمرِّر. ضِدّ الانسداد المِعَوي، والكَزاز.

١غ نَقيع الخَشخاش المُنوِّم ١٥٠ غ نُضيف عِدّة نقاط من ماء رابل Rabel لكى نَحلّ سُولفات الكينا. إنّ المَريض يَجِب أَن يَحتفِظ بِالحُقْنة لأطول وَقت

10 غ (١) التَّسمية للمُؤلِّف.

# حَسَاء الدكتور بَاتِي الصَّدْري Bouillon pectoral du docteur Bailly

فَرُّوج ضَعيف ٢/٢ فرّوج ١٦ لوزة ٨٧- حُقَن لَوز حُلو سَحْلَب .... ا ملعقة حُقْنَة الأرْغُوتِيْن بَلَح عُنَّاب ۸ عنّامات ماء زُبيب ...... ١ كمشة نَزيفات شَرجيَّة وبَو اسِيريَّة . سِرْ فِل

٢ كلغ نُخالة ماء

نُخفِّف الكمِّيَّة بالغَليان حتّى ١,٥ كلغ ماء حَوالي و نضيف:

> شراب التُّولُو السُّكَري ٠٦٠ غ

# حَساء الدكتور نُوش الصَّدْري Bouillon pectoral du docteur Nauche (F)

نَعْلَى نِصف نخاع خَروف أو عجل مع اللِّفْت، ونصف مَلفوفة حمراء، والجزّر، والقرَّة، في ليتر ونصف ماء، حتَّى يَبقى نِصفَ الكُمِّيَّة . يُؤخَذ هذا الحَساء بفناجين حُقْنَة سُولفات الكينا خلال النَّهار، نَقطعها بمقدار خِمْس سُولفات الكينا حجمها من الحَليب أو من شراب الصّمغ السُّكّري. في إصابات الصّدر و المعدة.

> حَساء صَدْرِيّ (F) Bouillon pectoral خَرَز الصُّخُور

ماءكمِّيَّة كافية	مُمكن. غالبًا ما يُستبدَل نَقيع الخَشخاش
	الممن عاب ما يسببدل طبيع العسعاس بالماء العادي .
ما يَكفي للحصول على ٥٠٠ غرام من السّائل بعد ١٠ دقائق من الغليان.	بُصْرً هذه الحُقْنَة أيضًا بواسطة ٨
السائل بعد ۱۰ دفاق ش العليان.	غرامات غليسرولة سُولفات الكينا
حُقْنَة مُلَيِّنَة (بيطريّة)	و١٠٠غ ماء أو نقيع ما.
غليسًرين٠٠٠ غ	حُقْنَة الشَّيْلَم المُؤَرْغَت، حُقْنة قِبَالِيّة
ماءماء	شَيْلُم مُؤَرْغَت ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٨٨- حَمَّامات (مُستحضّرات للـ)	ماء ٥٧٣ غ
Bains (Préparations pour) (F)	نَغلي عشر دقائق ونُمرِّر .
لم يَعُد دستور أدوية ١٩٤٩ يَذكر أيَّة	حُقْنَة الصّابُون
تَركيبة للحمّامات الطُّبّيَّة . وذُكر أنّ مُعظَم	صابُون أبيض٨غ
تلك الحَمّامات لا يُشكِّل سوى فائدة	ماء شائعماء شائع
تاريخيّة. من تلك المُستحضرات أو	نحلّ ونذوّب على الساخِن.
التَّر كيبات:	
	31
خَام مارِّخ	حُقْنَة مُبَوِّلة
حَمّام حامِض	
حامِض كلورهيدريك تجاريّ١ كلغ	ديجيتال
حامِض كلورهيدريك تجاري كلغ ماء كمِّيَّة تكفي لحمَّام، أي٣ ل	
حامِض كلورهيدريك تجاري كلغ ماء كمِّيَّة تكفي لحمَّام، أي٣٠ ل نَمزُج. نَتَذكر القاعدة: نَسكُب	ديجيتال
حامِض كلورهيدريك تجاري كلغ ماء كمِّيَّة تكفي لحمَّام، أي ٣٠٠ ل نَمزُج. نَتَذكر القاعدة: نَسكُب الحامِض في الماء. نَستعمِل مَغطسًا غير	ديجيتال ٣٠،٠ غ ماء تنقع لمدَّة ١٢ ساعة في الماء البارد.
حامِض كلورهيدريك تجاري ١٠٠٠ كلغ ماء كمّيَّة تكفي لحمَّام، أي ٣٠٠٠ ل نَمزُج. نَتَذكر القاعدة: نَسكُب الحامِض في الماء. نَستعمِل مَغطسًا غير مَعدِنيّ. إنّ مِقدار الحامِض في هذه	ديجيتال ماء ماء ماء تقع لمدَّة ١٢ ساعة في الماء البارد. تُعطى في حال لا يَتحمَّل فيها المَريض
حامِض كلورهيدريك تجاري كلغ ماء كمِّيَّة تكفي لحمَّام، أي ٣٠٠ ل نَمزُج، نَتَذكَر القاعدة: نَسكُب الحامِض في الماء. نَستعمِل مَغطسًا غير مَعدِنيّ. إنّ مِقدار الحامِض في هذه التَّركيبة هو تَقريبًا أقوى مِقدار مُستعمَل؛	ديجيتال ٢٠٠ غ ماء تُقع لمدَّة ١٢ ساعة في الماء البارد. تُعطى في حال لا يَتحمَّل فيها المَريض أخْذ الدِّيجيتال من الدّاخل.
حامِض كلورهيدريك تجاري ١٠٠٠ كلغ ماء كمّيَّة تكفي لحمَّام، أي ٣٠٠٠ ل نَمزُج. نَتَذكر القاعدة: نَسكُب الحامِض في الماء. نَستعمِل مَغطسًا غير مَعدِنيّ. إنّ مِقدار الحامِض في هذه	ديجيتال ماء ماء ماء نتَّقع لمدَّة ١٢ ساعة في الماء البارد. تُعطى في حال لا يَتحمَّل فيها المَريض أخْذ الدِّيجيتال من الدّاخل.
حامِض كلورهيدريك تجاري كلغ ماء كمّية تكفي لحمّام، أي كل نَمزُج. نَتَذكّر القاعدة: نَسكُب الحامِض في الماء. نَستعمِل مَغطسًا غير معدِنيّ. إنّ مِقدار الحامِض في هذه التَّركيبة هو تقريبًا أقوى مِقدار مُستعمَل؛ ويكون بشكل عام ٢٠٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٠٠٠ أو يكون مِن الحامِض.	ديجيتال ماء ٢٠٠ غ ماء تُقع لمدَّة ١٢ ساعة في الماء البارد. تُعطى في حال لا يَتحمَّل فيها المَريض أخْذ الدِّيجيتال من الدّاخل. حُقْنَة مُبُوِّلة ديجيتال ٢ غ
حامِض كلورهيدريك تجاري١ كلغ ماء كمّيَّة تكفي لحمَّام، أي٢ ل نَمزُج، نَتَذكّر القاعدة: نَسكُب الحامِض في الماء. نَستعمِل مَغطسًا غير مَعدِنيّ. إنّ مِقدار الحامِض في هذه التَّركيبة هو تقريبًا أقوى مِقدار مُستعمَل؛ ويكون بشكل عام ١٠٠، ٢٥٠، ٢٥٠٠ أو يكون مِقام من الحامِض.	ديجيتال ٢٠٠ غ ماء ٢٠٠ غ نتَّقع لمدَّة ١٢ ساعة في الماء البارد. تُعطى في حال لا يَتحمَّل فيها المَريض أخْذ الدِّيجيتال من الدّاخل. حُقْنَة مُبَوِّلة ديجيتال ٢ غ
حامِض كلورهيدريك تجاري ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ديجيتال ٢٠٠ غ ماء ٢٠٠ غ نَّقع لمدَّة ١٢ ساعة في الماء البارد. نُعطى في حال لا يَتحمَّل فيها المَريض أُخْذ الدِّيجيتال من الدّاخل. حُقْنَة مُبَوِّلة ديجيتال ٢ غ إشْقيل ٢ ع
حامِض كلورهيدريك تجاري١ كلغ ماء كمّيَّة تكفي لحمَّام، أي٢ ل نَمزُج، نَتَذكّر القاعدة: نَسكُب الحامِض في الماء. نَستعمِل مَغطسًا غير مَعدِنيّ. إنّ مِقدار الحامِض في هذه التَّركيبة هو تقريبًا أقوى مِقدار مُستعمَل؛ ويكون بشكل عام ١٠٠، ٢٥٠، ٢٥٠٠ أو يكون مِقام من الحامِض.	ديجيتال ٢٠٠ غ ماء ٢٠٠ غ نَقْع لمدَّة ١٢ ساعة في الماء البارد. تُعطى في حال لا يَتحمَّل فيها المَريض أخْذ الدِّيجيتال من الدّاخل. حُقْنَة مُبَوِّلة ديجيتال ٢ غ إشْقيل ٢ ٢ غ اشْقيل ٢ ٢ غ ماء ٢٠٠ غ نُمرِّر ونُضيف:

الحمّام (دستور أدوية ١٩٠٨).

# حَمّام قِلَوِي حَديدي

في مَغطس كبير، وبعد السَّطْل الأوّل من الماء، نَسكُب:

أمونياك مُشْبَع بالكافور مدع غ ملح المطبخ ملح المطبخ

نُكمِل مَلْء المغطس ونُحرِّك بواسطة رَفْش أو رَفْشَين سُخِّنا بالنّار حتّى اللَّون الأحمر. لمغطسٍ مُتوسط تُنقَّص المقادير حتّى النِّصف، ولمغطسٍ للأولاد، تُنقَص حتى الرُّبع.

حَمّام كادِيّ (بالْزَر) Bain cadique زَيت الكاد ٥٠ غ ضِبغَة كِلّايا كمّيّة كافية صِفار يَضِ

ماء مُقطَّر نحل في ماء الحَمَّام. يُمكن استبدال ضبغة الكِلّايا بمقدار ٢٥٠ غرامًا من الصّابون الأسود. ضدّ الحَصَف والهَرَص والتَّصدُّف وإصابات أخرى.

Bain fortifiant	حمّام مُقوِّ
٤٦٠	نَعْنَع القَمْل
٠٦٠	خُزامَی
٥٤ غ	عُود الوَجّ
۴۰	كَراوِيا
٥٤ غ	قِشر صَفْصاف
7:16 75 6	11: .1

نُحضِّر الحَمَّام بواسطتها. راديوس يُضيف ١٥ غرامًا من كُرَيَّات نانْسي إلى حمّام مُماثِل.

Bain émollient	حَمّام مُلَيِّن
٠٠٠٠ غ	أصناف مُليِّنة
٠٥٠ غ	بزر کتّان
	ماء
ادِّ وهي مَوضوعة في كيس ، نُمرِّر ونَعصُر ونَسكُب	
ماء الحَمَّام مُرفَقًا بالتَّحريك.	

مُنَشْدَر	حَمّام
منشدر	حمام

کلغ	الأمونيوم	كلورهيدرات
J		ماء

# حَمّام نشاء

نَحل ٥٠٠ إلى ٨٠٠ غرام من النَّشاء في كمِّيَّة قليلة من الماء البارد ونَسكُب الكل في حمّام فاتر. ويُحضَّر حمّام النَّشاء للأولاد من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ غرام من النَّشاء. خصائض هٰذا الحمّام الطِّبَيَّة هي مُضادّة لما هو أُكاليّ وحُكَاكِيّ.

# الْشَرْقَيّ، حُمَّيْض الْحَقْل الْشَرقَيّ، حُمَّيْض Oriental patience (E) Patience orientale (F) Rumex patientia ssp. orientalis, Rumex orientalis (S)

نَبات بَرِّيّ أَمْرَط قَويّ جدًّا من فَصِيلَة

<sup>...</sup> كَمِّيَّة كَافِية (١) كلّ التَّسميات للمُؤلِّف ما عدا اللاتينيّة.

البَطْبَاطِيَّات. ريزومه قصير، مُتفرِّع، جُذوره غَليظة. ساقُه مُنتصِبة، تَعلو من ٩٠ إلى ٢٠٠سم، وتَبلُغ سماكة قاعدتها ٢سم أحيانًا، مُضلَّعة، حمراء الصَّبغة، مُتفرِّعة. الأوراق رقيقة، مُسطَّحة، القاعديّة مُتطاولة، مُنفرجة أو مُثَلَّثة الرّأس، مُستديرة أو قَلبيّة القاعدة، طويلة الأعناق نِسبيًّا. الأوراق السّاقيّة مُتناقِصة، قصيرة الأعناق. الحوافي مُتموِّجة غالبًا، ولكنَّها غير مُتَقبِّضة. الأزهار خُنثويّة، الذَّكريَّة مِنها أو الأنثويَّة في شبه دَوَّارات على الفُروع أو السّاق، مُشَكِّلة أنواعًا من السَّنابل في عُثْكول كثيف و مُورق القاعدة. دَوّارات عديدة الأزهار، مُتلاصِقة غالبًا. الزِّنادات التَّمريّة هزيلة وغير مُتساوية. الكأسِيّات الخارجيّة ضيِّقة، تَنعكِس عند الإثمار. مَصاريع مُستديرة، قَلبيّة القاعدة، طولها ٥ إلى ١٠ ملم، ورديّة اللُّون غالبًا.

الحُمَّيض الشَّرقيِّ: عُثكُوله مُتفرِّع خالٍ من الأوراق تقريبًا. أوراقُه القاعديّة واسعة، تُطول حتّى ٣٠سم، قاعدتها قَلبيّة نوعًا ما، أوراقه العُليا مُزَوّاة القاعدة. دُوَّاراته غير مُتميِّزة جيِّدًا. المَصاريع كبيرة القَدّ، قَلبيّة الشَّكْل الدّائريّ، مُنفرجة، كاملة أو خفيفة التَّسنين، مُخضَرَّة اللُّون الأبيض عادة، واحد منها فقط يحمل جُسْأة.

إنَّ لهٰذا النُّوَيْعِ هُو الَّذِي يَنبت في الرُّبوع اللَّبنانيّة في المناطق الجَبليّة السُّفلي والمُتوسِّطة، في الأراضي الخَصْبة،

المَرويّة جيِّدًا. مَهْد النَّوع هنغاريا، ويُزرع حم ي في غير مكان. أمَّا النَّوَيْعَ فَفِي لُبنان وسوريا وتركيا واليونان.

> المُرَكِّبات - مُرَكَّب حديديّ -فُوسفوري، مَواد عَفْصانيَّة، غلو كوسيدات.

> الخصائص - مُقوًّ، مُضادّ لفَقْر الدّم (يَرفع نِسبة الهيموغلوبين أي اليحمور)، مُنقّ، مُبوّل، مُسهّل، قابض.

> الاستعمال الدّاخليّ - حالات الأنيمية، يَرَقان، سِلّ، سُكَّرِّي، الكُباد، الأمراض الجِلديّة (قُوبات، أكزيما، قَرَع)، رُوماتيزم مُزمِن، إمساك.

> الاستعمال الخارجي - القُروح الخادرة، قُرْحات السّاق، سَيلانات المَهْبل.

طريقة الاستعمال الدّاخليّ - نَقيع ٣٠ غرامًا من الجذر المُجفَّف المُقَطِّع في ليتر ماء. يُغلى دقيقتين. يُغطّى ١٠ دقائق. يُؤخَذ خلال يَومين (مُستحضر مُرّ الطّعم). مسحوق الجذر في بَرْشام من ٠,٥٠ غرام، من ٢ إلى ٤ بَرْشامات في اليوم خلال الوجبات. في الإمساك نُحضِّر نَقيع ٢٠ غرام جذور مُجفِّفة مُقطّعة في ليتر ماء يُغلى ٥ دقائق ويُغطّى ٥ دقائق ويُؤخّذ خلال ٤٨ ساعة. النَّقيع السَّابِق ذاته يُؤخِّذ لتنشيط الكّبد. في حال أيّ تَبَدُّل سَريع في الجلد، من لُون رَصاصيّ المُواج، أو استرخاء في الملامح العامّة، نَشرب ٣ فناجين يَوميًّا

592

وطوال ٣ أسابيع مُتوالية من نَقيع ٢٠ غرام جذور مُقطَّعة في ليتر ماء يُغلى ٥ دقائق ويُغطَّى مثلها ويُصفِّى.

طريقة الاستعمال الخارجي - لبّ الجَذْر الغَض الطازج يُوضَع لَصوقًا على القُرحات. نقيع الجذور يُستعمَل حقنًا فرجيّة لمُعالَجة السّيلانات المَهبليّة.

# ٩٠ - حُمَّيْض ظَرِيْف (١)

Beautiful sorrel (E)
Patience gracieuse (F)
Rumex pulcher (S)

ريزوم مُعمّر غَليظ من فَصِيلَة النطناطيّات. ساقُه مُنتصة أو صاعدة، غالبًا مُتَلَوِّية، قَليلة الوَبْر، تَصْطبغ غالبًا بالأحمر، تَعلو من ٢٠ إلى ٦٠سم، مُتفرِّعة (ما عدا النُّوَيْع Cassius)، فُروعها طويلة، مُتَلَوِّية، مُنسِطة أو حتى مُتفاوتة الاتِّجاهات. الأوراق القاعديّة ضُمِّيَّةً التَّجميع، تَجفّ عادة وقت تَفتُّح الأزهار، طويلة العُنُق، مُتطاولة الشَّكْل، بَندُورية الشَّكْل، مُستديرة أو شبه قلبيّة القاعدة، مُنفرجة أو مُثَلَّثة الرّأس، مَرْطاء أو نادرة الوَبْر. النَّصْل قد يُصل إلى ٢٥سم مُقابل ٩سم. الأوراق السّاقيّة مُتناقِصة، سِنانيّة، العُليا صغيرة جدًّا. ازهراره في شبه سُنْبُلة مُعَثْكِلَة قليلة الارتخاء. الدَّوَّارات كلُّها مُنفصلة، عديدة الأزهار، مُزوَّدة بورقة إبطيّة، ماعدا القِمَّة فَقَط. الأزهار

(١) كلِّ التُّسميات للمُؤلِّف ما عدا التُّسمية اللاتينيّة.

ضُرِّيَّة. الزِّناد مُساوِ للغِلاف أو أقصر منه، فصلي تحت الوسط بقليل، يَعْلُظ ويَنعكِف أثناء الإثمار. الكأسيّات الخارجيّة عُشبيّة، مُتطاوِلة، مُنفرِجة، مُنبسِطة، أصغر من المَصاريع. المصاريع تُصبح جلديّة، عُروقها بارزة جدًّا، شبكيّة، ٤ إلى ٦ ملم، مُنفرِجة نوعًا ما، أسنانها الهامشيّة من ١ إلى بُسْأة، ولكنّ مِصراعًا واحدًا منها فقط يحملها قويّة جدًّا.

أَرْبعة نُوَيْعات من لهذا الجنس في لُبنان.

من المُفيد مُراجعة خَصائص أنواع الحُمَّيض عامّة: حُمَّيض الحَقْل (في المُعجَم الأُوَّل) وحُمَّيضة (في المُعجَم الثاني، صفحة ٧٢، رقم ٨٩).

٩١- حَوْدَان آسْيَوِيّ، شَقائِقِ النُّعْمان، كَبِيْكَج، كَفِّ السَّبْع، كَفِّ الضَّبْع، لالَة Asiatic crowfoot, Persian buttercup, Turban (E)

Renoncule asiatique, Renoncule des jardins, Renoncule d'Orient, Renoncule des fleuristes, Rouma, Hasard (F)

Ranunkel, Asiatischer hahnenfuss (D) Ranunculus asiaticus (S)

نبَات مُعَمَّر من فَصِيلَة الحَوْذَانِيَّات؛ جنوره مُتَدرِّنة مُتطاوِلة الشَّكْل الأَسْطوانيُّ؛ ساقُه فَرديّة عادة، تَعلو من ١٠ إلى ٤٠ سم، هُلْبِيَّة نوعًا ما، قليلة التَّفرُّع، أوراقه الجَذْريّة الخارجيّة غير

ثمارها جِراء مُزدوجة المَصاريع في حيي عناقيد طولها من ٢٠ إلى ٣٠سم. الأوراق مُستدرة، قَلْسة القاعدة، مُرَوَّسة ، مُستديرة الأسنان ، قاتمة اللَّون الأخضر على نَصْلِها العُلُويّ، أَفْتَح لونًا من تحت. يُنْتِج فسائل عديدة. البَراعم الشُّتويَّة تَتَغطَّى براتِنج بَلْسَميّ الرَّائحة.

> من المُرجَّح أن يَكون لهذا الحَور مزروعًا في تَعْنايل باسم P. carolinensis.

الخصائص والاستعمال - يَنتُت هٰذا النَّوع في أمْريكا حَيث يُعطى صِنفًا من التّاكاماك الّذي يُدعى تاكاماك أمْريكي. البراعم الرّاتنجيّة جدًّا لها استعمالات الحَوْر الأسود ذاتها، ولكنها أكبر من بَراعمه قَدًّا، وأقْتَم منها احمرارًا وأقوى رائحة وأكثر عِطرًا وهي بالتّالي أكثر فَعالية.

تُستعمَل في الولايات المتّحدة الأمريكية كمُولة ومصادة لداء الحَفر وتُستخدَم لتحضير دواء شاف للجُرح يُسمَّى بَلْسَم فروشو Baume Frochot.

٩٣- حَى العالَم الحِرِّيْف، حَى العالَم الصَّغِيْرِ ، حَيُّوْنِ حِرِّيْفٍ ، وِدْنَةَ حِرِّيْفَة Biting stonecrop, Wall pepper, Creeping Jack (E)

Orpin brûlant, Orpin âcre, Sédum âcre, Petite joubarbe, Pain d'oiseau, Poivre de muraille, Vermiculaire âcre (F)

Scharfe fetthenne, Mauerpfeffer (D) Sedum acre, Sedum anglicum, Sedum tertium, Crassula minor (S)

مُقَطَّعة، قَلْتة القاعدة، مُستديرة المُحيط، مُفَرَّضة، عُنُقها مُتَليِّد ونصلها مُسْتَمرط. الأوراق التّالية مُقَطَّعة إلى سَكَمات عديدة الفُصوص، العُليا منها طويلة العُنَيْقات وقويّة التّقطيع في قاعدتها. الأوراق السّاقِيّة هي أيضًا مُتَعدِّدة الفُصوص، مَنْقوصة. أزهار كبيرة جدًّا، قُطْرها ٣ إلى ٦سم أو حتّى أكثر من ذلك. كأسبات خضراء أو أرجوانية، مُنبسِطة أو مَلْوية إلى الخلف. البَتَلات ٥ أو أكثر، قِرْمزيّة اللَّون الأحمر دائمًا تقريبًا، يُرتُّقاليَّة اللَّون الأصفر أحيانًا، أو حتى بيضاء (لم يُلاحظ عندنا). الأسدية عشرة مُسودّة اللّون، عَرَضيًّا إلى الأصفر البُرتُقاليّ في أزهار من اللُّون ذاته. سُنْبُلة ثَمريّة أسْطوانيّة مَخ وطية، مُتطاولة، أكناتها عديدة جدًّا، مَرْطاء، بَرْدِيَّة، قصيرة الحَيْزُوم.

٩٢ - حَوْر بَلْسَمِيّ، حَوْر كارولينا(١) Peuplier baumier, Peuplier balsamique, Peuplier de la Caroline, Peuplier tacahamaca (F)

Populus balsamifera (S)

شَجَرة أمْريكيّة من فصبلة الصَّفْصَافِيَّات تَعلو ٣٠ مترًا في البراري، ونِصْف ذلك في الزّراعات الأوروبِّيَّة. أزهارها تَتَفتَّح في آذار، الذُّكريّة منها فاقعة اللُّون الأحمر، طولها حوالي ٧,٥سم، الأنثى مُخضَرَّة اللّون، طولها من ١٠ إلى ١٢,٥ سم.

<sup>(</sup>١) التَّسمة العربيَّة الثَّانية للمُؤلِّف.

فَصِيلة المُخَلَّدات. سُوقه عديدة جدًّا ومُتقارِبة، تَعلو من ٥ إلى ١٥سم، مَدّادة ومُنتصِبة، وهي من نَوعين، أحدهما عَقيم وكَثيف الكساء الورقي، والنَّاني مُخصِب، قليل الإيراق ينتهي بالازهرار. أوراقه مُتبادلة، لاطِئة، إهليلجية الشَّكل، لَحْمِية، مُزَوَّاة، رافخة، مُلساء النَّصْل، طولها حَوالى ٦ملم، طعمها حارق جدًّا. اتَّصال الأوراق بالساق يكون حاضنًا بعض الشَّىء. أزهاره صفراء، سَنَمِيَّة أو سُنبليّة التَّجميع العَفْزَليّ الشَّكْل الهاميّ الارتكاز. كأسها خُماسِيَّة الكأسِيّات. تاجُها خُماسى التُّويجات السِّنانيّة الحادّة الطَّرَف. النَّمْرة عُلَيْبَة أو حُوَيْصَلة تَحضُن بزورًا بَيضويّة الشَّكل. نَبات غير لُبنانيّ يَشيع على الحيطان القديمة والصُّخور، من البَحر حتى الجبال. أقسامه المُستعمَلة هي النّبات الكامل الغَضّ.

المُرَكِّبات - نسبة مُرتَفِعة من الماء، لُعاب بكثرة، قِلَوِیْدات: نِیكُوتین، سَیدامِین، رُوتین، سكاكر، ڤیتامِین «ث»، وفی رَماده یُوجَد كربونات الكلس. كما ذُكِرت المُركِّبات التّالیة: سَدْهیدْرِیْن، صَمْغ، راتِنج.

الخصائص - مُضاد لتَصَلَّب الشَّرايين، مُهَبِّط ضَغْط الدّم، مُحَمِّر للبَشْرة، مُضاد للصَّرْع والتَّعَرُّق وداء الحَفَر، شاف للجُرح، مُصَرِّف، مُزيل التُّولُول والتَّفَن.

الاستعمال - تَصَلُّب الشَّرايين، ارتفاع

تَوَتَّر الشَّرايين، أكزيما، قُروح خادِرة، التهابات البَشرة الفُطرِيّة، قُرحات، ثَفَن، ثُولُول، أورام، التهابات الغُدد: Adénites. وكان هذا النَّوع يُستعمَل في الماضي مَسحوقًا ضِدّ الملاريا ونَوْبات الصَّرَع والإسهال.

طريقة الاستعمال - نُقاعة، عَصير، مَرُوخ، نَبيذ. نُقاعة مِلْعَقة صغيرة رؤوس مُزهِرة في فنجان ماء غالٍ، يَنصح بها الطِّب الشَّعبيّ للخصائص المذكورة مَرَّتين في اليوم. السُّوق الغَضَة المَمعُوسة تَصلح في معالجة الأكزيما والتهابات البَشرة المُتسبِّة عن فُطور.

مُلاحظات - حَى العالَم الحِرِّيف هو نَبات سام، ويُسبِّب آلامًا في الرَّأس وضعفًا عامًّا وتَقَيُّؤات، إذا أُخِذ بمقادير قَويَّة؛ وهو يَدخل في تركيب مَرُوخات ومَراهم. إنَّ فترة وَضْع السُّوق الغَضَّة المَمعُوسة تُحدَّد سَلَفًا ويجب ألَّا تكون قصيرة أبدًا. العصير الطّازج يُمكنه أن يُحدِث إصابات عَيْنِيّة لا يُمكّن شفاؤها. وبالرُّغم من أنَّ لحَيِّ العالَم الحِرِّيف تأثير مُنْقِص للتَّوتُّر الشِّريانيّ بالتَّأكيد، فإنّ استعماله الدّاخليّ قد يُؤدِّي إلى بُروز أعراض رَفْض الجسم له. وقد يَكون استعماله محصورًا بالتَّداوي الخارجيّ كمُزيل للتَّفَن والثُّؤلُول طَبيعيًّا وغير مُؤذٍ، كما يُفيد أيضًا في إنضاج الدُّمَّل، علمًا بأنَّه قد يُحدِث هنا أيضًا بعض التَّهِتُجات الجلديّة المَوضعيّة.

نَعجُن، نَخبُز، ونَترُك الخُبز ٢٢ إلى خ ش ب ٢٤ ساعة على فُرن الخَبّاز قَبْل تغليفه. تركيبة أخرى تُعطي ما يُسمَّى خُبْز الأبازيْر: Pain d'épices:

یانسون ۱۵ غ کُربَرة ۱۵ غ قَرَنْفُل ۲ غ کربونات البوتاسیوم ۲ غ قُرُفَة ۲ غ ماء ۲ غ طَحین ۲ غ

نُحضِّر عجينة ونُقطِّعها إلى قِطع نُبرنِقها بصفار البيض ونَخبزُها كما ذُكر أعلاه. إذا أضفنا إلى هٰذه التَّركيبة البزور الطَّاردة للدود نَحصل على ما يُسمِّى. Pain d'épices à vers. كان القُدماء يَتغذّون من خُبز يُحضِّرونه من العَسل وطحين الشَّيْلَم، وكان يُدعى Mélitate.

عَسَل .....كمِّيَّة كافية

# ٩٥- خَشَب (حَوادِث يُسبِّبها الـ -) Wood (E)

Bois (accidents) (F)

Holz (D)

الخَشَب هُو القِسم الصُّلْب في سُوق النَّباتات وأغصانها وجُذورها، يَتألَّف بشكل أساسي من الأقنية المُوصِلة للنَّسْغ الخام.

إنَّ العَمل بالخشب وتَناقُله بالأيدي قَد

ė

## Medicinal bread (E) جُبُرْ طبّي - ٩٤ Pains médicinaux (F) Heilbrot (D)

اقترح البعض، تحت اسم "خُبز حديدي" خُبزًا أساسه كَربونات پروتوكسيد الحديد. إنّ الخُبز الذي يُصنَع بهذا الشَّكل يَكون تقريبًا عديم الطَّعم الغَريب. وطرأت أيضًا للمُؤلِّف عينه فِكرة صُنْع خُبز من بيكربونات الصُّوديوم، ومن أوكسيد الزّنك، ومن تحت نيترات البيْسموث، إلخ. يُستوحَى من ذلك بالواقع أنّه بالإمكان إدخال طائفة من المَواد العِلاجيّة إلى الخُبز بهذه الطَّريقة ومُعالجة المَرضى بواسطة غذائهم. ومع ذلك فإنّه من المَعروف أنّ الأملاح قد تَتَغيَّر نوعًا ما.

# خُبْز اليانْسُون

٠٠٠	يانسون كامل
	طحين
غ	سُکّر
<b>ξ</b>	بَياض بَيْض .
<b>Y</b>	صَفار بَيْض
(الدُّرْدِيّ)كمِّيَّة كافية	زَيت الطُّوطَ

يُؤدِّي إلى أمراضِ جلدية بالمُلامَسة من النَّوع الأكزيماتي، أو إلى تفاعلاتِ حساسِيةٍ مُتفشِّية. وتُلاحَظ هذه الحوادث عادة عند الحَطّابين والنَّجّارين. ويكون بعضُ الأخشاب غالبًا أكثر مَسؤولية من سواه. فيُتهم مَثلًا خشبُ الزّان والكَسْتناء والحَور والدّلب وخاصة السّنديان، ولكنّ الأخشاب الغنية بالزُّيُوت الدُّهنيّة وبالمواد العَفْصية هي التي أكثر ما تكون السّبَب.

فقد تَظهر أكزيما أودامِيّة أو نافِطة، التهاب مُخاطِيّة الأنف، برونشيت يكون مَظهرًا لإصابة الأغشية المُخاطيّة. الخَشَب الأفريقيّ يُحدِثُ على البَشرة تَنقيطًا أصفر اللَّون بينما يُحدِث عليها الخَشَب اليابانيّ المُسمّى Tagayasan تَنقيطًا بُنيًّا.

إِنَّ الظَّواهر العامّة تُترجَم بالحُمّى، الغَثيان والتَّقيُّؤ. وتُؤدِّي نُشارَة الخَشَب الأجنبيّ إلى حُدوث نَوْبات من الرَّبُو. وقد يَجد المُوسيقيُّون أنفسَهم أحيانًا مُنزَعجين من خَشَب آلةٍ مَصنوعة من خشب أفريقيّ. أمّا الفِلِّين فقد يُحدِثُ تَغَبُّرًا خاصًّا بالرِّئة يُدعَى «تَغَبُّر الفِلِّين»(۱) Subérose.

إلى جانب لهذه الحوادث الّتي يُسبّها الخَشب بالذّات، هُناك حَوادث أخرى مردُّها ليس إلى الطُّفيليّات التي تُصيب الخَشب بقدر ما هي إلى المَوادّ التي تُستعمَل لمُكافَحة تلك الطُّفيليّات. إنَّ المَوادّ المُحواد المَحواد المَحواد المَحافَحة الله الطُّفيليّات. إنَّ المَحواد المُخصَصة للقضاء على

الطُّفيليّات والّتي يَكون أساسُها الْپَنتاكلوروفينُول هي قابلة لكي تُحدِث اضطراباتٍ في المجرى الهَضميّ والجهاز التَّنفُّسيّ والجهاز العَصبيّ والكبد والكليتين. أمّا الورنيش والدِّهانات الورنيشيّة فليست مُسالِمة تمامًا لأنَّها قد تُؤدِّي بدورها إلى حَوادث رئويَّة.

# ٩٦- خَشْخَاش أَرْغَمُونِيّ (١)

Argemone poppy (E)
Coquelicot argemone (F)
Argemone mohn (D)
Papaver argemone (S)

نَبات حَوْلي أخضر اللَّون من فَصِيلَة الخَشْخَاشِيَّات، مُوبر، عديد السّوق عادة، يُعلو من ١٠ إلى ٣٠سم. سُوقُه مُفَشَّكَلة أو صاعِدة، حَرائرها مُنسِطة أو مُنتصِبة. أوراقُه هُلْبيّة الصّفحتَين أو مُستمرطة. براعمه بيضانية. كأسيّاته خضراء. تاجه من ٣ إلى ٤ سم، البَتَلات بَيضيّة مُتطاولة، زنْجَفريّة اللّون الأحمر مع بُقعَةٍ لونها إلى البِّنفسجيّ في قاعدتها. العُلَيْبَة ضَيِّقة الشَّكل المُتطاول الأسْطواني، هُلْبِيَّة بأوبار كثيفة، أو بحرائر نادرة، أو حتى مَرْطاء تمامًا، لها ٤ إلى ٦ أضلاع طُوليَّة بارزة. الأسطوانة أَضْيَق من العُلَيْبَة بقليل، وهي نِصف دائريَّة الشَّكل. ازهراره رَبيعيّ في الحُقول والأماكن الحُرجيَّة وعلى الصُّخور.

<sup>(</sup>١) كلّ التَّسميات للمُولِّف ما عدا التَّسمية اللاتينيّة.

راحَة الأسد

Lion's-leaf, Lion's-turnip (E) Léontice, Léonure (F) Löwentrapp, Echte löwenblatt (D) Leontice leontopetalum (S)

العَسْلَج جنس نَباتات مُعمَّرة من فَصِيلَة البَرْبَارِيْسِيَّات رِيزُومها دَرَنيِّ غليظ. أوراقها مُركَّبة رِيشيّة أو ريشيّة التَّخريم أو راحِيّة. ازهرارها عَناقيد أو سَنَمات مُزدوِجة التَّفريع. أزهارها من ٣ إلى ٩ كأسيّات بَتَلانيَّة؛ ٦ بَتَلات؛ ٦ أَسْدية حُرَّة؛ الثَّمرة عُلَيبة غير مُنْفَلِقة، ٢ إلى ٤ يُزور.

عَسْلِج الأسد نَبِتَة لُبنانيّة مُعمّرة، رِيزومها نام جدًّا تكسوه بَشَرة جامِدة تَتَقشَّر بشكُّل غير سَويّ. ساقُه فَرديّة تَعلو من ١٠ إلى ٥٠سم، مُتَمدِّدة فَوق التُّربة، تُحيط بقاعدتها الأوراق الجَذريّة، وتَحمل بَعض الأوراق السّاقِيّة تَحت الازهرار. الازهرار في عُثكول هَرَمي غَني جدًّا مُؤلِّف من عَناقيد مُرَكَّبة. أوراق مُزدوجة التَّقسيم الثُّلاثيّ المُخَرَّم. الأوراق القاعِديّة تَطول حتّى ١٥سم وتَعرُض نحو ٢٠سم. عناقيد زُهريّة كثيفة، أزهارها مُتقاربة، زاهية اللُّون الأصفر، سُداسيّة الكأسيّات والبَتَلات والأسدية، قُطرها نحو ٢سم. الأسدية ذات سدادات مستديرة الشَّكل، مُصْفَرَّة اللَّونِ. الثَّمرِة عُلَسة مُمَدَّدة، حُوَيْصليّة، مُمرّكة بعروق مُتوازية، قَد تَطول ٣سم وتَعرض أكثر من ٢سم.

٩٧ - خَميرة الدار، رَقَف، عَسْلَج الأسد، البُزور كُرَويَّة الشَّكْل. ازهراره في آذار خم ي و نىسان .

> الخصائص والاستعمال - يُجمَع العَسْلَج في شرق مُحيط البحر المُتوسِّط، خاصة في الشَّرق الأوسط حيث تُجمَع أرومته الَّتي تُجفَّف وتُقَطَّع إلى شَرائح وتُحفَظ؛ المَسحوق مُعطِّس. وهي تُعتبر مَحلِّيًا تِرياقًا جيِّدًا لِلَدْغ الأفاعي وعِلاج الصَّرْع.

> يَذَكُر دُورْقُو، في مَخْزَن الأدوية، ما حرفيَّته: «في لُبنان يُستعمَل عصير يُحضَّر من الجُذور الغَضّة في مُعالجة داء النُّقطة، يَهِتَزُّ المَريض ويَتَحرَّك بانتفاضات واختلاجات صرعية ارتعاشية كثيفة حادة ومُتَكرِّرة قَبْل أن يَستشعِر التّأثيرات الخَيّرة المُؤاتبة لهذه المُعالجة الْفَعَّالَةِ».

> مُلاحَظة - هُناك نُوَيْع أو ضَرْب من عَسْلَج الأسد ينبت في سوريا، أوراقه قصيرة تبلغ ١٠سم على الأكثر. ساقه تَعلو نحو ١٥سم. ازهراره مُخفّف. أزهاره بالكاد أصغر من النوع النَّموذجيّ، ولكن زُنيداتها تكون أقصر نسبيًّا، تَتَقوَّس في النِّهاية. نَدعوه: عَسْلِج الأسد الصَّغير (١).

<sup>(</sup>١) التَّسمة للمُؤلِّف.

خنا

الخَنازِيرِيّة المَناقِع ، حَشَيشة الخَنازِيرِيّة المَناقِع ، حَشَيشة الخَنازِيرِيّة المَناقِع ، حَشَيشة الخَنازِيرِيّة (E)
Scrofulaire aquatique, Bétoine d'eau,
Grande scrofulaire (F)
Wasserbraunwurz (D)
Scrofularia aquatica (S)

نَبات بَرِّيّ مُعَمَّر من فَصِيلَة الخَنازِيرِيَّات يَعلو من ٥٠ إلى ٩٠سم. ساقُه فَرعاء. أوراقُه السُّفلى مُتقابِلة والعُليا مُتعاقِبة. نَصلها إهليلجيّ الشَّكُل، مُستدِق الطَّرَف، مُتباعِد التَّسنين. أزهاره مِحوريّة وهامِيّة الارتكاز، عُنقوديّة التَّجميع، صغيرة القدّ، حمراء اللَّون، رائحته بَشعة، طعمه حامز ومُرّ.

الخصائص والاستعمال - كان هٰذا النَّبات يُستعمَل في الماضي ضِدّ الإصابات الخَنازِيرِيّة؛ وكان أساسًا لعِدَّة مُرُوخات أو مَراهم. تَسلَّط الضَّوء على خصائصه العِلاجيَّة على أثر فُقْدان الأدوية الشَّافية للجُرح الّذي رافق حِصار رُوشيل أيّام الملك لويس الثَّالث عَشَر. يُستعمَل نَقيع الخَنازِيريّة عِند عَرَب الجَزائر لمعالجة الحُمَّيات عَرَب الجَزائر لمعالجة الحُمَّيات المُقلِعة. وكان قد نُصِح بهذا النَّبات قديمًا كتِرياق ضِدٌ فيروس الكَلب وكطارد للدُّود. بمقادير قويَّة يُصبح مُقَيِّئًا وسامًا.

أُعيد تسجيله في الإصدار التّاسع للفَرْ ماكوبيا الفَرَنسيّة عام ١٩٧٤. د س م

الخصائص - الثّمار مُسهِّلة قَوِيَّة. النَّبات الغَض يشتهر كَرَقُوء، شافٍ للجرح وشافٍ للحروق.

الاستعمال - إمْساك، جُروح، حُروق، نَزيفات خارجِيّة.

طريقة الاستعمال - لَصُوقات مَوضعيّة خارجيَّة من النَّبات الغَضّ المَمعوس على الجُروح والحُروق. الأوراق تُستعمَل في بَعض المناطق الأوروبِّيّة في لَصُوقاتٍ مَوضعيَّة على الحُروق ولوَقْف النَّزيفات الدَّمَويَّة الخارِجيّة.

۱۰۰ - دُسُم، دُهُون، شُخُوم، أجسام دَسِمة، مَوادّ دهنيَّة

Graisses, Corps gras, Matières grasses, Lipides (F)

إنّ الشُّحوم أو الدُّهون أو الدُّسُم هي مَوادَ تُسْحَب من الحَيوان أو من النَّبات، وتكون مُختلِفة القِوام، سائلة أو تَنصهِر بحرارة قليلة، تُشكّل على الورق بُقعَة شَفّافة ودائمة؛ وهي مَوادّ لطيفة المَلْمَس، مُطْعِمة، لا تَذوب في الماء، قليلة الذَّوبان عمومًا في الكحول، ذَوّابة فليلة الذَّوبان عمومًا في الكحول، ذَوّابة بالقِلَى. تُسمَّى الشُّحوم، حسب قوامِها أو حسب مَصدرها، زُيوتًا، تلك الّتي بالقِلَى. تُسمَّى الشُّحوم، حسب قوامِها تكون سائلة بالحرارة العادِيّة؛ زُبْدات، المَواد الدَّسِمة الّتي تَكون رَخْوة عند المَواد الدَّسِمة الّتي تَكون رَخْوة عند بدرجات قليلة؛ شُحومًا، المَواد الحَيوانيَّة الدَّسِمة، تَكون رَخْوة الحَيوانيَّة الدَّسِمة، تَكون رَخْوة

9

٩٩- داذِي مَخْزَنِيّ، هِيُوفارِيقُون مَخْزَنِيّ، أَنْدرُوسَامُن، رُمَّان الأَنْهار، عَرِيْنَة

Park-leaves, All Saint's-wort, Tutsan (E)

Androsème, Millepertuis androsème, Toute saine, Herbe sicilienne (F)

Grundheil, Grosses johanniskraut (D) Hypericum Androsæmum, Androsæmum officinale (S)

نَبات طبِّي مُعمَّر عِطرِي الرّائحة المُستَحبَّة من فَصِيلة الدَّاذِيَّات يَعلو من المُستَحبَّة من فَصِيلة الدَّاذِيَّات يَعلو من إلى ١٠٠سم. وهو لا يَختلِف عن أنواع الدَّاذي إلّا بثماره العِنبِيَّة بدلًا من الثَّمار العُليبِيّة الشَّكل وهذا ما جَعل البُوتانيِّين يَفرِدُونه عن الدّاذي في أوَّل الأمر. أوراقُه بَيضِيّة الشَّكل المُستطيل وشبه دائمة. فُروعُه كبيرة مُزدوِجة الزَّوَايا. أزهارُه زاهِيَة اللَّون الأصفر، قطرها ٣سم، سَنمِيَّة التَّجميع، هامِيَّة قطرها ٣سم، سَنمِيَّة التَّجميع، هامِيَّة الارتبكاز، صَيفِيّة الازهرار. عُنيباتُه حمراء اللَّون ومن ثمَّ مُسودَّة عند تَمام نضجها.

المُركِّبات - صِباغ أحمر غَنيّ بالدُّهن والماء.

د س م

ومُنصهِرة جدًّا؛ وأخيرًا تُسمَّى وَدَكًا، المَوادِّ الدَّسِمة من الصِّنْف عينه، ولكنَّها تَكون أكثر صَلابة منها وتَنصهِر فوق درجة ٣٨٠سغ. إنّ طُرُق استخراج الشُّحوم تَختلِف باختلاف حالة كلَّ منها.

المُركِّبات - إنَّ الدُّسُم والوَدَك والزُّيوت النَّباتيَّة تكون مُركَّبة من مَزيج من عِدَّة جَواهر مُفَرَّقة أهمُّها وأشيَعُها ما يلى:

مادَّة بيضاء اللُّون، بِلُّوريَّة، تَنصهر عند ٦٢°سغ، تُدعى دُهْنِيْن أو سْتياريْن، تركيبها الكيميائيّ (C<sub>18</sub>H<sub>35</sub>O<sub>2</sub>)3 تركيبها الكيميائيّ مادَّة مُماثِلة، ولكنَّها تنصه, عند ٤٧ سغ، تُدعى نَخْلِيْن (مَرْغَريْن)، تَركيبُها الكيميائيّ (C<sub>16</sub>H<sub>13</sub>O<sub>2</sub>)3 تَركيبُها الكيميائيّ وأخيرًا مادَّة سائلة تُدعى زَيْتِيْن أو  $C_3H_5\equiv (C_{18}H_{33}O_2)_3$  دُهْنِيْن، تركيبُها إِنَّ هٰذه المُركِّبات الثَّلاث تُمثِّل الأستيرات الدُّهنيّة، والنَّخْليكيّة، والزَّيْتيكيّة الموجودة في الغليسّرين. إنّ المَواد الدَّسِمة الطَّبيعيَّة هي مَزيج من هٰذه الأستيرات أو الغليسريدات الّتي تُعطى، بتثبيتها لعناصر الماء، الحوامض الدَّسِمة من جهة أو الحوامِض الدُّهنيّة، ومن جهة ثانية، وكتعبير ثابت، تُعطى الغليسّرين.

نَبَات عُشيق مُعَمَّر مُنتصِب من فَصِيلة السَّذابيَّات، مَكْسُو بأوبار غدِّيَّة، يَعلو من ٥٠ إلى ١٠٠سم. أوراقُه مُنَقَّطة بغُددِ تُرى بالشَّفافِية، طولها ٣سم ومُؤلَّفة من ٥ إلى ٨ أزواج من الوريقات المُسنَّنة الحَوافي. ازهراره عُنقُوديّ. كأسه خُماسيّة الكأسيّات الحُرّة السّنانِيّة والأقصر بمرَّتَين من التّاج. البَتَلات بيضاء أو وَرديَّة أو زَرْقاء اللُّون، تَخفّ طوليًا إلى ظُفَير صَغير، الجانبيَّتان مُنفرجتان، البَتلات الأخرى حادّة. الثُّم ة عُلَية خُماسيّة الغلافات الصّلية التي يُحتوى الواحد منها على بزرتين أو ثلاث. ازهراره من نيسان إلى خُزيران في المناطق الحُرجيّة. أقسامُه المُستَعملَة هي الأوراق وقِشرة الجُذور. كان الدِّقْتَمُون مُسجَّلًا في دستور ١٨٦٦.

المُركَّبات - زَيت دُهنيّ، مَوادّ وَمِعنيّة، عُصارات مُرَّة، شَمْع، كُولِين، تريغُونَلَين. وَجَد كلُّ من تُوماس ودَمْبَرْجِس في النَّبات عام ١٩٣٠ المَوادّ التَّالية: فراكسِينَلُون تَركيبُه دَلِيهُ دَلِيهُ دَلِيهُ وَلَيْتُون يَركيبُه دَلِيهُ وَلَيْتُون يَركيبُه وَلَيْتُون يَركيبُه وَلَيْتُون تَركيبُه تَركيبُه دَلِيهُ دَلْمُعُ دَلِيهُ دَلِيهُ دَلْمُ دَلِيهُ دَلِيهُ دَلِيهُ دَلْمُ دَلْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَلْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَلْمُ دَلِيهُ دَلِيهُ دَلْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَلْمُ دَلِيهُ دَالْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَلْمُ دَلْمُ دَلْمُ دَالْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَالِيهُ دَالْمُ دَالِيهُ دَلْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَالِهُ دَلْمُ دَالْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَالْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَالِهُ دَلْمُ دَالْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَلْمُ دَالْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَالْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَلْمُ دَالُهُ دَلْمُ دَلْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَلِيْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَلْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَلِهُ دَلْمُ دَلْمُ دَلِيهُ دَلْمُ دَلْمُ دَلِي

۱۳۲ – ۱۳۳°سغ.

الخصائص - مُضاد للتَّسْنُج، مُعرِّق غَزير، هاضم، طارد للدُّود، مُنشِّط، مُضاد للهستيريا، مُقوِّ، مُضاد لداء الصَّرْع؛ الأوراق: نافعة للمَعِدة وطاردة للدُّود؛ القُشور: مُقوِّية مُنشِّطة ومُضادَّة لفقر الدّم. وذُكِر أنّ النَّبات مُدِرّ للحليب.

الاستعمال - فقر الدّم، وَهْن وضَعْف الحَيويَّة، عُسْر الهَضْم، تَطَبُّل البَطْن، طُفَيليّات المَعِدة، إصابات الأنبوب الهَضميّ، دوارات ودوخات، تنظيم التَّغيُّط، إحداث تَقلُّصات المَهْبِل وعَضلاته الملساء. أعيد تسجيل النَّبات في دستور ١٩٧٥.

طريقة الاستعمال - مَسحوق الجذور من ٢ إلى ١٠ غرامات في اليوم. نُقاعة ٢٠ غرام أوراق في ليتر ماء غالٍ يُغطَّى عشر دقائق ويُؤخَذ منه ٣ فناجين في اليوم. نَقيع ٤٠ غرام قُشور مُقطَّعة في ليتر ماء يُغلى دقيقتين ويُغَطِّى عشرًا، ويُؤخَذ منه ٣ فناجين في اليوم. مِلْعَقَة ويغيرة من الجذر المَفروم لمقدار فينجانين من الماء الغالي تُؤخَذ يَومًا من اثنين.

مُلاحَظة - إنّ مُلامَسة النّبات قد تُحدِث عند البَعض ظَواهر حَساسِية، من حكّة شديدة وأورام وأكزيما. قِشرة الجُذور كانت تَدخُل في تَركيب مُستَحضراتٍ صَيدليّة عديدة. النّبات عِطرى جدًّا بكل أقسامه ويَنثُر عِطرًا نَقّاذًا

برائحة القرفة المُحْمَضَة. أوراقُه غَنيَّة بجيوب الزَّيت الدُّهنيِّ الطَّيَّار لدرجةٍ يَسهلُ مَعها إشعاله صَيفًا وهو على النَّبات بمُلامَسة النَّار.

# Embrocations (F) دَلُوك، نُطُول - ۱۰۲

# 

استعمال بيطري.

## دَلُوكَ مُنشِّط

٩٠ غ	زَيت زَيتون
۲غ	دُهن تَرْبَنتين
۲غ	كافور
۱۲ غ	نُشادر سائل
ماء كمِّية تَكفي لتَحضير	نُضيف:
	لترين.

ضِد المَجهودات وضِد المَلْخ والتواءات المَفاصِل. استعمال بيطريّ. 1.۳ دُهن البَقْدُونس

### Essence de persil (F)

دُهْن يُستخرَج بالتَّقطير البُّخاريّ لثمار

د ه ن

البَقدونس Carum petroselinum يَحتوي بنوع خاص على الأَثْيُول.

المُواصَفات - سائل عديم اللَّون أو فاتح اللَّون الأصفر. كَثافته ١,٠٤٠ إلى ١,١١٠ مع ٧ مَرّات حجمه من الكحول ٨٠ درجة ومع حجمه كحول ٩٠ درجة، يُعطى محلولًا صافيًا (كودكس).

الخصائص والاستعمال - إنّ هذا الدُّهْن هو مُخصَّص للحلول مَحلِّ الدُّهْن هو مُخصَّص للحلول مَحلِّ الأَّبْيُول. وقد استُعمِل كدواء مُبوِّل بمقدار ٠,٠٥ إلى ٠,١٥ غرام في اليوم، ومن الخارج على شكل مَرْهم ضِدَّ الهَوام.

١٠٤ دُهْن الزَّعْتَر الشّائِع، زَيْت الزَّعْتَر الشَّائِع الدُّهْنِيّ
 الشَّائِع الدُّهْنِيّ

Essence de thym, Huile essentielle de thym (F)

يُستخرَج بالتَّقطير البُخاريِّ من رُوُوس الزَّعتر المُزهِرة Thymus vulgaris وهو نوع من فَصِيلَة الشَّفَوِيَّات غير موجود في لبنان على عكس ما قد يُوحي به اسمه العَربيّ. دُهْنُه يَحتوي على نسبة من الفينولات (تيمول وكَرْقُكْرول) قد تَبلغ ٦٠ بالمئة من سِيْمان ومن پينان شمال، والقليل من البورنيول.

المُواصَفات - سائل عديم اللَّون أو باهِت اللَّون الأصفر، رائحته نَفّاذَة، طعمه مُفَلْفَل. كثافته عند + ٢٠°سغ هي من ٩٠٤٠ إلى ٠,٩٥٥. يَذوب في الكَحول القَويّ وفي الزُّيوت الدَّسِمة.

النِّتاج المَخزَنيّ يَجب أن يَحتوي ٣٠ بالمئة على الأقلّ من الفينولات المُعبَّر عنها بالتيمول.

الاستعمال - بَلْسَم أُپُودَلْدُوش، بَلْسَم ترانكيل.

الخصائص - دُهْن مُنشِّط، مُطهِّر قَويّ، مُبوِّل، قاتل للدُّود. يُستخدَم لاستخراج التيمول. مُقوِّ عام وفِكريّ، كَبِديّ، مُطهِّر عام، يُحدِث الطَّمْث، طارد للدّود.

١٠٥ - دُهْن كِبْش القَرَنْفُل، زَيْت كِبْش القَرَنْفُل، زَيْت كِبْش القَرَنْفُل الدُّهْنِي

Essence de girofle, Huile essentielle de girofle (F)

دُهن يُستخرَج من بَراعم أزهار القَرَنْفُل Eugenia caryophyllata بواسطة التَّقطير البُخاريّ.

المُواصَفات - يَحتوي على ٨٥ إلى ٩٣ بالمئة من وَزنه من الأوجينول الحُرّ والمُركَّب. وهو سائل فاتح اللَّون الأصفر يَتكثَّف لَونُه مع الوقت. يَنحَلَّ في ١,٦ جزء كحول ٩٥ درجة وفي مَرَّتين حجمه كحول ٧٠ درجة. وهو دُهْن مُياسِر خفف.

النِّتاج المَخزنيّ يَجِب أن يَحتوي على ٨٥ بالمئة كحد أدنى وعلى ٩٣ بالمئة كحد أقصى من الأوجينول.

الاستعمال - لُودانُم سِيْدِنْهام كودكس ١٩٤٩ . د ي ج

يَدخل في تَحضير إكسير مُنظَف أسنان، وفي مَرُوخ رُوزَن (كودكس ١٩٣٧)، وفي بَلْسَم نِرْقَال (كودكس ١٩٣٧). ويُستعمَل لِكَيّ لُبّ السِّن، ١٩٠٨). ويُستعمَل لِكَيّ لُبّ السِّن، وإذا رُكِّب مع أوكسيد الزِّنك فإنّه يُستخدَم لتَشكيل «أوجينات» Eugénates تُستخدَم في ضمادات أسْنانيَّة مُؤقَّتة؛ ويَدخل كذلك في تَحضير خَليطات مُزيلة للألم في الأسنان.

يُستخدَم لتَحضير الڤانيلِين الاصطناعيّ.

# ١٠٦ - دِيجِيْتَال أَرْجُوَانِيّة

Finger flower, Bloody finger (E)
Digitale pourprée, Grande digitale (F)
Fingerhut (D)
Digitalis purpurea (S)

مُركِّبات الديجيتال - من بَين مُركِّبات الدَّجيتال الأساسيّة ١٠ بالمئة من المَوادِّ المَعدِنيّة (أملاح البُوتاسيوم)؛ حوامِض عُضويّة (حامِض بُنِّيّ)، خِضابات مُلوِّنة (ديجيفلاڤايين)؛ خمائر: هيدرولازات (دياستازات تُحلِّل الماء)، أو كُسِيدازات (خمائر التَّأْكُسُد).

جُواهر الدِّجيتال الفَعّالة - إنَّ جُواهر الدِّيجيتال الفَعّالة المُباشِرة عديدة وصَعْبَة الفَصل إذ إنّها تَتَعرَّض إلى تَغييرات هامّة أثناء التَّجفيف والحفظ.

كان أوّل من استخرج من الدِّيجيتال، عام ١٨٤٥، عُنصُرًا عديم الشَّكْل، كلُّ من هُومُولَ وكواقَنّ، وأطلقا عليه اسم

ديجيتالين. عام ١٨٦٨ عَرَّف ناتيقَل على الدَّيجيتالين المُتبلِّر، وهي الفترة التي اعتبر فيها عُنصُر ناتيقَل العديم الشَّكْل على أنّه الجَوهر الفَعّال في الدَّيجيتال.

عام ۱۸۷۵ حَضَّر شميدبَرْغ الدِّيجيتُوكْسِين من البزور بتركيب كيميائيّ هو: ۲٫۵۰ و ۲٫۵۰ الدِّيجيتالايين بتركيب ۲٫۵۰ و ۲٫۵۰ الدِّيجيتالين العَديم الشَّكُل من البزور بتركيب ۲٫۵۰ و ۲٬۰۰۰ و ۲٬۰۰ و ۲٬۰۰۰ و ۲٬۰۰ و ۲٬۰

ومن ثمَّ عَزل كيلياني، عام ١٨٩٧، الدِّيجيتوفيلِّين بتركيب ٢٠٤٥٥، الدِّيجيتوفيلِّين بتركيب ١٩٠٤، واكتشف كلُويتّا، عام ١٩٠٤، ديجيتوكْسِين جديدًا، وعَزَل كرَفْت، عام ١٩١٢، من الأوراق ديجيصابُونين، وجيتالين بتركيب ٢٤٤٥، الَّذي يتحوَّل بالزَّمْوَهَة أو الاجْتِفاف، إلى أَنْهيدروجيتالين، واستخرج لاحقًا هيتروسيدًا جديدًا: الجيتِيْن.

عام ۱۹۱۳ عَزَل كلَّ من وِنْدُوس وسناكِنْبَرغَر، الجيتونين بتركيب كيميائي وسناكِنْبَرغَر، الجيتونين بتركيب كيميائي دراسة الدِّيجيتوكسين وأعطاه التَّركيبة الكيميائية دراسة الدِّيجيتونين وأعطاه التَّركيبة وتَلاميذُه إلى الدِّيجيتونين التَّركيبة التّالية وتَلاميذُه إلى الدِّيجيتونين التَّركيبة التّالية كرافْت وكيلياني الأنْهيدرو-ديجيتالين، كرافْت وكيلياني الأنْهيدرو-ديجيتالين، وثَبَّت التَّركيبة الكيميائيّة النِّهائيّة للدِّجيتالينُم فيروم (أحد ٤ هيتروسيدات مُحدَّدة في الدِّيجيتال) كالتّالي درو-(26H36O14).

د ي ج

الا - دواء عَسَلَيّ، مُعَسَّل - ۱۰۷ Mellites, Miels médicinaux, Hydromellés, Oxymellites, Oxymels (F)

# دُواء التُّوت العَسَليّ

عَصير التُّوت ..... ٢ جزء عَسل ..... ٢ جزء ماء .... كمِّيَّة كافية نُحضِّر بالطَّريقة ذاتها دواء البَيْلَسان العَسَلق.

# دُواء الرّاتانيا العَسَليّ

يُستعمَل بمقدار ٣٠ غرامًا في ٢٠٠ غرام في غَرور قابض.

# دَواء فجل الخَيْل العَسَليّ

عَصير فجل الخَيْل ......عسل عسل ...... ٣٧٥ غ

نَمزُج على البارد.

# دُواء نَدَى البَحْر العَسَلَى

رُؤوس نَدَى البَحر المُزْهِرة .... ٣٧٥غ ماء عسل أبيض ..... ٧٥٠غ عام ١٩٣٣، بَيَّن ستولَ ومُعاونُوه أنَّ الجَواهر الَّتِي تَمَّت دراستُها سابقًا هي نتيجة تَحليل غير كامل بالماء للغلوسيدات الَّتِي يَجب اعتبارها كهيتروسيدات الدِّيجيتال البدائية.

يَشْتَقَ الدِّيجِيتالين المُتبلِّر ممّا يُسمّى Purpurea glucoside A بواسطة التَّحليل المائي الجُزئيّ.

والحال هي أنّه من المُثبَّت اليوم أنّ مُعظَم تلك العناصر الصَّعبة الفَصْل، تَكون عُرضةً لتغييرات هامّة أثناء التَّجفيف والحفظ. وتَكون تَنقيتُها غير كاملة في بعض الأحيان، ويَكون عَزْلُها في الغالب سيّئ التَّحديد، وأنّ بَعضها ليس إلّا مَزيجات لجوهر واحد، أعطاها مُؤلفون مُختلفون أسماءً مُختلِفة.

إنّ بَعض تلك الهيتروسيدات يَختَصّ بالأوراق، وبَعضها الآخر بالبزور. وهي تُعطي، تَحت تأثير خميرة أو أكثر من الخمائر الخاصّة (ديجيپُورْپُورَاز)، سكاكر مُختلِفة بالتَّحليل المائيّ (غلكتوز، كزيلوز، ديجيتوكسين، إلخ...)، وتُعطي جانين أو أغْليكُون: ديجيتوجانين، ديجيتاليجانين، ديجيتوگسين، ديجيتوگسين، النَّشاط الفيزيولوجيّ للورقة.

وعلى جُذور يعض الأشحار والأعشاب ذؤن جَميعُها عديمة الكلوروفيل، صغيرة القَدّ، تَعلو من ٥ إلى ٣٠سم. سُوقُها مُنتصبة، ضُمَّيَّة الانتشاب، مُتراكِبة الحَراشِف الورقيَّة المُلوَّنَة. ازهرارُها عُنقوديّ التَّجميع. لَون أزهارها يَختلف مع النَّوع من الأبيض والأصفر والأزرق المُوَشَّح بالورديِّ والبِّنَفسجيِّ. الذُّؤنُون الخَفي نَبات طُفيليّ طبِّي يَنبت على جُذُور شُجَر الزّان.

> الخصائص - مُجِّد في الماضي على أنّه ضِدّ العُقْم. وقيل إنّ غَسيل المَهْبل الذُّؤنُون جنس نَباتات طُفَيلِيَّة من بعصارته قَبْل إدراك زَهرِه تُفِيد النِّساء

١٠٨ - ذُؤنُون خَفِيّ، عُشْبَة الرَّحِم(١) Common tooth-wort (E) Clandestine, Lathrée, Madrate, Herbe à la matrice, Herbe cachée (F) Echte schuppenwurz (D) Lathræa clandestina (S)

فَصِيلة الجَعْفِيلِيَّات تَعيش في التُّراب العَواقِر.

٧- راوَنْد فرنسا - يَنْتُج من الرّاوَنْد الذَّكَر Rhapontic الّذي يُزرَع اليوم في اللَّذَكَر Rhapontic الّذي يُزرَع اليوم في أماكن فَرنسيّة عديدة، كما يَنْتُج أيضًا من أنواع أخرى من الرّاوَنْد، مِثال الرَّاوَنْد، مِثال الرَّاوَنْد المُتَمَوِّج (١) Rh. undulatum (١) الرّاوَنْد المُتَراصِ (١) أو راوَنْد الحيمالايا Rh. وراوَنْد الحيمالايا Rh. الذي أُعيد تسجيلُه في الفَرْ ماكوبيا عام ١٩٧٤.

يَقَع راوَنْد فرنسا، كما الرّوَنْدات الّتي يُطلَق عليها اسم راوَنْد أوروبّا، ألمانيا، النَّمسا، هنغاريا، إلخ. في قطع كبيرة كمِعصَم اليد أو أكثر، وتكون عامّة أكثر طولًا منها عَرْضًا. قِطع الرِّيزوم غير مُنتظمة، عَقْداء وتُبرز لُبًّا في وسطها؛ قِطع الجُذورِ تكون أسطوانيّة نوعًا ما وخالية من اللُّب. الوجه الخارجيّ مُنَقَّط في بَعض الأحيان، ولكنَّه دائمًا مُزَوَّد بشبكة مُعَيَّنيّة. يُبَيِّن المَقطع العَرْضيّ عددًا كبيرًا من الحُزوز تَظهر على خُلْفِيّة بَيضاء اللَّون؛ وهي حُزوز مُشِعّة، مُحْمَرّة أو مُصْفَرَّة اللَّون، تَتَّجه من المَرْكز نَحو المُحيط؛ ولا يُبيِّن الأجهزة النَّجميَّة الَّتي تُشاهَد في راوَنْد الصِّبين. الرّاوَنْد يَقْرُشُ تَحت السِّنِّ ويَصبُغ اللَّعابِ قليلًا؛ رائحته أقلّ بُروزًا ومَسحوَّقه مُحمرً اللَّون. يُظْهر مَسحوق الرَّونْد الذُّكَر، إذا عُوْين في ضوء فَوق بَنفسجي يُصَفِّي على شاشة، تَفَلُّورًا يَنَفسِجِنَّا جَمَثْتِنًا، سِنما تَتَخِذ الرَّاوَنْدات الحقيقيّة مَظهرًا بُنِّيًّا مُخْمَليًّا.

۱۰۹ – راوَنْد، رَوَنْد (Rhubarb (E)

Rhubarbe (F)

Rhabarber (D)

Rheum (S)

# الأنواع الأوروبيَّة واللُّبنانيَّة

 ١- راوَنْد أوروبا - تَنتُج راوَنْدات أوروبًا من أنواع مُختلِفة من الرّاوَنْد تَصِل من سيبيريا والصِّين والحيمالايا على فترات مُتفاوتة. يَتمّ التَّعرُّف عليها عامّة كون طبقتها اللّيفيّة مُنتظمة التَّحزيز بالشُّعاعات التُّخاعيّة الّتي تَنطلق مُباشرة من مركز الدّائرة في خطوط شبه جالسة. ولا نرى فيها عادة البُقع النَّجميَّة الشَّكل الَّتي تُوجد في راوَنْدات آسيا. غير أنّ بَعض الرّاونْدات الإنكليزيّة تُبَيِّن بُقَعًا مُتفرِّقة هنا وهناك. ولكنَّها لا تُبيِّن أبدًا المُعَيَّنات المُميَّزة في راوَنْدات آسيا، وهي حُزوز مُنَقَّطة أو خُطوط مُتوازية. يُقرّ دستور الأدوية استعمال أروماتها شَرْط أن تُبرز بَعض المواصفات الخارِجيَّة المَوجودة في الرّاوَنْدات الحقيقيَّة: تَلَوُّن أصفر مُحْمَرً، رُخْمات وتَشكيلات نَجميَّة. إنّ التَّجفيف يُبَدِّل المظهر الخارجيّ أيضًا.

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

كِينُونيَّة، بَين راوَنْدات الصِّين وراوَنْدات داو أورويًا.

إنّ عَصير جُذُور الرّاوَنْد الغَضّة هو مُرّ الطَّعْم وخفيف الحُموضة الّتي يَدين بها إلى أو كُسالات البُوتاسيوم الّذي يُوجَد بنِسَب أقوى في السّوق والأعناق، ولكن في نَصْل الأوراق على الأكثر. وقد تكون نسبته أعلى من ذلك، في الرّبيع، بحيث تُحديث بَعد ابتلاع الأوراق أو المُرَملادات، حَوادث خطرة.

إِنِّ ما يُسمَّى راوَنْد الرُّهْبان (۱) أو الرَّهْبان (۱) أو الرَّاوَنْد الكاذِب (۱) هو بالواقع جَذْر نوع من الحُمَّيْض جَبَليّ (۱) Rumex alpinus L. الفَر ماكوبيا عام ١٩٧٦.

# ١١٠ - راوَنْد القُضْبان (٢)

### Rhubarbe à baguettes (F) Rheum rhabarbatum L. (S)

نَبات كبير جَميل من فَصِيلَة البَطْباطِيَّات. أوراقُه واسعة مُتَموِّجة تُوكَل أضلاعُها اللَّحميّة الحامِضة الطَّعم في كمْبُوت أو مُرَبّى. مَهدُه مَنْغُوليا أو بلغاريا، وهو يُزرَع في كافّة الحدائق الأوروبيّة، كما تُزْرَع هُجُنُه وأَصْرامُه العديدة. جَذْره هو القِسم المَخْزَنيّ الذي كان الأطبّاء القُدامي يُقدرونه النّي كان الأطبّاء القُدامي يُقدرونه جدًّا؛ وكان منذ القِدم وحتى القَرْن النّامن عَشر عقارًا مُسْتَوردًا نادرًا وباهظ

يُنتُج تَفَلُور أنواع الرّاوَنْد عن الرّاپُنتِسِيْن Rhaponticine ، بينما يبدو المظهر الَّذي تَخَذه الرّاوَنْدات الحقيقيّة تحت الشُّعاعات الفَوْبَنفسجيَّة، أنّه مُتسبِّب عن الإيمودِيْن Emodine. المُواصفات ذاتها تُوجد أيضًا في العَيِّنات القديمة جدًّا، وفي المساحيق والصبغات والمستخلصات (هذه الأخيرة تُخَفَّف في قليل من الكحول الصِّرْف).

مُنذ حَوالى ٤٠ سنة يُقَدَّم في بعض الأحيان عَقار باسم راوَنْد الهند من المُحتمَل أن يكون بالحقيقة راوَنْد Rheum Emodi Webb . الحيمالايا. يَحتوي على رابُونْتي جانيين يُحتوي على رابُونْتي جانيين Rhapontigenine ، وعلى فيتوستيرول. عَواهر أنْتراكينونِيّة وعلى فيتوستيرول. وهو عَقَار يَتقارب إذًا أكثر من الرَّاوَنْد الحقيقيّ، ويَجب ألّا يَحل مَحل هذا الأخير.

٣- راوَنْد لُبْنان - في لُبْنان، يقول دُورڤو، يُوجَد الرّاوَنْد الرّيباسيّ أي الرّيْباسيّ أي المناطق الرّيْباس Rh. ribes I. الرّيباسيّ الخبليّة العالية، أي على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق. وهو يُوجد كذلك جَنوب شرقي جَبَل الشَّيخ وعلى قِمَّة الزّمراني في سلسلة الجبال الشَّرقيَّة، وهو الّذي عَرَفه العَرَب مُنذ القُرون الوُسطى وقام بدراسته اللّبنانيّ إيلي فَرح عام ١٩٣٠. يُستعمَل اللّبنانيّ إيلي فَرح عام ١٩٣٠. يُستعمَل هٰذا الرّاوَنْد مَحلِّيًا كمُسهِل قَويّ، هٰذا الرّاوَنْد مَحلِّيًا كمُسهِل قَويّ، وهو يقع، بالنّسبة لنسيجه التّشريحيّ ولمحتواه من الجواهر الأنترا -

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

 <sup>(</sup>٢) كل التسميات للمؤلف ما عدا اللاتينية.

الثَّمن، ممّا يُوحى بفعاليته الثَّابتة.

المُرَكِّبات - الرِّيزوم يَحتوي على مَوادَّ أَنْتراكينونيّة مُسَهِّلة قويّة، وعلى هيتروسيدات عديدة، يَتحلّى واحد منها بتأثيرات هياجيّة جنْسِيّة.

الخصائص - مُشةً، مُسَهِّل، مُقوِّ، طارد للدُّود.

الاستعمال - خُرّاج، كُحوليّة، شَهيّة، شَعْر، إسهال، مَعِدة، أَمْعاء، طُفيليّات.

طريقة الاستعمال - لَصُوق يُوضَع على الخُراج لإنضاجه وتَخفيف ألمه، يُربَط بضماد، من أوراق الرّاوَنْد المَطبوخة بالماء الممعوسة. لمعالجة عوارض الكُحوليّة، فِنجانان يَوميًّا من نَقيع مُختلط من فلفل زراعيّ وأضلاع رَاوَنْد، ١٠ غرامات من كلّ واحد في ليتر ماء يُغلى ٣ دقائق ويُترك طوال اللَّيل. نَبيذ الرَّاوَنْد يُحضُّر بِمَرْث ١٠٠ غرام جذور مُجفَّفة ومُقطّعة في ١٠٠ غرام ماء حياة ٢٨ درجة، لمدّة ٨ أيّام؛ من جهة ثانية نَضع ١٠٠ غرام سُكّر في ليتر نَبيذ أحمر و١٠غ قِشر حامِض، نَمزُج المُستحضرين، نرمى قِشر الحامِض، نَترك المزيج ٨ أيّام، نُمرِّر، نَحفظ في قارورة مُقْفلَة: كأس ليكور قَبْل الوَجبة. شَطْف الشُّعر الأشقر لتَلْوينه، بعد الشمبوان، بنقيع ٥٠ غرام أزهار راوَنْد تُغلَى في ليتر ماء. نُقاعة ٢٠غ جُذور مُجفَّفة مُقطّعة في ليتر ماء غالٍ يُغطّى ١٥ دقيقة، فِنجانان في اليوم في حال

كُسَل المَعِدة. لتفريغ الأمعاء، مِلْعَقة كبيرة من نَبيذ يُحضَّر بمَرْث ٥٠غ جُذور في ليتر نَبيذ حُلُو لمدَّة ١٢ يومًا، نُمرِّر. لمحاربة كلّ أنواع الدِّيدان: غراما مسحوق الرِّيزوم في مِلْعَقة من العسل.

(۱) دَاوَنْد کَفِّتِ، راوَنْد راحِتِ Rhubarbe palmée (F) Rheum palmatum, Rheum palmatum L. var. tanguticum maxim. (S)

نَبات عُشبيّ مُعَمَّر من فَصِيلَة البَطْبَاطِيَّات يَعلو من ٢ إلى ٣ أمتار. ريزومه غليظ وجذوره عديدة. أوراقه قاعديَّة تُذَكِّر بأوراق الخَرْوع، عُنُقُها قويّ يَعرُض عند القاعدة ويُغَلَف قويّ يَعرُض عند القاعدة ويُغَلَف السّاق. نَصْل الورقة كبير خُماسيّ الفُصوص العَريضة الأسنان. العُروق بارزة. الأزهار عُثكُوليّة التَّجميع الهاميّ، سُداسيّة البَتلات الفاتحة اللَّون الأصفر، تُساعيّة الأسدية. الثِّمار أكنات ألاثيّة الوجوه، مُتدلِّية، مَكسُوّة بغشاء وقيق. نَبات مهده الصّين والتّيبت. والسِّيم المُستعمَل هو الرِّيزوم.

المُركِّبات - صِنفان من الغلوكوسيدات: تَنُّوغلوكوسيدات تَحتوي على حامِض عَفْصيك، حامِض عَبْهَريّ، وغلوكوز حُرَّة؛ وأربعة أنْتراغلوكوسيدات مُشتركة: كريزوفانايين، أيمودين، رايوكريزين، رايين. ومن المُرجَّح أن يكون الرّايين

<sup>(</sup>١) التَّسمية الثانية للمُؤلِّف.

هو المُركِّب الجَوهريِّ الفَعّال في جذر الرّاوَنْد الّذي يَحتوي، بالإضافة إلى ذلك، على نشاء، أوكسالات الكلسيوم، سكاكر، پَكْتين، راتِنج.

الخصائص - العَقَّار بمقادير خفيفة قابض، وبمقادير أقوى يُصبح مُسهِّلًا خلال ٨ إلى ١٠ ساعات. يَجب ألّا يُؤخَذ أبدًا في حال أمراض المَثانَة ووجود رَمْل أو حَصًى بَوليّة. وهو كذلك مُؤذٍ للأولاد. وهو مُدر للصَّفراء ومُفرز للصَّفراء.

طريقة الاستعمال - مسحوق، نقاعة، مُستخلَص سائل، مُستخضَر خَمريّ، صِبْغة، شَراب، بيلولات. يُستعمَل جدًّا في تَحضير اللِّيكورات لعَرفه المُستحَبّ وخصائصه الهاضمة. يُحضَّر من أضلاع الأوراق الكَمْبُوت المُمتاز والمُسَهِّل. الأضلاع تُؤكَل كذلك غَضَّة. عَمل هٰذا الرَّاوَنْد المُسَهِّل مُشابه لعمل السَّنا والنَّبْق. إنّ الضّلوع المأكولة لا تَصلُح للطِّب.

# المَّا مِلْجِيَّة، ضُبَيْباتٌ عِلاجِيَّة، حُبيْباتٌ عِلاجِيَّة، Aérosols médicamenteux (F)

كانَت التَّبْخِيرات والتَّدخِينات أيّام أَبُقْراط وغالِينُوس طريقة عِلاجيّة مُتَّبعَة لم تَزَل حَدِيثة العَهد. وقد أُدْرِجَت الرُّذَيْذات العِلاجِيّة في الكُودَكس الحَديث للتَّداوي، حَيث يُحدِّدُها كما يلي: إِنَّها أَمْزِجة مُعَلَّقة في الهَواء أو في غازات أخرى، مُؤلَّفة من ذَرّات دَقيقة جيًا، صُلْبَة أو سائِلة، يكون مُتوسط جدًّا، صُلْبَة أو سائِلة، يكون مُتوسط

قطرها أقل من خَمْسة مِيكرونات. تُستعمَل الأمْزِجة لإدخال أدوِية إلى الحُويْصَلات الرِّنوِيّة من دُون احْتِباسٍ يُذكَر في المجاري التَّنفُسيَّة العُليا (تَجْرِيْعٌ عَبْر رِنَوِيّ).

إِنّ الرُّذَيذات الحَقيقيّة تَحصَل بالذَّرّ الآليّ بواسِطة أدّوات تُسمّى «مُولِّدات رُذيذات عِلاجيّة». وحَسْبما تكون القُطيرات الصَّغيرة الّتي تُحدِثها الأدّوات المُختلِفة، أكانت تَحتوي على مَوادّ حَالَّة طيَّارة، أو على العكس من ذلك، كانت خالية من التَّبَخُريّة، فإنّ قطرها في الهواء قد يَتناقص بَعد ذَرِّها أو يَبقى ثابتًا لا يَتغيَّر بشكل مَلحوظ.

إِنّ الجُزْئيّات المُشكَّلة أي الذَّرّات المُماثِلة المُتساوِية والمُتجانِسة النَّرّات المُماثِلة المُتساوِية والمُتجانِسة المُحلول) تُنعشها وتُنشطها الحركات المحلول) تُنعشها وتُنشطها الحركات البرَوْنِيّة Browniens، وهي حَركات مُستمِرّة في الجُزَيْئات المجهريّة السّابِحة في أحد السّوائل، ولا تَتجمَّع تلك الذّرّات الحكمِيّة أو تَتكتّل إلّا على أثر شُحُنات إلكتروسْتاتيّة سَالِبة؛ فهي لا شُحُنات إلكتروسْتاتيّة سَالِبة؛ فهي لا تخضع لقوانين الجاذِبيّة. إنّ قطرها، المُتقارِب من ١٠، إلى ١ ميكرون، وضَغط مُركِّباتها البُخاريّ، والشُحْنة الإلكتروسْتاتيّة، هي الّتي تُحدّد استقرارها ودَوامَها.

إنّ الذَّرّات الحَكَمِيَّة غير مَرْئيَّة مُباشَرة بالعَين المُجرَّدة، ولكنَّها تُصبِح كذلك بَعد نَشرِ الضَّوء ومُراقبتِها أمام خَلْفِيَّة

روم

(أَرْضِيَّة) سَوداء وفي إضاءةٍ جانبيَّة كثيفة. كما أنَّه يَجب أن تكون الذَّرَّات جافَّة ولا تُبَلِّلِ الحواجزَ الَّتي تُلامسها فهي لَيست بالضَّباب ولا بالبُخار.

تَتَأَلَّف الأَدُوات المُولِّدة للرُّذَيْذات إمَّا من مِن بَخَّارات Vaporisateurs، وإمَّا من نَصْاحات Nébulisateurs، أو من مِبْخَرات Fumigateurs، أي مِرْذَاذات Atomisateurs.

إِنَّ الأَدْوِية المُجَرَّعة على شَكل رُذَيْذات كثيرة جدًّا، نَذكُر مِنها ما يلي:

- أَفَدْرِين ومُشتقّاتُه، نَفْتازُولين: سَمْپاتِيكوليتيك.
- أَسَتيل كُولين ومُشتقّاتُه، بِيلوقَرْپين: پاراسَمْپاتيكومِيماتيك.
- أَتْرُوپىيىن، سْكُوپُولامىيىن: پاراسَمْپاتىكولىتىك.
- خَلِّين: مُنْقِص التَّوتُّر مُوَسِّع وِعائيً.
- پَيّافَرِين أي خَشْخاشِين ومُشتقّاتُه: مُضادّات التَّشنُّج.
- أوكاليپتوس، نِياوْلي: مُضادّات لحُمّى.

ملاحظة - إنّ التَّداوي بالرُّذَيْذات يَجب ألّا يَتمّ إلّا بِناء لوصفة طَبيب وتَحت إشرافٍ طِبِّي.

# ۲۱۱۳ رُوم (Rhum, Rum (F)

الرُّوم مُسجَّل في دَستور الأدوِية. يَتمّ لتَحضير جَرُوع مُكَ الحُصول عليه بالتَّقطير، إمّا من عَصير جَروع تُودُو Todo.

قَصَب السُّكَر الذي يَخضَع سَلفًا إلى التَّخمُّر الكُحوليّ، وإمّا من ثُفْلِ أو شراباتٍ تَحصل من صِناعَة سُكَّر القَصَب. إنّ أوَّل قِسم يَمرُّ بالتَّقطير يُعيِّر حَوالى ٦٠ درجة كُحوليَّة؛ يُسمّى هذا القِسم «Cœur de chauffe»، ويُحْفَظ للاستِهلاك المَحلِّيّ. أمّا القِسم الثَّاني المُخصَّص للتَّصدير فيجب أن يُعيِّر ٤٥ التَّطبيق، فإنّ دُسْتُور الأدوية يُجيز عِيارًا التَّطبيق، فإنّ دُسْتُور الأدوية يُجيز عِيارًا الصَّيْدليّة، ويُحدِّد أنّه "يَجب ألّا يَحتوي الصَّيْدليّة، ويُحدِّد أنّه "يَجب ألّا يَحتوي على أقلّ من ٤٥ بالمئة من حجمه من الكُحول الأثيليكيّ».

المُواصَفات - إنّ رائحة الرُّوم وطعمه مُميَّزان، ولكنَّه يَكون في العادة أبيض اللَّون ويُقدِّم تَفاعلًا حامِضًا. الرُّوم العَتيق يَتَلوَّن باللَّون البُنِّيّ أثناء حفظه في بَراميل خَشبيّة؛ ويُساهِم في ذلك أحيانًا الحَراميل أو إضافة الكَراميل إليه، أي السُّكر المَحروق. يُصنَع نوعٌ آخر من الرُّوم يُدعى Tafia يُصنَع نوعٌ آخر من الرُّوم يُدعى Tafia تَافِيَة، من الصِّنف الثّاني الأدنى، بتخمير وتقطير عصير قصب السُّكر أو بتخمير وتقطير عصير قصب السُّكر أو بتخمير وتقطير عصير قصب السُّكر أو

أهم البُلدان المُنتجة للرُّوم هي الجَماييك، المَرْتينيك، غُوَادَلُوب، الإتِّحاد.

الاستعمال - كان الرُّوم يُستخدَم لتَحضير جَرُوع مُكَحْلَل بالرُّوم، يُدعَى جَروع تُودُو Todo. السُّكلُ ("Aleurites cordata) في الصَّين؛ وزُبْدَة المَاه وَاه (الله Mahwah الَّتي المَستخرَج من الباسِيَّة العَريضة الوَرَق Bassia latifolia في البَنْغال، وزُبْدَة المَدْهُنْكا (الله Madhunca أي باسِيّة السَّمْن أو شَجَرة الزُّبُدَة من فصِيْلَة السَّبُوتِيّات، وذُكر أنّه يُستخرَج من بُزورها زُبْدَة تُدعى زُبُدَة غَلام.

هُناك عَجَمات سَبّوتِيّة أخرى تُدعى أَرْقان، أَرْجَان، لَوْز البَرْبَر: Argania أَرْقان، أَرْجَان، لَوْز البَرْبَر: sideroxylon وهي جَنْبَة شائكة جدًّا تَنمو في البلاد المَراكشيّة وتُعطي زَيتًا يُدعى في المَغرِب زَيت الأرْقان أو زَيت البَرْبَر Huile d'Argan، وهو زَيت مائع يَصلُح لكاقة الاستعمالات المَنزِليّة ولكنة يُخصَّص للاستهلاك المَحَلِّيّ.

الكَريتَه، دَسَم الكَريتَه Shea butter (E) Beurre de Karité (F) Butyrospermum Parkii (S)

الكَريتَه هي شَجَرة من فَصِيلة السَّوائيّة، السَّوتيَّات تَنبُت في أفريقيا الاستوائيّة، من السُّودان الفرنسيّ إلى السُّودان المِصريّ، وتُنتِج بُزورًا، إذا عُصِرت وعُولجت بالماء الغالي، تُعطي مادَّة دَسِمة تُعرَف باسم دَسَم الكَريته أو زُبْدَة غلام Beurre de Galam.

الكَريته شَجَرة مُثمِرة مُتوسِّطة القَدّ،

١١٤ - زُبْدَة البَاسِيَّة الطَّويْلة الوَرَق، زَيْت
 البَاسِيّة الطَّويْلة الوَرَق

Beurre d'illipé (F) Bassia longifolia (S)

زَيت كثيف يُنتَج في الهند من الباسِيّة الطّويلة الورق من فصيلة السّبوتيّات؛ يحتوى على غليسريدات زيتيكية (٤٠٪)، لينو لايبكية، نَخْليكية (٢٥٪)، مِيريستيكيّة، إلخ. كثافتُه ٠,٨٦٠ إلى ۰٫۸۹٥، يَنصهر حَوالي ٣٨ إلى ٤٠°سغ. يُستخدَم هٰذا الزَّيت في الهند للاستعمالات المنزليّة، ولكنّ الزُّنوج يستعملونه في تمسيدات للروماتيزم، والنِّقْرس، والجَرَب، إلخ. يُشرَك أحيانًا، وعن خطإ، بينه وبين زُبْدَة البَّمْوِكُ (١) Bambouc وزُنْدَة البَّمْار ا(١) Bambara أو النَّخْل، أو كذلك بينه وبين زُبْدَة الشَّمْعِيّة العَطِرة Galé، أو شَمع الشَّمْعِيَّة الشَامِعَة (١) Myrica cerifera! ومع زُبْدَة أو وَدَك الكَانارَا(١) Suife de Vateria أي الّذي يُستخرَج من Canara indica في المالابار؛ والألوريْت القَلبيّ

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

ز ب د

أزهارُها بَيضاء اللَّون، شَكَالَة نوعًا ما، تَتَوزَّع من أعالي السّنغال وفوتاجالون حتى أعالي النِّيل، وفق شريطٍ طولُه نحو خمسة آلاف كيلومتر. لُبّ ثمارِها مأكول.

ثَمرتُها بَيضانيَّة الشَّكْل، تَحتوي على عَجَمة بحجم كَستناة الخَيْل، قِشرتُها رقيقة، لامِعة، بُنِّيّة اللَّون الأصفر. لَوْزتُها تُعطي من ٤٥ إلى ٥٠٪ من الدَّسَم الذي تُراوح كثافته بين ٨٥٨، و٠٨٨، ينصهر عند نحو ٣٨ إلى ٤٠٠٠.

عَبيد السُّودان يَستعملون دَسَم الكَريته كغذاء، كما يَستعملون الزُّبْدة البَقَريَّة تَمامًا؛ وهو دَسَم يَصلُح للإنارة.

في أوروبا تُستعمل زُبْدَة الباسِيّة الطَّويلة الوَرق وزُبْدَة الكَريته أحيانًا، وبَعد تنقيتهما الملائمة، مَمْزُوجتين للتَّغذية أو في مَصانع الشوكولاته.

إنّ جذع الشَّجَرة قد يُعطي، بالحَزّ، حوالى ١٥٠ غرامًا في السَّنة، لَبَنًا نُقطانِيّ الشَّكْل (١٥ Guttoïde)، قليل الاستعمال لأنّه يَتَرَتْنَج ويُصبح فَتُوتًا جدًّا خلال بضعة أشهر.

كُسْبُ الباسِيّة سامّ للطّروش؛ وكُسْبِ الكَريته أقلّ خَطرًا، ولكنّه لا يُعْتَلف بسهولة.

١١٦ - زَرَاوَنْد البرازِيل، أرِسْتُولُوخِيَة زَوْرَقَة (١)

Worm-killer of Brasil, Birthwort of Brasil (E)

Aristoloche du Brésil, Aristoloche Mil-Homens, Aristoloche cymbifère (F) Brasilianisch Osterluzei, Brasilianisch hohlwurz (D)

Aristolochia cymbifera (S)

نَبات طبِّي من فَصِيلة الزَّراوَنْدِيّات، كانت ريزوماتُه مُسجَّلة في فَرْماكوبيات ١٨١٨ و١٨٦٦؛ أعيد تَسجيلُها في الفَرْماكوبيا الحديثة عام ١٩٧٥.

(۲) آرَاوَنْد نَتِن ، أَرِسْتُولُوخِيَة نَتِنَة (۲) الله Stinking worm-killer (E)
Aristoloche fétide (F)
Stinkende Osterluzei, Übelriechend hohlwurz (D)
Aristolochia fætida (S)

نَبات طبِّي من فَصِيلة الزَّرَاوَنْدِيّات كان مُسجَّلًا في فَرْماكوبيات ١٨١٨ و١٨٦٦ على وهو يُستعمَل جدًّا في المكسيك على شكْل نَقيع مَغليّ يُستخدَم لتَنظيف القُرحات. وقد يكون مُطمِثًا قَويًّا على غِرار مُعظم أنواع الزَّراوَنْد. إنّ مِقدار مُعظم أنواع الزَّراوَنْد. إنّ مِقدار مُعظم أنواع النَّبات هو ١ إلى ٢ غرام، ولكن استعمالها أصبَح اليوم طيً غرام، ولكن استعمالها أصبَح اليوم طيً

 <sup>(</sup>١) كل التَّسميات للمُؤلَّف ما عدا التَّسميتان الفرنسيَّتان الأولى والثَّانية والتَّسمية اللاتينيّة.

 <sup>(</sup>٢) كل التَّسميات للمُؤلَّف ما عدا التَّسمية الفرنسيَّة والتَّسمية اللاتينيَّة.

Arsenic (E) زُرْنِیْخ – ۱۱۸ Arsenic, Régule d'arsenic (F) Arsen (D) Arsenicum (S)

As = 75

الزَّرْنيخ هو جسم كيميائيّ بَسيط يُوجَد في الطَّبيعة لوحده أو بالاشتراك مع الكبريت والحديد الكبريت والحديد (Assfe). الصِّناعة تُحضَّره بحرق المَعدِن الأخير، الزَّرنيخ جسم صلب، لونُه بلَون الفُولاذ، يَتَبلّر في مُعَيَّنات، ثِقلُه النَّوعيّ ٥,٧٥، يَتطاير عند حَوالى مُعْ.

الخصائص والاستعمال - الزَّرنيخ المَعدِنيّ لم يَعد يُستعمَل في الطَّب ولكنَّه لم يَزل في المنزل حيث يُطلَق عليه "مَسحوق الذُّباب"، "المَوت للذُّباب"، "الزَّرنيخ الأسود". ولهذا الاستعمال يُسحَق ويُوضع في صحن ويُحلِّ بالماء ويُترك، فَيَتأكْسَد المَعدِن رويدًا رويدًا فَيتَشكَّل الحامِض الزَّرنيخيّ رويدًا رويدًا فَيتَشكَل الحامِض الزَّرنيخيّ الذي يَذوب في الماء فيصبح سامًّا ويَقتُل الذُّباب.

الزَّرنيخ بحد ذاته لم يَعد يُستعمَل في الصَّيدلَة وأصبحَت مُشتقّاتُه المَعدِنيَّة والعُضويَّة اليوم قليلة الاستعمال. إنّ مُشتقّاته العُضويَّة، التي عالجت السَّفْلِس طوال ٥٠ عامًا، أُهْمِلت اليوم تمامًا تقريبًا. ولكنّ بعض مُشتقّاتِه الثُّلاثِيّة التَّكافُؤ لم تَزل تُعالج داء المُتَمَوِّرات.

ملاحظة - إنّ بعضَ الأرْسنيات

تُستعمَل بشكل كثيف في مُكافحة الآفات الزِّراعيّة، مِثال أرسنيات الكلسيوم والرَّصاص والألمينيوم. فإذا تَمَّ التَّداوُل بهذه المَوادِّ وتَناقُلِها من دون أخذ الحيطات اللّازِمة، فقد تَسبَّب في الأرياف أحيانًا بحوادث خَطِرة.

زعت

١١٩ - زَعْتَر، سَعْتَر شَائِع، صَعْتَر شَائِع، العَبْس، زَعْتَر رَسْمِيّ

Thyme, Garden thyme, Pot-herb thyme (E)

Thym, Thym commun, Pote, Barigoule, Farigoule, Frigoule (F)

Thymianquendel, Gartenquendel (D)
Thymus vulgaris (S)

جُنيْبَة صغيرة بَرِّيَّة مُعَمَّرة من فَصِيلَة الشَّفُويَّات تَعلو من ١٠ إلى ٣٠سم. سُوقها عَوْجاء، مُتلَوِّية، لِيفيّة. فُروعها مُرمَدَّة اللَّون، مُنتصِبة، مُتراصّة. أوراقها صغيرة، لاطئة، سِنانيَّة، خَمْليّة، طَحْلاء الصَّفحة السُّفلي. أزهارها وَرديّة أو بَيضاء اللَّون، صغيرة القَدّ، سُنبليّة التَّجميع، إبطيّة الارتكاز. الكأس التَّجميع، إبطيّة الارتكاز. الكأس مُحَدَّبة، أوبارها قاسية، ثُلاثيّة الشّفاه السُفلي العريضة، ثُنائيّة الشّفاه السُفلي الحادةة. التّاج مُزدوج الشّفاه. الأسدية النبيات عِطريّة. طعمه مُرّ. الأقسام النبيات عِطريّة. طعمه مُرّ. الأقسام والأوراق. نَبات أوروبي غير مَوجود في والأوراق. نَبات أوروبي غير مَوجود في لُنان.

المُرَكِّبات - عَفْص، عُنصُر مُرّ،

زع ت

راتنج، صابُونُوسيد، زَيت دُهنيّ يحتوي على فانُولَيْن: تيمُول حتّى ٦٠ بالمئة، وكَرْقُكْرول. تَرْبِينات: تَربِينان، سِيمان. كُحولات: بُورنَيول، لينالُول،...

الخصائص الدّاخلية - مُنشِّطة عامّة، جَسدية ونفسانية، مُنشِّطة للدَّورة الدَّموية الشَّعْرية، مُقوِّية عَصبيَة، مُعتَبَرة كمُنبِّهة للذَّكاء، ناعِظة ومُنشِّطة جِنسية، مُشهِّية، للذَّكاء، ناعِظة ومُنشِّطة جِنسية، مُشهِّية، رافِعة للتَّوتُر الشِّريانيّ، مُضادّة للتَّشنُج، نافعة للمَعِدة، بَلْسَمِيّة، مُقشِّعة، مُعدَّلة للإفرازات، مُطهِّرة للأمعاء، مُطهِّرة للإفرازات، مُطهِّرة للأمعاء، مُطهِّرة للإفرازات، مُطهِّرة للأمعاء، مُطهِّرة للتكاثر الحُريْضات في الأمراض للتكاثر الحُريْضات في الأمراض المُعْدِية، مُبوِّلة، مُعَرِّقة، مُطمِثة، طاردة للرَّيح، مُخدِّرة مُنوِّمة للدُّود، طارِدة للرَّيح، مُخدِّرة مُنوِّمة خفيفة.

الخصائص الخارجية - مُطهِّرة ومُبيدة للبَّكتيريا، مُضادَّة للبَّتانَة والتَّدَعُص، لائمة، مُصرِّفة، مُضادَّة للروماتيزم، مُبيدة للطُفيليّات.

الاستعمال الذاخلي - وَهْن جَسدي وَنَفساني، قَلَق وغَم وكَدَر، نُوراستينيا، انحطاطات عَصبية، فقر الدّم (الأولاد)، خَفْض تَوتُّر الشَّريان، يَرَقان، سُعال نَوْبِي تَخَفُّجِي (شُهاق)، إصابات رِئويّة: وَرَم الرِّئة، فُطار، برونشيت، سِلّ، رَبُو؛ كَسَل هَضميّ، بطء الهَضم، إصابات كَسَل هَضميّ، بطء الهَضم، إصابات أمعائيّة (تِيفُوئيد) وبَوْلِيّة، تَخَمُّرات، تَجمُّعات الرِّيح في البَطْن وتَطبُّل البَطْن، إصابات البَرْد والصَّقيع: كريب، زُكام إصابات البَرْد والصَّقيع: كريب، زُكام الحساسية، الدَّعثُ والتَّوصيم،

الرِّعشات، الذَّبحات.. وهو في هذا المجال واحد من أفضل العلاجات. أمراض مُعدِية، داء الدَّمامِل، رُوماتيزمات، اضطرابات دَوريّة، اختفاء الطَّمْث الطَّارئ، سَيلان المَهْبِل، طُفَيليَّات الأمعاء: صَفَر، أقْصُور، دودة وحيدة، مَلْقُوَّة، حالات أرَق.

الاستعمال الخارجي - أمراض جِلديَّة، دَمامل، قُروح، سَيَلانات المَهْبل، عنايات الأسنان والفَم، تَعَب عام، روماتيزم مفصلي وعَضَلي، نِقْرس، داء المفاصل، تساقُط الشَّعْر، تَطْهِيرِ البَشَرة، تَقَمُّل، جَرَب. تَطُول لائحة خَصائص الزَّعتر الطِّبِيَّة حتّى ذكرها الدكتور ڤالني بأنّ الصّعوبة مع الزَّعتَر ليست بمعرفة الحالات التي يُعالجها بل هي في إيجاد سببٍ ما يمنع أو يَحدّ الإكثار من استعماله واستهلاكه كَيفَما كان. التِّيمُول يَدخل في صناعة عدد كبير من الأدوية الشّائعة الاستعمال الدَّاخليُّ والخارجيُّ؛ وهو كذلك واحد من الأجزاء المُقَوِّمة التي يستعملها المُحَنِّطُون المُعاصِرون؛ أمّا الفينول الثَّاني أي الكُرْ قاكرول فهو المُطَهِّر الَّذي يكثر استعماله في صناعة العطور.

طريقة الاستعمال الدّاخلي - نُقاعة من غُصْن (عِرْق) زعتر في مِقدار فِنجان ماء يُغلى ثَوانٍ ويُغطّى عشر دقائق، يُحلَّى أم لا، وبالعَسَل الأفْضَليَّة، ويُؤخَذ نَحو ٤ فناجين في اليوم، بين أو بَعد الوَجبات. استعمال الزَّعتر اليَومي في المطبخ،

شوربات، أحْسية، مَشاوي. الزَّيت الدُّهنيّ يُستعمَل إمّا نِقاطًا، من ٣ إلى ٥ نِقاط، ٣ مَرّات في اليوم، في محلول كُحوليّ أو مع العَسَل؛ وخاصّة على شكل بيلولات تُحضَّر كما يلي:

 دُهْن زَعتر
 ۱۰،۱۰ غ

 صابُون لَوزيّ
 مسحوق الخُبّازَة

يُؤخَذ منها ٤ إلى ٦ بيلولات في اليوم، بعد الوجبات. اشتراك دُهْن الزَّعتر ودُهن السَّرُو في مُعالجة الشُّهاق. يُلاك الزَّعتر في حال الدَّبحات.

طريقة الاستعمال الخارجي - في مَراهم للبَشَرة، مُصرِّفة ومُحوِّلة للروماتيزم والأوجاع العَضَليّة، مُسْحات للصّدر في مُعالجة الشُّهاق، مُستَحضرات حَلِيبيّة أو كريمات للتَّجميل، مياه تواليت مُبيدة مُمتازة للبكتيريا. غالبًا ما يُضاف إلى الحامض والبَرْغَموت في محاليل صابونيّة لتطهير اليدين أثناء الجراحة. نقيع الزَّعتر المَعْلَى في زَيت الزَّيتون، في كمادات على القُروح وفي مُعالجة عَقْص الحشرات ونَهْش الأفاعي: الدُّهْن أو النَّبتة المُفَرفَكَة كعلاج مُساعِد. ضِدّ أوجاع الرُّوماتيزم نَفرم الزَّعتر، نُسخِّنه في وعاء، نَضعه في قطعة من الشَّاش ونَضعها ساخنة على المكان المُؤلم.

حَمّام عِطري: نَغلي ٥٠٠ غرام من

الزَّعتر في ٤ ليترات من الماء، نُضيفها إلى الحَمَّام لنفعها في اعتلال المفصل، النَّقْرِس، الرُّوماتيزم والوَهْن. وهو بالإضافة إلى ذلك يُمَيِّع الموادِّ المُخاطِيَّة ويُسهِّل التَّقَشُع.

زع ت

# حَمّام عِطرى (الدّكتور لوكلير):

دُهْن زَعتر ۲۰۰۰ غ دُهْن صَعْتَر (أوريغانُم) ۲۰۰۰ غ دُهْن نَدى البحر ۲۰۰۱ غ دُهْن خُزامى ۲۰۰۰ غ تحت كَربُونات الصُّود ۲۰۰۰ غ مِقدار يُضاف إلى ماء حَمّام عامّ: مُقوِّ يُفيد مَرْضى داء المفاصل.

# مَزيج للاستنشاق:

يُوضَع منه مِلْعَقَة صغيرة في مِقدار طاسَة من الماء السّاخِن. نُكَرِّر الاستنشاق ٢ إلى ٣ مرّات في اليوم. أمّا نقيع كمشة من الزَّعتر في ليتر ماء يُغلى حتّى يَنقص نِصفه، يُقَوِّي فَرْوة الرّأس، يَمنع أو يُوقف تَساقُط الشَّعْر.

مُلاحظات - الزَّعتر هو واحد من أكثر النَّباتات العِطريّة الّتي استُعمِلت في التَّداوي منذ أبعد الأزمنة من أطبّاء مِصر وأثّرُوريا واليُونان والرُّومان، مِثال

١٢٠ - زُعْرُور عادِي، نِلْك

Azerole tree, Neapolitan medlar, Mediterranean medlar (E)

Aubépine azérolier, Azérolier, Argérolier (F)

Azaroldorn, Azarolbaum (D) Cratægus azarolus (S)

شُجَيرة لِيفِيَّة أو شَجَرة من فَصِيلَة الوَرْدِيَّات، تَعلو من ٢ إلى ١٠ أمتار. فُروعُها قليلة الشَّوك نِسبيًا، غَليظة، زَغَبِيّة لَبِدَة وهي فَتِيّة. الأوراق طَويلة الزاوية القاعدِيّة، زَغَبِيّة، بَحْرِيَّة اللَّون، غير مُقسَّمة أحيانًا، ثُلاثيّة الفُصوص غير مُقسَّمة أحيانًا، ثُلاثيّة الفُصوص العحميقة البُروز نوعًا ما في أكثر الحيان. قَلَمان، نادرًا ثَلاثة، كذلك البُزيْرات. الثَّمرة صفراء اللَّون أو البُرقُ اللَّون أو بُرتُقاليّة اللَّون الأحمر، كُرويّة السَّكُل، فطرها أكثر من سنتمتر واحد، تُقطف وتُباع للاستهلاك المحَلِّي أحيانًا. تُزهِر مِن آذار إلى أيّار.

المُركِّبات والخصائص - لا نَملك حتى الآن المُركِّبات الكيميائيّة في هٰذا النَّوع. وبالرُّغم من ذلك أوْرَدَ بعضُ المراجع الأجنبيّة (١٩٨٧) أنّ أزهار النَّلْك وثماره وفروعه الفَتيّة وأوراقه كانت شائعة الاستعمال الطبيّ. نُقاعة الأزهار تُستعمَل كَمُقوِّية قَلْبيَّة ومُنظَمة لضَغْط الدّم؛ كذلك تُستعمَل ضِد الخَفْقَة والاضطراب القَلْبيّ. نُقاعة الأزهار، كالشَّمار التي تُؤكل غَضّة أو الشَّرايين. نُقاعة الشَّمار التي تُؤكل غَضّة أو الشَّرايين. نُقاعة الشَّمار التي تُؤكل غَضّة أو الشَّرايين. نُقاعة تُستعمَل الشَّرايين. نُقاعة تُستعمَل المَّنْ المُجفَّفة تُستعمَل الشَّرايين. نُقاعة تُستعمَل الشَّرايين. نُقاعة الشَّمار المُجفَّفة تُستعمَل الشَّرايين. نُقاعة الشَّمار المُجفَّفة تُستعمَل الشَّرايين. نُقاعة الشَّمار المُجفَّفة تُستعمَل

ديوسقوريدس وأبقراط ويلايئس وفيرجيل. ويحتوي الزَّعتر، تِبعًا لأنواعه، من ٠,١٠ إلى ١,٥٠ من الزَّيت الدُّهنيّ الطَّيّار، وكان شامْبرلان أوَّل من بَيِّن، عام ١٨٨٧، عَمل لهذا الزَّيت المُبيد للبكتيريا عامَّة وعُصَيَّة (باسيل) الجَمْرة الخَبيثة. كادياك ومُونييه قاما بدراسته عام ١٨٨٩ على العُصَيَّة التِّفِيَّة وعُصَيَّة الخَنب أو الرُّعام Morve عند الحيوانات ذات الحَوافِر، والتَّكاثُر الجُرثوميّ في أحْسِيَة اللَّحْم. ومن ثم قام مُوْرَل ورُوشيه ١٩٢١-١٩٢٢ بدراسته على المُكَوَّرة السِّحائية Méningocoque ، عُصِيَّة أَنَرْث (تمفوئيد)، عُصَيَّة الدِّفْتيريا وعلى المُكَوَّرة العُنقُوديَّة. عُلماء آخرون دَرسوه على عُصَيَّة السِّلِّ. عام ١٨٩٤ نَبَّن مِلكال مَقدرة أبخرة الزُّعتر المُبيدة للبكتيريا. زَيت الزَّعتر الدُّهنيّ هو مُطهِّر أقوى من الفينول والماء المُتَأكُّسِج واليرمنْغانات والغَيَّاكُول. إنَّ مسحوق الزَّعتر المُجفَّف هو مُنظِّف جيِّد للأسنان يُقَوِّي اللَّهُ، ويُمكِن استعماله مَخلوطًا مع الطِّين وبنسبٍ مُتساوية. أمَّا نُوڤي الإيطالي فبرهن عن عمل زيت الزَّعتر المُنَشِّط للكُرِّيّات البِيض، ممّا يجعله يُنَشِّط دِفاع الجسم في الأمراض المُعديَة.

بفعالية ضِد الإسهال، كما تُستعمَل الفُروع الرَّبيعيَّة الفَتيَّة كطاردة للحُمَّى.

١٢١ - زُعْرُور مالِس(١)

Smooth hawthorn, Smooth May tree (E)
Aubépine lisse (F)

Glattes weissdorn, Ebenhagedorn (D) Cratægus lævigita (S)

شُجَيرة من فصِيلَة الوَرْدِيَّات تَعلو من الله على المتار؛ لحاؤها الفَتيّ فاتح اللَّون الرَّماديّ، مالِس، يُصبح بُنَيًّا فيما بعد ويتَشقَّق؛ أوراقُها مُعبِلَة، ثُلاثيّة إلى خُماسيّة الفُصوص القليلة العُمق، دقيقة الأسنان؛ أزهارُها بَيضاء أو مُتورِّدة اللَّون، من نيسان إلى حزيران، عِذْقِيَّة النَّجميع، خُماسيّة الكأسِيّات، خُماسيَّة البَسَتَلات الحُرّة، قَلَمان أو ثلاث، البَسَتلات الحُرّة، قَلَمان أو ثلاث، الأسدية حمراء؛ الثَّمرة مُفرَدَة النَّواة، النَّعانيّة المادّة، بيضانيّة المادّة، عبر مُستحبّة؛ الطَّعم حُلو، تَفِه. حفيفة؛ غير مُستحبّة؛ الطَّعم حُلو، تَفِه. النَّقام المُستعملة: الأزهار قبل تَفتُحها، النَّمار النَّاضجة، لحاء الفُروع الفَتية.

المُركِّبات - في الأزهار: تريمتيل أمِين وأجسام أمينية مُختلِفة، مَنْغانيز، مُركِّب عَديم الشَّكْل، مُركِّب عَديم الشَّكْل، غلوكوز. في القِشرة: قِلَوِيْدان هُما كُراتَجِين وأوكْسِيا - كَنْتِين؛ هٰذا الأخير هو قاعدة ثُلاثيّة وُجِدت في عددٍ كبير من البررة (نواة البَرْبَريسِيّات والقَمَرِيّات. في البزرة (نواة

التَّمرة): بَقايا حامِض سِيانهيدريك؛ وتَحتوي الثِّمار على خِضابات (كاروتينويديّة) وعلى حامِض أَسْقوربيك أي القيتامين «ث».

زعر

الخصائص - الأزهار: تُنظِّم النَظْم النَظْم الفَظْم الفَظْم الفَلْم الفَلْبيّ. رينون Renon جَمَع بين التيوسينامِيْن والزّعرور كعناصر خافِضة للتَّوتُر الشّريانيّ. عَملُ الزّعرور مُقوِّ للفَلْب، خافِض لضَغْط الدّم بتوسيع العُروق، مُضاد للتَّشنُّج، مُنوِّم خفيف، طارد للحُمّي. الثّمار قابضة في حال الإسهال، حَالَة للحَصَى الكليويّ.

الاستعمال - خَفَقان واختلاج القَلْب، أوجاع قلبية، ذَبحة الصَّدر، تَقلُّصات وتَشنُّجات وعائية، خَفْقة القَلْب أي إسراعه، اضطرابات قَلْبيّة تَهيُّجيَّة، تَأثُّرية وحالات الأرق من سِنّ القُعُود، عُسْر الهَضم، تَصلُّب الشَّرايين، ارتفاع النَّبُوتِيَّة، حالات القَلق والاكتِئاب، طنين الثُّوتِيَة، حالات القلق والاكتِئاب، طنين الأُذُن، دُوارات؛ حالات الأرق المُختلِفة، إسهال، ديسنتيريا (الثَّمار) للرُّمال الكليويّ والصَّفراويّ (الثَّمار).

طريقة الاستعمال - الزّعرور هو عُنوان دِراسة أُحادِيّة في الإصدار العاشِر للفَرْماكوبيا الفَرنسيّة. أزهارُه يَجب أن تُجْمَع قَبْل تَفتُّحها الكامِل بقليل. دَواء شَعبيّ ضِدّ خَفقات القَلْب ولمحاربة الأرق، نُصِح بها في أمريكا عام ١٨٩٦ وبَعد ذلك بقليل في فرنسا من قِبَل هُوشارد والدّكتور هنرى لوكلير.

<sup>(</sup>١) كلِّ التَّسميات للمُؤلِّف ما عدا التَّسمية اللاتينيَّة.

نُقاعة الأزهار أو مسحوقها بمُعدَّل ٢ إلى ٤ غرامات في فنجان ماء غالٍ، يُؤخَذ ثلاثة فَناجين في اليوم. صِبْغة الأزهار الكُحوليّة الخُماسيّة (١/٥)، يُؤخَذ منها الكُحوليّة الخُماسيّة (١/٥)، يُؤخَذ منها قبْل كلّ وَجْبة وطوال ٣ أسابيع من كلّ شهر فقط (كخافض لضغط الدّم)، أو مُنوِّم مُخدِّر خَفيف. المُستخلص ومُنوِّم مُخدِّر خَفيف. المُستخلص الرَّهر ومُنوِّم مُخدِّر خَفيف. المُستخلص يُؤخَذ منه ١٠ إلى ٢٠ نُقطة في اليوم، أو المائع بأجزاء مُتساوية مُحضَّر من الزَّهر يُؤخَذ منه ١٠ إلى ٢٠ نُقطة في اليوم، أو يُؤخَذ منه ١٠ إلى ٢٠ نُقطة في اليوم، أو الرَّعرور المائع وصِبغة يُؤخَذ منه ١٠ إلى ٢٠ نَقطة في اليوم، أو الزَّعرور المائع وصِبغة الرَّعرور الكحوليّة مذكوران في دستور أدوية ١٩٦٥.

خليط مُضاد للتَّشنُّج من: صِبغة زُعرور ٢٠غ، صِبغة آلاميّة ١٠غ، كُحولَتور الفَراسِيُون ١٠غ، ٤٠ إلى ٦٠ نقطة، ٣ مَرّات في اليوم. أو صِبغَة بلَّادون اغ، صِبغة زُعرور ١٠غ، صِبغة آلاميّة ١٠غ، ٢٠ نقطة في قليل من الماء، مَرّتان في اليوم، ضِدّ القَلْق والاكتِئاب والأمراض العُصابِيّة. أو كذلك: صِبْغة آلاميّة ٣غ، صِبْغة زُعرور ٣غ، مُستخلَص ناردين ٤غ، ماء النَّعْنَع كمِّيَّة كافية للحصول على ٩٠ ملل. مِلْعَقَة صغيرة مع بعض الماء كمسكّن قَلبتي وِعائتي. كذلك يُحضَّر نَبيذ من ١٠٠ غ هَدال، ٥٠غ زُعرور، نَبيذ أبيض ليتر واحد؛ نَمرُث طوال أسبوع. كوب مادير قَبْل الوجبتين الرَّئيسيَّتين، في اضطرابات سن القُعُود وحالات عُسر

الهضم العصبية، وحالات الأرق عند القُلابِيِين. زُهورات ٥ إلى ٢٠غ من الثَّمار في ليتر ماء غالٍ، يُؤخَذ منها ٢ إلى ٣ فناجين في اليوم.

مُلاحَظة - إنّ الحامِض الكراتيغُوليّ الذي عُزِل من قِشرة الزّعرور الشّائِك والزّعرور الشّائِك من والزّعرور أحاديّ المِدَقَّة يَتألَّف من مزيج من تريتَرْيانات بنسبة ٦٠ إلى ٦٥٪ من الحامِض الأُرْسُوليّ. أمّا الأوكْسياكَنْتِين فهو قِلَوِيد تركيبُه الأوكْسياكَنْتِين فهو قِلَوِيد تركيبُه البَرْبَرِيس الشّائع (غير لبنانيّ) وقد يُوجد كذلك في جُذور النَّوع اللُّبنانيّ وقد يُوجد كذلك في جُذور النَّوع اللُّبنانيّ وقد يُوجد كذلك عدد كبير من المُستَحضرات الصَّيدليّة التي يَدخل في تركيبها الزّعرور.

إنّ التَّسميات العَربيَّة والفَرنسيَّة والفَرنسيَّة والإنجلِيزيَّة والألمانيّة لهذا النّوع هي ترجمة لاسمه اللّاتينيّ؛ فالسّابِقة اævis والكَلمة lævis تَعنيان lisse أي مالِس، مِثال Lævicaulis أي مالِس السَّاق.

١٢٢ - زِفْت أبيض، زِفْت بُورغُونيه، زِفْت أصفر

Poix blanche, Poix de Bourgogne, Poix jaune (F)

إنَّ هٰذا الزِّفت أو القار أو القَطْران هو حَصيلةٌ مُباشرة لحَزِّ الأبِيْسَة السَّامِيَة Picea مَصيلةٌ مُباشرة لحَزِّ الأبِيْسَة السَّامِيَة excelsa Lam.

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمؤلِّف.

لَونها من الأصْهَب إلى البُنِّيّ المُصفرٌ، وهي كامِدة، قاسية وكَسُورة وهي باردة، ومع ذلك فإنّها تَتَخذ شكل الأوعية الّتي تُوضع فيها، رائحتها كالتَّربَنْتين. طعمها حُلُو، خالٍ من المَرارة. تَحتوي على الماء أحيانًا وهو الماء الذي يكون فيها بشكل طبيعيّ أو يضاف إليها بقصد الغِشّ. كانت هذه الكُتَل تَصل في الماضي من أماكن جَمْعِها في نَوع من البراميل المَخروطيَّة الشَّكُل يُطلَق عليها اسم Tinettes أي العَطّرون منها ويضعونها في مَثانات خيرُنير.

كان لهذا الزِّفت يَدخل في تركيب لَزْقات مُختلِفة. وكان يُستعمَل غالبًا كما هو كطبقة «écusson» مُحوِّلة مُصرِّفة؛ وكان يُرَش فَوقها مادة مُقيِّئة في بعضِ الأحيان.

يُنَقِّى هٰذَا الزِّفت كما يُنَقِّى القَطْران النَّباتيّ تمامًا. وعندما يُصبح نَقيًّا فإنّه يُستخدَم لتحضير لَزْقة الصَّمْغ المُشَمَّع المُصَمَّغ.

# ١٢٣- زِنْزَلَخْت، إِزْدَرَخْت

Azedarach, Margosa tree (E) Azédarach, Margousier (F) Zederach, Margoza (D) Melia azedarach (S)

شَجَرة كبيرة من فَصِيلَة الإزْدَرَخْتِيَّات مَهدُها الهند الشَّرقيّة. جذعُها مُستقيم السّاق. أوراقُها مُركَّبة ريشيَّة مُتعاقِبَة

شديدة الخضار اللامع، ورريقاتها بيضوية، حادة، كامِلة أو خفيفة التَّسنين. أزهارُها بعُذْقٍ كبير، إبطيّ الارتكاز. رائحتُها ولونُها كرائحة اللَّيْلَك ولَونه. أنبوب الأسدية أرجوانيّ اللَّون. ثمارُها نَوَوِيَّة مُرَّة الطَّعم لا تُؤكل، صفراء اللَّون عند نُضجها، يُستخرَج منها مادَّة فَعَالة سامّة.

المُرَكِّبات - في لحاء الشَّجرة قَلُويد دافِع للحُمِّى، استَخرجَه بِدِّنْغتون ودعاه متخرجَه بِدِّنْزَلَخْتِيْن» (۱)، azadirine «أزادِيْرين» أو «زِنْزَلَخْتِيْن» (۱)، وأشار أُوْدَنامْسُن إلى وجود صابونين في لحائها يتَمتَّع بخصائص مُخدِّرة مُخبِّلة.

الخصائص - لحاء الجذور والأوراق والثّمار النَّوويّة المُجفَّفَة طارِدة للدُّود، والثّمار لمُعالَجة السَّعْفَة والقَرَع، لحاء الشَّجَرة طارد للحُمَّى ومُخدِّر ومُخبِّل، أوراق طاردة للحَشرات (وقيل إنّ كلّ الشَّجرة الحَيَّة هي طارِدة للحَشرات).

الاستعمال - طُفَيلِيّات المَعِدة والأَمْعاء، الحُمَّيات، القَرَع، السَّعْفَة، الحشرات، صيد الأسماك. تُستعمَل الأوراق بَعد ازْرِبابها في تخضير الأَبْقار، لكنّها تُؤثِّر في طَعم الحليب ولونه. يُستخرَج من التّمار مادّة فَعّالة سامّة.

طُرُق الاستعمال - دواء باسم «مَرْغُوزا» Margosa يُستعمَل في أميركا كطارد لللود، من لحاء الجذور

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

ز ي ت

والأوراق والثمار. لُبّ الثمار يُمزَج مع الشَّحم وتُفرَك به فَرْوَة الرَّأس، في بلاد العجم، لمعالجة القَرَع والسَّعْفَة. لحاء الشَّجرة مُخدِّر يَستخدِمُه الصِّينيّون في صَيد الأسماك.

مُلاحَظة - يَتَقلَّد النّاس في بُومْباي العُقود والقلائد المَصنوعة من عَجمات ثمار الزِّنْزَلَخْت الصّلْبة جدًّا كعُقود تيمِيَّة حِرْزِيَّة فَألِيَّة، أو يُعلِّقون السُّبْحات المَصنوعة منها فوق أبواب بُومْبَاي بهدف إبعاد الأمراض. وفي رواية فيكتور هوغو الشَّهيرة تَتَقلَّد ال أَزْمِرَلْدَا عقدًا من الزنْزَلَخْت.

#### Huile d'olive (F) زَيْت الزَّيْتُون - ١٧٤

إِنّ زَيت الزّيتُون هو زَيت دَسِم يَحصل من ثِمار Olea europæa من فَصِيلَة الزّيتُونِيّات، بالكَبْس البارد، أو بالأركاس أي النّبْذ، أو بطرق مِيكانيكيّة أخرى مُعترف بها (الإصدار التّاسع للفَرْماكوبيا). قُدِّر الإنتاج العالميّ من زَيت الزَّيتون عام ١٩٨٠ ما قيمته للعام ١٩٥٨ طُنّ مُقابل ١١٠٨٠٠٠ طُنّ للعام ١٩٥٨.

إنّ التَّسمية "زَيت زَيتُون بِكُر Huile أَن التَّسمية "زَيت زَيتُون بِكُر d'olive vierge المُستخرَجة من الزَّيتون، إمّا بالكَبْس، وإمّا بالنَّبْذ أو بطرق ميكانيكيَّة أخرى مُعترَف بها. إنّ زَيت الزَّيتون المَخزَنيّ هو زَيت الزَّيتون البكر الّذي يَجب ألا يَخضع لأيّة مُعالجات سوى التَّنْقِية

بواسطة التَّصْفيق، والنَّبْذ أو التَّصْفية من دون أيّة إضافات مُساعِدة لها، وإزالة الهواء منه في الفراغ وفي الحرارة العاديّة السّائدة.

إنّ حُبوب الزّيتون الّتي تُضغَط هكذا، تُحلّ بعدَ ذلك في الماء الغالي وتُعصر من جديد. فنحصل بذلك على (الزّيت العاديّ المأكول). إنّ ثُقْل العمليّة الثّانية هذه الّذي يُسخَّن على النّار، يُعطي منتوجات مُفْسَدة نوعًا ما: Huile de

المُواصَفات - زَيت مائع، شَفّاف، صافٍ، مُصفَرّ أو مُخضَرّ اللّون، عديم الرّائحة، طعمه خاصّ حُلو ومُستحَبّ. لا يَتَركَّد حتّى بعد راحة طويلة في حرارة ١٥٠ سغ. يَبدأ بالتَّجمُّد عندما تنخفِض الحرارة إلى ما دون العَشْر درجات تَحت الصَّفر، فيُصبح عند ذلك مُحبَّبًا وكأنّه زِبْدِيّ، وذلك بسبب المَرْغَرِين الّذي يَحتوي عليه (حَوالى المَرْغَرِين الّذي يَحتوي عليه (حَوالى في الاستهلاك المَنزليّ.

زَيت الزَّيتون يَذوب بكامله، مُعطيًا محاليل صافية، في الأثير، الكلوروفورم، سُولفور الكربون، البَنزين، أثير البترول. وهو غنيّ جدًّا بغليسَّريدات الحامِض الزَّيتِيك؛ كثافته تَتراوح بين ٩١١، و٩٥٥، عند درجة ٢٠سغ.

يَحتوي على حَوالى ٧٠٪ من الأولايين المَصحوب بالقليل من

اللِّينُولايين. ويُمثِّل فيه الغليسَّريدات الصُّلْبَة النَّخْلِين والستيارين. وهو زَيت خالٍ من الشيتامين B و C. وجود فيتامين A. ولم يُحدَّد فيه الشيتامين D.

الخصائص - زَيت الزَّيتون هو مُليِّن، مُسهِّل، ومُفرِز للصَّفراء بمقدار ٣٠ إلى ٥٠ غرامًا في اليوم، عن طريق الفَم أو في حُقَن شرجيَّة. يُستخدَم لتحضير مَروخات، ولَزْقات، ومَراهم، ويُستعمَل كسوَّاغ لمواد غير قابلة الذَّوبان في الماء (لاستين، كريوزوت، إلخ.). بعد تَعادله، يُستعمَل لتحضير محاليل زَيتيَّة تُرْزَق وقطرات عَينية زَيتية.

الاستعمال - لَصْقة بسيطة. زَيت مُكَوفَر. زَيت بدهن النياوْلي المُنَقِّى. زَيت زَيت رُيت زَيت زَيتون مُعادَل ومُعقَّم. مَروخ زَيتي كلسيّ دستور ١٩٦٥.

وهو الزّيت الّذي يُفضّله السّاعَاتِيُّون لتَسْحيم تُروس السّاعات، لكن بعد إخضاعه للعمليّة التّالية: نَسكُب الزّيت في قنّينة، نُدخِل فيها صَفيحة من الرّصاص، نُقفِلها، ونُعرِّضها للإشعاعات الشَّمسيّة. يَتَغطَّى الزّيت لويدًا رويدًا بكُتْلَة جُبْنِيّة الشَّكُل تَتَركَّد جُزئيًّا في القعر، بينما يَفقد الزّيت لونه ويُصبح صافيًا. وعندما لا يعود يَتَشكَل أيّ راسب، نفصل عنه الزّيت.

۱۲۵ – زَیْت النَّخْل Huile de palme (F)

يُستخرَج زَيت النَّخل من سَوْذَق ثَمَرة

نَخْلَة كبيرة شائكة Elæis guineensis أي نَخْل الدُّهن أو نَخْلَة الزَّيت أو إلْوِيْس، وهي شَجَرة من النَّخْلِيَّات تَعلو نَحو ٢٠ مترًا وتَنبت طَوعيًّا في أفريقيا الغَربية. أكبر مُنتجي لهذا الزَّيت هما نيجيريا والدّاهومي. تُنتِج لهذه الشَّجَرة على الأكثر بين عامها العاشر وعامها الأربعين. يتألَّف قِرطها من ثمار غير الأربعين. يتألَّف قِرطها من ثمار غير مُنتظمة الشَّكل البَيضانيِّ، تَبلُغ حَوالى مُنتظمة الثَّمرة، غِلاف العَجمة من حَوالى تُلث الثَّمرة، غِلاف العَجمة من حَوالى المَن ثمار أورتُها من ١٦ إلى ١٥٠، لورتُها من ١٦ إلى ١٨٪.

هُناك أنواع أخرى من النَّخْل، في البَرازيل والغِيّان، لها أهميَّتها الصِّناعيّة المَحلِّيّة، ولكنّها تَبدو حتّى اليوم خالية من الفائدة الصَّيدليّة، مِثال: Elæis من الفائدة الصَّيدليّة، مِثال: melanococca, Attalea cohume, Attalea spectabilis, Attalea funifera, Orbignia speciosa, Acrocomia, etc.

المُواصَفات - زَيت كثيف، قِوامُه قِوامُه قِوامُ الزُّبدة، ذَهبيّ اللَّون الأصفر، رَائحته عَذْبة كرائحة البَنفسج وطعمه حُلو جدًّا. يَذوب في الكحول الغالي وفي الأثير البارد. يَبْيَض في الهواء أو بتأثير المَواد المُؤكْسِدة. يَحتوي على أولايين وعلى نَخْلِين، مع القليل جدًّا من الغليستريدات الستياريكية واللينولايكية. يَتلوَّن بالأصفر البُرتقاليّ بواسطة الجَزَرِيْن ويَنصهر عند نحو ٣٥ إلى ٤٠. إذا حُضّر بالطُّرق المَحلِّية يكون في العموم حامِضًا جدًّا. يُمكن يكون في العموم حامِضًا جدًّا. يُمكن

زي و

الحُصول على دُسوم أَقَلِّ حُموضة وتَحتفِظ بلونها الأصفر إذا ثَبَّننا الثَّمار. كثافته عند ١٥° تُساوي ١,٩٢٢ إلى ١,٩٤٠؛ يَحتوى على ڤيتامين A.

يُسحب من اللَّوزَة زُيت أبيض اللَّون، كثيف ولَطيف المَذاق جدًّا، يُدعى زَيت النَّخْل Huile de palmiste؛ وهو زَيت يَنصهر عند نحو ٣٤° إلى ٣٥°؛ غني جدًّا بغليسَّريدات كَپْريليكيّة وكَپرْيكيّة وغاريّة، ٥٠ إلى ٢٠٪، إلى جانب غليسَريدات مُختلَطة ميريستيكيّة، نَخْليكيّة، ستياريكيّة، زَيتيكيّة، مع بقايا غليسَريد لينولايك وكَپْرويك.

يَختلِف إنتاج الزَّيت من ٤٠ إلى ٥٠٪ للسَّوْذَق، ٤٠ إلى ٤٥٪ في اللَّوزَة للسَّوْذَق، ٤٠ إلى ٤٥٪ في اللَّوزَة Palmiste. استعمالاته الرَّئيسيّة هي معامِل الصّابون، صِناعة الدُّهنيّات، والتَّغذية. ولقد اقتُرح في المُستعمَرات، عام ١٩٣٥، استعمال زَيت النَّخْل المَغسول بالماء أو بالكحول كبديل عن زَيت الزَّيتون أو شحم الخِنْزير المُستوردة من أوروبًا لتحضير الزُّيوت الطَّبِيَّة والمراهم.

## ١٢٦ - زُيوت طبيَّة

#### Huiles médicinaux (F)

نُحضِّر بالطَّريقة ذاتها زَيت الأَبْسَنت، والفَيْجن، والحَنْدَقُوق، والدَّاذي، والوَرد الباهِت (أو الجوري) (زَيْت مُورَّد)، والحُلْباء، والبَيْلسان.

## زَيْت البابُونَج المُتَرْبَن

#### Huile de camomille térébenthinée (F)

نُحضِّر بالطَّريقة ذاتها زَيت النَّعنع المُتَرْبَن، ولكن باستعمال ١٠٠٠ جزء من دُهن التَّربَنْتين لكلِّ ١٥٠٠٠ جزء من النَّعنغ الجَعِد.

## زَيْت البابُونَج المُكَوْفَر

#### Huile de camomille camphrée (F)

نَعمل بالحلّ البَسيط إمّا في حرارة المُختبر السّائدة أو في حَمّام مريم عند ٥٠٠ سغ:

کافور مَبْشور زَیت بابُونَج ۹۰۰غ

نُصفِّي. دستور أدوية ١٩٣٧.

إذا استعملنا كافورًا طبيعيًّا مُيامِنًا، نُلاحظ في أنبوب التَّجربة انحرافًا مِقْطابيًّا يَبلغ + ١٠°.

زَیْت الجِراء (F) الجِراء کان هٰذا الزَّیت یُحضَّر بطبخ ۳ کلاب مَوْلُودة حَدیثًا فی مِقدار ۱۶۶۰ غرامًا من

زَيْت كَبِد المُورَة المُفَسْفَر

Huile de foie de morue phosphorée (F)

زي و

زَيت كَبِد المُورة .......... ٢,٩٧,٥٠ غ زَيت مُفَسْفَر بنسبة ١٪ ......٢٠٠ غ

نَمزُج جيِّدًا. عشر نُقاط من هٰذا المُستحضر تَحتوي على نِصف ملغرام فوسفور. المِلعَقَة الصَّغيرة تَحتوي منه إذًا على حَوالى ربع ملّغرام (دستور 1904).

يُحضَّر عِند الحاجة.

مَقاديره القُصوى للأولاد عن طريق الفَم ١ إلى ٤ ملاعق صغيرة في اليوم، وحسب العمر. للبالغين: ٢٠ غرامًا دُفعة واحدة و٤٠ غرامًا كلّ ٢٤ ساعة.

إن لهذا الزَّيت مُسجَّل في الجدول C.

زَيْت كَبِد المُورَة اليُوديّ المُحدَّد

Huile de foie de morue iodo-ferrée (F)

بُرادَة حديد ٠٤٠ غ

يُود ......يُود .....يود

ماء .....كمِّيَّة كافية

نَدُق في هاون ونُضيف رويدًا رويدًا اليُودور المُشكَّل من:

زَيت كَبِد المُورَة البُنِّيِّ أو

الأشقر أو القِرش ........ ٥٠٠ غ

١٢٧ - زُيُوت مُحْتَرَّة

Huiles pyrogénées (F)

تُصنَّف تَحت لهذا الاسم الزُّيُوت الَّتي تَحصل من تَحلُّل أجسام مُختلِفة بفعل زَيت الزَّيتون حتّى تَلف الرَّطُوبة تمامًا، وعندها إضافة الصَّعتر وسَعتر البَرِّ ونَعنع الحَقْل والمَردكوش والهيوفاريقون، بكمِّيّات مُتساوية من ٦٠ غرامًا، وتمرير الكلّ بعد مرور ١٥ يومًا.

إنّ لهذا المُستحضَر ظَلّ يَصدُر طَويلًا في دستور الأدوية.

إِنّ زُيوت الخَرَاطين أي ديدان الأرض Oleum المختراطين أي ديدان الأرض Oleum lumbricorum والعلاجِم Oleum lacertarum والعِظاء bufonum Oleum spermatis ranæ وسَرْء الضَّفْدَع Oleum scorpionum التي وسَرْء العَقَارِب من زُيوت الجراء، كانت تُحضَّر مثلها، إلّا أنّه لم يكن يَدخل في تحضيرها أيّ نَبات عِطريّ.

إنّ التّجريبيّين كانوا يُقيمون وَزنًا لكلّ تلك الزُّيوت الّتي اختفت اليوم من كافّة الفَرْماكوبيات. ولكن، أفلا يُمكن تقريب التّأثيرات التي نتوقّعها أحيانًا من بعض السّموم (أفاعي، عَلاجِم، نَحْل) من عمل تلك الزُّيوت المُفتَرض؟

زَيْت كَبد المُورَة المُركّب

Huile de foie de morue composée (F)

زَيت كَبِد المُورة المَعصور

على البارد .....على البارد

يُود .....٠٠٠٠ يُود

بروم .....باروم

فوسفور ٠,١٠غ

مِقداره ٣ ملاعق كبيرة في اليوم.

1.4

النَّار. تركيب لهذه الزُّيوت مُعقَّد جدًّا؛ زَيت زَيتون .........٥٥ غ زی و نُقطِّر في حَمّام رَمْل في مُقطِّرة من زَبْت الأَلْوَة المُحْتَرّ الصَّلْصال الرَّمليّ المُطيَّنَة جيِّدًا. Huile d'aloès pyrogénée (F) زَيْت شار ت الطارد للدُّود نَضع كمِّية مطلوبة من الألْوَة في مُقَطِّرة، نُسخِّن ونَتَلَقِّي النِّتاج الَّذي Huile anthelminthique de Chabert (F) دُهن التَّر بَنْتين ..... أجزاء مُجِّد هٰذا الزّيت كدواء طارد للدُّود زَيت دِيپًل الحَيوانتي ..... جزء عند الأولاد، في تَمسيدات على مِنطَقة نَمزُج معًا. بعض المؤلِّفين يَقول السُّرَّة، تُكرَّر ٢ إلى ٣ مَرّات في اليوم. بالتَّقطير. زَيْت أَلْويَ باتاڤيّ، زَيْت أَلْويّ هولّندِيّ مِلعَقتان صغيرتان في فنجان زهورات Huile aloétique batave (F) لُعابيّة، ضِدّ الدُّودة الوحيدة. عِلاج

أَلْوَة، صَبْر، مَقْر .....أَلْوَة، صَبْر، مَقْر

مُعَمَّر – سَبُوْلَة ، سَبُوْل صَغِيْر (۱٬۰۰ ) قِرْط ، ثُوْم س ب و Culin chive (E) مُعَمَّر Ciboulette, Civette, Appétit (F) Lauch, Schnittlauch, Porree (D) Allium schænoprasum (S)

س

الينُم المَناقِع، بَخُور الماء (۱۲۸ Sélin des marais, Persil des marais, Encens d'eau, Persil laiteux (F) Selinum palustre, Peucedanum palustre (S)

نَبات من فَصِيلَة الخَيْمِيَّات يَنبت في مُسْتَنقَعات أوروبًا الشَّماليَّة وفي حقول فرنسا الشَّماليَّة والشَّرقيَّة المَنْقِعيَّة. استُعمل مُنذ العصور القديمة في مُعالجة حالات الصَّرْع والعُصَاب والهستيريا والرَّقْص، إلخ.

جَذره، وهو القسم الوحيد المُستعمَل، لَحْميّ، سَميك الألياف الطَّويلة، لَونها الخارجيّ بُنِيّ قاتم، بَيضاء لابِنَة من الدّاخل، رائحته قَويّة وعِطريّة، طعمه حامِز ولاذع. إذا جُفَف يَحتفِظ برائحته وطعمه؛ مَسحوقُه فاتح اللَّون الأصفر، يميل إلى الرَّماديّ.

المُركِّبات - يَحتوي الجذر، حسب پِيْشييه، على زَيت طيّار، زَيت دسم، مادّة صَمْغِيّة، جَوهر مُلوِّن أصفر، وحامِض خاص هو حامِض سالينيك.

نبات مُعمَّر من فَصِيلَة الرَّبْقِيَّات يَعلو من أقْرِباء البَصَل والثُّوْم ولَكنَّه يَخلُو من السّاق المُتفِخة المِغْزلِيّة الشَّكل، كما أنَّه يُشبه السَّبُول ولَكنَّه هَزيل أصغر منه قَدًّا وأقل السَّبُول ولَكنَّه هَزيل أصغر منه قَدًّا وأقل ارتفاعًا. خَيْماتُه كُرويّة الشَّكل جميلة الأزهار الوَردِيَّة أو الأرجُوانِيّة الزّاهية. النَّيماليّة وآسيا نُزولًا نحو الجَنُوب على الشَّماليّة وآسيا نُزولًا نحو الجَنُوب على معظم السُّفوح الجبليّة وحتى أنَّها تُوجَد في أمريكا الشَّماليّة؛ وهي شِبه طَوعِيَّة في مُحيط البَحر المُتوسِّط ولَكنَّها غير في مُحيط البَحر المُتوسِّط ولَكنَّها غير مَذكورة في فلورا لُبنان. السَّبُولة تُقاوِم الشَّولة أَفْضَل منه.

المُركِّبات - زَيت دُهني مُكَبْرَت، صَوّان؛ ولَعَلَّها تُشارِك البَصَل والثُّوم والكُرّاث بَعضَ المُركِّبات أو مُعظَمها وبذلك تكون خَصائصُها الطَّبِيَّة مُشابِهة أو حتى مُماثِلَة لها.

الخصائص - مُلَطَّف، مُضاد لدَاء الحَفَر، مُطهِّر، طارِد للسُعال، مُقوِّ للقَلْب، لائم الجرح، مُزيلِ التَّكَلْكُل والثُّولُول، مُبَوِّل، مُلَيِّن، مُقَشِّع، مُنْقِص

<sup>(</sup>١) التَّسميتان للمُؤلِّف.

س ح ل

السُّكَّر الدَّمَويّ، مُسَهِّل، مُصَرِّف، مُنفِّط، مُنَشِّط، مُضادّ للسَّرطان.

الاستعمال - الكُحُولِيَّة أي إدْمان الكُحولِيَّة أي إدْمان الكُحول، ثُؤلُول وتَكَلْكُل، تَطَبُّل البَطن، عَشْر الهَضْم، تَخَمُّرات المَعِدة والأَمْعاء.

طريقة الاستعمال - خُضار تابل يُؤكّل في السَّلَطات والمُقَبِّلات حَيث يَبدو مُفيدًا جدًّا في حالات عُسْر الهَضْم وكسل المَعِدة وتَخَمُّرات الأمْعاء العَفِنَة. أيضًا تُتَبَّل به الأطباق في حال تَطَبُّل البَطْن وذلك بفرمه طازجًا معها. بُصَيلاتُه مُنشِّطة قَويَّة وإن كانت أقَلّ ممّا هي عليه بُصَيْلات النُّوم. أمّا في حال بِداية الشُّعُور بالخَدَر الكُحوليّ (السُّكْر) أو حَتَّى مُعالجة ظواهره، فنمرث حوالي ٥٠٠غ من السَّبولة الطازجة في لم ليتر حليب لمُدَّة ٢٤ ساعة، نُمرِّر. يُؤخَذ منه كأس صغيرة ٣ مرّات في اليوم. عصير السَّبُولَة الطَّازِج يُوضَع ٤ مَرّات في اليَوم على التَّكَلْكُل والَّقُولول وسوى ذلك، مع الانتباه إلى حماية البَشرة السَّليمة. كذلك فَرْك عَقْص العَنْكَبوت بالأوراق الغَضَّة المَمعُوسة، وفَرْك وَخْز النَّحْل والزُّنبور بدرناتِ غَضَّة مُقَطَّعة.

## Orchis tachetée (F) سَحْلَب أَبْقَع – ۱۳۰ Dactylorhiza maculata (S)

نَبات مُعَمَّر من فَصِيلَة السَّحْلَبِيَّات. ساقُه مَلأى أو جَوْفاء. أوراقه خَفيفة الاختصار القاعِديّ الواضِح، سِنانيّة،

كثيرة البُقَع الباهِتة اللَّون البُنِّيّ وهي خضراء. سُنْبلَة كثيفة، عديدة الأزهار. أزهاره فاتحة اللَّون الوَرْديّ، وبالكاد يُمكن تَمييزها عن أزهار النَّوع Orchis يُمكن تَمييزها عن أزهار النَّوع holocheilos. شُفَيْفَة مُنَقَّطة أحيانًا باللَّون الوَرْديّ الزّاهي وهي غَضَّة. مِهماز غليظ، أقل طُولًا من المَبيض.

الخصائص - مُليَّنة، مُضادَّة للنَّزلات، مُضادَّة للنَّزلات، مُضادَّة للإسْهال، مُنشِّطة للجهاز العَصبيّ المَركزيّ.

الاستعمال - حِفظ أغْشِية المَعِدة والأمعاء المُخاطيّة، التهابات المَعِدة والأمعاء، تَهيُّج المَعِدة والأمعاء، الإسهال.

طُرُق الاستعمال - نقيع حَوالى ٤٠ غرامًا من الدَّرنات المُجفَّفة في ليتر ماء يُغلى ربع ساعة ويُؤخَذ منه ٤ فناجين في اليوم. كما يمكن تَحضير هٰذا التَّقيع مع الحليب أو مع مَرَقٍ ما. كذلك نُحضر جيلاتين بخلط ٣ ملاعق صغيرة من مسحوق الدَّرنات و٣ ملاعق صغيرة من اللّا كُتوز (سُكَر الحليب) وإضافة ٣٠ غرام ماء بارد. بِعدَها نُضيف ٥٠ غرام ماء مغليّ ونُسخَن هٰذه المَعجونة في حَمّام مريم لمدَّة نِصف ساعة. نُضيف عن حَمّام مريم لمدَّة نِصف ساعة. نُضيف المُستحضر من ٥٠ إلى ١٥٠ غرام المُستحضر من ٥٠ إلى ١٥٠ غرامًا في اليوم.

العُنَّاب هي الضَّال أي العُنَّاب البرِّي، سنذا

١٣١ - سِدْر، نَبْق المسيح، شَجَرَة النَّبْق Nabk tree, Christ's thorn (E) Jujubier d'orient, Nabqa, Nabca, Nabka, Épine du Christ (F) Christdorn, Christdornbrustbeere (D) Zizyphus spina-Christi, Rhamnus spina-Christi (S)

شُجَيرة لِيفيّة أو شَجَرة من فَصِيلَة النَّ قِبَّاتِ قد تَعلو من ٤ إلى ٥ أمتار، ولكنّها غالبًا ما تُكون على شكل جُنيبة بسيطة. فروعها مُتَلَوِّيَة مُزوَّاة بعض الشَّيء، بيضاء أو مُسودّة اللُّون. إبرها واحدة مُستقىمة غالبًا ما تكون طويلة جدًّا، الأخرى مُحَدَّبة وأقصر منها بكثير أو حتّى مُخْفِقَة. الأوراق ثُلاثيّة العُروق، طولها ٢,٥ إلى ١(٦)سم، قليلة الانحناء القاعدي، كاملة الحوافي أو خَفيفة التَّسنُّن الدَّقيق، مُثَلَّثة أو مُستديرة الرَّأس، زَغِنَة أحمانًا على عُروق الصَّفحة السُّفلي. الكؤوس وزُنيداتها صُوفيّة. التَّمرة مُفردة النَّواة Drupe بَيضاويّة الشَّكْل الكُرَويّ، قد يَبلغ قطرها ١٢ ملم عند النُّضج، حمراء فسوداء اللّون.

هناك ضرب خال من الإبر، أوراقه أكبر قَدًّا، هو السِّدْر السَّرْح (١) أو نَبْق المَسيح السَّرْح (١) Zizyphus spina-. Christi Willd. var. inermis Bois الثِّمار مَأكولة. زُرع الضَّرب بين صُور وصَيدا في القرن التّاسع عشر.

الخصائص والاستعمال - إنّ الأنواع ذات الثِّمار المأكولة والمُتقاربة من

Ruta, Ruta graveolens, Ruta hortensis (S)

والسِّدْر أي نَبْق المسيح، والشُّبُهان.

وجاء عن ثمار السِّدر والضَّال أنَّها تَتَحلَّى

بخصائص نافعة للصَّدر؛ وإذا مُعِس جَزر

الضّال وعُصِر يُعطِي عُصارة فَعّالة في

مُعالجة الغُفَاءَة العَينية Leucoma (طت

شَعبيّ تُونسيّ). ولَعلّ هذه الثِّمار تَتَحلّى

كذلك بالخصائص المُهنِّطة للتَّوتُّر أي

الضَّغط الدَّموي، وهذا ما يُفسِّر سب

الدّوار الّذي يَحصل على أثر الإكثار

منها. وإذا كان خَشَب السِّدر مُماثلًا

لخشب العُنّاب، فإنّ قُدامي الأطبّاء

العُرَب كانوا يستعملون خليط رَماده مع

الخَلِّ يَضعونه على لَدْغ الأفاعي. خَشب

السِّدر شديد الصَّلابة، شائع الاستعمال

الحِرَفيّ. وقد تحتوى ثماره على بعض

الأنْتِ اكمنون، على غرار العُنَّاب. أمَّا

الشُّجيرات فتُستعمَل في السِّياجات الحَيّة

وتُزرَع مع أبعاد تراوح من متر إلى

مترين. وقيل إنّ إكليل الشُّوك الذي

وُضع على رأس السَّيِّد المسيح كان منها.

١٣٢ - سُذاب، فَيْجَن، سُذاب مَخْزَنِي،

Rue, Common rue, Herb of grace (E)

Raute, Garten raute (D)

Rue, Rhue, Rue officinale, Rue des jardins, Rue fétide, Herbe de grâce (F)

وهو نبات غير لبناني من فصيلة

(١) التَّسمة للمُؤلِّف.

فَيْجَن نَتِن

السُّذاب المَخْزَنيّ أعيد تسجيلُه في الفَرْ ماكوبيا عام ١٩٧٤.

٠. ذ ا

السُّذابِيَّات. أوراقُه مُزوَّدة بتَنْقيطات شَفّافة مَرَدُّها إلى وجود غُدَد فارِزة، تُصبح مُرْمَدَّة اللَّون بالتَّجفيف أزهاره سَنَميّة التَّجميع الهاميّ الارتكاز، مُخضَرَّة اللَّون الأصفر. رائحة النَّبات، بكافَّة أقسامه، قَويّة جدًّا ومُنتِنة، طعمه حارّ، حامِز ومُرّ.

المُركِّبات - يَحتوي السُّذاب المَخْزَنيّ على هيتروسيد (۱ إلى ۲ بالمئة)، وعلى رُوتِيْن أو رُوتوسيد Rutine، وعلى زَيت دُهنيّ (۰,۱۰ بالمئة) يَدين له بخصائصه الفيزيولوجيّة. كثافة لهذا الدُّهن ۸۳۳، إلى ٠,٨٤٠، وهو يَذوب في جزئين أو ثلاثة أجزاء كحول ۷۰ درجة، ويَتَكوَّن على الأكثر من مَتِيْل نُونِيْل سيتُون، ومن كمِّية صغيرة من مَتِيْل هَپْتِيْل سيتُون، ومن كمِّية صغيرة من مَتِيْل هَپْتِيْل سيتُون.

إِنَّ هٰذَا التَّركيب يَنْطَبِق في الحقيقة على الدُّهْن المُستخرَج من السُّذَاب المَخْزَنِيّ، أي «سُذَاب الشِّتَاء»، ومن السُّذَاب الجَبَليّ (١٠) . Ruta montana L. (١٠) أي «سُذَاب الجَبَليّ أي «سُذَاب البَرّ، أي «سُذَاب البَرّ، أي «سُذَاب البَرّ، وعلى المَوسوعة في علوم الطَّبيعة)؛ وعلى العكس من ذلك، علوم الطَّبيعة)؛ وعلى العكس من ذلك، فإنّ الزَّيت الدُّهنيّ المُستخرَج من السُّذَاب القُنَيْبيّ المُستخرَج من السُّذَاب القُنَيْبيّ المُستخرَج من مَيْل هَنْ اللَّبنانيّ، فَيَتركَّب الرَّيت الدُّهنيّ اللَّبنانيّ، فَيتركَّب بمعظمه من مَيْل هَنْ الأخير يَتَجمَّد في حرارة الزَّيت الدُّهنيّ الأخير يَتَجمَّد في حرارة الني بكثير (٥ إلى ١٠ درجات سنتغراد تحت الصِّفر) من الحرارة التي يَتَجَمَّد تحت الصِّفر) من الحرارة التي يَتَجمَّد

فيها الزَّيْتان الآخران (حَوالى ٨ إلى ١٥ درجة سنتغراد فوق الصِّفر).

إِنَّ الرُّوتُوسِيْد 20H<sub>2</sub> 20H<sub>30</sub>O<sub>16</sub> 20H<sub>3</sub> مَكن شَطْره بواسطة أَنْبَخانَة ذَوّابَة، قد تُدعى أَنْبَخانَة النَّبْق Rhamnodiastase إلى كَرْسِيتُول وإلى رُوتينوز Rutinose ويَتَشكُل الرُّوتينوز بدوره من رَمْنُوز وغلو كوز.

الرُّوتُوسيد هو مسحوق أصفر اللَّون مُتَبلِّر مُياسِر، يَنصهر عند حَوالى ١٩٦٥ سغ، قليل الذَّوبان جِدًّا في الماء، يَذوب في الكحول، وبنوع خاص في الأثير المائي، وعلى السّاخن، في أقل من ٥ أجزاء من البيريديْن.

لقد لُوحِظ الرُّوتين، منذ العام ١٩٢٤، في حَوالى ١٥ نوعًا نباتيًّا تنتمي إلى فصائل مُختلِفة جدًّا، مِثال التَّبْغ، البَنْدورة، البَيْلسان، وبنوع أخص في الحنطة السَّوداء الّتي يُستخرَج منها كمِّتات صناعة.

الخصائص - يثير السُّذاب، مَوضِعيًّا، عَمَلًا مُهيِّجًا (أقل حِدَّة من عَمل الأَبْهَل) على البَشرة وعلى الأغشية المُخاطيّة. من الدّاخل قد يُؤدِّي إلى حَوادث شديدة من التهاب المَعِدة والأمعاء، مَصْحُوبة بدوارات، وارتجافات، وتَخلُّجات. يُستعمل السُّذاب كمُطْمِث، وكمُنشَط للتَّقلُّصات الرَّحِميَّة، وكمُضاد للنَّرْف. وهو لا يُحدث الإجهاض (الإجراميّ) سوى بطريقة غير مُباشِرة وبمقادير سامّة (ج. يُوشِيْه).

استُعمل السُّذاب ضد الجرب، والحُمَّيات.

القِسم المُستعمَل هو النَّبات المُزهِر (دستور أدوية ١٩٤٩).

يُستعمَل الرُّوتُوسيد ضدَّ ارتفاع التَّوتُّر الشِّريانيِّ (الضَّغط)، ويُصْلِح الهَشاشَة الشَّعْرِيّة الّتي تُيَسِّر حُدوث النَّزيفات. يَتحلَّى بعمل فيتامينيّ P. يُعطى بمقدار ٢٠,٠٢ غرام ثلاث مَرّات في اليوم.

سام - جَدول Toxique - Tableau A

أشكاله الصبيداية ومقاديره - يُحضّر من الفَيْجَن: مَسحوق، مُعَلَّب، ماء أي هيدرولة، وخَلّ. - نُقاعة للاستعمال الدّاخليّ من ٥ غرامات لكلّ ليتر؛ ومثله للاستعمال الخارجيّ من ٢٠ غرامًا لكلّ ليتر. دُهْن السُّذاب (لا يُنصَح باستعماله كثيرًا)، يُعطى على شكل جَرُوعات بمقدار نُقطة إلى عشر نقاط. من الخارج، يُستخدم مسحوق السُّذاب للقضاء على القَمْل مَسحوق السُّذاب للقضاء على القَمْل وتنظيف القُرْحات القديمة (للتاريخ).

۱۳۳- سِرْفِل الغاب<sup>(۱)</sup>، سِرْفِل بَرِّيّ، بَقْدُونس بَرِّيّ، كُشْبُر

Wild chervil, Cow weed, Cow parsley (E)
Anthrisque des bois, Cerfeuil des bois,
Cerfeuil sauvage, Chérophylle, Persil
sauvage (F)

Kalberkerbel, Wilder Kerbel, Wilder kälberkropf (D)

Anthriscus sylvestris (S)

أُحادِيّة الإثمار من فَصِيلَة الخَيْمِيّات، سرف أزهارُها بَيضاء. أسنان الكأس مُهْمَلَة. البَتَلات مُتطاوِلة أو مُزَوَّاة القاعِدة، مُنفرِجة الرَّأْس أو كامِلة، غير مَلْوِيّة. التَّمرة بَيضاويّة مُتطاوِلة. الماريكارپ ذات ٥ ضلوع مَرْئيّة على الرَّأس

سِرْفِل الغاب نَبات مُعمَّر أَرُومته غليظة ومُتطاوِلة وساقُه ناسُورِيّة ومُضلَّعة عِقَدُها مُنتفِخَة بَعض الشَّيء. أوراقُه لامِعة ثُلاثيّة التَّقسيم إلى سَكَمات مُتطاوِلة سِنانيّة. أزهارُه كبيرة نِسبيًّا، في خَيمات هامِيَّة طويلة السُّويقات وشُعاعاتٍ شبه مُتساوِية. الثَّمرة مُزوَّدة بمنقار قصير جدًّا، مُتطاولة، مالِسة ولامِعة.

فقط، وما بقى فهو أسطواني خال من

الخصائص - إنّ التَّبخيرات التي تَتمّ بواسِطة أقسام النَّبات الهوائيَّة المُجفَّفة المُحروقة تُشفي آلام الرّأس المُبْهَمة. في منطقة سواسي في تونس يُعالَج السِّل بنقيع الأوراق يُضاف إليه عَصير الرُّمّان الحامِض. العِلاج يَجب أن يَستمر ٧ أيّام. وجاء عنه في يَستمر ٧ أيّام. وجاء عنه في الموسوعة»: مَنافعه الطَّبيَّة مُبهمَة. يُقال إنّه يُفيد المَعِدة ويُنشِّط الدم. جُذورُه مُستطيلة يُقال إنَّها لا تَخلو من بَعض العَناصر الجُحاليَّة الضارّة بالحيوان.

115

Anthriscus: جنس نَباتات مُعمَّرة أو

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

ر ن - ١٣٤ سِرْفِل لِفْتِي، سِرْفِل عَسْقَلِي - ١٣٤ Parsnip chervil, Turnip roated chervil (E) Cerfeuil bulbeux, Cerfeuil tubéreux (F) Rübenkälberkropf (D) Chærophyllum bulbosum (S)

نَبات عُسْقوليّ بَقْليّ مُحْوِل من فَصِيلَة الخَيْمِيَّات، طَوعيّ في أوروبّا الوُسطى. شيمراخُه الزَّهريّ يَعلو حتّى المترين. أوراقُه لِيفيّة قليلًا Frutescente، مُركَّبة، خَمْلِيَّة التَّصْل، ثُنائيَّة أو ثُلائيَّة التَّفليق. جَذرُه لَحمِيّ لِفْتيّ الشَّكْل، أبْيض اللَّون، سُكَّريّ الطَّعم، حَجمه حجم اللَّون، سُكَّريّ الطَّعم، حَجمه حجم الجزرة المُتوسِّطة، يُؤكل مَطبوخًا الجزرة المُتوسِّطة، يُؤكل مَطبوخًا ويُصبح طعمه ألذّ نكهة إذا حُفِظ بضعة أشهر بعد جمعه.

المُركِّبات - في الجذور مَوادَّ أزوتية ٣,٥٪، مَـوادَّ دُهـنـيَـة ٢٠,٤٪، مَـوادَّ هِيدروكربونيَّة ٢٧,٨٪. النَّبات سامّ بكامله ما عدا الجُذور.

مُلاحظة - كان هذا السِّرفل شائعًا في المَعْشَبات الطَّبِيَّة إلى جانب نَوع آخر اسمه "سِرْفل المَجانيين" (٢) Chærophyllum (٢) temulum L. (S) Cerfeuil des fous (F) ولكنَّهما لا يُستعمَلان اليوم.

Tuberous stachys (E) كرُوسْن اليابان (۱۳۵ Stachys tubéreux, Épiaire tubéreuse, Crosne du Japon (F)
Knollige ziest (D)
Stachys tuberifera, Stachys sieboldii (S)

نَبات بَرِّي وزِراعِيّ مُعَمَّر من فَصِيلَة الشَّفَوِيَّات يعلو ٤٠سم، سوقُه مُربَّعة، أوراقُه مُتقابِلة، قلبيّة الشَّكْل، رِيزوماته المُتَدرِّنة الَّتي تَحمل انتفاخات مُتتالية تُشكِّل القِسم المأكول.

المُركِّبات - سَطاقِيُوز، وهو سُكَّر تركيبه الكيميائيّ 40H<sub>2</sub> وتَحتوي الدَّرنة وَجد في دَرَنات النَّبات، وتَحتوي الدَّرنة بالنِّسبة لوزنها الجافّ على ما يلي: ٦٠ إلى ٧٠٪ سَطاقيوز، ٥ إلى ٧٪ أملاح مَعدنيّة، ١٠٥٠٪ هَيُولِيّات (أَلْبُومين، نُوكُلايينات، أزوت نَشَويّ، تَرِيْغونَلِين، سَطاقِدْرِين: ٢٠٥٠، OH; مِيتايين، مُشتَق من البرولِيْن، إلخ.)؛ ولكنّ الدَّرنة لا تَحتوى على نَشاء.

الخصائص والاستعمال - الكروسُن مُغذًّ، طعمه مُستحب جدًّا يُذَكِّر بطعم قَلْب الأرضي شوكي وجُذور السَّلْسَفيل، وهو يُشكِّل أطباقًا مُمتازة تُحضَّر مع اليَخَنات والصَّلْصة والسَّلَطات وسوى ذلك. دَرناته مِغزليّة الشَّكْل، بَيضاء المكسر، قليلة الألْياف.

ملاحظة: جاء اسم لهذا النَّبات في

<sup>(</sup>١) كلّ التَّسميات للمُؤلِّف ما عدا التَّسمية الفرنسيَّة الثالثة والتَّسميتان اللاتينيَّتان.

<sup>(</sup>١) التَّسمية الثانية للمُؤلِّف.

<sup>(</sup>٢) التَّسمية للمُؤلِّف.

«الموسوعة في علوم الطبيعة»: بطاطا يابانيّة. دَخل هذا النّبات إلى أوروبًا من الصِّين عام ١٨٨٠ وزُرع في مُقاطعة فَرنسيَّة تُدعى Crosne فاحتفظ باسمها: «كروسْن». إنّ صعوبة تَقشير دَرَنات لهذا النّبات وإنتاجه الضّئيل جعلا زراعته تُتراجع وتبقى مُحدودة حتّى اليوم.

١٣٦- سَطاقِس الغاب، سَطاخيس الغاب(١) Wood stachys (E) Stachys des bois, Épiaire des bois, Ortie puante, Ortie puante des bois, Panacée des laboureurs (F) Waldziest, Forstziest (D) Stachys sylvatica (S)

نَبات مُعَمَّر من فَصِيلَة الشَّفُويَّات يَعلو من ٤٠ إلى ١٠٠سم. أوراقُه خضراء، مُستَّنة، مُوبرة، لاطئة، السُّفلي قصيرة العُنُق. أزهارُه قاتمة اللَّون الأرجُواني، في سُنْبُلة من دُوَّارات مُورِقة من ٣ إلى ٦ زهرات. كأس مُوبرة، غدِّيّة، خُماسيّة الأسنان المُثَلَّثة الشُّكل. التَّاج أطول بمرَّتين. الأسدية أربعة. الكرّابل بَيضانيّة، سوداء اللُّون. أرومته مَدّادة زاحِفة، سميكة، لَحميَّة، تُرسِل فسائل. رائحته مَعدومة، طعمه مُرّ.

المُرَكِّبات - زيت طَبَّار، سَطاقِبُوز تَركيبه الكيميائي C<sub>24</sub>H<sub>42</sub>O<sub>21</sub>,4 OH<sub>2</sub> وهو سُكِّر يُوجد في الأقسام المَطمورة للنَّبات، وجَدَه عام ١٨٩٠ كلِّ من شُوْلُز

وڤون يُلانْتا في دَرَنات السَّطاقِس سطا الدَّرَنيِّ (۱) Stachys tuberifera وسَطاقس الغاب والسَّطاقِس المُنْتَصِب(١) أو السَّطاقِس السُّنبُليِّ.

الخصائص - مُضادّ للتَّشنُّج، مُطمِث،

الاستعمال - يَشتهر هٰذا النّبات على أنَّه مُطمِث بنوع خاصٌّ، طنين الأذُن، سِنّ القُعود، تَقَلُّصات.

طريقة الاستعمال - في حال طنين الأذُن يُؤخِّذ ٣ فناجين في اليوم من نُقاعة ٥٠ غرام رؤوس مُزهِرة في ليتر ماء غال يُغطّى عشر دقائق. لمعالجة الاضطرابات الوعائية في سِنّ القُعود وآلام الحَيْض وعدم انتظام الطَّمْث وحالات النَّزيف، ٣ فناجين في اليوم من نُقاعة ٣٠ غرام نَبات مُزهِر مُجفَّف في ليتر ماء غالٍ يُغطّى عشر دقائق. جَرُوع لمعالجة آلام الحَيْض من مُستَخلص السَّطاقِس المائع ٢٠غ، شراب النَّعنع ٩٠غ، ماء ما يكفى لكى يُصبح لدينا ٣٠٠ ملل. في شَحّ الطُّمْث، فِنجانان في اليوم، أسبوع قَبْل الموعد المُرتَقَب، من نُقاعة ٢٥ غرام نَبات في ليتر ماء غال يُغطّي ٥ دقائق.

<sup>(</sup>١) كلّ التَّسميات للمُؤلِّف ما عدا التَّسميات الفرنسيَّة والتَّسمية اللاتينيَّة.

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

س ء د

المُحُسْر، سَمار حُلُو، عَلُوب، كَالُوب، كَالُوب، عَلُوب، Foxtail sedge, Mat sedge (E) كِرْش Souchet à nattes (F) Zypergras (D) Cyperus alopecuroides (S)

ريزُوم غَليظ مُعَمّر من فَصِيلَة السُّعْدِيَّات. سوقُه قَويّة، ثُلاثيّة الزُّوايا، تَتَخطِّي المتر عادة. أوراقُه مُسطَّحة، خَشنة، عَرضها أكثر من سم واحد، الأوراق القُلافية قد تَطول ٤٠ إلى ٥٠سم. ازهراره مِظلِّيّ الشَّكْل الواسع، مظلَّتُه مُرَكِّمة، شُعاعاتها الأوَّليّة غير مُتساوية تَبلغ حَوالي ١٨سم وتَنتهي بخُيَيْمات قُطرها من ٤ إلى ٥سم، قُناباتها المُقَلِّفة تَتخطَّاها بَعض الشَّيء. لهذه الخُييُّمات تَنقسم بدروها إلى سَنابل عديدة طولها ١٥ إلى ٤٠ سم وعرضها ٧ إلى ١٥ملم، تحمل عددًا كبيرًا من السُّنَيب لات المُرتكِزة في كلّ الاتِّجاهات. السُّنيبلة ذات ٨ إلَّى ١٢ زهرة وطولها من ٤ إلى ٨ملم. العَصْفات مُحمرَّة اللَّون، مُنسِطة بَعض الشَّيء، حادَّة الرّأس، جُؤجُؤها مُخضَرّ اللُّون و مَضغوط.

أوراقُه تُستعمَل في صِناعة الحُصْر. شقراء اللَّون. ولعلّ رِيزوماته تُفيد الرُّمال الكلويّ. المُركِّبات

۱۳۷ - سُعْد الحُصْر، سَمار حُلو، عَلُوب، ١٣٨ - سُعْد مَأْكُول، زُلَم، حَبّ الزُّلَم، كِرْش Foxtail sedge, Mat sedge (E) حَبّ العَزيز

Earth almond, Edible cyperus (E) Souchet comestible, Abélésie, Amande de terre (F)

Erdmandel, Erdmandelzypergras (D) Cyperus esculentus (S)

نَبات مُعمَّر من فَصِيلَة السُّعْدِيّات. ريزومه قصير يُعطى رُؤودًا مُنتفِخة على شكل درنات بيضانية الشَّكْل. سوقُه جامدة تَعلو من ١٠ إلى ٤٠سم، مُثَلَّثة الزَّوايا، مَرْطاء، مالِسة، عديدة الأوراق القاعديّة، وهي أوراق أقصر من السّاق عادة، مُسطِّحة، جامِدة، مُلتفّة الحَوافي. الأوراق القُلافيّة مُنبسِطة، ٣ إلى ٦، الدُّنيا منها أطول من الأَنثِيل (١١) Anthèle. الأنشل تسبط أو مُركّب، مُرتخ، ٥ إلى ١٠ شعاعات مُغَلَّفة القاعدة بشبه ورقة أنبوبية. السَّنابل بَيضيّة عريضة، مُرتَخية، ذات ٥ إلى ١٥ سُنَسْلة مُسَاعِدة نوعًا ما، خَطَّتَة، مُنفرجة وذات ٨ إلى ١٦ زهرة. عَصْفات غِشائية، كشفة التَّراكُ، سُباعية العُروق، مُصفَرّة، ذَهبيّة أو

الخصائص والاستعمال - الدَّرنات

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

وأخف وَزنًا، وأفتح لَونًا بشكل عامّ، سك ا ولكنّها مُسْودَّة اللَّون في الإشارات الطُّوليّة.

> الرّائحة والطَّعم مُماثِلان لرائحة وطعم الجَلَبَة الدَّرنيّة.

> يُستعمَل راتنج سَقَمُونيا المَكْسِيك في بيلولات لانْسِيرُو. كودكس ١٩٤٩.

۱٤٠ - سكابيُوزَه فِلَسْطِينِيَّة، فَاقُوع Palestine scabious (E) فِلَسْطينيِّ Scabieuse de Palestine (F)

Palästina skabiose (D) Scabiosa palaestina (S)

نَبات حَولي من فَصِيلَة الدِّبْسَاسِيَّات زَغَبِيّ نوعًا ما يَعلو من ٢٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه مُنتصبة، فُروعه مُنتصبة مُنبسطة. أوراقه مُختلِفة الأشكال، أوراق قاعدة السّاق تكون كاملة في الغالب، مُفَرَّضة أو مُسنَّنة الحافة، وحتى ريشيَّة التَّقسيم أحيانًا، الأوراق العُليا، خاصة عند التحام الفُروع، تَتَكوَّن من سُبور مُختلفة الطّول، مُستمرطة. السُّوَيقات طويلة وغليظة نسبيًا. رُؤيسات ذات قُنابات مُتطاولة سِنانيّة، زُغَبيّة القاعدة بنوع خاصّ. التّاج بارز الإشعاع بنوع خاص ، مُصفر اللُّون الأبيض أو ليلكي اللُّون المُتَورِّد. الرُّؤيسات من ١,٥ إلى ٢سم. القُلَيْفَة كثيفة الكساء الوَبْريّ الأبيض، سُرَّتُها أقصر مرَّتين من الحُفَيْرات. زائدة تاجيّة مأكولة دَسِمة مُستحبَّة الطَّعم، زَيتها جميل اللَّون الأصفر الذَّهبيّ، مأكول. المِصريُّون يَزرعون لهذا النَّوع بمساحات كبيرة كمادّة غِذائيّة؛ يُعطون منه المُرْضِعات لزيادة حَليبهنّ. قديمًا كان يُباع في شوارع باريس شراب يُحضَّر من دَرَنات لهذا النَّوع ويَدْعونه Chuffa، على غِرار شراب السُّوس. أعيد تَسجيلُه في غِرار شراب السُّوس. أعيد تَسجيلُه في الفَرْ ماكوبيا الفَرْ نسبة عام ١٩٧٦.

۱۳۹ سَقَمُونِيا الْمَكْسِيك، جَلَبة أُوْرِيْزَابا Scammony of Mexico (E) Scammonée du Mexique, Jalap d'Orizaba (F) Ipomœa orizabensis (S)

يَجب عدم الخلط بين هذه السَّقَمونيا وسَقمونيا حَلَب. أعيد تَسجيلُها في الإصدار التَّاسع للفَرْماكوبيا الفَرَنسيَّة عام ١٩٧٤.

يَتمثّل هذا العَقّار في جُذور دَرَنيّة كبيرة الحجم، مُقطَّعة إمّا إلى قِطع طُوليّة رَماديّة أو بُنِّيّة اللَّون الرَّماديّ، مع أثلام عرضيَّة وعميقة، وإمّا إلى شرحات قُطرها ٥ إلى ١٠سم وسماكتها ١ إلى ٥سم، تُبْرِز مَناطق مُتراكِزة مُتَقلِّصة بسبب التَّجفيف، ومُتقاطِعة بخطوط شُعاعيّة أفتح لونًا؛ المَقْطَع واضح، مُتماسيك ويُظهِر عددًا من التَّنقيطات السَّوداء الرّاتنجيّة.

الدَّرنات الصَّغيرة الكاملة تُشبه دَرنات الجَلَبَة المَخْزَنيّة، ولكنَّها أكثر منها استطالة، مِغْزَليّة الشَّكْل، أكثر تَجعيدًا

<sup>(</sup>١) كلِّ التَّسميات للمؤلِّف ما عدا التَّسمية اللَّاتينيَّة.

س ل ق

واسعة، مُنبسِطة، ذات ٣٠ إلى ٣٥ عِرقًا، تَتخطّاها أم لا أسنان الكأس.

مُلاحَظة - من الأنواع اللّبنانيّة المُنتشِرة الّتي تُعرَف باسم فاقُوع في الجنوب، مِغْثَريَّة يَرغبها النَّحل. مُركَباته وخصائصه مجهولة، ومن المُفيد تحليله المِخبريّ أو أقلّه تَجربته في نِطاق الخصائص الواردة لأنواع السكابِيُوْزَة الأخرى، أخصها Scabiosa succisa. الأسماء المُقترَحة أعلاه هي ترجمة الاسم العلميّ.

Beet (E) مِلْق، سَلْق كبير الثَّمَر - ١٤١ Bette à gros fruits, Blette, Poirée (F) Beete (D)

Beta macrocarpa, Beta bourgæi (S)

نَبات زِراعي طبِّي من فَصِيلَة السَّرمَقِيّات، مُحول أو حَوْلِيّ. جَذرُه هَزيل، سُوقُه مُنتصِبة أو مُتدلِّية. أوراقُه السُّفلي ضُمَّيَّة التَّجميع، صغيرة القدّ، مُتطاوِلة، مِلْوقيّة، مُنفرِجة، تَخفُ إلى عُنُق، الأوراق الباقية مُعَيَّنِيَّة إلى سِنانيّة. أزهارُه مُخضرَّة أو مُحمرَّة اللَّون، لاطئة، تَجيع في جَثُواتٍ صغيرة إبطيّة الارتكاز تُشكّل سُنبُلة طويلة مُرتَخية. الثَّمرة تُبيرة، تُشكّل أسطوانةً كأسيّة الشَّكل الله المُتلفة ال

الخصائص والاستعمال - أوراقُه شائعة الاستهلاك الغذائي التُونسي. مسحوقُها يَشتهِر على أنّه رَقوء يُوقِف النّزيف في الاستعمال الخارجيّ. أمّا

نَقيع الأوراق المَغليَّة فَيُنصَح به في بَعض المناطق التُّونسيَّة للقضاء على الأوديمات. سَلْق: الاسم التونسيّ.

# ١٤٢ - سُمّاق ثُلاثِيّ الوَرَق، سُمّاق شائك (١)

Three foliate sumach, Spiny sumach (E) Sumac trifolié, Sumac épineux (F) Dreilaubsumach, Dornigesumach (D) Rhus tripartita, Rhamnus tripartita, Rhus oxyacantha (S)

السُّمّاق جنس شُجَيرات من فَصِيلَة البُطْمِيَّات، أوراقُها مُتبادَلة، ثُلاثيَّة أو عَديدة الوُريقات. أزهارُها خُنثويَة أو ضُرِيَّة أو ثُنائيَّة المَسْكِن. مُفتاح مَعرفتها في لُبنان كما يلي: أوراق مُتعدِّدة الوُريقات المُفردة التَّركيب الرِّيشيّ. الشَّجَرة غير شائكة تمامًا، مُخمليّة الكساء الزَّغبيّ. أزهارها ضُرِّيَّة. ثمرتها مُخمليّة أوراق مُخمليّة بُلائيّة الوُريقات. الشَّجَرة شائكة بكامل ثُلائيّة الوُريقات. الشَّجَرة شائكة بكامل أقسامها، أزهارها ثُنائيّة المَسْكِن. الثَّمرة أقسامها، أزهارها ثُنائيّة المَسْكِن. الثَّمرة مُرْطاء ولامِعة: . Rhus tripartita D.C.

السُّمَاق الشَّائك شُجيرة لُبنانيَّة فَرْعاء جدًّا، داغِلة، تَعلو حَوالى المترين. فروعها مُتَلَوِّية وشائكة. أوراقُها مَرْطاء، ثُلاثيَّة التَّركيب، قصيرة الأعناق. الوُرَيقات لاطئة، مُزَوَّاة القاعدة، بيضاويّة الشَّكْل المُنقلِب، مُفصَّصة الرِّأس. أزهارها ثُنائيّة المَسْكِن، في عُنقود هاميّ قصير. الثِّمار كُرَويّة

<sup>(</sup>١) كلّ التَّسميات للمُؤلِّف ما عدا التَّسميات اللاتينيَّة.

تركيبها الكيميائي C<sub>15</sub>H<sub>27</sub>. C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(OH)<sub>2</sub> س م س تُستخرَج كذلك من عُصارة شَجرة بَلاذُر الشُّرق اللَّيْنة. زَبت مُنَفِّط مُصفر اللَّون.

الخصائص - مُهَيِّج سام، مُنفِّط.

الاستعمال - مُستخلَص، كُحولَتور، مَسحوق. نُصِح به ضِدّ القُوبات والشَّلَل و السَّلَعَةِ .

طريقة الاستعمال - نُصح بالمُستخلَص ضد السَّلَعَة والشَّلل وضد سَلَس البول اللّيلي. ويُعطى من مسحوق الأوراق ۰,۰٥ إلى ٠,٢٥ غرام تُكرَّر حتّى الإحساس بحِكّة أو وَخْز أو نَخْز أو تَنمُّل ما. قليل الاستعمال. أَدْخَل أَلْدَرْسُن هٰذَا السُّمَّاقِ إلى الخزانة الطَّبِّيَّة عام ١٩٧٤. وأعيد إدراجه في الفَرْ ماكوبيا الفرنسيّة الحديثة عام ١٩٧٥.

١٤٤ - سِمْسِم، سَمْسَق، جَلْجان، جُلْجُلان Sesame, Gingelly, Gingili (E) Sésame, Jugeoline (F) Sesam, Ollinge (D) Sesamum indicum, Sesamum orientale, Sesamum radiatum (S)

نَبات عُشبيّ حَوليّ من فَصِيلَة السَّمْسَقِيّات يَعلو من ٧٠ إلى ١٥٠سم. جذوره وَتَديّة، سُوقه أسْطوانيّة، مُثلّمة، مُنتصِبة، فَرعاء. أوراقه مُعنَّقة، مُتقابلة، إهليلجية. نصلها مُتَموِّج الصَّفحة غائر العُروق. أزهاره إبطية الارتكاز فردية، بيضاء ومُوشِّحة غالبًا بالأحمر أو الأصفر. ثماره جراء رباعية المصاريع

ولامعة. يُزهر من تشرين الأوّل حتّي آذار.

مُلاحَظة - السُّمَاقِ الشَّائكِ غير وارد في المراجع المُختصَّة، نُورده لَعلّ التَّحليل المخبريّ يكشف يَومًا مُركّباته وخصائصه المُحتملَة، والَّتي قد لا تَختلف عن مُرَكِّبات الأنواع الأخرى، خاصة بما يتعلّق بالمواد الدّباعية العَفْصِيّة، كما قد يكشف عن سُمّيّة هذا النَّات أو عَدَمها.

١٤٣ - سُمّاق مُتَجَذِّر السّاق، سُمّاق

Radicant sumac, Venomous sumach (E) Sumac radicant, Sumac vénéneux (F) Wurzelstielsumach, Giftsumach (D) Rhus radicans (S)

السُّمَّاقِ السَّامِّ يَحصل من نَوعين مُتقاربين من فَصِيلَة البُطْمِيَّات: السُّمَّاق المُتَجذِّر السَّاق والسُّمَّاق الحُجَاليّ؛ وهُما من نباتات الأميركتين ولكنّهما يُزرعان في أوروبا. أوراق السُّمّاق السّام، وهي القِسْم المُستعمَل، ثُلاثيّة التَّركيب، مُعنَّقة الوُريقات، كاملة الحَوافي، مَرْطاء الصَّفحتين. وهي ذات حُموزة تكفى معها مُلامستها فقط حتى تُهيِّج البَشَرة بشكل عنيف وتُحدِث عليها النُّفْخات والنُّفاطات. وتفقد الأوراق الكثير من فعالبتها إذا جُفَّفت.

المُركِّبات - تَدين الأوراق بسُمِّيتها إلى وجود الكَرْدُول Cardol، وهو مادّة

<sup>(</sup>١) كلِّ التَّسميات للمُؤلِّف ما عدا التَّسمية اللاتينيَّة.

س م س

تَحتوي حَوالى ٢٠٠ بزرة. البُزور صغيرة القدّ، مُفَلْطَحة، إهليلجيّة، لَونها يَختلف مع الضَّرب من الأبيض إلى التِّبْنيّ والأصفر والأحمر والأسمر والأسود (في الهند).

المُركِّبات والخصائص - أوراق السِّمْسِم لُعَابِيَة. البُزور تَحتوي على ١٥ إلى ٢٠٪ هَيُولِيَّات، ١٨٪ نَشاء، ٤٠ إلى ٥٠٪ زَيت وافر، نِصف مُجَفِّف يُستعمَل في عددٍ كبيرٍ من المُستحضَرات المَنزلِيَّة. ويُستعمَل الزَّيت كمُسهِّل في أمريكا الشَّماليّة.

يَكُونَ الزَّيتَ الَّذِي يَنتج عن العَصرِ الأُوَّلِ ذَهبيِّ اللَّونَ الأَصفر، مع طعم خفيف كطعم بزر القنَّبِ الَّذِي يَستهوي الشَّرقيِّين. يَجمد عند ٤ درجات تحت الصَّفر.

يَحتوي زَيت السِّمسِم حَوالَى ٨٥٪ غليسريدات حوامِض دُهنيّة سائلة، مِثال: لينولاييك، أولاييك؛ ١٥٪ غليسريدات حوامِض دُهنيّة صُلْبَة، مِثال: پَلْميتيك، ستياريك، أراشِيديك؛ يَتم البَحْث عن زَيت السِّمْسِم في المَرْغَرين وفي بَقيَّة الزُّيوت الغِذائيَّة عن طريق تَفاعُلات مُلوَّنة مُختلِفة.

مئة كيلو من حَبّ السِّمْسِم تَحوي ٤٠ كيلو من السَّيْرَج المأكول، ١٢ كيلو من الزَّيت الصِّناعي، ٤٨ كيلو من الكُسْب. السِّيْرَج أو الشَّيْرَج هو زَيت السِّمْسِم يُستخلص من البُزور بَعد نَقْعها بالماء وتَصفيتها وتَحميصها وطَحنها لإنتاج

الطَّحينة ثمَّ تَرسيب الطَّحينة لفرز السَّيْرَجِ عن الكُسْب.

الاستعمال - اقترح استعمال زيت السَّمْسِم كبديل لزيت الزَّيتون في المُستحضرات الصَّيدليّة؛ وهو أقل عُرضةً للجمود والزَّنخ. مُسجَّل في الفَرْمَاكوبيا الألمانيّة مُنذ العام ١٩١٠، وفي الفَرْماكوبيا السّويسريّة. يُصنَع منه مَرْهم شَمْعيّ: زَيت سِمْسِم ١٢٠٠غ، شمع أبيض ٣٥٠غ، ماء ٧٥٠غ. ولكنّه يُكسِب اللَّرْقات قِوامًا كثير الرَّخاوَة.

تُستعمَل بُزور السِّمْسِم في لُبنان ومِصر وسوريا وتركيا كما هي أو مَدقوقة في أكثر الأحيان في صِناعة الحَلَاوة الّتي قام بتحليلها Guigues عام ١٩٠٤، ومن ثمّ حَلَّلها بَعد ذلك أزاديان.

زُيوت السِّمْسِم المُتَدَنِّية الجُودة صِناعيّة تَصلح لمعامل الصّابون وكمبيدة للحشرات، إلخ؛ أمّا الكُسْب فيُعطى عَلَفً للماشية أو سمادًا للتُّربة.

### ١٤٥ - سَمَن كُونْترا(١)

Semen-contra, Semencontre, Barbotine, Semencine, Graine de Zédoaire, Semence sainte, Graine d'Alger (F) Artemisia species (S)

السَّمَن كُونْترا هي رُؤيسات زَهريَّة غير مُتَفتِّحة من الأرْطَماسيا Artemisia Cina Berg. والأرْطَماسيا البَحريّة الشَّحيحة الزَّهر<sup>(۱)</sup>، وهي نَباتات من فَصِيلَة

<sup>(</sup>١) التَّسمية للعؤلُّف.

المُركَّبات تَنبت في إيران وأفغانستان وتركستان وشمال الهند.

يَتَأَلَّفُ السَّمَن كُونْترا، كما تَعرضه الأسواق، من رُؤيسات زَهريّة صغيرة بَيضانيّة الشَّكُل طولها ٣ملم وعَرضها ملم واحد، تَختلِط إلى عدد كبير من السُّويقات الصَّغيرة المَرْطاء الّتي يَبلغ طولها ٢ إلى ٤ملم. قُلافَتها مُؤلَّفة من حَوالى ١٢ قُنابَة مُزَوْرَقة الظَّهر ومُزوَّدة بعدد كبير من الأوبار الغارزة المُتعددة بعدد كبير من الأوبار الغارزة المُتعددة الخلايا وبزَغَب عَنكبُوتيّ خفيف. الخلايا وبزَغَب عَنكبُوتيّ خفيف. تحضُن القُلافة ٣ إلى ٥ زَهرات أنبوبيّة، تأجُها مُقسَّم الرّأس إلى ٥ أسنان قصيرة أنبوبها المزموم مُغطَّى بأوبار غديّة أنبوبها المزموم مُغطَّى بأوبار غديّة مُشابهة لأوبار القُنابات.

المادَّة الطَّازة مُصفرَّة اللَّون الأخضر اللَّذي يَميل إلى البُنِّي مع الوَقت. رائحتها عِطريّة قَويّة جدًّا ومُيَنْسَنَة. مَسحوقها مُخضَرّ اللَّون الأصفر.

المُركِّبات - يَحتوي السَّمَن كُونْترا على ٢ إلى ٣٪ زَيت طيّار خفيف اللَّون الأصفر، طارد للدّود، مَوادّ راتِنجيّة، الأصفر، طارد للدّود، مَوادّ راتِنجيّة، سَنْتُونِيْن ، ٢٠٥، من ١,٢٠ إلى ٣,١٥٪، يَنصهر عند ١٧٠ سخ، وعلى أرطامِيزِيْن، وهو سيتون ١٧٠ سخ، إذًا يَنصهر عند ٢٠٢ إلى ٣٠٠ سخ، إذًا بحرارة أعلى من الحرارة الّتي يَنصهر فيها السَّنتُونِيْن.

في الأسواق عِدَّة أنواع، سَمَن كُونْترا حَلَب، سَمَن كُونْترا الشَّرق، سَمَن كُونْترا طَشْقَنْد، سَمَن كُونْترا البَرْبَر. الصِّنف

الأوَّل هو الأكثر جودة، وهو أَمْرَط سم ن ومُخضَرِّ اللَّون، بينما الصِّنف الأخير هو زَغِب، مُرمَدِّ اللَّون ومَلي، بالعيدان الصَّغيرة لا يَحتوي على سَنْتُونِين.

إنّ الأصناف المَخْزَنِيّة حسب دستور ١٩٦٥ هي الّتي تَحتوي على ١٩٦٠٪ على ١٩٦٠ من السَّنْتُونِين. هناك أنواع وضروب أخرى من الأرْطَماسيا تحتوي أيضًا على السَّنْتونين، مِثال:

Artemisia brevifolia wall. Artemisia gallica willd. Artemisia maritima L. Artemisia mexicana Artemisia neo-mexicana

إنّ السَّنْتُونين يكون في لهذه الأنواع بنسبِ أقلّ ممّا تَتَطلَّبه الفَرْ ماكوبيات.

الاستعمال - يقول كُوبَرْت إنّ مَزيج الدُّهْن والسَّنْتُونين الموجود في النَّبات بشكلٍ طبيعيَّ هو أقلّ سُمِّيَة بكثير مِمّا لو أعطي العُنصران كلُّ على حِدة. حَصيلة ذلك أنّ مُستحضرَات السَّمَن كُونْترا هي أفْعَل من السَّنْتونين.

يَنصح پُوشّيه بعدم استعمال الجواهر الفَعّالة في كافّة النّباتات الطّاردة للدّود إطلاقًا، ولكنّه يَنصح باستعمال النّبات المُراد بذاته.

تُستعمَل السَّمَن كُونْترا لطرد الأَفْصُورات الخُرْطُوانيّة الشَّكْل، قَبْل أو بنفس الوقت الذي يُعطى فيه مُسهِّل قَويّ غالبًا ما يكون الكالومَل. لم يَعد مُستعمَلًا.

طريقة الاستعمال - (لذكرى

التاريخ). يُعطى السَّمَن كُونْترا في نُقاعة من عشر غرامات في ليتر ماءٍ غالٍ، وفي شَراب سُكَّريّ، وفي بسكويت، وفي أقراص مُلبَّسة (سَمَن كُونْترا مُلبَّس)، أو في مَسحوق. مقادير المَسحوق الاعتياديّة والملالغين) وإلى ١٠ غرامات لجُرعة واحدة ولكلّ ٢٢ ساعة؛ الأولاد، من صفر شهر إلى ٣٠ شهرًا ومن ٣٠ شهرًا إلى ١٥ سنة ن من العُمر. نُكرِّر ذلك يَومين أو ثلاثة أيّام العُمر. نُكرِّر ذلك يَومين أو ثلاثة أيّام مشروبات مُحَمَّضة لتلافي امتصاص مشروبات مُحَمَّضة لتلافي امتصاص السَّنتُ ننن.

١٤٦ - سَنْدَرُوْس رُباعِيّ المَصارِيْع، تُوْيَا مَفْصِلِيّة (١)، تُوْيا عِقْدِيّة

Sandarach tree (E)
Tetraclinis articulé, Thuya arcticulé,
Cyprès à sandaraque (F)
Sandarachbaum (D)

Tetraclinis articulata, Callitris quadrivalvis, Thuya articulata (S)

شَجَرة صغيرة من فَصِيلَة السَّرُويَّات تَعلو نحو ٦ أمتار؛ وهي من أكثر أنواع جنسها زِراعة. أغصانُها ثُنائيّة التَّفرُع، مفصليّة، أوراقها دائمة، خَطيَّة الشَّكل، دَوَّاريّة التَّجميع عند الأشجار الفتيّة، ومن ثُمّ مُتقابلة، تُصبح عندها حَرْشَفيّة الشَّكل وجلديّة النِّصال. أزهارها وحيدة المَسكِن. أكرازُها الأنثى ذات حَراشف

لِيفيّة، مِصراعيّة. البزور صغيرة. الخَشب جيِّد الصِّنف. لحاؤها غنيّ بالعَفْص، وهي من الأنواع الّتي تُنتِج زُيوتًا وراتِنجًا يُدعى سَنْدَرَك. مهدها الجزائر ومراكش.

## ۱٤۷ - سِنْدِيان (المُركِّبات والاستعمال) Chêne (composants et usage) (F)

إنّ قِشرة فُروع السِّنديان الفَتيَّة هي قابضة مُميَّزة جدًّا لِغِناها بالعَفْص. وهي تَحتوى بالإضافة إلى ذلك على مَادّة مُلوِّنة حمراء، ولُعاب، وسُكُر، وڭورْسىت C<sub>6</sub>H<sub>7</sub>(OH)، وحامض غَلِّيك، حامِض إلَّاجِيك، القليل من الرّاتِنج، أوقصالات الكلسيوم، إلخ. وهي شائعة الاستعمال. فإذا سُحِقت بشكل خَشِن يُطلَق عليها اسم Tan وتُستخدَم في دِباغة الجُلود. أمَّا العَفْص الموجود فيها فلا يُعطى حامِض غَلِّيك بالتَّأكْسُد، وهو يَختلِّف عن عَفْص الجَوْزة المَرَضِيّة الذي يَتَفكّك راسبُه مع الجيلاتين بسهولة. إنَّ عَفْص القِشرة (أي الحامض الكورسيتانيك) هو الذي يُعطى مُرَكِّبًا قابلًا لإنتاج الجلد الجَيِّد. مُسحوق القِشرة Fleur de tan غالبًا ما كان يُستعمل في الطُّبِّ في نَقيع من ٥٠ غرامًا لكلِّ ليتر ماء، يُستعمَل في غَرْغَرات وحُقَن شرجتة، كما يُمكن استعماله من الدّاخل. ونُصِح بنُقاعة القُشور في ضمادات وفي حُقن، وحُضِّر منها مُستخلَص.

<sup>(</sup>١) التَّسميتان العربيتان الأولى والثانية والتَّسمية الفرنسيّة الأولى للمُؤلِّف.

١,٨ سم كحدٍّ أقصى، يَتساقط في تشرين سن د

أمّا الشّمرة إذا حُمّصَت وطُحِنت فَتُصبح قَهوة البَلُوط. ويُفَضَّل في هذا المحال بَلُوط السّنديان الحُلو المَذاق. إنّها قَهوة نافعة للمَعِدة وليست مُهيَّجة كالقَهْوة الحَقيقيّة. والبَلُوطة تَحتوي على كالقَهْوة الحَقيقيّة. والبَلُوطة تَحتوي على ٣٨٪ نشاء، ٩٪ عَفْص، ٤٠٪ صَمْغ، ٢٥٪ راتِنج، ٢٥٪ مُستخلص مُرّ، ٤٠٪ رنت دسم، وبَقايا أخرى. مُجِّد ١٤٠٪ لَيْ وبَقايا أخرى. مُجِّد البَلُوط ضدّ السَّلَعَة. أقماعُه قابضة البَلُوط بالبَلُوط اللَّم العض بهيدرولة البَلُوط الكُحوليّة في الأمراض الكَبِديّة. ويُقال إنّ الأتراك يَطمُرون البَلُوط بالتُراب على يُضيفُونَه إلى طَعام يُدعى Racahout أو على يُضيفُونَه إلى طَعام أَدر يُدعى Palamoud.

أعيد تَسجيل هذا النَّوع في الإصدار التَّاسع للفَرْماكوبيا الفرنسيّة عام ١٩٧٥.

الأوّل. إنتاجُها وافر بشكل عامّ. أوراقُها مُتفاوتة القَدّ، طولُها من ٣,٧ إلى

٥,٧سم، حَوافيها مالِسة أو شائكة

الأسنان. أوراقها الفَتيَّة تَكْتسى بهُلْب

يَختفي فيما بعد عن الصَّفَحات العُليا

التي تُصبح قاتمة اللُّون الأخضر

اللَّامع. لحاؤها أسود اللُّون تَقريبًا،

يَتَفَلَّع في صَفائح، غَني بالعَفْص الجيِّد

الصِّنف. البَلُّوطَة قصيرة السُّويقة،

قِمعُها نِصف كُرُوي، حَراشفه الصقة

تمامًا، لِنْدِيَّة، مُرمدَّة اللَّون.

Spanish oak (E) (۱۱ مِنْدِیان إِسْبانی – ۱۶۹ Chêne d'Espagne (F) Spanischereiche (D) Quercus hispanica (S)

كان بَلُّوطُها مَوضِع تجارة كُبرى في مَدينة أشبيليا، وهو يُؤكّل نَيئًا أو مَطبوخًا.

١٥٠ - سِنْدِيان صِباغِيّ

Tinctorial oak (E)<sup>(Y)</sup>
Chêne quercitron, Quercitron, Chêne noir (F)
Farbereiche (D)<sup>(Y)</sup>
Quercus tinctoria, Quercus velutina (S)

شَجَرة كَبيرة تَعلو من ٢٥ إلى ٣٠

(٢) التَّسمية للمُؤلِّف.

۱۶۸- سِنْدِيان أَخْضَر، سِنْدِي، دَرَّام، بَلُّوط أَخْضَر

Evergreen oak, Holly oak, Holm oak, Belote oak (E)

Chêne vert, Yeuse, Ballote (F) Stecheiche (D)

Quercus ilex, Quercus ballota (S)

شَجَرة تَعلو حتّى ٢٨ مترًا، مَهدها غرب البحر المُتوسِّط وأفريقيا الشّماليّة وسَواحل الأطلنتيك. أوراقُها دائمة، جَميلة المظهر، تَعرُض بقدر ما تَعلو، كثيفة الإيراق القاتم اللَّون. خَشبُها صُلْب، لا يَتلف، واسع الاستعمال الصّناعيّ ويُعطي فحمًا مُمتازًا. أزهارها مع الأوراق الفتيَّة في حزيران. بَلُوطها مأكول، حُلو الممذاق، يَطول حوالي

<sup>(</sup>١) كلّ التَّسميات للمؤلّف ما عدا التّسمية اللاتينيّة.

مترًا. أوراقُها مُعبلَة، كَبيرة، تُشبه أوراق السِّنديان الأحمر، طولُها ١٥ إلى ٢٠سم وعرضُها ١٢ إلى ١٥سم، أضْواجُها قليلة العُمُق، فُصوصها مُنفرجة، قاتمة اللَّون الأخضر على صَفْحتِها العُليا مع بَعض الأوبار المُتفرِّقة، باهِتة اللَّون على صَفحتها السُّفلي المَكسُوَّة بزَغَب قُطنيّ أشقر اللُّون يَختفي بالفَرْك؛ لِونُها الخَريفيّ إلى الأحمر البُنِّيّ. بَلُّوطتها كبيرة، بَيضانيّة؛ قِمعُها يُغطِّي نِصفَها، حَراشِفُه كامِدة اللَّون المُرمَد، لاصِقة في القاعدة، حُرَّة على الأطراف. قِشرة الشَّجَرة مُسودَّة اللَّون الخارجي، يُرتقاليّة اللُّون الأصفر من الدَّاخل، غَنتُه بالعَفْص، وبمادَّة صِباغيّة صفراء تُدعي Quercitron وهي هيتروسيد يُعطى إذا انْشَطَ رامْنُوز وكُورْسَاتُول.

اه منظ دَمّاع، سَيال، أَقاسيا دَمّاعة – ١٥١ Shittah tree, Shittim wood, Thirsty thorn (E)

Acacia seyal, Arbre à gomme, Delile (F) Seyal akazie (D)

Acacia seyal (S)

شَجَرة من سبط السَّنْطِيَّات وفَصِيلة القَرْنِيَّات، بَرِّيَّة وزراعِيّة، كثيرة العُصارة الصَّمْغِيّة. صَمْغُها يُعتبر دُون صَمْغ القُرْظ.

Acacia gummifera (S)

شَجَرة من فَصِيلة القَرْنِيَّات كثيرة الشَّماليّة الشَّماليّة وقد انتشرت في جميع الأقطار الحارّة. يُستخرَج منها صَمْع السَّنْط الطَّيِّب الرَّائحة الكثير الاستعمال.

۱۵۳ - سَنْط عَسَليّ، أقاسيا عَسَلِيَّة، ظُبَّة Acacia mellifère, Mimosa mellifère (F) Acacia mellifera (S)

شَجَرة بَرِّيَّة وتَزيينيّة من فَصِيلة القَرْنِيَّات جميلة الشَّكل تَعلو من ٣ إلى ٥ أمتار. مَهدُها اليَمَن وتهام بحر القلزم. أوراقُها عابلة مُركَّبة. أزهارها عُنقوديَّة التَّجميع، عَسليَّة اللَّون. صَمْعُها قليل الغَزارة جيِّد الصِّنف. تَحتاج هذه الشَّجرة، إذا زُرعت في تُربة رَمليَّة إلى حوالى ٤٠٠ملم من الأمطار السَّنويّة كحد أدنى.

العَنْبَر، مِيْطُ العَنْبَر، أَقَاسِيا العَنْبَر، مِيْمُوزا Cassia, Popinac, Sponge tree (E) العَنْبَر Acacia farnèse, Mimosa farnèse, Cassier, Cassie (F)

Antillen-akazie, Schwammbaum (D) Acacia farnesiana, Mimosa farnesiana (S)

شَجَرة أو شُجيرة من سبط السَّنْطِيَّات وفَصِيلَة القَرْنِيَّات. فروعُها مُنبسِطة،

١٥٥ - سُوْرَنْجان الخَريْف، خَمَل، سود لَحْلَاح، عَكْنَة، قاتِل الْكَلْب، سِرَاج الغُوْلَة الخَريْفِي

> Colchicum, Meadow saffron, Naked ladies, Autumn crocus, Purple crocus (E) Colchique d'automne, Narcisse d'automne, Safran des prés, Safran bâtard, Tue chien, Mort chien, Safran d'automne, Veillote, Veilleuse (F)

Herbstzeitlose, Motten safran (D) Colchicum autumnale (S)

عَرَفَ أَطبّاء الإغْريق السُّورَنْجان ليس كَسُمٍّ فحَسْب بل كمادَّة عِلاجيّة أيضًا وكان الطّبيب البيزنطيّ جاك بسيكريت قد استعملها للتَّداوي في أواسط القَرْن الخامس للميلاد. بَعد ذلك أُهمِل هذا العَقّار وغَمَره النِّسيان حتّى العام ١٧٦٣ عندما لَفَت ستورك الانتباه إليه من جديد. اسم السُّورَنْجان العِلميّ «كُولْشيكُم» Colchicum مَرَدُّه إلى بلاد الكُولْشِيد التي اشتَهرت بسُمُومها فيما مَضي، وكان السُّورَنْجان يَشيع في أرضها. القُدامي كانوا يستعملون البَصَل والزَّهْر والبُزُور؛ أمَّا اليوم فيَقتصِر استعماله الطُّبِّيّ على البُّزور فقط وذلك تَقَيُّدًا بِمُقرَّرات الاتِّفاق الدُّوَلِيِّ الذي تَمَّ في بروكسل.

البَصَلة الطَّازجة الغَضَّة تَحتوى على عُصارة لَبَنيّة، حامِزة الطّعم، ماسِطة وذات رائحة مُميَّزة، يَذهبُ التَّجفيف بقسم من خصائصها؛ لذلك يَنْصَح عددٌ كبيرٌ من الأطبّاء باستعمالها غَضّة.

مُتَلَوِّية، مَرطاء، غير مُنْتظَمة ومُتشابكة نوعًا ما. أغصانُها وأعناقُ الأوراق خَفيفة الزَّغب. أذناتُها شائِكة، صُلْبَة الرّأس الحادّ، طولها ١ إلى ٢سم. أوراقُها مُزدوجة التَّركيب الرِّيشيّ لها ٥ إلى ٨ أزواج من الرُّيّيشَات، وتَضمّ ١٠ - ١٥ - ٢٠ زُوجًا من الوُريقات الخَطَّيَّة القصيرة، طولها ٣-٤ ملم وعرضها ٣-٤ ملم. رؤوس فَرديّة، كبيرة، مُزنّدة، ضُمِّيَّة التَّجميع على إبْط الأوراق، غير مُتساويَة الزِّنادات. أزهارها ذَهَبيَّة اللَّون الأصفر، فَوّاحة العرف العِطري الشَّديد العُذوية. قرونُها أسطوانية، مُقوَّسة، مُنتظَمة، مُخَفَّفة الطَّرفين، تُزهر في لُبنان على مَدار السَّنة تقريبًا، ومن أيّار إلى تشرين الثّاني في مهدها الهند والمناطق الاستوائية.

كانت تُزرع في الماضي لإنتاج العِطْر المشهور المُسمى «Cassie». تُجمع أزهارها خلال شهر شباط في جبال الألب البَحريّة وفي إيطاليا ويُستخرَج منها الزَّيت الدُّهنيّ بمرثها في الدُّهن أو الشَّحم Enfleurage لأنَّها لا تَتَحمَّل الحرارة المُرتفِعة. ثمارها تُدعى بالیْبابُولا Balibabolahs ولها بعض الخصائص الطُّنَّة.

س. و د

الأزهار استُعمِلت أيضًا، ويَبدو أنّها أعْطَت نتائج جيّدة. الأوراق أيضًا تَتَحلّى ببعض النّشاط الطّبّيّ وهي سامّة للحَيوانات.

البُزور هي ثابِتة في تأثيرها الطبِّيّ أكثر من الأبْصال، كما أنّ تحديد زَمَن جَمعها المُلائمُ هو أسهل. وهي شِبه كُرَويَّة الشَّكْل، قاتمة اللَّون البُنِّيّ، قطرها حَوالى ٢ ملم، سَطحها مُنقَّط بغير انتظام، كامِد اللَّون، مُمَرَّك الطَّرف بزائدة لَحميّة (أريْل) قُرْب السُّرَّة. لَوزتُها مُرمَدَّة اللَّون؛ سُويداؤها صُلْبَة وقَرْنيّة المادة. رائحتُها مَعدومة؛ طَعمها مُرّ؛ مُسحوقُها جميل اللَّون البُنِيّ (كودكس).

المُركِّبات - يَدِين السُّورَنْجان بعمله العِلاجِيّ إلى قِلَوِيْد يُدعى كُولْشِيسِين حَصَل عليه كلَّ من بلاتييه وكافَنتُو عام ١٨٢٠ وخَلَطا بَينه وبين الڤيراترين، إلى أن حَدَّده نِهائيًّا كلَّ من جَايْجَر وهَسَ عام ١٨٣٣. عام ١٩٥٢ عَزَل منه بَلَّت هيتروسيدًا دعاه كُولْشِيكُوسيد بتركيب كيميائيّ ٢٤٥١ نِسبتُه في البُزور مُساوِية لنسبة الكُولْشِيسِين.

في البَصَلة، بالإضافة إلى النَّشا، يُوجد سُكَّاروز، صَمْغ، عَفْص، راتِنج. في البُزور يُوجد نَشاء (في الأريْل فقط)، سُكَّاروز، حامِض غَلِيك أي عَفْصِي، زَيت، ألورون. الكُولشِيسِين المَخْزَنيّ يَجب أن يَحتوي على ٠٥،٥٠٪ من القِلَوِيْدات العامّة كحد أَدْنى.

مُلاحظة - في لُبنان ثَمانية أنواع من

السُّوْرَنْجَانَ غير السُّورَنْجانَ الخريفيِّ عِلمًا بأنَّها تُزهِر كُلُّها في الخَريف، ابتداءً من تشرين الأوَّل وحتّى شباط للبَعض مِنها. وقد تكون سامّة أو أقلَّه خطِرَة كسُورَنْجانَ الخَريف بسبب الكولْشِيسِين، ومن هنا ضَرُورة دِراستها وتَحليلها المِخبريِّ للوقوف على مُحتوياتها الكيميائية.

١٥٦ - سُوْس غُدِّيّ (١)

Réglisse glanduleuse (F) Glycyrrhiza glabra var. glandulifera, Glycyrrhiza glandulifera (S)

نَبات مُعَمَّر من فَصِيلَة القَرْنِيَّات، مُتقارِب من النَّوع «سُوس بَنَفسجي»، مُتقارِب من النَّوع «سُوس بَنَفسجي»، مُرتفِع نوعًا ما يَعلو من ٢٠ إلى ٤٠سم. سُوقه وأوراقه زَغَبِيَّة غلِيَّة. الكأس غليَّة زَغِبَة، أسنانها خَطِّيَة، وهي بطول الأنبوب على الأقلّ. التّاج إلى اللَّون البَنفسجيّ. القُرون كثيفة التَّسلُّح نوعًا ما بزوائد مُسْتَشْوِكَة، تَحتوي عمومًا على ٢ بُرُور فقط.

نَبات مُقْتَحِم يُزهر من نَيسان إلى حُزيران ويرغب الأراضي الرَّطْبة أم لا، ولكن العميقة التُّربة منها. مجاله الجُغرافي في كافّة شرْق البَحر المُتوسِّط، ما عدا مِصْر وآسيا حتى الهند.

اطلُب دراسة السُّوس ومُركِّباته واستعماله (في المُعجَم الأوَّل، صفحة ٨٨، رقم ١٤١، وفي المُعجَم الرابع،

<sup>(</sup>١) التَّسميتان العربيَّة والفرنسيَّة للمؤلِّف.

صفحة ١١٩، رقم ١٤٩).

١٥٧ - سَوْلَع خَيْلِيّ، صَبْر الخَيْل (١) Aloès caballin (F) Aloe linguæformis (S)

يَقع هٰذا الصِّنْف من الصَّبْر في كُتَل مُسودّة اللّون، رائحتُه شِياطِيّة بَعضً الشّيء Empyreumatique، ويُصبح كالبَهار الأسود في الحرارة الصَّيفِيَّة العالية. إنَّ هٰذا الصَّبْر ليس بصنفِ مُحدَّد مُمَيَّز ولَكنَّه يَتألُّف من تَجميع الأصناف التِّجاريّة الأخرى. كما يَدّعى بَعضُ المُؤلِّفين أنَّه يُحَضَّر على السَّواحِل الإسْبانِيّة من مُختلف أنواع السَّوْلُع الّتي تَنبتُ فيها، وعلى الأخَصِّ النَّوعَ الَّذي ورد أعلاه. أمّا الاسم العِلميّ فمن اللّاتينيّة Caballus أي حصان.

مُلاحظة - تَتَحلَّى نَعضُ المَوادّ بخاصِّية فريدة إذ أنَّها تُقَوِّى عَمَل الألْوة المُسَهِّل من دون أن تكون تلك الخاصِّية لها أصْلًا. فهناك عَددٌ من المَواد المُرَّة التي تُمتلِك تلك المَيِّزة، منها بنوع أُخَصَّ سُولفات الكينين. مِثال ذلك فإنَّ مِقدار ٥,٠٣ غرام من الألْوَة إذا اشترك مع ٠,١٠ أو ٠,١٥ غرام من سُولفات الحَديد، تُعطى معًا من التّأثير بقدر ما يُعطى مقدار ٠,١٠ أو ٠,١٥ غرام من الألْوَة لوحدها؛ كما أنّ مَيْلَها والحالّة هٰذه إلى تَهْييج المَعْي المُستقيم يَخفّ بشكل بارز. وللألْوة عَملٌ فَريد آخر

#### (١) التَّسميتان العربيَّتان للمؤلِّف.

عُرف مُنذ أبعد الأزمِنة وهو أنّ مِقدارًا سول قَويًّا جدًّا مِنه وحتّى مُفرطًا لن يُحدِث تأثيرًا أكبر مِمّا قَد يُحدِثه المِقدار المُسَهِّل المُناسِب، وهو بالرُّغم من ذلك، وعلى عَكس بَقيَّة الموادّ الماسطة (أي المُسهِّلة القَويَّة) لن يُؤثِّر كمادّة سامّة.

#### ١٥٨ - سُولْفُون الشُولْمُوغْرا، شُو لُمُو سُو لُفُو ن Chaulmosulfone (F)

خَليط من دِيامِيدات الدِيسُولْفُون والحوامض المُحضّرة من زيت الشُولْمُوغْرا المُهَدْرَج. وهو مسحوق زبدي اللّون الأبيض، تَفِه الطّعم، خُفيف الرّائحة العِطريّة. يَنصهر عند ١٣٥-١٣٨ سغ (انصهاره فَوري). لا يَذُوبِ عَمليًّا في الماء البارد أو السّاخن. ذَوَّابِ جِدًّا في كحول ٩٥ درجة يَغلي، وفي ٥٠ جزءًا من الكحول ذاته بحرارة ٠٠°سغ. خفيف الذّوبان في الزُّيوت.

كان مُسجَّلًا في فَرْماكوبيا ١٩٥٨ ولكنّه أَهْمِل اليوم بَعد أن استُعمِل عِدَّة سَنوات لوحده أو بالاشتراك مع الإيزومازيد.

الاستعمال - في مُعالجة الإصابات ذات المبكروبات الفُطْريَّة Mycobactéries ، والبررص ، والسلل . وقد أُعطِي بالفَم في أقراص؛ وتَحْت البَشَرة؛ وضُمن العَضل في محلول زَيتي؛ وفي تَحاميل شَرْجيّة.

(راجع: زَيت الشُولْمُوغرا، المُعجَم الثاني، صفحة ١١٢، رقم ١٤٠).

س ي س ١٥٩ - سَيْسَم أَرُنْسِيُوم

Calf's snout, Lesser snapdragon (E)
Muflier oronce, Antirrhine, Tête-demort (F)
Kleines löwenmaul (D)
Antirrhinum orontium (S)

نَبات حَولي من فَصِيلَة الخَنازِيرِيَّات ساقُه مُنتصِبة، بسيطة أو خفيفة التَّفرُع تعلو من ٢٠ إلى ٥٠سم، أوراقُه قصيرة العُنُق، مُتطاولة إلى سِنانيّة خطيّة. أزهاره فَرديّة التَّجميع، إبطيّة الارتكاز، تُشبه رأس الكَبْش، شبه لاطئة، تُشكِّل عُنقودًا سُنبليّ الشَّكْل المُتقَطِّع. فُصوص الكأس خَطيّة، وهي بطول التّاج أو أطول؛ التّاج أرجُوانِيّ بطول التّاج أو أطول؛ التّاج أرجُوانِيّ الصّبغة يَبلغ نَحو السَّنتمتر الواحد. وذُكِر أنّ لَونه إلى الورديّ المُوشَّح بالأصفر. الثَّمرة عُلَيْبَة زَغِبَة، بَيضاوِيّة الشَّكْل.

## ١٦٠ - سَيْسَم هَجيْن (١)

Faux muflier, Kickxie bätarde (F) Kickxia spuria, Antirrhinum spurium, Linaria spuria (S)

نَبات حَولي من فَصِيلَة الخَنازِيرِيَّات قليل الوَبْر، مُتفرِّع القاعدة، فروعه نائمة، غير مُتفرِّعة بدورها عمومًا. أوراقُه مُتبادَلة، غير رمحيّة القاعدة، قصيرة العُنق، دائريّة الشَّكل البيضويّ، مُنفرِجة، كاملة أو مُفَرَّضة مُسنَّنة الحافة، طول السُّفلي منها ٢سم.

الأوراق الزَّهريّة أصغر، مُستدِقًة الطُّول، الطَّرَف. زُنيدات إبطيّة مُختلِفة الطُّول، خَيطيّة الشَّكل، مُنبسِطة. فُصوص الكأس عريضة القاعدة. التّاج أصفر، شفته العُليا إلى اللَّون البَنفْسجيّ ومهماز مَعكوف إلى نِصف دائرة، طوله طول النَّصْل. النَّمرة عُلَيْبة مَرطاء، البُزور مَكسوَّة بحُفَيْرات مَلْوية إلى الدّاخل. ازهراره من حُزيران إلى كانون الأول، في الأراضي الرَّمليّة بنوع خاص.

الخصائص والاستعمال - النّوعان أعلاه لُبنانيّان، وهما من الأنواع التي تَذكرها المُؤلّفات الطّبّيّة المُتخصّصة، ولكن من دون مُواصفات ولا تحديد للخصائص الطّبيّة. الأوّل هو نَبات سام (دورڤو). وجاء عنه في «الموسوعة في علوم الطّبيعة» أنّ أزهاره تَحوي بعض المَنافع الطّبيعة» أنّ أزهاره تَحوي بعض المَنافع الطّبيعة» وتُوقِف الإسهال.

مُلاحَظة - الكلمة اللاتينية Spurius معناها هجين أو غَلط.

<sup>(</sup>١) كلِّ التُّسميات للمؤلِّف ما عدا التَّسميات اللاتينيَّة.

الاستعمال - إسهال، بَشَرة، قُروح، مَغْص، قُوْلَنْج، فُوَاق أي حازُوقَة.

طريقة الاستعمال - في مُعالجة الإسهال يُؤخِّذ فِنجان في اليوم من نَقيع ٢٠ غرام نَبات مُجفَّف في ليتر ماء يُغلى ٥ دقائق ويُغطّى عشرة. أمّا لتحضير أقنعة مُجدِّدة لشباب البَشرة فنضع طبقة من أوراق النَّمات الغَضَّة المَدقوقة، نحتفظ بالقناع ساعتين على الأقلِّ. على القُروح نَضع أوراق النّبات النّيئة المُفَر فَكَة.

اشتهر هذا النّبات في الماضي باسم «حِكْمَة الجَرّاحِينِ» نَظرًا لعمل أوراقه الغَضَّة المَدقُوقة المُفيدة في لأم وشِفاء القُروح والجُروح الحَربيَّة المُختلِفة. أمَّا سَيِّدات اليونان والرُّومان فَكُنَّ يَرغَبْنَها جدًّا لأنَّها كانت تُكسبهُنّ بشرة ناعمة حَريريّة خالية من كلّ الشُّوائب، وكُنّ بذلك يضَعْنَ على وجوههنّ قناعًا من الأوراق المهروسة ويُكرِّرْنَ ذلك لأربع أمسيات مُتتالية. نَبات لُبناني قليل الانتشار يرغب التُّربة العُضويَّة الغنيَّة بالأزوت ممّا بجعله يَقْرَب الأماكن السُّكَنيَّة .

١٦١- سنْسَنْمَ يُون الحِكْمَة، سَمَّارَة شافية للجُرح. الحِكْمَة، عُشْبَة القِدِّيْسَة صُوْفيا، حِكْمَة الجَرَّ احِيْد (١)

> Wisdom hedge mustard, Sainte Sophie's grass (E)

> Sisymbre sagesse, Sagesse des chirurgiens, Science du chirurgien, Talictron, Herbe de Sainte Sophie (F)

> Verstandgras, Sophia wegerauke (D) Descurainia Sophia, Sisymbrium Sophia (S)

نَبات حَوْلي من فَصِيلَة الصَّلِيبيَّات يَعلو من ٣٠ إلى ٨٠سم. ساقُه مُنتصِبة، باهتة، مُرْمَدَّة اللُّون الأخضر، مُورقة، فَرعاء، نَجميّة الأوبار. أوراقه إلى اللُّون الأخضر الرَّماديّ، عميقة التَّقطيع إلى فُصوص خَطِّيَّة دقيقة جدًّا. أزهاره باهتة اللُّون الأصفر، صغيرة القَدّ، عُنقوديّة التَّجميع الهامي، رُباعية الكأسيّات والبَتَلات الأقصر، سُداسيّة الأسْدِية. التَّمرة قَرْن رَقيق، مُقَوَّس، مُنتصب على زنادات مُتباعِدة عن السّاق، يَنفتح عن مِصراعَين ثُلاثيَّى العُروق، يَحضن بزورًا مالِسة، صفراء اللُّون ومُرتُّبة على صَفَّ واحد من كلّ جهة. رائحة النّبات مَعدومة. طعمه حامِز ولاذع. أقسامه المُستعملة هي النَّبات من دون الجذور، اليزور .

المُرَكِّمات - مُشْتَقّات مُكَثرَتَة.

الخصائص - قابضة، طاردة للدود،

<sup>(</sup>١) كلّ التَّسميات العربيّة للمؤلّف.

س ي ك

١٦٢ - سِيكلامَن القُصن، سُكَع جَزِيْرَة القُصن، بُقْلامُس الرَّبيع

Orbicular cyclamen, Cos's cyclamen (E) Cyclamen de l'île de Cos, Cyclamen printanier (F)

Kreisförmig cyclamenveilchen (D) Cyclamen coum, Cyclamen vernum (S)

دَرَنَة مُعَمَّرة من فَصِيلَة الرَّبِيعِيَّات الازهرار من شُ قُطْرها لا يَتَخَطَّى ولا يَبلغ ٣ سنتمترات. الحُرجيّة الظَّليل أوراقها تَظهر في أواخر الخريف قَبْل الأزهار بزمن طويل، وهي مُستديرة الشَّكُل نادرًا ما تَتَخطَّى ٥سم، خضراء المُعجم النَّان اللَّون المُبقَّع بالأخضر الفاتح من فَوق، المُعجم النَّان حمراء اللَّون الأرجوانيّ من تحت، ١٣٣؛ والمعطويلة العُنُق الذي يَنشُب مُباشرة من صَفحة ١٢١. السِّيكلامَن سَفحة ١٢١. السِّيكلامَن سَفحة نظمُ ومن ريزوم قصير إذا كانَت السِّيكلامَن سَلِي تَلك مَطْمُورة بعمق؛ حَوافي الأوراق بإشرافٍ طبيّ.

غير مُسنَّنة كما في الأنواع اللَّبنانيَّة الأخرى وخفيفة التَّموُّج أحيانًا. أزهارها على شِمراخ مُتَلَوِّ ونائم عمومًا، لا يتخطَّى قُطْرها السنتمتر الواحد، ورديَّة اللَّون أو قاتمة اللَّون الأرجوانيّ مع بُقعة أقْتَم لونًا على عُنُقها. الكَاسِيّات حادة. النَّمرة مُغَلَّفة بلَوْلَبات الشَّمْراخ المُلْتَفّ. الأزهرار من شباط إلى آذار في الأماكن الحُرجيّة الظّليلة الدُّباليّة التُربة.

الخصائص والاستعمال - راجع المُعجم الثّاني، رقم ١٦٣، صَفحة ١٣٣؛ والمعجم الرَّابع، رقم ١٥٢، صَفحة صَفحة ١٢١. يَجب التَّنبُه إلى أنّ دَرنات السِّيكلامَن سامَّة يُمنَع استعمالها إلّا بإشرافٍ طبِّق.

١٦٣ - شُبُهان شائك، صامُور شائك، شَبَه شائك

Garland thorn, Christ's thorn, Jerusalem thorn (E)

Paliure, Paliure épineux, Épine du Christ, Porte-chapeau, Argolou, Épine noire (F)

Südlicher stechdorn, Christdorn (D) Paliurus spinachristi, Paliurus australis, Paliurus aculeatus, Rhamnus paliurus (S)

شُحُرة ليفيَّة مُعَمَّرة من فَصيلَة طيقة الاستعمال - نُقاعة ٣٠ غرامًا وأكثر، مَرْطاء، مُتفرِّعة جدًّا، أُذَيْناتها مُحوَّلة إلى إبر، إحداها شديدة التَّقَوُّس، الأخرى شبه جالسة. فُروعها مُسودّة اللُّون، الفَتيّة منها خالية من الارً . أوراقها مُعنَّقة، خفيفة الانحناء، مُزَوّاة أو مُستديرة القاعدة، يَصاويّة الشُّكْل، خفيفة الرّأس المُستدِق، ثُلاثية العُروق الطُّوليَّة، هامشها دقيق التَّموُّج المُسنَّن. أزهارها في عناقيد إبطيّة الارتكاز، قصيرة، صغيرة، مُصفرّة اللُّون، قُطرها ٣-٤ملم. الكأسيّات مُخضرَّة اللَّون، تَتَخطَّاها البَتَلات المُنسطة. الأسدية خمس. المسض

يبرز من أسطوانة ويعلوه قلم مشروم أو ش ب ه ثُلاثي التَّشريم. تَتَشكُّل الثَّمرة من جَرّاء تَنتُق Accrescence الأسطوانة إلى قرص مُستدر، يُذكِّر بشكل القُتَعات الصِّنيّة، مُتَموِّج الأطراف المُفرَّضة المُشقرَّة اللُّونَ، قُطره ٣سم. نَبات مَزروع وطُوعيّ يُزهر من نيسان إلى حزيران، ويُستعمَل في سِياجات لا تُقْحَم.

> المُركِّمات - رامْنُولُوتابوسيد . Rhampoluteoside

> الخصائص - ثماره مُبوِّلة تزيل الأوريا والحامِض البَوْليّ، تَتصدَّى للكولسترول، مُنْقِصة للتَّو تُر أي مُهبِّطة لضَغط الدّم.

> الاستعمال - زيادة الأوريا، الحامِض البَوْلي، الكولَسْترول، رُمالات بَوْلِيّة، فَرط التَّوتُر أي ارتفاع الضَّغط الدَّمويّ.

النَّبْقِيَّات، تَعلو من متر إلى ثلاثة أمتار من الثِّمار المُجفَّفة في ليتر ماء غال يُغطِّي عشر دقائق ويُؤخَذ منه ٣ أو ٤ فناجين في اليوم. نَتْقع الثِّمار في النَّبيذ الأبيض. مُستخلص مائي يُؤخَذ منه ٣٠ نُقطة، ثلاث مرَّات في اليوم.

ش ج ر

الْأَبْسَنْت، خشب بَرْنُود، الْأَبْسَنْت، خشب بَرْنُود، أَنْمُوارُون فِيَيَارْد (۱) مُمُوَارُون فِيَيَارْد (۱) Absinth tree, Pernod's wood (E) Arbre absinthe, Bois Pernod (F) Absinthbaum, Pernodholz (D) Nemuaron Vieillardii (S)

شَجَرة من فَصِيلَة المُونِيمِيَّات (٣) تَعلو حتى ١٥ مترًا ولكنَّها في الغالب صغيرة الفَد، تَنتشِر في غابات كاليدونيا الجديدة على ارتفاعاتٍ مُتوسِّطة وفي أثْرِبة نَضِيديَّة أو طَلْقِيَة مُنَضَّدة Micaschiste.

الخصائص والاستعمال - قُشورُها قَويَّة العَرْف الأنيسُونيّ، وهي مُقوِّية ومُنشَّطة، ويَستعملُها أهلُ البلاد عَلوكًا كما يَستعملونَها ضِدّ الآلام الحَقْوِيّة وأوجاع الكلى. وهي تَدخُل في تَحضير عِلاج ضِدّ الاحتِقانات الرِّنُويَّة وضِدّ الشَّلَلُ. وقد استُعمِلت كمُجْهضة.

القَيْء، جَوْز القَيْء، جَوْز القَيْء، جَوْز القَيْء، اللهُواب الغُراب ستريكْنُوس جَوْز القَيْء، خُبْز الغُراب Nux vomica tree (E)

Vomiquier, Strychnos vomiquier, Noix vomique (F)

Brechnussbaum (D)

Strychos nux vomica (S)

شَجرة مُتوسِّطة القَدّ من فَصِيلَة

(٣) التَّسمية لإدوار غالب.

اللَّوْغانِيَّات تَعلو حَوالي ١٢ مترًا. أغصانُها سَرْحَة، أفنادها شائكة، أوراقها بيضويّة الشَّكْل، أزهارها مَجموعات مُخضَرَّة اللَّون تُعطى عُنيبات مُستديرة الشُّكُل تُحتوي على عدد كبير من البزور التي يُطلَق عليها اسم جَوز القَيْء، والتي تُشَكِّل، إلى جانب قشور الشَّجرة، المصدر الرئيسي لاستخراج القِلَويد السَّامّ أي الستركنين. القِشرة آدَّت أحيانًا إلى حَوادث مُميتة. أمّا البزور، أي جَوْز القَيْء، فشبه أسطوانية الشَّكْل، مُفَلَّطَحة بشكل بارز، مَبعُوجة من وسطها قلبلًا، فاتحة اللُّون السِّنْجابِيِّ أو رَمادِيَّة، مَظهرها مُطَلِّس لامِع مَرَدُّه إلى زَغَب حَريري من الأوبار التي تَشعّ حَول نُقطَة مَركزيّة على كلّ من وَجْهَى البزرة، كما نُلاحظ على وسط أحد الوَجهين خطًّا صغيرًا بارزًا يُنطلِق من السُّرَّة ويُنتهي إلى حافَّة البزرة. السُّوَيداء قَرْنيّة المادّة وهي تُشَكِّل القسم الأكبر من البزرة. الجنين النّباتي صغير يَقع مُقابل نُتُوء هامشيي. قِوام البزرة صُلْب جدًّا، قُطرها من ٢ إلى ٢,٥سم وسماكتها من ٤ إلى ٦ ملم. جَوْزة القَيْء عديمة الرّائحة، طعمها شديد المرارة جدًّا، مسحوقها رَمادي اللُّون، تُستعمَل أحيانًا كما هي لتحضير طُعْم جاذِبٍ في الصَّيْد المَحظُور لأسماك المأه الحُلُوة، ذلك أنّ تلك الأسماك قد تُصبح خطرة للأكل.

المُركِّبات - تَحتوي جَوْزة القَيْء على قِلَوِيْدَيْن هما السترِكْنين C<sub>21</sub>H<sub>22</sub>O<sub>2</sub>N<sub>2</sub>،

 <sup>(</sup>١) كل التَّسميات للمؤلِّف ما عدا التَّسميتان الفرنسيَّتان والتَّسمية اللاتينية.

 <sup>(</sup>٢) أوجين فِيتَارُد، عالم نباتي فرنسي، تُوفِي عام ١٨٧٢.

، العَصبيّ، خا نافعة للمعدة.

والبروسِين C<sub>23</sub>H<sub>26</sub>O<sub>4</sub>N<sub>2</sub>، وعلى حامِض إيغازُوريك، هيتروسيد يُدعى لُوغانُوسيد، ألورون، مَنّان، غالَكْتان، مادَّة دَسِمة. وتَحتوي على ٢,٧ إلى ٣,١٣ بالمئة من القِلَويدات العامَّة التي تحتوي على حَوالى ٤٥٪ من السترِكْنِين.

ولكي نَعرف جوزة القَيْء ونُحدَّد مُواضع القِلَويدات فيها، يجب إزالة المَواد الدَّسِمة من مَقطعها وذلك بمرثها في أثير البَترول لمدَّة ٢٤ ساعة، ومن ثمّ وضعها في نُقطة حامِض سُولفُوريك فيها بَقايا قانادات الأمُّونيوم، عِندها يَتلَوَّن مُحتَوى كل خَليّة من خلايا السُّويداء باللَّون البَنَفْسَجيّ. تُتَّبَع الطَّريقة ذاتها باللَّون البَنَفْسَجيّ. تُتَّبَع الطَّريقة ذاتها بالنِّسبة لفُول إنْياس.

#### سام - جَدول Toxique - Tableau A

الاستعمال - التَّسَمُّم بالأدوية البَرْبيتُوريّة (مَقادير قَويَّة)، حَالات السَّلَل الكُحوليّ والدِّفتيريّ والرَّصاصيّ الشَّلَل الكُحوليّ والدِّفتيريّ والرَّصاصيّ Saturniques، حالات شَلَل لَدْنَة ورَخْوة ومُخِيّ، حالات شَلَل مَثانِيَّة وأمْعائيّة، حالات شَلَل مَثانِيَّة وأمْعائيّة، نُوراسْتينيا، وَهْن، فقدان الشَّهيّة، خالات عُسْر حالات عُسْر المَوْمِنَة، حالات عُسْر الهَضْم الوَهْنِيَّة، سَلَس البَوْل اللَّيليّ.

تَضاد الاسْتِطْباب - ارتفاع التَّوتُر الشَّرياني، الإثارة والتَّهيُّج الدِّماغي والنُّخاعي، حالات الشَّلل المُترافقة بتَصَلُّبات، إصابات كَبديَّة كليويّة هامَّة.

الخصائص - مُنشِّطة للجهاز

طريقة الاستعمال - مَسحوق جَوْز القَيْء يُعَيِّر ٢,٥٪ من القِلَويدات، يُؤخَذ منه في أقراص أو بيلولات، المقادير الاعتياديّة التّالية للبالغين: ٠,٠٠ غرام لكلّ ٢٤ للجُرعة الواحدة، ١,٠٠ غرام لكلّ ٢٤ ساعة؛ المقادير القُصوى حسب فَرْماكوبيا ١٩٧٦ هي ١,٠٠ غرام دُفعة واحدة ٣٠٠ غرام لكلّ ٢٤ ساعة. يُمنَع واحدة ٣٠٠ غرام لكلّ ٢٤ ساعة. يُمنَع عن الأولاد دُون التّانية من العُمر، ويُعطى مِنه فيما بَعد مِقدار ٠,٠ سنتغرام مُقابل كلّ سنة من العُمر، ويُعطى كلّ سنة من العُمر،

صبغة مُحضّرة من المُستخلّص بحيث تَحتوى على ٠,٢٥٪ من القِلُويدات العَامَّة، فتكون بذلك، وبأوزان مُتساوية، ١٠ مَرّات أقل فعالية من المسحوق. أمّا مقاديرها العاديّة حسب فَرْماكوبيا ١٩٧٦ للبالغين هي ٠,٥٠ غرام لجُرعة واحدة، ١,٥٠ غرام خلال ٢٤ ساعة؛ المقادير القُصوي وهي مقادير مُرتفعة عن اللّزوم (الفرماكوبيا) فهى غرام واحد لجرعة واحدة وخُمْسة غرامات خلال ٢٤ ساعة. غرام واحد من الصِّبغة يُساوي ٥٧ نُقْطة. الامتناع عن إعطاء الأولاد دون التّانية من عمرهم؛ ومن ثمّ بعد ذلك تُعطى نُقطة واحدة لكلّ سنة من العُمْر. إنّ صبغة كُودكس ١٨٨٤ الخَمسِيَّة (١/٥) كانت مُضاعَفة الفّعالية عن الصّبغة أعلاه، وكانت تُعطى بمقادير أقلّ منها بمرَّتين.

ش ر ا

يُنصح بصبغة جوز القَيْء أحيانًا في تَمسيدات خارجيّة. كما يُستعمل جَوز القَيْء أحيانًا مُسحوقًا أو مُبروشًا ومَمزوجًا مع مِقدار ١٠ مَرّات وزنه من الوَدَك المصهور، بهدف القضاء على القوارض كالجرذان والفئران والدَّثيمة أى فأرة الأحراج، إلخ.

#### \* خَليط مُشَةً:

صِبغَة جوز قَيْء .....٥غ صِبغَة كَنْكينا .....٥ غ صِبغَة يانسون نَجميّ .....٥ غ يُؤخَذ من المَزيج ٥ نقاط في قليل من الماء قَبْل الوجبتين الكبيرتين.

## \* نَبِيذَ مُشَهٍّ ومُقَوٍّ

صِبغَة جَوز قَيْء .....١,٥ صِبغَة كُوكا .....٢٠٠٠ غ صِبغَة كُولا ..... كولا .... شَراب قشر أبو صفير ١٠٠ غ ٠٥٧ غ

يُؤخِّذ منه كأس مادير (٥٠ غرامًا) قَبْل الوجبات الثّلاث.

## ١٦٦ - شرابات، شراب اللّيمون Sirops, Limonade (F)

شَراب لَيمون حامِض لَيمُون حامِض ..... ٢ عدد حامِض كلورهيدريك سُكُر .....٧٠ ماء غالِ ..... ١٠٠ غ شَرابِ السُّكُر .....

نَسكُب الماء الغالى على اللَّيمون المُقَطِّع إلى شرائح والمُنظِّف من البزور، نَترُك النُّقاعة لمدَّة ساعة؛ نُضيف السُّكِّر ونُمرِّر (دستور ١٨٨٤).

إِنَّ هٰذَا هُو مَا يُسمَّى بِشُراب لَيْمُونَ مَطبُوخ، أمّا شراب اللّيمون النّيء فيُصنع مع الماء البارد. إنّ شراب لَيمون البُرتُقال يُحضّر بالطّريقة ذاتها.

## شر اب لَيْمون سيتريك شراب الحامِض السيتريك

السُّكَّرِي ۱۰۰ غ ¿ 9 · ·

دستور أدوية ١٩٦٥.

نَمزُجٍ.

إذا استبدلنا شراب الحامض السيتريك بمقداره من شرابات البَرْبَريس، الكَرَز، الفَرَمْبواز، الكِشْمِش، البُرتُقال، الصَّمْغ، الخَلِّ، نَحْصَل على مَشروبات مُعتدِلة لَذيذة جدًّا وتُستعمَل للأمراض

إذا وَضعنا لهذه الشَّرابات في زُجاجات للمياه المَعدِنيّة التي نَملأها بعد ذلك بماء غازي بسيط، نَحصل على ما يُسمّى شراب لَيْمون غازي باللّيمون الحامِض، بالكِشْمِش، بالخَلّ، إلخ.

## شَراب لَيْمُون كلورهيدريك

محلول ١/١٠ .....٢ غ

ماء مُقَطَّر ..... ٨٧٥ غ نَمزُج. دستور أدوية ١٨٨٤.

١٦٧- شَشَم، عارِشَة الوَردِيَّة (١)، عَيْن الدِّيك، عُصْبَة السُّوس

Bead tree, Wild liquorice, Rosery pea (E) Jéquirity, Réglisse d'Amérique, Liane à réglisse, Arbre à chapelet (F)

Paternosterkraut (D)

Abrus precatorius (S)

طَرَفية سوداء، تَتَشكَّل فيها خلال إنْتاشها شع ي مادّة هَيُوليناتيّة قابلة للذَّوبان وسامّة جدًّا تُدعى جاكيرِيتِيْن أو أَبْرين، بفضل خميرة دَرَسها بُورتَس باسم جاكيرِيتيزِيْماز يَصناعة السُّبْحات والقَلائِد. وتُستعمَل في صناعة السُّبْحات والقَلائِد. وتُستعمَل لمعالجة التهابات المُلتحِمة الحُبيبيّة. لمعالجة منها مَرْقًا بنسبة ١٠ إلى ٥٠٠ ونَجعل منه لُوسيونات للعين من مَرّة إلى ثلاث مَرّات في اليوم.

Barley (E) مُعْرُوف - ۱۹۸ Orge (F) Gerste (D) Hordeum vulgare (S)

الشَّعير جنس أعشاب حَوْليَّة أو مُعَمَّرة، بَرِّيّة أو زرَاعيّة من فَصِيلَة النَّجِيلِيَّات. أوراقها مُسطَّحة. سَنابلها هاميَّة كثيفة. سُنيْبلاتها مُفردَة الزَّهْر، مُثْلَثَة على عقد الرَّاشَة المَفْصِليَّة الهزيلة. السُّنيْبلة الوُسطى لاطئة، الجانبيَّة مُزنَّدة. الرُّويْشَة rachéole تَستطيل إلى حَريرة. عَصْفَات ضَيِّقة، غالبًا مِخْرَزِيَّة وحادَّة، خَشِنة. الأسْدية غالبًا مِخْرَزِيَّة وحادَّة، خَشِنة. الأسْدية ثلاثة. الحَبَّة لاصقة.

المُرَكِّبات - هورْدَانين (قَلْويد)، مالْتين، نَشاء، فُوسفور، حديد، كلسيوم، بُوتاسيوم، مَغْنازيوم.

الخصائص - مُلَيِّنة، مُقَوِّية عامّة وعَصَبِيَّة، مُقوِّية تَلْبِيَّة، مُجدِّدة للقُوَّة، هاضمة، مُصرِّفة كَبِديَّة، مُضادّة

جَنْبَة زِراعيَّة عارِشة من جُزُر الأَنْيل وأفريقيا والهند، من فَصِيلَة القَرْنِيَّات الفَراشانِيّة (٢). أوراقُها مُزدوِجة التَّركيب الرِّيشيّ، عديدة الوُريقات، مُتَقابِلة. ازهرارُها عُثكوليّ التَّجميع الكَثيف. أزهارها صغيرة وشبه لاطئة. جَذرها صِناعيّ يُشبه جَذر السُّوس. بُزورها مُستديرة الشَّوس. بُزورها مُستديرة الشَّوس. بُزورها مُستديرة الشَّكل؛ قُشورها جامِدة، صُلْبَة، حمراء اللَّون، سَوداء النُقطة. لُبابُها دُهنيّ قِيل إنّه يُقيد الأمعاء.

المُركِّبات - جاكيرِيتِيْن أي أَبْرِيْن، خميرة.

الاستعمال - تُستعمَل الأوراق في غوادَلُوب لتحضير مُستخلَص يَقوم محلَّ السُّوس. الجَذر يُستعمَل في جاڤا وكُولكُوتا كجذر السُّوس الّذي يُشبهه إلى حدٍّ كبير، ممّا دَفع إلى تَسميته «سُوس أمريكا» أو «عارِشة السُّوس». البُزور زاهية اللَّون الأحمر مع بُقْعَة

<sup>(</sup>١) التَّسمية الثانية للمؤلِّف.

<sup>(</sup>٢) التَّسمية للمُؤلِّف.

ش ع ي

للإسهال، مُنعِشة، رافِعة للتَّوتُرِ الشَّريانيِّ بتضييق الأوعية، مُصرِّفة، مُسكَّنة.

الاستعمال - إصابات رئوية: سِلّ، برونشيت مُزمن؛ فُقدان المَعادِن من الجِسم، نُمُوّ، كَسَل المَعِدة، كَسَل الأمْعاء، كُبَاد، مزاج صَفْراوي، النهابات المِعَى، إسهالات، ديسنتيريات، تيفوئيد، أمراض التهابيَّة في المجاري البَوْليّة (التهابات الكلية، التهابات الكلية، التهابات الكلية، التهابات الكلية، النخفاض التَّوتُر.

طُرُق الاستعمال - يَدخُل الشَّعير في تَحضير زهورات المُسْتشفيات الفرنسيَّة المُسمَّاة: «صالحة وجيِّدة لكلّ شيء». زهورات من ٢٠ غرامًا من الشَّعير المَقشور في ليتر ماء، نأخذ منها قدر ما المُنظَّف حتى تَتفتَّح الحبوب: ٣٠ إلى المُنظَّف حتى تَتفتَّح الحبوب: ٣٠ إلى ساعة. زهورات مُغذَية ومُسهِّلة، نأخذ منها قدر ما نريد.

مُسحوق المالْت أي الشَّعير المُفَرَّخ، من ٥ إلى ٢٠ غرامًا في اليوم وفي أقراص أو في حساء (غذاء للأولاد والمُتْعَبين والنَّاقهين والكهول).

من الخارج، طحين الشَّعير في لَصُوقات لمعالجة الالتهابات الجلديّة.

179- شُلْطَة الحَرَمُوْن، زَلُوْع صَفِيْر، شِرْش ناعِظ (١)

Prangos of Hermon, Aphrodisiac prangos (E)

Prangosier de l'Hermon, Prangosier aphrodisiaque, Petit zallou'a (F)

Hermonischprangos, Aufputschendwurzel (D)

Prangos Hermonis, Prangos meliocarpoides var. trachonitica (S)

نَبات بَرِّي جَبَلِيّ مُعَمَّر من فَصيلَة الخَسْمِيَّات. ساقُه مُنتصبة، فَرعاء جدًّا، تَعلو من ٣٠ إلى ٦٠سم، وهي زَغَبيَّة طَحْلاء اللُّون. أوراقُه الجَذْريَّة بَيضاويّة المُحيط العام، ثُلاثية التَّقسيم الرِّيشي إلى سَكَمات صغيرة تَتَقَطَّع بدورها إلى فُصَيصات مُتراصَّة جدًّا، خَطَّيَّة الشَّكل، زَغَيّة الكساء، طَحْلاء اللَّون الأخضر. أزهاره صَفراء اللَّون؛ يَتلاتُها يَضاويّة الشَّكل، كامِلة، مَلْويّة الرّأس، في خَيْمات من ٥ إلى ٧ شُعاعات. القُلافَة والقُلَيْفَة من قُنابات قصيرة، خَطِّيّة الشُّكُل السِّنانيّ. الثَّمرة أطول من زُنيدتها بثلاث مَرّات، وهي بَيضاويّة الشَّكل يَتخطَّى طولها السَّنتمتر الواحد، مَقطُومة الرَّأس، إسْفنجيّة الغِلاف، لها حافة تُشكِّل أجنحة فِلِّينيَّة أو إسْفِنجيَّة. جالسة، سميكة، مُثَلَّثة المَقْطَع. نَبات محصور الوجود في سوريا والسُّلْسلة

 <sup>(</sup>١) كل التسميات للمؤلّف ما عدا التسمية العربية الأولى والتسمية الفرنسيّة الأولى والتسميات اللاتينيّة.

ش م ع

الشَّرقيَّة يرغب التُّربة البُركانِيَّة بنوع خاص . أوراقه تَسْتَلَدُّها الماشية ويَدسم عليها الحليب . جذره هو شِرْش الزَّلُوع النَّاني الّذي وَرَد في دروس المعهد الزِّراعيّ الثّانويّ في بيروت عام ١٩٥٦ التي كان يُلقيها العالم النَّباتيّ الدكتور الياس مُبارَك .

#### Animal wax (E) مُنَمْع حَيَو انْيَ - ۱۷۰ Cires animales (F)

هُناك شُمُوع حَيَوانِيَّة تَتَكَوَّن على أَشْجار مُختلِفة كالسُّمّاق الكاذِب أي العَبْرَب: Japanese wax tree (E), Rhus . succedaneum (S)

إِنَّ لَهٰذَا الشَّمعِ اليابانيِّ مَا هُو سُوى الْبَالْمِيتِين، وهُو شَمْع أبيض اللَّون، مع صِبغَة خَفيفة اللَّون الأصفر؛ رائحتُه خفيفة الطَّابع العَفن؛ بالرَّغم من أنَّه أكثر رَخاوَة فهُو أكثر تَفتُّتًا من شَمْع العَسَل. ويَبدو أَنَّ الشَّمْع الذي يُجمَع

في الصِّين وفي تُونكان عن عِدَّة أشْجَار، هُو نِتاج حَشَرات صغيرة تُدعى في الصِّين: لا-تْشُنْغ La-Tchong، وتَنتمي اللهِ نَوع Ericerus ceriferus وفَصِيلَة القِرْمِزيَّات ورُتْبَة نِصْفِيَّات الأجْنِحة. ويَصل هٰذا الشَّمع بكمِّيّات ضَخْمة إلى انكلترة على شكل كُتَل من حَوالى ٧٥ كيلو الواحدة.

قِرْمِزِيَّة التِّين تُعطي شَمْعًا مُماثلًا لشمع العَسل، ويَحتوي على الجَواهر ذاتها، ولكن بنِسب مُختلِفة، إن شَمْع قِرْمِزِيّة التِّين، يكون بحالته الخام، مُحمَر اللَّون الأصفر، يَنصهر بين ٥١ و٥٢٠ سغ، يَذوب بكامله في الأثير، يَذوب جزئيًّا في الكحول؛ ويَبدو أنّه قابل في الستعمالات مُفيدة (سَسْتِيني).

إنّ شَمْع الـ Andaquies تُنتِجُه حَشَرة من جنس Melipone ومن رُتبَة نِصْفِيًات الأَجْنِحة في أَمريكا الجَنوبيَّة، وهُو شَمْع أصفر اللَّون يَنصهر عند ٧٧°سغ.

١٧٢ - صَعْتَر سُوْرِيا، أُورِيْغَانُم سُوْرِيَا(١)

Syrian organy (E)

Origan de syrie (F)

Syriendost (D)

Origanum syriacum, Majorana syriaca,

Origanum maru (S)

نَبات بَرِّي مُعمَّر من فَصِيلَة الشَّفَويَّات، مُخشوشيب القاعدة، مُنتصب السوق والفُروع المُغطَّاة بالزَّغَب المُنبسِط. الأوراق مُعنَّقة؛ أعناقها غالبًا ما تكون مَكسُوَّة بالزُّغَب الكبر الكثافة؛ نَصلها بَيضي، من ١ إلى ٣سم، كامل أو نادرًا خفيف تَموُّج الأطراف، أزغَب، لَونه إلى الرَّ مادي، عُروقه واضحة البروز. السَّنابل بيضية أو أسطوانية ونادرًا ما يتعدَّى طولها السنتمتر الواحد، تَتَجمَّع بحُزْمات على رؤوس الفُروع الإبطيّة ورأس السّوق، أعناقها مُختلِفة الطّول. القُنّابات على صَفّين. الكأس ٢ ملم، عَميق التَّخطيط الخارجي، أزْغَب. التُّويج أبيض، ٥ ملم، أنبوبه مُنَظِّم ويَبرز بالكاد. حامل السّمة والأسدية بارزة. ازهراره من حزيران إلى كانون الأوّل. يتواجد في كلِّ الأراضي الصَّخريّة، السُّفوح الحَجريّة، الحيطان القديمة، الجلول المُهمَلَة، مُنتشِر جدًّا، في لُبنان أكثر منه في سوريا.

يَنتشر لهذا النَّوع جُغرافيًّا في جَنوب تُركيا، سُوريا، لُبنان، فلسطين، الأردن، وهو نادر في مصر. في لُبنان

(١) كلِّ التَّسميات للمؤلِّف ما عدا التَّسميات اللاتينية.

ص

المَبَلِيّة الجَدِي الجَبَلِيّة – ۱۷۱ Alpine caprifoly (E) (۱) Chèvrefeuille des Alpes, Chèvrefeuille alpestre (F) Alpen Geissblatt (D) (۱) Lonicera alpigena, Lonicera webbiana (S)

جَنْبَة مُعَمَّرة مُنتصِبة من فَصِيلَة الخَمانِيَّات تَعلو من ٢ إلى ٣ أمتار. الخَمانِيَّات تَعلو من ٢ إلى ٣ أمتار. ساقُها فَرعاء، غير فارِغة، لُبُها أبيض. أوراقُها مُعْبِلَة، بَيضويّة الشَّكُل، مُهدَّبة، طولها من ٥ إلى ١٠سم، عُروقها خَمْلِيّة وهي فَتِيّة. أزهارها تَوأمِيَّة على إبط الأوراق، وأحيانًا فَرديّة، صفراء اللَّون، تَصْطَبغ بالأحمر، تاجُها قصير الأنبوب. الثَّمرة كُرَويَّة، بَيضانيّة، تُشبِه الكَرَزَة، مَهدُها أوروبا الوسطى. تُزهِر في أيّار.

الخصائص - الثَّمار مُقيِّنة مُسْهِلة .Éméto-cathartiques

يُعتبر كُلَّتي الوُجود تقريبًا Ubiquiste.

الخصائص والاستعمال - لا نَملك حتى الآن أيّة مُعطَيات علميّة عن مُركِّبات لهذا النَّوع وخصائصه واستعماله الطِّبِّيِّ الدَّقيقِ. إلَّا أنَّه «زعتر» الجَنوب اللَّبناني، و ﴿ زُوباع ، المَتْن وكسروان وسواهما؛ وهو النَّوع الّذي يكاد لا يَخلو منه منزل في كَافَّة أنحاء لُبنان، ولا مِخبر من مخابزه، لتحضير مَنقوشة الصّباح وعروس المدرسة وحتى جاط السَّلطة إذا كان غضًّا قَبْل ازهراره. وهو يُستعمَل مُجفَّفًا ومَسحوقًا لوحده أو مخلوطًا إلى أحد أنواع الصّعتر الأخرى بهدف تُلطِيف مَذاقه اللَّاهب البارز. وهو النَّوع الأقرب شكلًا إلى الصَّعتر الشائع الأوروبي المنبت والوردي الأزهار، ولكنّه يَتميَّز عنه بأزهاره البَيضاء بنوع خاص .

مُلاحَظة - يَذكر عدد من عُلماء النَّبات الشَّرق الَّذين تَوالَوا على دراسة نباتاتنا الشَّرق أوسَطيّة، على أنّه «زوفا» التَّوراة، ذلك أنّ الزّوفا المَخزَنيّة Hysope هي نوع أوروبِّي فَقَط، وأنّ ما يُسمَّى زوفا في كافّة المَناطق اللَّبنانيّة قاطبة لا ينتمي فعلًا إلى جنس Hyssopus، أي زوفا.

١٧٣ - صُمُوغ مُخْتَلِفَة

Gommes diverses (F)

صُموغ مُختلِفة تَلي الصَّمْغ العَربيّ وتَتَعلَّق به بطبيعتها وتركيبها؛ وهي الأصْماغ التّالية: ١٥- صَمْغ البَرْبَر؛

۲°- صَمْع الكاپ؛ ٣°- صَمْع سالابريدا أو صَمْع سَدْرا بيضا Gomme Sadrabeida، وهو صنف يَقع في دُموع طويلة دُودِيَّة الشَّكْلِ أو مُتَلَوِّية، حَصَلَت منها نُخبةٌ بيضاء اللَّون باسم «صَمْع فِضِّيّ اللُّون الأبيض " Gomme blanc d'argent ! ٤°- أصماغ الهند الّتي تَضم عِدَّة أنواع (کلکوتا، بُومْبای، سِدْنای) والّتی يَبدو أنَّها تَحصل من أشجار مُختلِفة، من بينها فِيْرُونِيَا الفِيْلِ<sup>(۱)</sup> Feronia elephantum من فَصِيلَة السَّذابيَّات، وكذلك من بَعض أنواع البرازيَّة ومن الأنْبَج أي المَنْغا من فَصِيلَة البُطْمِيَّات، ومن النَّـوع Anogeissus latifolia أي صَمْع غَاتًى Gomme Ghatti (١) من فَصِيلَة الإهْليلَجِيَّات، إلخ؛ ٥°- الصَّمْغ النَّتِن الأحمر Gomme sapote. إلَّا أنَّ كافَّة لهذه الأنواع لا تَظهر في الأسواق سوى بالمُصادَفة، فلن نَسترسل بالكلام عنها.

إنّ صَمْع أنْجيكو (۱) G. angico الذي محصل من سَنْط أنْجيكو (۱) Acacia يَحصل من سَنْط أنْجيكو angico يَجد له في البرازيل استعمالات صَمْع السّنغال الأوروبَّيَة ذاتها. في الولايات المُتَّحدة الأميركيَّة يُستعمَل صَمْع الغَاف أو صَمْع المَسْكِيْت (۱)، الذي يَنتُج من الغَاف الحُلو (۱) Algarobia ومن ألْغَارُوبِيا غدِّيَة (۱) Algarobia وذلك لصُنْع المَعاجين glandulosa الصَّدْرية.

ص م و

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمؤلِّف.

ص م و

نَجد أحيانًا صُموغًا حمراء اللَّون صَعبة مُركَّزة من الدَّكْسْترين أو من لهذا النَّوبان؛ فنجعلها قابلة للذَّوبان بتعريضها الدَّكْسترين ذاته مُجفَّفًا ومَطحونًا. يُمكن إلى حرارة الفُرْن. للسَّمْغ العَربيّ للهذا الصَّمْغ أن يَحلّ مَحلّ الصَّمْغ العَربيّ

إنّ ثمار أنواع السَّنْط الصَّمْغِيَّة الَّتي تُسمَّى «بَابْلَاه» Bablah (كلمة هِنديَّة تُطلَق على ثمار سَنط الهند والسَّنْط العَربيِّ)، أو تُسمِّى عَفْص شَرقيِّ، تُعطي عُصارة السَّنْط، وتُستعمَل في دِباغة الجُلود وفي الرَّسْم.

نَجد في الأسواق باسم غُومَّلِيْن Gommeline (صَمْغ اصطناعيّ) مَحاليل

مُركّزة من الدَّكْسْترين أو من هذا الدَّكْسترين ذاته مُجفَّفًا ومَطحونًا. يُمكن لهذا الصَّمْغ أن يَحلّ مَحلّ الصَّمْغ العَربيّ في مُعظَم وُجهات استعماله. لذلك من المُفيد أن نُميِّز العَربَيْن من الدَّكْسْترين. ولهذا، نُسخِّن المادَّة مع حامِض كلورهيدريك ومع أورْسِيْن، فتُعطي كلورهيدريك ومع أورْسِيْن، فتُعطي الأصْماغ كُتلة نَديفيَّة الشَّكل زرقاء اللَّون يُحوِّلها البُوتاس الكُحوليّ إلى محلول بنقسجيّ اللَّون استشعاعه أخضر. ولا يُعطى الدَّكْسْترين تَفاعلًا مُماثلًا.

على أن تُجفَّف سَريعًا في الشَّمس وتُحفَظ طح ل في أوعية خَشبيّة بمعزل عن الرُّطوبة (دستور ۱۹۰۸).

> المُرَكِّات - مادَّة جيلاتينيّة من ٦٠ إلى ٧٠ بالمئة مُركَّبَة من ميريسْتِيْن وأولايين، مادة راتنجية، أمْلاح الكلسيوم والحديد والصوديوم، يُود ىكمِّتة قلىلة.

الخصائص - طارد لطيف للدُّود من الدَّاخل وهي خاصّة مَعروفة مُنذ أكثر من أَلْفَى سنة، عَرفها تَيُوفراسْتُس وديُو سْقوريدس وكان قُوشيه يبيعها في باريس عام ١٧٥٦، استُعمِل هٰذَا الطَّحْلُب حتى القُرون الوُسطى، أهمِلَت بَعده إلى أن بَعثها من جديد ونَشرها باسمها الحالى الطّبيب اليُونانيّ ستيفانُوبُولي عام ١٧٧٥. من الخارج مُضادَّة للالتهاب، ومن الدَّاخل مُنشِّطة دَرْ قِتَّة .

الاستعمال - من الدّاخل: طُفَيليّات المَعِدة، أَقْصُور، حادّات الذَّيْل، خاصَّة عند الأولاد. الغُدَّة الدَّرْقِيَّة (غواتر). من الخارج: التهابات الغُدّد.

طريقة الاستعمال - من الدَّاخِل نَقيع ٣٠ غرامًا في ليتر ماء غال يُغطّي ٣ ساعات على الأقلِّ ويُؤخِّذ منه ٣ فناجين في اليوم (الدكتور كازان). المسحوق لأولاد تحت الخامِسة من العُمر يُعطَى بمقدار غرام واحد، وفَوق هذا العُمر من ٢ إلى ٤ غرامات. يُؤخِّذ المسحوق

١٧٤ - طُحْلُب كُوْرسِيكا، طُحْلُب بَحْري، مَرْجانِيَّة سَوْداء، فَوْقَس طارد لللُّود<sup>(١)</sup>

Corsian alsidium, Corsian moss (E) Mousse de Corse, Mousse de mer, Coralline de Corse, Coralline noire, Dentelle de Vénus, Helminthocorton, Varech vermifuge (F)

Korsischmoos (D)

Alsidium helminthocorton, Muscus marinus, Sphærococcus helminthocorton, Gigartina helminthocorton (S)

أَلْغ بَحريّ أحمر من فَصِيلَة الخُثّيَّات الحُمْر Rhodomélacées طُوله من ٢ إلى ٤سم. مَشَرَته قاتمة اللُّون الأحمر، خَيْطيَّة الفُروع الزّاحِفة المُتشابكة فيما بينها ومن ثمّ مُنتصِبة، هزيلة، مُزدوجة اللُّون، أَسْطُوانيَّة، لَحْمِيَّة. ثمار مَثانِيَّة نادرة Cystocarpes (من اليُونانيّة و Fruit)، شِبه كُرَويّة، تُوجِد على أطراف الفُروع. الرِّيزُوم مُزَوَّد بأوبار «مُقَلِّدَة للجُلْور» Rhizoïdes وتَلعب دُورها. رائحة النَّبات بَحريّة قَويّة يُودِيَّة. طعمُه مُمَلِّح بارز. الأقسام المُستعملة هي المَشرة على مدار السَّنة

<sup>(</sup>١) التَّسمات للمُؤلِّف.

ط ح ي

مع الماء أو الحساء أو الحليب، صباحًا على الرِّيق. حُقْنَة طاردة للدُّود من ١٠ غرامًا غرامات طُحلُب كُورسيكا، ٢٠ غرامًا أَبْسَنت بَحريَّة في مِقدار فِنجان ماء كبير يُغلَى قليلًا.

# \* صُرّات طاردة للدُّود

# ١٧٥ - طَحِيْن الزُّرُوع

### Farines de céréales (F)

يُستعمَل في تَغذية الأولاد الصِّغار عددٌ كبيرٌ من أصْناف الزُّروع، وعن حَقّ؛ وهي أصْناف نُورِد تَركيب مُعظمِها في جَدول مُرْفَق.

# ۱۷٦ - طَحِيْن الشُّوفان (أو الخَرْطال، أو Farine d'avoine (F)

إنّ طَحين الشُّوفان غَنيّ بالهَيُولِيّات الجيِّدة الصِّنف، وهو يُوفِّر الأملاح المعدِنيَّة بنسبة هامّة وبخاصّة المَوادّ الدَّسِمة. كما يَتمتَّع بخصائص مُسهِّلة

يَدعمها مُحتواه القَويِّ من عناصر السَّفَاة الهَيُوليناتِيَّة أي طَبقة الأليرون. وهو طَحين يُستعمَل جدًّا في إنكلترة لتَغذية البالغين عامّة والأولاد بنوع خاصّ.

إنّ المُستحضرات الّتي تُعرَف بأسماء: طحين مُورْتُن، طحين الثَّريدَة الخَمْليّة، مَلْت هُولَّنْدة، وِلْهَلْمِیْن، إلخ. هي مُستحضرات أساسها طَحین الشُوفان. وهو طحین یَزْنُخ ببعض السُّهولَة نظرًا لغِناه بالموادّ الدَّسِمة. كما تُستعمَل بالمُنافَسة نَدیفات الشُّوفان (شُوفان مَقشور ومُسطَّح) وجَرِیش الشُّوفان مَقشور ومُسطَّح) وجَرِیش الشُّوفان حساء).

إنّ طَحين الشّيلَم، والشُّوفان، والحِنطة السَّوداء مَوهُوبة كذلك بخصائص مُنعِشة. وعلى عكس ذلك، فإنّ طحين الرُّز قد يُستعمَل للوقاية من الإسهال أو لمحاربته. إنّ هذا الطَّحين الذي يُحضَّر من الرّز المَقشور، هو خالٍ عمليًّا من القيتامينات B، وإنّ استعماله لا يجوز بالتّالي، أن يَطول كثيرًا وبنسبة كبيرة، من دون مُواجهة سيّئاتٍ أو أضرار. يُستخدم طحين الشَّيلَم لتحضير خبز الأبازير Pain d'épice. إنّ خليط طحين الشَّيلَم وطحين القمح يُشكّل ما طحين الشَّيلَم وطحين القمح يُشكّل ما يُسمّى Météol.

بَقيَّة أنواع طحين الزُّروع غَنيَة بالقيتامين Bl (بمعدّل وسطيّ ٠,٢٤ ملغ، يتعلَّق بنسب الاستخراج). ولا يوجد فيها لا ڤيتامين C ولا A.

طحين الذُّرة الصَّفراء يُستعمَل جدًّا في بعض البلدان، في إيطاليا خاصة، حَيث يُستخدَم لتحضير الپُولَنْتا الشَّهيرة. وهو طحين يُتَهم بأنّه وراء عدد كبير من أوبئة الحُصَاف، أي داء الذُّرة، أي البَرَص الإيطاليّ Pellagre. هَيُولِيّاته فقيرة نوعًا ما بالجودة.

يُشكِّل طحين الذُّرة أساس مَنتوجات، أكثر ما تُستعمَل في تَغذية الأولاد، تُعرَف ببعض الأسماء التّالية: زَالِيْن، طحين مكسيكيّ، مَايْيزاليْن، إلخ. وتَتألَّف المايِيْزانَه من النَّشاء المُستخرَج من الذُّرة وليس من الطحين. ويُطلق اسم مسحوق الخُبْز على مسحوق خشن، يُستعمَل في المطبخ وفي صِناعة يُستعمَل في المطبخ وفي صِناعة الخُبز (تحميص)، وسوى ذلك من الخُبز (تحميص)، وسوى ذلك من مَنتوجات المَخابز.

۱۷۷ - طُوْقَرْيُـون الـمـاء، طُوْقَرْيُـون ثُوميّ<sup>(۱)</sup>، أَسْقُوردِيُون مائيّ، ثُوْم الحَيَّة Water germander, Tomentous germander, Scordium (E)

Germandrée d'eau, Germandrée aquatique, Germandrée tomenteuse, Scordium (F)

Lauchgamander, Wassergamander, Skordion (D)

Teucrium scordium ssp. palustre (S)

نَبات زَغَبيّ قُطنيّ مُعَمَّر من فَصِيلَة الشَّفَوِيَّات. ساقُه خضراء اللَّون ومُدرَّجة

(١) التَّسميتان العربيَّتان الأولى والثانية للمُؤلِّف.

(١) التَّسمية للمؤلَّف.

بالبَنَفْسجي الأرجُواني Violine، مُنتصِبة غالبًا، مُورقة، مُوبرة، قُطْنِيَّة، عُشبيّة، فَرعاء جدًّا، تَعلو من ٣٠ إلى ٦٠سم. أوراقُه لاطئة، مُستطيلة إهْليلَجيَّة، مُفَرَّضَة الحافّة، رَخْوَة، رَماديّة اللّون الأخضر، السّاقِيّة منها مُستَديرة القاعدة، والفُرُوعِيَّة (١) Raméales تَضيق إلى زاوِية في قاعدتها، والأوراق الزَّهريّة تَتخطَّى الأزهار المُزنَّدة الّتي تجتمع من ٢ إلى ٤(٦) في شِبه دُوّارة وحيدة الاتِّجاه على إبْط الأوراق وطول السَّاق. الكأس مُوبرة، غدِّية، مُحدَّبة القاعدة Gibbeux جَرَستَة الشُّكُل، خُماسيَّة الأسنان السِّنانيّة الحادَّة الرّأس، الشِّبه مُتساوية، وهي أقصر من التَّاج بمرَّتَين. التّاج أرجُوانيّ أو بَنَفْسجيّ أطول من الكأس. الثَّمرة بُنِّيَّة اللَّون عند نُضجها، شَبَكيَّة العُروق. المَآبر شبه بارزة. الأرومة رئْدِيَّة، الجذر يَنغرز في الوَحْل. الرّائحة ثُومِيَّة. الطَّعم ثُوميّ ومُرّ. الأقسام المُستعمَلَة هي الرّؤوس المُزهِرة والأوراق. نَبات لُبنانيّ دَخِيْل أو طارئ.

المُرَكِّبات - جَوهَر مُرَّ، كُولِين، عَفْص، زَيت دُهنيِّ، رَاتِنج طُوقَريُونيِّ.

الخصائص - طارد للحُمَّى، مُقوِّ، شافٍ للجُرح، نافع للمَعِدة، مُدِرَّ للصَّفراء، مُبوِّل، مُطهِّر، طارد للدُّود.

الاستعمال - الوَهْن وضَعْف الحَيَويَّة،

القُرْحَة. يُضيف الدّكتور قالني الاستعمالات التّالية: نُقاهَة، فقدان الشّهيَّة، عُسْر هَضْم وَهْنيّ، أمراض الغُدد، عَجْز الكَيِد، أمراض مُعدِية، برونشيت مُزمِن وكريب (الدكتور لوكلير)، روماتيزم، نِقْرس، ديسَنْتيريا.

طريقة الاستعمال - من الخُمور المُقوِّية التي تُحفَظ في زجاج مُحكَم، يُؤخَذ منها كوب صغير قَبْل أو بَعد الوَجبات الثَّلاث، نبيذ ٤٠ غرام رُؤوس مُزهِرة في ليتر نبيذ غالٍ يُغطَّى ١٥ دقيقة ويُمرَّر ويُؤخَذ منه في حالات الوَهْن والضَّعْف. القُرحات الجلديّة تُغْسَل بنقيع ٤٠ غرام رُؤوس مُزهِرة في ليتر ماء غالٍ يُغطَّى ١٠ دقائق.

مُلاحظات - قد يَكون هٰذا النَّبات مَخْفيًّا تمامًا تَحت الماء أحيانًا، ويَنشب جذوره في قَعر المُستَنقَع والحُفَر والحُقول الرَّطْبة. تَيُوفراسْتُس أطلق عليه اسم Skordion من اليُونانيَّة أي نُوم نَظرًا لرائحة الثُّوم التي تَبعثُها الأوراق المُفَرفَكة. في الماضي دَخل هٰذا النَّبات في تَركيب تِرياق البُنْدُقيّة الشُّهير إلى جانب عددٍ كبيرٍ من النَّباتات الأخرى ولحم الأفاعي وعطام الحيوانات، تِرياق كان يُفترَض أنَّه يَشْفِي عَددًا كبيرًا من الأوجاع. فْرَاكَاسْتُور، من جهته، أدخَله في القَرن الحادي عَشر في تَركيب مَعْجونه العَسَليّ المُسمَّى دِياسْقُوريوم الّذي قيل إنَّه يَقضى على الطَّاعُون. أمَّا اليوم

فيقصر الاستعمال الأوروبيّ على صباغة الصُّوف بلون قَويّ الخَضار يُخفَّف بإضافة سُولفات الحديد إلى الصِّبغَة فتحوِّله إلى اللَّون الأخضر الزَّيتُونيّ الجميل.

# ۱۷۸ - طُوْقَرِيُون مَخْزَنِيّ، خامادَرِيُوس، كَمادريُوس

Common germander, Wall germander, Ground oak (E)

Germandrée petit-chêne, Germandrée officinale, Petit-chêne, Chasse-fièvre, Chêneau, Chênette (F)

Echter gamander (D)

Quercula, Chamædrys, Teucrium chamædrys (S)

نَبات بَرِّي مُعَمَّر من فَصِيلَة الشَّفَويَّات يَعلو من ١٠ إلى ٣٠سم. ساقُه خَضَراء، مُخَطِّطة باللَّون البَّنَفْسَجيّ الأرجوانيّ، نائمة فَصاعِدة، هَزيلة، لِيفيَّة، مُتفرِّعة، مُوبرة. أوراقُه شديدة الخُضرة، جلدِيَّة النَّصْل، لا مِعة الصَّفحة العُليا، مُوبرة الصَّفحة السُّفلي، بَيضويَّة الشَّكْل، مُعرَّقة، مُفرَّضة، قصيرة الأعناق. أزهارُه أرجوانيَّة أو وَردِيَّة اللَّون، ثُلاثيَّة إلى سُداسية التَّجميع الوحيد الاتِّجاه على إبْط الأوراق، عنقودِيَّة التَّجميع الهامي. كأسها مُحمَرَّة اللَّون، جَرَسيَّة الشَّكْل، مُوبرة. التّاج خالٍ من الشَّفة العُليا، شَفتُها السُّفلي خُماسية الفُصوص. الأسدية أربعة بارزة. التِّمار مُحَلَّمة، بُنِّيَّة اللَّون. الأرومَة مَدَّادة. الرّائحة عِطريّة وخفيفة. الطّعم قابض

ومُرّ. الأقسام المُستَعملَة هي الرّؤوس المُزهِرة والأوراق.

المُرَكِّبات - عَفْص، زَيْت دُهنيّ، عَناصر مُرَّة، رَاتنج طُوقَرْيُونيّ.

الخصائص - مُطهِّرة، مُلِرَّة للصَّفراء، طارِدة للحُمّى، نافِعة للمَعِدة، شافية للجرح، مُقوِّية، مُبوِّلة، كانت مُسجَّلة في دستور ١٩٤٩.

الاستعمال - نُقاهات، فقدان الشَّهيَّة، عُسْر الهَضْم الوَهْنيِّ، العَجْز أو الضَّعف الكَبِدِيِّ، أمراض الغُدَد Adénopathies، أمراض مُعدِية، برونشيت مُزمِن، أمراض مُعدِية، برونشيت مُزمِن، كريب، روماتيزم، نِقْرِس، ديسنتيريا، تَطَبُّل البَطْن، قُرحة.

طريقة الاستعمال - نُقاعَة ٢٠ إلى ٤٠ غرام رُؤوس مُجفَّفة في ليتر ماء غالٍ يُخطَّى ١٠ دقائق، يُؤخَذ منها من يُخطَّى ١٠ دقائق، يُؤخَذ منها من الدَّاخل كمُقَوِّية مُرَّة، ومن الخارج كلائمة للجرح. في ابتلاع الهواء وتَطبُّل البَطْن يُؤخَذ ٢٥ نُقطة في نِصف كُوب من الماء قَبْل الوَجبَتين من صِبغة ١٠ غروس مُزهِرة وأوراق تُنْقَع في ١٠٠ غرام كحول مُرهرة وأوراق تُنْقَع في ١٠٠ غرام كحول من ٧٠ درحة لمدَّة ١٠ أيّام، تُصفَّى وتُحفَظ في زُجاج مُحكَم. للشهيَّة تُؤخَذ كأس

صغيرة قَبْل الوَجبة من نُقاعة ٤٠ غرام رُؤوس مُجفَّفة في ليتر نَبيذ غالٍ يُغطَّى ١٥ دقيقة. نُصفِّي ونَحفظ في الزُّجاج. لمُعالجة القُرْحَة نَرُش مَسحوق الخامادَريُوس على المكان المُصاب من البَشرة. لهذا ويُشكِّل الطُّوقَريُون واحدًا من الأصناف الشّافية للجُرح.

مُلاحظة - يَعود اسم هٰذا النَّبات العِلميّ إلى التّشابُه بين أوراقه وأوراق السِّنديان المُزنَّد، ولهذا ما يَقى من خلطه البُوتانيكي مع الأنواع الأخرى. أمّا اكتشاف الخصائص الطِّبيَّة فيُنْسَب إلى أمير طروادة Teucer. وقد جاء في الندوة الوطنية الأولى للنباتات الطبيّة والتَّداوي بها التي أقيمت عام ١٩٩٥ في لُبنان، في كلمة اليروفسور السيِّدة إيزابَيل فُوراسْتي Fourasié أنّ استعمال لهذا النَّوع مُنِع لسنوات قليلة خَلَت في فرنسا بعد أن تأكُّد تَسبُّبَه لحوادث مُميتة على مَرّ الأيَّام، علمًا بأنَّ الطَّوقَريُون يَدخل هناك في صنع الشُّرْتروز وأنواع القُرْموث واللبكورات الهاضمة والمشهبة و المُقَوِّبة .

طوق

١٧٩ - ظَهِيْرَة بِلُّوْرِيَّة، حَشِيشَة البِلُّوْر Ice plant, Diamond ficoïdes (E) Glaciale, Cristalline (F) Eiskraut-Mittagsblume (D) Mesembryanthemum crystallinum, Cryophytum crystallinum (S)

نَبات حَوْلَتَ من فَصِيلَة الظُّهْرِيّات أو الظُّهيْريّات سُوقُه تَعلو من ٣٠ إلى •٤سم، مُنبسِطة، أسْطوانيّة، لَحميّة؛ أوراقُه ذات حُور بصلات بارزة جدًّا، البلُّور، غاسُول إفرنجيّ.

سَضاء أو خفيفة اللُّون الورديّ؛ أزهارُه صَغيرة القدّ، بَضاء اللُّون، ورديَّة الحَتَار بَعض الشِّيء، تَتَفتُّح خلال النَّهار. ازهراره يستمر من حزيران إلى آب.

الخصائص والاستعمال - مُجِّدت هذه الظُّهيرة في الماضي على أنَّها دواء مُلَطِّف في حالات السُّعال التَّخَلُّجي، والسِّل، وحَقَّن البَول؛ وإذا فُركت تُوضَع على الحُروق، وعلى القُروح.

مُلاحظة - يَزرعُها الهُواة للزِّينة بسبب فَرادَة نُقاطها البِلُّوريَّة الَّتِي تُشْبِه نُقاط الماء المُثَلَّج. وذُكر أنَّها صِناعيَّة يُستخرَج من عُصارة أوراقها أملاح قِلُويَّة تَدخُل في صِناعة البلُّور؛ من أسمائها: عُشبة يَمتد من حزيران إلى تشرين الأوّل. الأقسام المُستعملَة هي الأزهار والنّبات المُزهِر والبزور.

المُركِّبات - غلوكوسِيدات، زَيْت دَسِم، قِلَوِيدات عديدة منها ما يلي: دَلْ فِينِيْنِ ، C<sub>34</sub>H<sub>47</sub>O<sub>9</sub>N دَلُوزِيْن . C<sub>25</sub>H<sub>41</sub>O<sub>8</sub>N

الخصائص - مُضادَّة للالتهاب، مُبيدَة للطُّفَيليّات، طارِدة للدِّيدان المِعَويّة، مُبوِّلة، مُسهِّلة، دامِلة للجروح.

الاستعمال - الجَرَب، التَّقَمُّل، البَوْل، العَيْن.

طريقة الاستعمال – لمُعالَجة الجَرَب نَدْهَن بمرهم من ١٥ غرامًا من البزور المَسحُوقة المَخلُوطة مع ١٥٠ غرامًا من الشَّمْم الحَيوانيّ المُناسِب. في مُكافَحة التَّقَمُّل نَذُرّ الأماكن المُصابَة بمسحوق البزور المُجفَّفة المَطحُونَة. أمّا في حال احتقان البَوْل فنضع لَصُوقًا من النَّبات الخَض المُفرفَك على أسفل البَطْن. الجُفُون المُلتَهِبة نَغسِلها بنُقاعة من ١٠ الجُفُون المُلتَهِبة نَغسِلها بنُقاعة من ١٠ غرامات من أزهار العائق في نِصف ليتر ماء نضيفه إلى نُقاعة ١٠ غرامات من بَتَلات الورد الأحمر.

ملاحظة - إنّ استعمال العائق من الدَّاخل لا يَتمّ إلّا بإشراف الطَّبيب، فالنّبات سامّ بكلّ أقسامه ما عدا الأزهار، كما أنّه يُستعمَل في مجال الطِّبّ البيطريّ. مَهْد العائق هو آسيا الصُّغرى ولكنَّه لم يُذكر في فلورا لُبنان.

2

١٨٠- عاثِق الحُقُول، كُنْسُوْدَة مَلَكِيَّة، رِجْل القُبَّرَة، خالِف وَالِدَيْه

Field larkspur, King's consound, Knight's-spur (E)

Dauphinelle pied-d'alouette, Dauphinelle des blés, Dauphinelle consoude, Consoude royale, Herbe aux poux (F)

Feldrittersporn, Rittersporn, Hornkümmel (D)

Consolida regalis, Delphinium consolida (S)

نَبات حَوْلِيّ من فَصِيلَة الحَوْذانِيَّات يَعلو من ١٠ إلى ٢٠سم. ساقُه مُنتصِبة، هَزيلة، شِبه مَرْطاء، مُتفرِّعة. أوراقُه سُيور طَويلة ضَيِّقة، قُناباتها بَسِيطة وقصيرة. أزهاره قاتمة اللَّون الأزرق، طَويلة الزِّنادات، في مَجموعات من آو ١٠ زَهرات في عُنْقُود هاميّ مُرْتَخ، أو ١٠ زَهرات في عُنْقُود هاميّ مُرْتَخ، خَمْس كأسِيّات بَيضويّة الشَّكْل، بَتَلانِيَّة. التّاج من أربع بَتَلات مُتَّجدة تَستطيل إلى مِهماز يَبلغ طولُه حَوالى تَستطيل إلى مِهماز يَبلغ طولُه حَوالى تَحضُن بزورًا سوداء اللَّون، مُجعَّدة تَحضُن بزورًا سوداء اللَّون، مُجعَّدة ومُحرشَفة. الجذور وَتدِيّة. الرّائحة مَعدومة. الطَّعم حامِز ومُرّ. ازهراره مَعدومة. الطَّعم حامِز ومُرّ. ازهراره

# عَحنة جيلاتين قَرْن الأيل

Pâte de gélatine du corne de cerf

مَلتُوت قَرْن الأيِّل السُّكُّريِّ ....١٠٠٠ غ صَمْغ عَربِيّ .....١٠٠٠ غ شَرابِ سُکَّری (بسیط) ۷۵۰ غ ماء زَه اللهُ تُقال ¿ 10. ماء شائع .....ماء شائع نَقُوم بالعَمليَّة كما في تُحضير عَجينة

# عَحينة الحَلَزُونِ أو النزّاق

الأَشْنَة Lichen. لذكرى التاريخ.

Pâte de limaçons ou d'escargots

لَحْم بَزَّاق أُو حَلَزُون ١٠٠ غ ٤٥٠٠

نُحضِّر عَجينة مُتجانِسة بهرس اللَّحم في الهاون ومن ثُمَّ سحقه على حَجَر خاصّ لصُّنْع الشوكولا، ومن ثمّ نُمرِّر من خلال مُنْخُل شَعرى. نصهر الكلّ، و من جهة ثانية:

\$ 0 . . صَمْغ عَربيّ ماء .....كمِّيَّة كافية

من دُون طَبْخ، نُمرِّر لهذا اللَّبِّ في مُنْخُل نُمرِّر، نُبُخِّر في حَمَّام مريم إلى القِوام الشّرابيّ، نُضيف إلى الصَّمْع عند ذلك لُتَ الحَلَزون و٦ زلالات بيض مَخفوقة جيِّدًا مع ٦٠ غرامًا من ماء زَهْر البُر تُقال؛ نُنهى عمليّة التّبخير في حَمّام مريم مع التَّحريك. للتاريخ.

أمّا ضُروبه الكسرة الأزهار فتُزرع للزّينة أردنا ذلك. فقط وتُستَبْعَد من التّداوي. الأطبّاء القُدامي كانوا يعتبرونه لا يُضاهى في تَمتين الكسور وشِفاء الجروح، وهو استعمال طواه الزَّ مَن وأهمل تمامًا.

١٨١ - عَجُّور، عَبْد اللّاوي

Chate of Egypte, Orange melon, Hairy cucumber (E)

Concombre d'Egypte, Concombre chaté, Abdellawi (F)

Agyptische melone, Orangen melone, Arabische kukumer (D)

Cucumis melo var. Chate, Cucumis chate (S)

نَبات حَوْليّ تَزيينيّ وزِراعيّ من فَصِيلة اليَقْطِينِيَّات مُوبِر جِدًّا. سُوقه مُتَلَوِّية، خُماسيّة الزُّوايا. أوراقُه كلويّة الشَّكْل المُستدير. ثمارُه مأكولة، مُوبرة، إهْليلجية، خضراء اللُّون المُجَذَّع بالأحمر أو الأصفر. تَكثُر زراعتُه في البلاد الحارة أخصها مصر والسودان.

١٨٢ - عَجِينَة، عَجائن Pâtes (F)

Pâte de figues عَحبنة التّين

نُحوِّل كمِّتة مطلوبة من التِّين إلى لُت من الشُّعر، نَخلطه مع مِقدار ٤ مَرّات وزنه من السُّكُّر، ونَصنَع عَجينة نَمدُّها بالشَّوْبَك؛ نَضعها في المِحَمّ لمدَّة ٢٤ ساعة ونُقسِّمها إلى مُرَبَّعات أو إلى مُعتَّنات. يُمكننا أن نُقَنِّد هٰذه العجينة إذا

ع ج ي	شَراب التُّوت السُّكَّريِّ	عَجِينة راقُو السَّوداء Pâte noire de Ravaut
	بَلْسَم تُولُو	مِيكْسْيُود Mixiod ميكْسْيُود مُنسَووق عِرْق الذَّهَبِ ١ غ
	مُستخلَص عِرْق الذَّهَب ٢ غ صَمْغضمُغ	تحت نيترات البيزموت
	عَجينة صَدريّة بَلْسَميَّة الأزهار الأرْبعة ٥٠٠ غ	مادة إضافيّة، بكمِّيّة تكفي لمقدار ١٠٠٠ غ كانت تُستعمَل في معالجة الدّيسنتيريا الأميبيّة والتهابات المِعَى والأمعاء
	صَمْغ عَربي ٣٠٨٠ غ صِبغة تُولُو ٢٤	المَجهولة السَّبب وذلك إمَّا على شُكل حُبَيْبات (من ١ إلى ٢ مِلْعَقة صغيرة مع
	ماء	كلَّ من الوَجبات الثّلاث)، أو في مُضغوطات (١ إلى ٢ في اليوم)، وليوم من يومين. للتاريخ.
		عَجينة رِئَة العِجْل الصَّدريّة Pâte pectorale de mou de yeau
	Pâte de lactucarium         عَجينة العُنَّاب         مُستخلَص عُصارة الخَسّ الكحوليّة ١ غ	Pâte pectorale de mou de veau         خ ۱۰۰۰         خ عجل         تین مُجفَّف
	Pâte de lactucarium  عَجينة العُنَّابِ مُستخلَص عُصارة الخَسّ الكحوليّة ١٠٤ غ صِبغَة بَلْسَم تُولُو ٢٠٠٠ غ نُحضِّر العَجينة. كان يُعطى من هٰذه	Pâte pectorale de mou de veau         إرئة عجل         قين مُجفَف         تَمْر         عُنّاب
	Pâte de lactucarium  غجينة العُنَّاب  مُستخلَص عُصارة الخَسّ الكحوليّة ١٠٠ غصبغّة بَلْسَم تُولُو ٢٠٠٠ نُحضِّر العَجينة. كان يُعطى من هذه العجينة في الماضي من ٣٠ إلى ٢٠ غرامًا في حال الإصابة بالبرونشيت.	Pâte pectorale de mou de veau         إية عجل         ين مُجفَف         ين مُجفَف         تمر         عُمّر         عُتاب         صَمْع عَربي         سُكَّر قَبْدِي         المُكَّر قَبْدِي
	Pâte de lactucarium  عَجينة العُنَّابِ مُستخلَص عُصارة الخَسَّ الكحوليّة ١٠٠ غ  مُستخلَص عُصارة الخَسَّ الكحوليّة ١٠٠ غ  صِبغَة بَلْسَم تُولُو ٢٠٠٠ نُحضِّر العَجينة كان يُعطى من هٰذه العجينة في الماضي من ٣٠ إلى ٢٠ غرامًا في حال الإصابة بالبرونشيت .  عَجينة للألكْترودات (مُخَطَّطُ القَلْب عَجينة للألكْترودات (مُخَطَّطُ القَلْب الكَهْرَبائيّ)	Pâte pectorale de mou de veau         رئة عجل         تين مُجفَّف         تين مُجفَّف         تُمْر         عُنّاب         صَمْع عَربي         سُكُّر قَنْدِي         بلُسَم تُولُو         ماء زَهْر البُرتُقال
	Pâte de lactucarium	Pâte pectorale de mou de veau         رئة عجل         تين مُجفَف         تين مُجفَف         تمر         مَنْ مُجفَف         مُتاب         مُتاب         مُتاب         مُتاب         مُتاب         مَنْ عَربي         مَنْ يُولُو         مَاء زَهْر البُرتُقال         صِبغة الوانيليا
1 2 9	Pâte de lactucarium	Pâte pectorale de mou de veau         رئة عجل         تين مُجفّف         تين مُجفّف         تمر         تمر         مُحمّدة الأُشْنَة (الخَرَز)

ماء مُقطَّر ٢٠٠ غ
ماء الكَرَز الغاري١٠
كُودايينكُودايين
نَحُلُّ الصَّمْغ في الماء كما هو مذكور
في مقال «عُجينة الأوكاليبتوس
المَّخْزَنيَّة». نُضيف السُّكَّر ونُبخِّر حتّى القِوام المُناسِب. نُبرِّد؛ نُضيف ماء
الْهُوام الماسب. ببرد؛ تصيف ماء الكرز الغاري ومحلول الكُودايين في
صِبغَةٌ بَلْسَم تُولُو؛ نَمزُج جيِّدًا ونَصُبّ
في قَوالب. نُنهي العمليّة بالتَّبخير في
مِحَمِّ حرارته ٤٠°سغ.
<ul> <li>١٠٠ غرام من لهذه العَجينة تَحتوي</li> <li>حَوالى ٥ سنتغ من الكُودايين.</li> </ul>
مُلاحظة - تُلوَّن هٰذه العَجينة عادة
بالورديّ وذلك بإضافة كمِّيّة صغيرة من
مادّة مُلوَّنة وَرديَّة مُسموحة: أريتروزِيْن
(كودكس ١٩٦٥).
نظام الجدول Régime du Tableau A
١٨٣ - عُدَيْن ثُلاثِيّ التَّذَلُّق، مَكْلُوْرَة ثُلاثِيَّة التَّذَلُّق <sup>(١)</sup>
Cuspidate cudrania, Cuspidate maclura
(E)
Cudranie tricuspide, Maclure tricuspide
(F)
Cudrania tricuspidata, Maclura tricuspidata (S)
data (S)

مِلح بَحريّ مُسحوق٤٣٨ غ
حَجَر خَفَّان مَسحوق مَعْ ٥٤٠ غ
ماء مُقطَّر كمِّيَّة كافية١٢٠٠ غ
نَحُلُّ بيتَرتْرات البوتاسيوم والملح في
الماء السّاخن. نَمزُج صَمْع الكُثَيراء
وحَجَر الخَفّان. نُضيفُ الغليسّرين إلى
المحلول المِلحيِّ ونَسكُب على مهل فوق حَجَر الخَفَان وصَمْغ الكُثَيراء
الممزوجين وندقُهما بواسطة مِدَقَّة.
عَجينة مَخزَنيّة ببَلْسَم تُولُو والكُودايين
Pâte officinale au baume de Tolu et à la codéine
تركيبة كودكس ١٩٦٥:
صَمْغ عَربتي ٤٢٥ غ
صِبغة بَلْسَم تُولُو ١٠
كُودايينكُودايين
ماء كَرَز غاريّ مُقَطَّر١٠ غ
سُكَّر أبيض لمقدار كيلو واحدكمِّيَّة كافية
سُكَّر سَميدكمِّيَّة كافية
ماءكمِّيَّة كافية
نُحضِّر كما في عَجينة الأوكاليپتوس.
قَبْل أن نَصُب، نُضيف ماء الكَرَز الغاريّ
ومِن ثمّ صِبغة تُولُو الَّتي نَكون ذَوَّبْنا فيها
الكُودايين .
التَّحضير التَّالي كان مُسجَّلًا في
کودکس ۱۹۶۹:
صَمْغ عَربيّ٥٢٥ غ
سُكَّر أبيض ٤٢٥ غ

شَجَرة صَغيرة من فَصِيلَة التُّوتيَّات

مَهدها الصِّين، تَعلو حوالي ٦ أمتار. فُروعها هزيلة تَحمل أشواكًا قصيرة،

 هَ: بلة، جالسة وصُلْبَة. أوراقُها عابلة، مُتبادَلة، رأسها ثُلاثتي التَّفصيص عمومًا، قصيرة، مُعنَّقة. أزهارها ثُنائية المسكن، إبطيّة الارتكاز، مُخضَرّة اللُّون الأصفر، غير تَزْيينيّة. النَّمرة كُرَويّة الشُّكُل، حمراء اللَّون، مَأْكُولة. تُزهر في تموز وتَصلُح لسياجات وقائيّة جدًّا.

١٨٤ - عُدَيْن جافًا، مَكْلُوْرَة كاليدونيا(١) Java cudrania, Calidonian maclura (E) Cudranie de Java, Maclure Calidonienne (F)

Cudrania Javanensis, Maclura aboinensis (S)

العُدَيْن جنس أشجار أو شُجَيرات من فَصِيلة التُّوْتِيَّات، مُنتصِبة أو عارِشة أحيانًا، شائكة، أوراقُها عابلة، مُتبادَلة، مُعنَّقة، كاملة. أزهارها ثُنائيَّة المسكن، إبطيّة الارتكاز، مُخضَرَّة اللُّون الأصفر. ثمارها كُرَويّة الشَّكْل. مَهدها الصّين وأستراليا وكاليدونيا الجديدة. أمَّا عُدَيْن جاڤا فجَنْبَة عارشة من غابات كاليدونيا وأدغالها، ترغب التُّربة الغَنيَّة بالكلسيوم. وهي جَنْبَة طاردة للحُمّي.

١٨٥ - عَرْصَف جنيف(٢)

Geneva bugle (E) Bugle de Genève (F) Genfer günsel (D) Ajuga genevensis (S)

العَرْصَف جنس نَباتات من فَصِيلَة

(١) كلّ التَّسميات للمؤلّف ما عدا التَّسميات اللاتينيّة.

(٢) التَّسمة للمؤلِّف.

الشُّفَويَّات، حَوْليَّة أو مُعمَّرة، يَكون عرص يَعضُها أحيانًا رئدي. أوراقُها دَوَّاريّة التَّجميع. أمّا عَرْصَف جنيف فنوع مُعمَّر سأَقُه مُنتصِبة، غير رئْديّة، مُوبرة، تَعلو من ١٥ إلى ٣٠سم. أوراقُه مُسنَّنة خَضراء ومَكسوَّة بالأوبار المُتفرِّقة. الزُّهرة زرقاء، ومنها ضُروب وَرديَّة أو بيضاء .

> الخصائص - قابض، لائم، شاف للجرح.

الاستعمال - كامِل النَّبتة، الأوراق.

طُرُق التَّداوي - مِلْعَقَة صغيرة من مُسحوق النَّبات، ٣ مَرَّات في اليوم، مع المُربّى أو العسل أو في أقراص. نُقاعة الأوراق في الماء الغالى يُغطّي عَشر دقائق ويُؤخَذ منه ٣ فناجين يَوميًّا. النُّقاعة المُركِّزة تُستعمَل للغسيل والشَّطْف والحُقِّن والكمادات.

يُعتَبر العَرْصَف في الأرياف الأوروبيَّة من أفضل الأدوية اللّائمة للجروح، فتُوضع مُباشرة على الجُرح وتُربَط إليه حتّى ولو كان داميًا نازفًا. ويُؤكِّد بعضُ المؤلِّفين أنَّه كثيرًا ما رأى جُروحًا في الحَقْل، مُلوَّثة بالتَّراب وسواه، تُشفى تمامًا وبسرعة بعد ضمادها بهذه العُشبة، ولا يَبقى لها أيّ أثر لالتهاباتٍ مُفترَضَة بَعد هٰذا العلاج. ويَذكُر البَعض أنّ النَّبتة الفَتيَّة الغَّضَّة تُؤكَّل مُضافَة إلى الحساء مع القُرّاص والسَّيْلان. السيفالين ما يلي: C<sub>28</sub>H<sub>38</sub>O<sub>4</sub>N<sub>2</sub>، وهو ديهيدروپسيكوترين؛ إنّ هاتين القاعِدتين تَذوبان في القِلَى بفضل وجود عَمل

فينوليك حُرّ في ذَرّاتهما. أمّا تَركيب الأمّاتين فهو:  $C_{29}H_{40}O_4N_2$  وهو أثير السيفالين المَثيليكيّ.

بالإضافة إلى ما تَقدَّم، يُوجد في عِرْق الذَّهب المَخزَنيّ ٤ قِلُويدات ثانويّة هي: إيكامِيْن وهيدرو إيكامين اكتشفهما هَسّ عام ١٩١٤؛ أميتامِيْن تركيبه C29H36O4N2 ومتيل پسيكوترين

يلى: C<sub>28</sub>H<sub>36</sub>O<sub>4</sub>N<sub>2</sub>4OH<sub>2</sub>؛ وتركيب

إِنَّ تَوزِيع هٰذه القِلَوِيدات يَختلِف في النَّوعين اللَّذين يَنتميان إلى جنس النَّوعين اللَّذين يَنتميان إلى جنس Uragoga، ولكن نِسبة القِلَويدات العامّة تَبقى فيهما ذاتها بشكل محسوس. تَتمركز هٰذه القِلَوِيدات بشكل حَصْرِيّ في القِشرة وعلى الأكثر في طبقاتها الدَّاخليّة، مِمّا يُوجب الاحتفاظ بالأسطوانة المَركزيّة كفُضالة عندما نسحَق العَقّار.

إنّ عِرْق الذَّهب المَخزَنيّ يَجب أن يَحتوي على ٢٪ كحد أدنى من القِلَوِيدات العامّة المَحسوبة بالأماتين بالنِّسبة إلى العَقّار المُجفَّف في حرارة بالنِّسبة إلى العَقّار المُجفَّف في حرارة .٠١-٥-١٠٠

الاستعمال - مَسحوق (دستور ١٩٦٥)، مسحوق مُعيَّر (فرماكوبيا)، شراب عرق الذَّهَب السُّكَريِّ المُركَّب، صِبغة (دستور ١٩٦٥). مُستخلص عِرْق

المُركَبات - يَحتوي عِرْق الذّهب المَخْزَنيّ على حَوالى ٣٠٪ من النّشاء، وعلى شمع، وراتنج، وأوقصالات الكلسيوم وأملاح مَعدنيّة، وعلى ٣ إلى شريّة (٢ إلى ٣٪) مُشتقَّة مَن الأيزوكينولايين، وهي: أمّاتين، من الأيزوكينولايين، وهي: أمّاتين، سيفاليين، پسيكُوتْرين؛ ويَحتوي سيفاليين، پسيكُوتْرين؛ ويَحتوي بالإضافة إلى ذلك على مادّة عَفصيّة قابلة لللذّوبان، وهي حامِض إيكاكوانيك، ٣ إلى ٥٪، يَعمل كدواء مُضادّ للإسهال تَمَّت دِراسته عام مُضادّ للإسهال تَمَّت دِراسته عام قليل الذّوبان في الماء، تركيبه مجهول.

إنّ الأماتين هو غير قابل للتَّبلُّر، ولكنّ أملاحه مُتَبلِّرة. وهو ذَوّاب جدًّا في الأثير، والكلوروفورم؛ قليل الأثير، والكحول، والكلوروفورم؛ قليل اللَّوبان جدًّا في الماء وفي أثير البترول، لا يذوب في القِلَى.

السيفالين مُتَبلًر، لا يذوب في الكحول وفي الكلوروفورم، أقل ذوبانًا في الأثير من الأماتين، أكثر ذَوبانًا منه في أثير البترول وذَوّاب جدًّا في محاليل القِلَى الكاوية.

البسيكوترين خفيف الذَّوبان في الماء، يَذوب في القِلَى. إنَّ السيفالين هو الأقوى من حيث العَمل المُقَيِّئ.

لقد أظهرت أبحاث كلّ من كارّ وبِيْمَن، ١٩١٤-١٩١٨، أنّ تركيب البسيكوترين الكيميائيّ قد يكون كما

الذَّهب، شراب عِرْق الذَّهَب السُّكَّريّ (فر ماكوبيا).

تضادّاته - حوامِض نَباتيّة، نُقاعات ع ق ا قايضة.

خطر - الجدول Dangereux - Tableau C

الخصائص - يُستعمَل كدواء مُقشِّع في التَّزْلَة، والشُّهاق: ولكن على الأكثر كدواء مُقيَّئ في التَّلَبُّكات المِعَويّة، وفي حالات نَفْث الدّم. وهو كذلك مُضاد للإسهال، ومُضاد للدِّيسنتيريا. إنَّ المُقيِّئ. أخصّائيّون يَستعملونه في مرهم المُقيِّئ. أخصّائيّون يَستعملونه في مرهم كدواء مُحمِّر للبَشَرة وحتِّى كدواء كاوٍ، على طريقة زَيت الكروتن. وهكذا فإن مروخ هَانّاي الّذي يُستعمل كمُحمِّر للبَشَرة بُن يُستعمل كمُحمِّر للبَشَرة و أَلَّد مِن اللَّمَة وَيَت الكروتن. وهكذا فإن مَروخ هَانّاي الّذي يُستعمل كمُحمِّر للبَشَرة، يَتألَّف من: عِرْق ذَهب مُسحوق جزء واحد، زَيت زَيتون جزء واحد، رَيت زَيتون جزء واحد، مُهارة خنزير جزئين.

نُقاعته صافية؛ نقيعه عَكِر ومُضطَّرب ويَحتوي كثيرًا من النَّشاء. والنقيع لا يَصلح إلّا في حُقنَة شَرجيّة للدِّيسنتيريا.

طريقة الاستعمال - مسحوق ٦,٠ إلى غرامين كمُقيِّى ومُسهِّل قَويّ، ٣٠،٠ إلى ٣,٠٠ غرام كمُقشِّع؛ رقم عرام كمُقشِّع؛ نُقاعة بنسبة ٢٪؛ مُستخلَص كحوليّ ١,٠٠ إلى ٣٠،٠ غرام؛ شراب سُكَّريّ ١٠٠ إلى ٥٠ غرامًا؛ شراب سُكَّريّ مُركَّب؛ أقراص (دستور ١٩٣٧) من مُركَّب؛ أقراص (دستور ١٩٣٧) من ١٠،٠ غرام؛ ٢ إلى ٨ أقراص؛ صِبْغَة مُرامًا كمُقبِّع (١/١) من ٥ إلى ٢٠ غرامًا كمُقبِّع (١/١) من ٥ إلى ٢٠ كمُقشِّع؛ مَسحوق عِرْق الذَّهَب المُؤَفْيَن وَمسحوق عِرْق الذَّهَب المُؤَفْيَن أو مسحوق دُوڤَر.

Espèces (F) عقاقير نباتيَّة - ۱۸۷

عَقاقير طاردة للرّيح، بُزور طاردة للرّيح، بُزور حامِية.

يانسون، شُومار، كُزْبَرة، كَراوِيا، بأوزان مُتساوية (١٨٨٤).

عَقاقير مُبوِّلة، خَمْسة جُذُور مُشَهِّية، خَمْسة عَقاقير مُشهِّية.

جُذور مُجفَّفة مِن الشَّومر، والسَّفَنْدَر، والحَرفُ س البَرِّي، والهَ لميون، والبَقدونس، بأوزان مُتساوِية (١٨٨٤).

في زهورات نُقاعة بالماء الغالي بنسبة ٢٠ بالألف.

ثِمار الشُّومر، أوراق عِنَب الدُّب، جَنْر السُّوس، بأوزان مُتساوِية (في مُلحق دستور أدوية ١٩٤٠، وفَرْماكوبيا بلجيكا).

# عقاقير مُطْمِثة

ناردین، شیح، خَرْبَق أسود، أثینة دُودِیّة، جَزر الشِّیح، بأوزان ۱۰ غرامات من كلّ نوع.

## عقاقير مُليِّنة

أوراق مُجفَّفة مِن الخَبَّازة، الخُبَّيزة، بُوصِير، حَشيشة الزُّجاج، بالتَّساوي في تَبخيرات، حقَن شَرْجيَّة، حمّامات، لَصُوقات، نَقيع مَغليّ بمقدار ٥٠ بالألف (دستور ١٨٨٤).

Jujube tree, Zizyphus, Indian jujube (E) Jujubier, Gingeolier, Guindanlier, Cicourlier (F)

Jujubebaum (D)

Zizyphus jujuba, Zizyphus vulgaris, Zizyphus sativa, Zizyphus officinarum, Rhamnus Zizyphus (S)

جَنْية أو شَجَرة صغيرة مَرْطاء من فَصِيلَة النَّبْقِيّات تَعلو من ٥ إلى ٧ أمتار وأكثر. فُروعها عديدة، مُتَلوِّية، مُزَوَّاة. إبَرُها مفقودة غالبًا أو تُوجد على الفُروع الثَّانويّة فقط. أوراقها يَيضويّة الشَّكْلَ المُتطاول إلى سِنانيّة، طولها ٢ إلى ٦سم، مُستدقّة أو مُنفرجة الرّأس، مشطيّة التَّفريض، مَرْطاء، لامِعة، ثُلاثيّة العُروق، أذناتُها شائكة. الثَّمرة مُفرَدة النَّواة، مأكولة، لذيذة الطَّعم السُّكّريّ اللَّعابيِّ والجيلاتينيِّ بَعض الشَّيء، بُنَّيَّة إلى قاتمة اللَّون الأحمر العُنَّابيّ، فسوداء عند النُّضج، بَيضانيّة إلى مُتطاوِلة الشُّكْل، مُتدلِّية، قد يَبلغ طولها ٢سم. نَواتها صُلْبَة، إهليلجبّة الشُّكُل وخشِنة السَّطح. أزهارها صغيرة القدّ، صفراء اللُّون، بضُمَّات إبطيّة الارتكاز من ٣ إلى ٥، وقيل من ٢ إلى ٣ زُهرات. ازهرارها من أيّار إلى حُزيران. مَهدها الصِّين (والهند؟) وتَأْقِلْمَت في منطقة البَحر المُتوسِّط حَيث أدخِلت إليها حَوالي العام ٢٠٠٠ قبل المسيح.

المُركِّبات - الثَّمرة وتُدعى عُنَّابَة تَحتوي على قليل من الأنْتراكِينون.

المُستخلَص المائيّ من خشب العُنّاب يَحتوي على جَوهر مُتبلِّر هو الحامِض الزِّيزيفيك أو الحامِض العُنّابيّ Acide الزِّيزيفيك أو الحامِض العُنّابيّ الزِّيزيفُوتانيك أو الحامِض العُنّابيّ العَفْصيّ Ac. Zizyphotannique، قليل العَفْصيّ Ac. Zizyphotannique، قليل من السُّكَر (Latour)، زَيت دَسَم، لُعاب، پَكْتين، مالات، نيترات، تَرْترات.

الخصائص - الثّمرة الطّازجة مُعندِّية. النَّمرة المُجفَّفة مُهدَّئة، مُليِّنة، نافعة للصَّدر، مُبوِّلة. رَماد الخَشَب المَمزوج مع الخَل مُضاد لِللَدْغ الأفاعي. المُستخلَص المائيّ لخشب العُناب يَتحلَّى بخصائص الكاشو (من أفضل المُقوِّيات القابضة في تَنشيط وتقوية المُعدة والأمعاء، وفي مُعالجة يَوميّة للإسهال، والنَّزيفات البسيطة، وسَيلان المَهبِل والتَّعقيبة...)؛ زَيت العُنَّاب للطَّناعات المكانكة الدَّقيقة.

الاستعمال - التهاب الحَنْجَرة والمجاري التَّنفُسيَّة، بُحَّة، برونشيت، زُكام، رَبُو، شعال، التهابات معويّة وبَوليّة، إمساك، ارتفاع التَّوتُّر الشِّريانيِّ.

طريقة الاستعمال - عَجينة العُنّاب: كودكس ١٨٨٤ وملحقه ١٨٩٥، الثَّمار الأربعة المُقشَّعة: كودكس ١٨٨٤ ومُلْحَقه ١٨٨٥، نقيع الثِّمار: كودكس ١٨٦٦، العُنّابة أعيد تسجيلها في الفَرْماكوبيا الفَرنسيّة الحديثة عام

19۷٥. مُستخلَص مائيّ من خَشَب العُنّاب. العُنّابة تَتَعارض والرَّغَبات التَّناسلة.

- نقيع ٣٠ إلى ٦٠ غرامًا من النّمار في ليتر ماء يُغلى نِصف ساعة، يُغطًى عشر دقائق ويُؤخَذ منه قدر المُراد. أو نقيع العُنّاب والتّين والتّمْر والزَّبيب معًا. رَماد خَشب العُنّاب يُمزَج مع الخَلّ ويُوضع على عَضَّة الأفعى. زَيت العُنّاب يُستعمَل حديثًا في الصّناعات الميكانيكيّة الدَّقيقة كبديل عن الزُّيوت المُستخرَجة من أبيض البال.

مُلاحَظات - العُنَّاب يَشيع جدًّا في الجزائر، ويُزرع هنا وهناك في لُبنان حيث يُشرَك بينه وبين السِّدْر الكُرَويّ النِّمار! ولقد عَرَف العُنَّابِ أطبَّاء العَرب واستعملوه من أزمنة قديمة جدًّا. وهم يَستعملون مزيجًا من رَماد خُشبه ومن الخَلِّ ويَضعونه على الجُروح النّاتجة عن لَدْغ الأفاعي. ومن جهة ثانية، يُقال في لُبنان إنّ العُنّاب «يُدَوِّخ» ذلك أنّ أكل ١٠ إلى ١٥ عُنَّابة قَد يُؤدِّي عِند البالغ إلى الدّوار والدّوخة! ويُؤكّد البعض أن أكل كمِّيَّة مُبالَغة من العُنّاب يُؤدّي إلى هُبوط التَّوتُّر الشِّريانيّ، مِمّا يُعرِّض أصحاب «الضّغط الواطي» إلى الوَهْن والاسترخاء، وربَّما الغَيبوبة (حالة مُماثلة حدثت في بيروت فأودت بصاحبتها، محمولةً إلى أقرب مُستشفى حيث تَمَّت معالجتها من هبوط الضَّغط الدُّمويّ إلى درجة دنيا).

إنّ هاتين الخاصّيّتين، إن صَحَّتا، قد عنب تكونان مُفيدتين جدًّا لمن تفاجئه الأفعى السّامَّة على غَفلة منه، ولمن يَشكون من ارتفاع الضّغط. وما أكثرهم! وإنّه من المُفيد جدًّا امتداد التَّجربتين الآيفتين وتطبيقهما على أخشاب السّدر والضّال والشُّبُهان، كما على ثمار كلِّ منها المأكولة على غِرار العُنّاب، وهي أنواع المأكولة على غِرار العُنّاب، وهي أنواع تنتمي إلى فَصِيلَة العُنّاب وجنسه، ما عدا الشُبُهان الذي يَنتمى إلى جنس Paliurus.

١٨٩ - عُنْبُوب كَبِير الثَّمَر(١)

Big cranberry, Big bogberry (E) Airelle à gros fruits, Canneberge à gros fruits (F)

Grosser moosebeere (D) Oxycoccos macrocarpa (S)

جَنْبَة مُعمَّرة، عَدُوّة الكِلس، لِيفيّة القاعِدة من فَصِيلة الخَلَنْجِيَّات. سُوقُها نائمة ومُتَجَذِّرة. أوراقُها بَيضيّة الشَّكل، مُنفرِجة الرّأس، غَير مُقسَّمة وغَير مُسنَّنة، مُنفرِجة الرّأس، غَير مُقسَّمة وغَير مُسنَّنة، الأذنات، أطول من أوراق عُنْبُوب المَناقِع. أزهارُها فَرْدِيّة، طويلة السُّويْقات، بَتلاتُها أربَعَة مُتَّجِدة القاعِدة، زاهِية اللَّون الوَرديّ، مُلْتَقَّة الأطراف نحو الكارج على غرار سِيكلامَن صَغير. الكاس رُباعيّة خُماسيّة الفُصوص الكاس رُباعية خُماسيّة الفُصوص الأبيدة. الشَّمار عُنَيْبات مُتطاوِلة الشَّكل، كبيرة القَدّ، حَمراء اللَّون، رُباعيّة الخُجرات، مأكولة.

<sup>(</sup>١) كلّ التّسميات للمؤلّف ما عدا التّسمية اللاتينية.

نَبات أكبر من عُنْبُوب المَناقِع بكل الّبي تُسمّى cranberries، وهو من أقسامه، يُزْرَع في أمريكا لثماره الكبيرة نَباتات الفَرْماكوبيا.

# ۱۹۰ - غَرْغَرَة، مَضْمَضَة (Collutoires (F)

Collutoria (S) غَرْغَرَة كلُورهيدريكية عَسَل أبيض ............. ٤٠ غ ليكور لابارّاك ..... أو عَسَل مُورَّد ..... مُورَّد ٢٠.... حامض كلورهبدريك .....١٠ مُنظِّفة. في الرِّيالَة أو اللُّعابيّة الزِّئبقيَّة Ptyalisme mercurie، فی دَهْنات علی اللِّثتين؛ يَجِب تَلافي مُلاَّمَسة الأسنان. غَوْغَ هَ مُغَلِّسَهِ - مُبَورِقَة (أو رورك) ¿ 10 غليسرين نَوْرَق مُسحوق ....٨غ أَنْ يَحُلُّ ٨٠ بالمئة من البَوْرَق. المَحلول غَرور ضِدْ شَلَل اللَّسان يُحفَظ من دُون تَلَف أو فساد. Gargarismes (F)

۱۹۱ - غَرُور

	غَرور بِبُورات الصُّوديوم	
٠٠٠ غ	رُد أحمر	وَ
١٠٠٠.	اء مُقطَّر غالٍ كمِّيّة تكفي .	ما
نُمرِّر ونَعصُر	نُقاعة لمدَّة نِصف ساعة،	

بواسطة قُماشة رقيقة، ومن ثمّ نَحلّ: غوغ يُورات صُوديوم مسحوق ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ غ نُضيف إلى النُّقاعة:

> عسل مُورَّد ..... ١٥٠ غ ونُكمِل إلى ١٠٠٠ غرام بالماء المُقطِّر. نُحضِّر بالطَّريقة ذاتها الغَرُور العَقول أو المُشتَب باستبدال ٣٠ غرامًا من بُورات الصوديوم بـ١٥ غرامًا من الشَّت (دستور ١٩٤٩).

# غَرور ضِدّ الحُناك

كحولة حشيشة الملاعق ....٢٠ ماء مُقطِّر كمِّيَّة تكفى ٢٠٠٠ ملل ضِدّ التهابات غشاء الفّم والتهابات اللُّنة (نشرة الأطناء ١٩٤٢).

# غَرور ضِدّ الرِّيالَة

بَوْرَق كلورور الصود .....١٥٠ غ نَحُلّ على السّاخِن. الغليسّرين يُمكنُه عسل عسل السّاخِن. الغليسّرين يُمكنُه

رُوح حشيشة المَلاعِق ٢٤.... ¿ ٨ . . . . مِلح نُشادر حشيشة الحُمّى (مسحوق) ..... ع نَنقع على السّاخن طوال ليلة، نَصُبّ

ماء المَريميّة ..... ٢٥٠ غ

# غرور مُصَفْصَف حامِض سالِسيليك ..... كحول ..... ٤ ١٥٠ غَرور مُضادّ لداء الحَفَر (١٨٦٦) أصناف مُرّة .....٥ غ

٠ ٢٥ غ ماء غال نُقاعة لمدّة ساعة، نُمرِّر ونُضف:

ماء مُقطَّ

دواء عَسَلتي بَسيط ..... ٤٠٠ غ صِبغَة مُضادّة للحَفر ....٣٠٠

#### ١٩٢ - غُرَيّاء ، لاصُوْق Collodion (F)

كان مَايْنارد، عام ١٨٤٨، أوَّل مَن عَرَّف بمحلُول قُطْن الانْفِجار -Fulmi coton في الأثير المُكْحلَل، الّذي لم يَزل يُستعمل مُنذ ذلك الحين وحتى اليَوم باسم غُريَّاء.

إنّ قُطْن الانْفِجار الّذي يُستخدَم في تَحضير الغُرَيّاء يَتألُّف بنَوع خاص من السَّلُولُوز ال أوكْتُونيتريك القابل للذَّوَبان في مزيج من الكحول والأثير؛ ويَختلِف قُطْن الانْفجار عن قُطْن البارُود -Coton poudre الحَقيقي بنوع خاص كُوْن هٰذا الأخير يَتألّف بشكل أساسي من السَّلُولُوز اله أونْديكانيتريك Undécanitrique القليل الذَّوَبان في الأثير المُكحْلَل. وفي تَحضيره نَأخُذ:

قُطْنِ الانْفِجارِ المَخْزَنيِّ .....٥ غ كُحول ٩٥ درجة .....٢٠ غ

أثير نَقي مُكَرَّر ....٧٥ غ نُدْخِل قُطْن الانْفِجار في قارورة عريضة الفُتْحَة؛ نُبَلِّل القُطْن بالكُحول، ومن ثمّ نُضيف الأثير ونَخُض ؛ بَعد الذُّوبان، نَترُك المَزيج لكي يَرتاح و نُصَفِّق .

يَكُونَ النِّتَاجِ الحاصِلِ شَرابِيِّ القِوام، عَديم اللَّون أو خَفيف اللَّونَ اللَّبنيُّ، مُتعادَل، لَهُوب جدًّا. إذا مُدَّ بطبقات رَقيقة، يَترك بَعْد تَبَخُّره قِشرةً عديمة اللَّون ولاصِقة. يَجب حِفظُه في مكان بارد وفي قارورات مُقفَلة جيِّدًا.

يَتم الحُصول على الغُريّاء المَطّاطيّ بإضافة ٥ غرامات من زَيت الخروع إلى مقدار ٩٥ غرامًا من المُستحضر السّابق، أي جزء واحد إلى عشرين. وهو يُستخدَم لتحضير الغُريّاء الحامِض المُركّب، و الغُريّاء المُصَفْصَف Salicylé .

صَنَع أحدُهم من ٢٠غ من الغُريَّاء المَطّاطيّ ومن ٠,٥٠غ من المُصَعّد، دواءً مَوضِعيًا ضِدّ نَدَبات الوَجه التي تُحدِثُها الإصابة بالجُدَري: Variole . confluente

أمّا لإكساب الغُريّاء خصائص خاصة اقْتَرح البَعضُ إضافة الكريُوزوت إليه، وإضافة پركلورور الحديد، والأفيون، ومُستخلَص مِلح الرَّصاص Extrait de saturne، وحامِض الفينيك، وحامِض البَنْزَويك، واليُود، إلخ.

يُشار باسم قِشْرة Pellicule إلى الطَّبقة العِلاجيّة الخفيفة التي يَتركها الغُريَّاء غري

المُشْبَع بالجواهر الطِّبِيَّة على الجلد عندما يَتَبخَّر. وأعطى البعضُ التَّركيبة التّالِية للغُرَيَّاء المُذَرَّح<sup>(1)</sup>:

ذُرّاح مَسحوق ٢١٣٠ غ أو كمِّية كافية أثير خَلَيك ٢١٨٦ غ أو كمِّية كافية حامِض خَلَيك قابل للتَّبلُّر ٢١٨٠ غ أو كمِّية كافية قُطْن البارود ٢٥,٤٥ غ أو كمِّية كافية كحول مَتيليك ٢٦٨٠ غ أو كمِّية كافية نُعالجُها بالأثير وبالحامِض الخليك نُعالجُها بالأثير وبالحامِض الخليك المُحول المَتيليك ونُضيف قُطْن البارود. الكُحول المَتيليك ونُضيف قُطْن البارود. إذا عُولجت نَافِطة الشِّيكُورِيَة (١٠): إذا عُولجت نَافِطة الشِّيكُورِيَة (١٠): أيُعطى غُرَيَّاء أَشَد تَنْفيطًا.

يُطلِق سَاتُن اسم "أَلْكُولان" Alkolène على غُريّاء من دون أثير؛ يُحضِّر قُطْن الانْفجار بتغطيس قُطْن مَنْدوف مُقَطَّع بشكل دَقيق لمدَّة ٥ دقائق في مزيج حامِض كبريتيك كثافته ١٩٨٤ (١٩٣٤ عرامًا)، وحامِض نيتريك كثافته ١٨٤٠ (٩٣ غرامًا)، نُسخِّن المزيج في حَمّام مريم عند ٧٧°سغ؛ يُغسَل القُطْن بَعد ذلك بالماء الوافر وعِدَّة مَرّات ويُجفَّف في الهواء، ومن ثمّ يُخض مع الكحول في الهواء، ومن ثمّ يُخض مع الكحول (بكميَّة تكفي لكي تُغطِّي القُطْن بكامله)

الأسِتون له خاصِّيَّة حَلَّ قُطْن الأنْفجار، وهي خاصِّيَّة طُبُقَت واتُبعَت

غُريّاء بالأستُون: قُطْن انْفِجار ٥ غرامات، كافور غرام واحد، أستُون كمّيّة تَكفي لمئة ملل. يَتَبخَّر هٰذا المحلول ببطء أكبر ممّا يَتَبخَّر الغُريَّاء المَخزنيّ، ولكنّه يُعطي قِشرةً أَصْلَب. غُريّاء الأستُون لا يمكن مزجه مع العَفْص، إذ إنَّه بوُجود هذا الجسم تَتَشكَّل خُثارَة - Coagulum تَحتوي على كميّة كبيرة من قُطْن الانْفجار ومن العَفْص.

الخصائص والاستعمال - كان الغُريّاء في الماضي يُستعمَل جدًّا في الطَّبّ وفي الجِراحَة؛ وقد حَلَّ مكانه تِباعًا وبصورة مُتَصاعِدة اللَّصْقات المُشَمَّعة Sparadraps. ومع ذلك لم يَزل الغُريّاء يُستعمَل لضماد القُروح الصَّغيرة وكدواء رَقُوء على الجُروح الصَّغيرة أو على الغُوصات.

ولقد وَجَد الغُريّاء في المجال الصّناعيّ تَطْبيقات عديدة: صِناعة الأزهار الاصطناعيّة، الجلد الأرهار الاصطناعيّ، تَجليد الكُتُب، سَلُّولُويد (مادَّة صُلْبة شَفّافَة تُصنَع منها الأفْلام والأمْشاط وسوى ذلك)، إلخ. ويُحَشَّر غُريّاء التَّصوير الفُوتُوغرافيّ من ١,٥ غُريّاء التَّصوير الفُوتُوغرافيّ من ١,٥ قُطْن انْفجار، ٥٠ كحول، ١٠٠ أثير، ورور الأمّونيوم.

في تَحضير غُريّاءات عِلاجيّة. ويُشكّل غُريّاء الأستُون في الواقع أساس مُعظَم الأَدْويَة المُفَتِّتة للشَّفَن Coricides المُستعمَلة حاليًّا. التَّركيبة التّالية أعْطَت نَتائج جَيِّدة:

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمؤلِّف.

لِصَبْغ الشُّعر باللُّون الأسود، نَفرُك
الشُّعر بهذا اللِّيكور، ونُجفِّفه بعد عِدَّة
دقائق بواسطة قماشة ساخنة، ومن ثمّ
نَغسله بالماء العاديّ.
غَسُول سُولْفُوريّ، غَسُول مُكَبْرَت أو
كَبريتيّ
ثُلاثتي سُولفور البُوتاس
السّائل
ماء مُقطَّرع
نَحُلّ ونُصفِّي (دستور ۱۸۸٤).
نُحضِّر بالطَّريقة ذاتها الغَسُول
المُكَبْرَتُ بثُلاثي سُولفور الصّوديوم
الصُّلْب.
غَسُول سُولْفُو - صابُونيّ
صابُون أبيض٥٠ غ
ماء ٤٠٠ غ
نَحُلُّ، ونُضيف:
سُولفور البُوتاس السّائل ٥ غ
فَعَّالَ ضِدَّ الجَرَبِ.
غَسُول كريُوزُوت
كريُوزُوت٢٠ نقطة
ماءف
غَسُول مُخَلِّل
خَلِّ أبيض ٢٥٠ غ
ماء غ
غَسُول مُهَيِّج
بَتْرول١٥١ غ

لِصبغ الشعر باللول الأسود، نفرك	ا Lotions (E) عسول – ۱۹۳
الشَّعر بَهذا اللِّيكور، ونُجفِّفه بعد عِدَّة	Lotions (F)
دقائق بواسطة قماشة ساخنة، ومن ثمّ	
نَعْسله بالماء العادي.	غَسُول أَلِيْبَرْت التَّجميليّ
غَسُول سُولْفُوريّ، غَسُول مُكَبْرَت أو	ماء الوردع
كَبريتيّ	صابُون لَوزيّع
ثُلاثتي سُولفور البُوتاس	مَرْهم الخِيَارمُوهم الخِيَار
السّائل٢٠ غ	نُوزِّع الصّابون جيِّدًا بواسطة المرهم،
ماء مُقطَّر١٠٠٠ غ	ومن ثمّ نُضيف الماء على مَهْل.
نَحُلُّ ونُصفِّي (دستور ١٨٨٤).	غَسُول بَيْطَرِي ضِدّ تَعَفُّن الظِّلْف
نُحضِّر بالطَّريقة ذاتها الغَسُول	أَلْوَة (صَبْر)أَنْ ، ف
المُكَبّْرَت بثُلاثيّ سُولفور الصّوديوم	
الصُّلْب .	كحول ٥٠ درجة١٠٠٠ غ
غَسُول سُولْفُو - صابُونتي	نَحُلُّ في قارورة واسعة العُنُق، وعندما
صابُون أبيض٥٠ غ	يَتُمُّ الذُّوبان تمامًا، نُضيف على مَهْل ومع
ماء د ي ن	التَّحريك المُستَمِرِّ:
	حامِض سُولفوريك ٢٠٠غ
نُحُلّ، ونُضيف:	نَمزُج ونَحِفَظ في قارورة مُقفَلَة.
سُولفور البُوتاس السّائل٠٥ غ	عندما يُنَظُّف النَّسْر (أي القِسم الرَّخُو
فَعّال ضِدّ الجَرَب.	من الباطِن النَّافِر في الحافِر) نَضع عليه
غَسُول كريُوزُوت	من لهذا الغَسُول بواسطة فِرشاة صغيرة.
كريُوزُوتكنقطة	غَسُول تَجميلتي
ماءماء	نَبيذ أحمر ٣٦٠غ
غَسُول مُخَلَّل	سُولفات الحديد٧ غ
خَلّ أبيض ٢٥٠ غ	مِلح عادي غ
ماء غ	نُسخِّن دقائق، ونُضيف:
غَسُول مُهَيِّج	أوكسيد النّحاس غ
بَتْرُول١٥٠ غ	نَترك مدّة دقيقتين على النّار ونُضيف:
دُهن تَرْبَئْتين غ	مَسحوق العَفْصَة٧غ

رُوح حَبّ العَرْعَر .....١٥٠٠ غ نَفرك القَطَن، الصَّلْب، الحَقْو في حال وَهْن المجاري البوليّة وفي الاستسقاء، وفي فَرك وتَمسيد الأطراف المُتجلِّدة أو المُصابة بالشَّرَث والخَصَر وهي تَشقُّقات يُستها الرَّد.

198- غَفَث أُرْجُواني، عُشْبَة الحَصاة، عَفْث المُروج

Gravel grass, Trumpet grass (E)
Eupatoire pourpre, Herbe à la gravelle,
Herbe à la trompette, Herbe des prairies
(F)

Harngriebgras (D) Eupatorium purpureum (S)

نَبات مُعَمَّر من فَصِيلَة المُركَّبات الأنْبُوبيَّة الزَّهْر يَعلو من مِتر إلى مِترين وأكثر. ساقُه أَسْطُوانيَّة سَرْحَة. أوراقُه مُعَنَّقة، دَوّارِيَّة الارتكاز من ٣ إلى ٥ ورقات بَيضوية أو سِنانِيَّة الشَّكْل، مُستدِقَّة الرّأس، قاسية، خَمْلِيّة الصَّفحة السُّفلي. الأوراق العُليا مُعنَّقة، سِنانيَّة النَّفلي. الأوراق العُليا مُعنَّقة، سِنانيَّة النَّصْل الخَشِن المَلْمَس. الرُّويسات النَّهريّة هَرميّة التَّجميع أرْجُوانيّة اللَّون، الرَّهريّة الهرارُه في أعذاق هامِيَّة. ازهرارُه يَستمر من آب إلى تشرين الأوّل. مَهد يَستمر من آب إلى تشرين الأوّل. مَهد النَّبات أمريكا الشّماليَّة.

الخصائص والاستعمال - يَتَباهى الأمريكيُّون بخصائص النَّبات التّالية: مُضاد للحَصَى، مُضاد لالتهابات المَثانَة المُزمِنَة، مُضاد لالتهابات الأعضاء التَّناسُلِيَّة، مُثير الاشمئزاز من التَّبْغ

والتَّدخين. أمَّا استعماله فمُستَخلَص مائع يُؤخَذ منه مِقدار ١ إلى ٣ غرامات في اليوم.

۱۹۰ - غوارانا، پُولِّینِیا، پُولِّینِیا کُوپانا<sup>(۱)</sup> (Guarana, Paullinia (E

Guarana, Paullinia (F)

Paullinia cupana, Paullinia sorbilis (S)

الپُولِّينيا جنس نَباتات من فَصِيلَة السَّابَنْدِيَّات. وهي شُجَيرات عارِشة، أوراقها مُتعاقِبة، مُزدوِجة أو مُثَلَّثة التَّقسيم المُثْلَث أو رِيشيّة، أعناقُها غالبًا مُجَنَّحة. أزهارها صغيرة القَدّ، باهتة اللَّون، إبطيَّة الارتكاز، خُماسيّة الكَاسيّات، رُباعيّة البَيْلات والأسدية.

والغوارانا أو الپولينيا هي مَادّة طبّية يُحضِّرها غوارانيُّو الأورغواي أو الپارا من بُزور الپُولينيا كُوْپانا. أشار إلى الغوارانا، عام ١٨١٧، كاديت دوغاسيكُورت، ولكنّ مِيْرات لم يَحصل على عَيِّنة كبيرة من النّبات إلّا في العام على عَيِّنة كبيرة من النّبات إلّا في العام علاجهم بسحق البُزور على حجر مُسطَّح وساخِن، ويُضيفون إليها بعض الماء والكاكاو وطحين المَنْيُوك. وبَعد فترة والكاكاو وطحين المَنْيُوك. وبَعد فترة من الزَّمن تُضاف البُزور المَجروشة أو المُكسَرة إلى العجينة؛ يُعطى بعد ذلك المخليط الشَّكُل الأسطوانيّ (وفي بعض الأحيان أشكال أسماك أو أوراق أو ثمار) ويُجفَّف في الشَّمس.

<sup>(</sup>١) التَّسميات العربيَّة للمؤلِّف.

إنّ الغوارانا الّذي يُحضَّر كما أشرنا أعلاه هو مَادَّة صُلْبَة تَقع في أسطوانات من ١٥٠ إلى ٢٥٠ غرامًا، مُستديرة الأطراف، لَونُها بُنِّيّ، طولُها من ١٥ إلى ٢٠سم، سَماكتها من ٤سم. مَكسرها غير مُنتظم ومُحَبْحَب.

المُركِّبات - يَحتوي الغوارانا على ٣,٧ إلى ٥,٦ من الغوارانيين وعلى ٣,٧ إلى ٢,٥٨ من الغوارانيين، وعلى رُيوت طَيّارة، ومَادّة عَفْصَانيَّة (١) Tanoïde تُدعى غواراناتين. إنّ بُزور البُولِينيا هي أغنى من البُنّ أو من الشّاي بالكافيين. وهي تَحتوي، كما يقول عدد من المؤلفين، على الكافيين فقط، بينما نَجد في أعضاء النّبات الأخرى التيوبرومِين أيضًا.

الخصائص والاستعمال - لقد تَمَّت مُحاولة نَشْر وإشاعة استعمال الغوارانا كمادَّة مُقوِّية ومُضادَّة للإسهال، وهو الاستعمال الشّائع في البرازيل. ويُنصَح به أيضًا ضِدّ آلام الأعصاب، والشَّقيقة وكدواء طارد للحُمَّى. ولكن يجب اعتباره غذاءً توفيريًّا بنوع خاصّ.

البرازيليّون يَستعملون الغوارانا بمقادير من ٤ إلى ٨ غرامات في كوب ماء. ويمكن إشراكه مع الشوكولا لجعله مُقوِّيًا أكثر. ويُحضرونه مَسحوقًا، وأقراصًا مُحَلّاة، وصبغة، ومُستخلَصًا كحوليًّا، وشرابًا سُكَّريًّا، وبيلولات،

ومَرْهَمًا، وشوكولا.

طريقة الاستعمال - مسحوق: من غرام واحد إلى أربعة؛ مُستخلَص كحوليّ: من ٠,٢٥ إلى غرام واحد في اليوم.

أعيد تسجيلُه في الفَرْماكوبيا الحديثة عام ١٩٧٥.

١٩٦ - غَيَّاكُول، مَتِيل أورتُودِيوكْسي بَنْزُول

Gaïacol, Méthylorthodioxybenzol (F)

 $C_7H_8O_2 = 124,1$ 

إنّ الغَيّاكُول، الّذي اكتشَفه سَانْت كلير دُوڤيلٌ في مَنتوجات تَقطير الغَيّاك الحاف، هو أثير الهيروكاتشينن المُونُومَثيليكيّ.

يُوجد الغَيّاكُول بكمِّية كبيرة نَوعًا ما في كريوزوت الزّان، وهو يُستخرَج من هٰذا الأخير بالتَّقطير وجَمْع ما يَمرّ بين الفينولات بالخَض مع مَحلول نُشادريّ، الفينولات بالخَض مع مَحلول نُشادريّ، نُقطّر من جديد لكي نَجمع ما يَمُرّ عند تُقطّر من جديد لكي نَجمع ما يَمُرّ عند عُولجت بالبُوتاس الكحوليّ تُعطي عُولجت بالبُوتاس الكحوليّ تُعطي بلُورات نُفكّكها بواسطة بهاكول الذي لم يَزل يَنفصِل عندها الغَيّاكُول، الّذي لم يَزل يتفصِل عندها الغَيّاكُول، الّذي لم يَزل بحالة غير نَقيّة، بشكل سائل. يُمكن تَنقيته وتكريره بتبريده وبإثارة التَّبْلير وتَمهيده بواسطة بلُورة غَيّاكُول صُلْبة. ولكن الغَيّاكُول صُلْبة. ولكن الغَيّاكُول النَّقيّ يَحصل ولكن الغَيّاكُول النَّقيّ يَحصل ولكن الغَيّاكُول النَّقيّ يَحصل ولكن الغَيّاكُول النَّقيّ يَحصل الجة ولكن الغَيّاكُول النَّقيّ يَحصل الجة

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمؤلِّف.

الييروكاتشين المونوصودي بواسطة يُودور المتيل أو متيل سُولفات البُو تاسيوم.

المُواصفات - يَقع الغَيّاكُول النَّقيّ المَخزَنيّ في بلورات عديمة اللُّون، غالبًا ما تكون كبيرة الحجم، رائحتُها عِطريّة، تَنصهر عند ٢٨° سغ في سائل عديم اللُّون يَبقى مُنصهرًا حتّى حَرارة مُنخفِضة، وتكون كثافته ١,١٤٣ عند ١٥°سغ، يَغلي عند ٢٠٥°سغ؛ يَذوب فی ٥٢,٥ جزء ماء حرارته ١٥°سغ، يَذُوبِ جِدًّا في الكحول، والأثير، والغليسّرين، والحامض الخَلّي، والزُّبوت الثَّابية.

مُذابتُه المائيّة بنسبة ١٪ تكون مُتعادِلة مع الكُواشِف المُلوَّنة. وهو يَذوب جدًّا في المحاليل القِلَويّة بسبب عمله الفينوليكيّ؛ إذا حُلّ في مِقدار حجمه من غاسُول الصّود، يُعطي بعد التَّبريد، كُتلة بيضاء بلورية من غَيّاكُولات الصّوديوم.

تَضادّاته - المَنتول، الكافور، الكلورال.

حفظه - في قارورة مُقفَلة بمعزل عن الضّوء .

### خطر - جدول Dangereux - Tableau C

طريقة الاستعمال - مَقادير البالغين أعيدت إلى إصدار الفرهاكوبيا العاشر بينما لم تُرد فيه المَقادير الولَّادِيَّة.

المقادير الاعتيادية: ٠,٢٥غ لجُرعة

واحدة ٧٥,٠غ لكلّ ٢٤ ساعة؛ المقادير غي ا القُصوى: ٠,٥٠غ للجُرعة، ١,٥٠غ لكلّ ۲٤ ساعة.

> المقادير الولادية عن طريق الفَم، من صفر إلى ٣٠ شهرًا: ٠,٠٥ غ لكلّ ٢٤ ساعة؛ من ٣٠ شهرًا إلى ١٥ سنة: ٠,٠٥غ إلى ٣٠,٣٠غ لكلّ ٢٤ ساعة؛ عن طريق الشُّرْج: من صفر إلى ٣٠ شهرًا: الامتناع عنه؛ من ٣٠ شهرًا إلى ١٥ سنة: ٠٠,٠٥ إلى ٣٠,٣٠غ لكل ٢٤ ساعة.

الخصائص العِلاجية - عندما نمدُّه على الجِلد مَوضعيًّا، نَقيًّا ومُنصهرًا يُحدِث خلال ١٥ دقيقة، عند المحمومين فقط، انخفاضًا مُهمًّا في الحُمّى يليه سريعًا ارتفاع جديد بالحرارة مَصحوبًا بالعَرق، والقُشَعْريرات، والانزعاج. لذلك فإنّ استعماله كمُضادّ للحُمّى لا يُنصَح به كثيرًا. ولكنّه، في محلول عُشري (في زيت)، مُزيلٌ للألم المَوضِعي، مُفيد ضِد آلام الأعصاب، وآلام عُصَابات المَفْصِل، وآلام الحُمْرَة إي التهاب الجلد، وآلام ذات الخُصْيَة (التهاب الخُصْية Orchite)؛ إنّ خصائصه المُزيلة للألم يُمكنُها أن تكون مُفيدة حتى في العَمليّات الصَّغيرة مِثال شَقّ خُرّاج أو دَاحُوس.

من الدّاخل، بجرعات من ١٠,١٠ إلى ٠,٠٠غ في اليوم (بأجزاء من ٠,٠٥ إلى ٠٠,١٠غ في بيلولات، جَروعات مُكَحْلَلَة، أو محاليل في زيت كَبد المُورَة؛ أو كذلك في زَرْقات زَيتيّة

غي ١ بنسبة ٢٠٪، مع إضافة أوكاليبتول أو يُودوفورم)، فهو يَعمل كالكريوزوت في ثَبات تركيبه». تَلطيف السُّعال، ومُحاربة الحُمّى الدِّقِّيّة يُستعمل غالبًا الغَيّاكول السّائل الّذي Hectique، وزُلَّة المَسلولين، ولتَعديل يُسهِّل استعماله تَحضير المحاليل تَقشُّعاتهم الّتي تميل إلى أن تُصبح أقلّ صَديديَّة. وهو مُطهِّر مُفيد في النّزلة المُزمِنة التي تُصيب الشُّعَب. "ولكنّ ٩٠ درجة إلى ١٠٠غ غَيّاكول مَصهور الكريوزوت النَّقيّ، إذا استُعمل بشكل في حَمّام مَريم. دقيق، يَبدو أفْعَل وأقَلّ سُمّية من

الغَيّاكول الّذي يَنفرِد بحسَنةٍ وحيدة هي

والمَرُوخات والمراهم. يَتمّ الحصول عليه بإضافة ٢٠غ كحول ٩٥ درجة أو آذار ونيسان. الأماكن الجافّة، ف اص الحيطان، الأثربة الكِلسيَّة.

الخصائص والاستعمال - جاء في «المَوسوعة في عُلوم الطَّبيعة» أنّ جذور هذا النَّوع غليظة يُستخرَج منها بعض العناصر الطِّبيَّة الصَّحِيَّة النّافعة. ويُستخرَج من سُوقه صَمْغ يُدعى الحِلْتيت ولكنّه دون الحِلتيت الأصليّ خواصًّا ونَفعًا.

مُلاحظة - يَقول الشّاعر اليُونانيّ هَرْيودُس، في القَرن الثّامن قَبْل الميلاد، أنّ إله النّار في الميثولوجيا الإغريقيّة، بروميثيوس، بعد أن جَبَل الإنسان من طين الأرض، اختلس له النّار المُحْيِية من السّماء وحَمَلها إليه بواسطة الفارولا لكي يَنْفُخ فيه الحياة...

إنّ لُبّ الفارولا المُجفَّف يَصلُح بالواقع أن يكون فتيلًا، يَشتعِل في السّاق ببطء كبير ويُمكن حمله. أمّا سُوق أنواع الفارولا فتُستعمَل أحيانًا في صُنع الأمتعة والأثاث.

۱۹۸ - فَاصُولِيا الكابِ، فَاصُولِيا لِيما، فَاصُولِيا لِيما، فَاصُولِية التشاد

Cap bean, Lima bean (E)
Haricot du Cap, Haricot de Lima, Haricot du Tchad, Pois du Cap, Pois de sept ans (F)
Capbohnen, Limabohnen (D)

Phaseolus lunatus (S)

ف

ارُولا مَبْذُولة (۱)، قِنَة مَبْذُولة ، كَلْخ Giant fennel (E) Férule commune, Pamelier (F) Gemeines steckenkraut (D) Ferula communis (S)

نَبات مُعمَّر أَمْرَط من فَصلة الخَسْميّات، ساقُه غليظة حَوفاء مُرتفعة جدًّا تَعلو من متر إلى مترين (٤-٥ أمتار)، أسطوانيّة، تَتفرّع إلى فُروع مُتقابِلة ودَوَّاريّة. الأوراق واسعة، خضراء بَحريّة المُواج، ريشيّة، مُقطَّعة إلى سيور طويلة، خطِّية ضَيِّقة، لَيِّنة، العُليا حاضِنة مَحمولة بغمد واسع، مُستطيل، غِشائي، ذات نَصْل مُختصر جدًّا، السُّفلي مُعنَّقة. قُتّابات على قاعدة الأعناق الغشائية، مُستطيلة، مُعلكة. المِطلَّة المَركزيَّة شبه الطئة، من ٢٠ إلى ٤٠ شعاعًا، المِطلّات الجانبيّة تَتَخطَّاها وأعناقها أطول. ثُمرة بَيضيَّة أو إهليلجيّة، طولها ١٥ ملم وأكثر، عرضها ١٠ ملم، مُمرَّكة من كلَّ جهة بثلاثة أضلاع دقيقة، خفيفة البُزور. الهامش ٤ مَرّات أضيق من الغمد. الازهرار في

نَبات مُعَمَّر من فَصِيلة القَرْنِيَّات

الفراشية - ساقه عارشة كبيرة القد تعلو ٤ أمتار وأكثر. أوراقه ثلاثية الوريقات البيضوية الشكل المستدقة الراس. أزهاره مُخضَرَّة اللون الأبيض، صَغيرة وعُنقودية التَّجميع. قُرونُه قصيرة عادة لكنَّها قد تصل إلى ١٥ سم، وهي مفلطَحة، عَريضة، خشنة المَلْمَس، مُفلطَحة، عَريضة، خشنة المَلْمَس، يَحتوي القَرْن على ٣ إلى ٥ حَبّات يُحتوي القَرْن على ٣ إلى ٥ حَبّات مُفلطَحة، كلويَّة الشَّكْل، بيضاء، مُفلطَحة، كلويَّة الشَّكْل، بيضاء، مفلون، وهي أكبر بكثير من حُبوب الفاصُولياء المعروفة.

المُرَكِّبات - مَصاريع القُرون النَّاضِجة المُجفَّفة الخالِية من حُبوبها تَحتوي على: حَوامِض أمينيَّة: أرْجِينِيْن، أسْهاراجِين، قيتامين «ث»، نَشاء، عناصر مَعدِنيَّة.

الخصائص والاستعمال - مُبَوِّلة، مُنقِصة للسُّكَر، وتَدْخُل في خَليط زُهورات تُفيد الإصابات الكليَويَّة والقَلْبيَّة، الرُّوماتيزم، وتُفيد أيضًا كعلاج إضافي للسُّكَريّ. وتُستعمَل في إصابات الكلية، للسُّكَريّ، وتُستعمَل في إصابات الكلية، إصابات القلب، رُوماتيزم، سُكَريّ، إكزيما حَكاكَة مُشرِيَة ومُستَعصِية. حُبوبها المَطحونة لها الخصائص ذاتها. طحينها يصلُح لصُنع لَصُوقاتٍ ساخِنة على الإكزيمات الصَّعْبَة والمُشرِية. يمكن استعمال أقسام فاصُولياء إسْبانيا والكاپ والفاصولياء المَعروفة للحصول على النتائج الطبيَّة ذاتها. فاصولياء عمى النتائج الطبيَّة ذاتها. فاصولياء Sieva هو ضرب صغير الحبوب.

۱۹۹- فَحْم مُقَوَّى، فَحْم مُنَشَّط، فَحْم خَشَب مُفَعَّل

Charbon activé, Charbon de bois activé (F)

إنَّ الفَحْم النَّباتيِّ الذي يُحضُّر كما جاء في دراسة الفَحْم النَّباتيّ المَخزَنيّ (المُعجَم الثاني، صفحة ١٨٠، رقم ٢٢١) لا يمتلك مَقْدِرة اسْتِجْذَابِيَّة ومُزيلة للألوان تُوازى مَقدِرة الفَحْم الحَيَوانيّ. ومع ذلك بالإمكان الحُصول على فُحُوم نَباتيَّة مُساوية الفَعالِية له. وقد دُرست هذه الفُحوم لحاجات المصافى ومعامل التَّكرير وللصِّناعات الكيميائيّة بنوع خاص بهدف استخدامها في صُنْع الأقنِعَة التَّنفُّسيَّة . وقد اعتُمِدت لهذا الغَرَض مَوادّ مُختلِفة جدًّا مِثال أنواع التُّرب واللِّينيت أي الخَشَب المُتفَحِّم وَالفَوْقَس وَالثُّفُول؛ إلَّا أَنَّ المادَّةِ المَحْزَنيَّةِ يَجِبِ أَن يَتمّ الحُصول عليها من الخَشَب ومن دون تَدخُّل المَوادّ التَّشَبُّعيَّة. ويَرتكز التَّحضير على الحَرْق الطُّويل الأمَد بحرارة مُرتفِعة (۸۰۰ إلى ۱۰۰۰°سغ) بوجود أو عدم وجود مَوادّ غازيَّة بإمكانها أن تَلْعَب دور عناصر التَّأْكُسُد، كاللهمائي الكَرْبُوني و يُخار الماء.

المُواصَفات - مَسحوق أسود، عَديم اللَّون، تَفِه الطَّعم، يُمكنه امتصاص ١٥ إلى ٢٠٪ من الماء بمُجرَّد تركه في الهواء الطَّلْق، وتَثْبيت الرَّوائح بسهولة، والاحتراق حتى الجَمْر من دون لَهَب. حِفظُه في أوعية مُقفلَة (دستور أدوية).

الخصائص والاستعمال - إنّ استعمال

الفَحْم المُفَعَّل يَميل إلى التَّعميم والانتشار يومًا عن يوم. وهو يُستعمَل بالتَّنافُس مع فَحْم الحَيوان في إزالة ألوان وروائح بعض المستحضرات الصِّناعيَّة ويَدخل في تركيب مُختلِف الآلات المُخصَّصة لحماية المجاري التَّنفُّسيّة من الموادّ الطَّيّارة الخَطرة.

بالإضافة إلى ذلك، يُستخدَم هذا الفَحْم لتَحضير مُسْتَجْذَبَات (١): Adsorbats يتم الحصول عليها بحرك الفَحْم المُقوَى في محاليل عِلاجيّة أو في مُستحضرات غازية. يُثَبِّت الفَحْم المواد التى تُوضع معه بالاسْتِجْذاب ويُحرِّرها فيما بعد داخل الجسم. اعتُمد الفَحْم بنوع خاص في المجال الطبِّي لاستبجذاب اليبود وأملاح الزنبق والفِضَّة. كذلك استُعملَ في حُقَنِ ضموريديّة بالتَّنافُس مع الفَحْم الحَيوانيّ المُنَقِّي.

٢٠٠- فَرْبِيُوْن لَسِيرُس، حَبّ المُلُوك، فَرْبِيُوْن مُتَصالِب، طارْطَقَة

Caper-spurge, Myrtle spurge, Wild caper (E)

Épurge, Catapuce, Euphorbe épurge, Petite catapuce, Catherinette, Lathyris (F) Springwolfsmilch (D)

Euphorbia lathyris, Euphorbia lathyrus, Euphorbia spongiosa, Tithymatus lathyris (S)

فَصِيلَة الفَرْيُونِيَّات يَعلو من ٦٠ إلى فرب ١٥٠سم. أوراقه مُتقابلة، مُتصالِبة رُباعيّة، نصلُها سِناني الشَّكْل وَحيد الضَّلع عَديم العُروق بَحريّ اللَّون، طوله آ إلى ١٢ سم وعرضه نحو ٢سم. أزهاره مُصفرّة اللّون. ازهراره خَيْميّ الشَّكْل، رُباعي الأطرام الفَرِقة، يَستمرّ من حزيران إلى تموز. بزوره وأوراقه و جذوره ولينه طبيَّة.

> المُركِّبات والخصائص - تُعطى بزورُه عن طريق الاستخراج بالأثير من ٣٥ إلى ٤٠٪ كمعدَّل وَسطى من الزَّيت المُحَمِّر للبَشَرة Rubéfiante، وهو مُسَهِّل عَنيف جدًّا (ومن هنا اسم النَّبات الأجنبيّ) كان يُستعمَل في الماضي في الطِّبّ؛ يَحتوي الزَّيت على راتِنج، أَسْقُولاتين وعلى جَوهَر آخر مُتَبلِّر. أوراقُه دواء مُخَبِّل للأسماك، ويَشتهر نقيع النَّبات العُشبيّ المَعْلَى كدواء مُزيل للشَّعْر. جذوره مُقشِّعة ومُقيِّئة، وَرَدت مع البزور في كُودكس ١٨٦٦. البزرة والجذر أعيد تَسجيلهما في الإصدار التّاسع للفرماكوبيا عام ١٩٧٤. لَبَن النَّبات يحتوى على مَطّاط، راتِنج، عَفْص، صَمْغ، نشاء، أملاح من بينها مالات الكلسيوم، وهو حامِز الطُّعم وخُطِر. أمَّا بزور ما يُسمّى Catapuce majeure فهي بزور الخروع.

نَبَات عُشبي ليفي بَرِّيّ مُحول من

<sup>(</sup>١) التَّسمة للمؤلِّف.

ف ش ا ۲۰۱ فُشاغ الجَمايِيْك، باتُور الجَمايِيْك Sarsaparilla of Jamaïque (E) Salsepareille de la Jamaïque (F) Jamaïque stechwinde (D) Smilax sp. (S)

يَصل هٰذا الصِّنف إلى أسواق لنَّدن، آتيًا من أمريكا الوُسطى عن طريق الجماييك، حَيث يَتَميَّز منه الجَماييكي الرَّماديّ والجَماييكيّ الأحمر. يَقع لهذا الصِّنف في رَبْطات مُكَوَّنة من جُذور خالية من الرِّيزومات ومن السُّوق، ومَكْسُوَّة بِالجُذَيرِاتِ؛ ويَكُونَ لَونُها مُرْمَدًّا في بعض الأحيان وإلى البُنِّيّ أحيانًا أخرى، ولكنَّه يَكُون بُرتُقاليّ اللُّون الأحمر في أكثر الأحيان. وتكون الجُذور عميقة التَّجاعيد ومُضَلَّعة. إنّ نِسبة قُطْرها العامّ بالمقابل مع الأسطوانة المركزيَّة يكون: ٦:١٠. نَشاؤه نادر الوجود في حُبوب مُنفردة، قُطْره من ١٢ إلى ١٤ ميكرونًا، ويكون بالحري في تَجَمُّعات من ٢ إلى ٤ حُبوب، وهي تَجَمُّعات مُتساوية العدد فيما بينها تقريبًا.

المنول صُودِيّ محلول، فينول صُودِيّ محلول، فينول صُودِيّ مُرَكَّزة صُودِيّ مُرَكَّزة Phénol sodique dissous, Phénol sodé liquide, Soluté concentré de phénol sodique (F)

من مُشتقّات الفينُول الرَّئيسيَّة. دستور أدوية ١٩٣٧.

نَحصل على الفينول الصوديّ المحلول كما يلي: فينول مَخزَنيّ ١٠٠

غرام، صودا كاوية سائلة ٢٠ غرامًا، ماء كمِّيَّة تَكفي لتحضير ليتر واحد من المحلول.

الاستعمال - إنّ لهذا المحلول يجب ألّا يُستعمَل (في تطهير الأماكن السَّكنيَّة وسواها) إلّا بَعد حَلِّه بعدَّة مَرّات حجمه من الماء، وحسب الوصفات.

خطر - الجدول Dangereux-Tableau C

## ۲۰۳ – فينول مُكَوْفَر (Phénol camphré (F)

من مُشتقات الفينُول الرَّئيسيّة.

سائل زَيتيّ يَحصل بهرس جزئين من الفينُول مع جزء واحد من الكافور. لا يحصل من ذلك مزيج بل يَتَشَكَّل خليط مُغَاير التَّحَوُّل Eutectique يَنصهر أو يبدأ بالانصهار عند درجة ٣٣° سغ تَحت الصِّفر. ظاهِرة مُشابهة تَحدُث مع الكريزول، التَّيمول، المَنْتول والكلورال. مَزُوج بكل النِّسب مع الفازلين، شَحْم الخنزير، ومع الزُّيوت. وهو يَذوب في الكحول والأثير ولكنه لا يَدوب في الماء. يُستعمل كدواء مَوضعيّ يَذوب في الماء. يُستعمل كدواء مَوضعيّ في معالجة الخُراجات السَّليَّة.

٢٠٤- قِنَّاء، قِتْي، مِقْتَى، فَقُوس

Snake cucumber, Curving cucumber (E) Concombre serpent, Concombre flexueux, Melon serpent (F)

Schlaugengurke (D)

Cucumis melo var.flexuosus, Cucumis sativus var. flexuosus. Cucumis flexuosus (S)

نَبات عُشبتي حَوْلتي زِراعتي وتَزيينتي من فَصِيلَة القَرْعِيَّات، أصْرامُه أربعة أو خمسة. سُوقُها مَدّادَة. أوراقُها طويلة الزِّناد، مُفَصَّصة. ثمارها طويلة، مُتَلَوِّية، ضَيِّقة، مُثَلَّمة، مُوبرة، طولها من ٣٠ إلى ١٠٠سم وقطرها من ٣ إلى ٨سم. لُونها إلى الخَضار العابق ومنها البَحري اللُّون والأغْبَر والأصفر. طُعمها بَين الخبار والكُوسَى.

٢٠٥- قُرَّاصِ قَصِفُ (١)

Fragile nettle (E) Ortie fragile (F) Zerbrechlichnessel (D) Urtica fragilis (S)

نَبات مُعَمَّر من فَصِيلَة القُرَّاصِيَّات،

(١) كلِّ التَّسمات للمؤلِّف ما عدا التَّسمة اللاتسة.

وَحيد المسكن، لِيفيّ القاعدة قرا ومُخشوشب، ولهذا يَكون قَصف القاعِدة السَّهِلَة المكْسَر، سُوقه العتيقة تكون مُخْشَوشِبة نوعًا ما، وسُوقه الحديثة عُشيّة، مُنتصة، قصيرة بشكل عام، طولها من ١٠ إلى ٥٠سم، فَرعاء، مُستمرطة، ولكنها مُزوّدة سعض الحرائر الحارقة. أوراقه طويلة الأعناق، قصيرة الهُلْب على صَفحتَى النَّصْل، مُسَلَّحة ببعض الحرائر الحارقة، نصلها بَيضوي حاد، مُزَوًّى أو مُستدير القاعدة، عميق التَّسنُّن، ولكنّ أسنانه عريضة نسبيًا وقليلة الحِدّة. ازهراراته الذُّكَرِيَّة سُنيليَّة الشُّكُل، شبه لاطئة، غير فَرْعاء، هزيلة، مُتطاولة على إبط الأوراق العُليا، مُتَوْأَمَة، رَاشَتُها مُجِنَّحة قليلًا. ازهراراته الأنشى كُرَويّة، مُزَرّكشة بالحرائر القارصة. أوبار قارصة مُتباعِدة، ولكنها تُحدِث تَهتُجًا حادًا وطويل الأمد.

> مُلاحَظة - نَوع من القُرَّيْص اللُّبنانيّ، يُزهر من كانون الثّاني إلى أيّار؛ وهو مُحدَّد الانتشار جدًّا، لذلك لم نَقَع على ذكره في المَراجع المُتخصِّصة في النَّبات الطِّبِّيِّ. ۚ إِلَّا أَنَّ ذَلَكَ، في ظنِّنا، لا يَعني خُلُوَه من الخصائص الطّبيّة.

ق ب ر

٢٠٦ قُبَريَة صُلْبة، قُبَرِيَّة لُبْنان، شَاهَتْرَج بَصَلى صُلْب، قَنْبَر قَصِيْر الفَصَ (١)

Strong corydalis, Bulbous corydalis, Corydalis of Lebanon (E)

Corydale solide, Corydale du Liban, Corydale à lobe court, Corydale bulbeuse (F)

Fester kletternder, Kletternder der Libanon (D)

Corydalis solida var. brachyloba, Corydalis libanotica, Fumaria bulbosa var. solida, Corydalis bulbosa (S)

ريزُوم مُعَمَّر كُرَيْويّ الشَّكْل، غِلافُه جلْدى مُسود اللّون، من فَصيلَة الخَشْخَاشِيَّاتِ الشَّاهَتْرَجِيَّة: Fumarioïdées. ساقه المَطمُورة قصيرة وتَنتَهى بغمدٍ مُصْفَر اللَّون الأبيض، تَنقسِم عند سَطح التُّربَة إلى فُروع زَهرِيَّة عديدة. أوراقُه مُتبادَلة طَويلة الأعناق و مُقَسَّمة إلى سَكَمات مِرْوَحِتة الشَّكْل يَبِلُغ قُطرُ بَعضها ٣سم. السُّوق الزَّهريّة هَزيلة تَعلُو من ١٠ إلى ٢٥سم ورُبّما أكثر، وهي مُتراصَّة قليلًا. البَتَلة الخارجيّة العُليا فايحة اللُّون الورديّ أو مُصفَرَّة قليلًا. التَلات الدّاخليّة أقْصَر، فاتحة اللون ولكن رأسها مُمرَّك باللُون الأحمر القاتم. ازهرارُه من آذار إلى أيَّار فَوق ١٠٠٠ متر عن سَطح البَحر عمو مًا.

المُركِّبات - عَدد كبير من العناصر الفَعّالَة القِلَويدِيَّة:

 $C_{19}H_{19}O_4N$  قبر الكيميائي تركيبه الكيميائي 325,3 عربيداليْن وهو قِلَويد تركيبه: گوريكاڤِين  $C_{22}H_{27}O_4N$  (دَواء مُخدِّر)، كُورِيكاڤِين وهو قِلَويد تركيبه (كُورِيكاڤامِيْن): وهو قِلَويد تَركيبه (كُورِيكاڤامِيْن):  $C_{18}H_{14}O(N-CH_3)(O_2CH_2)_2$  وهو قِلَويد تَركيبُه الكيميائيّ:  $C_{21}H_{25}O_4N$  قِلَويدات الأَفْيُون:  $C_{20}H_{19}O_5N$  إلخ. كُورِيدِيْن تَركيبُه الخ

الخصائص - مُسَكِّنة، مُخَدِّرة مُنطَّعة لِأفراز الغدد.

الاستعمال - من الأفْضَل الامتناع عن تعاطي هذا النَّبات في التَّداوي المَنزِليّ إلّا تَحت إشرافٍ طبِّيّ والاستِعاضة عَنه بنبات يَتمتَّع بالخَصائص ذاتها على أن يكون أقلَّ منه سُمِّية وخَطرًا.

طريقة الاستعمال - استُعمِل فُوسفات البُولْبُوكَپْنِيْن وهو قِلَوِيد يُمارِس على الجِهاز العَصبيّ تأثيرًا كابِتًا كابِحًا مُماثلًا لتأثير السكُوپُولامِين. يُعطى في حُقنِ تَحت الجلد ويَدوم مَفعولُه حَوالى لا ساعات، وهو مَفعول يُمكن إطالتُه إذا حُقِن الصَّمْغ العَربيّ في الوقت ذاته، في حُقِن السَّلُل الهازّ، وفي الشَّلُل الهازّ، وفي الارتجاف المُخيخيخيّ والارتجاف الأصليّ. المَقادير مُحدَّدة جدًّا ولا تُعطى إلّا بإشراف الطبّيب فقط.

(١) قَرْدَب الْمِيْص، عَقَيْدَة الدَّغْل (٢٠٨ Brushwood persicaria (E)
Renouée des buissons, Persicaire des broussailles (F)
Bushwerk Knöterich (D)
Polygonum dumetorum (S)

ق ر د

يَحتوي عدد كبير من النَّباتات الَّتي تنتمي إلى جنس قَرْدَب Polygonum) على (وحتَّى إلى جنس حُمَّيْض Rumex) على جَواه أَنْد اكنُونَة.

ولقد لفَتَ تُونْمَان، عام ١٩٠٦، الانتباه إلى قَرْدَب العِيْص الّذي يَتَحلّى بخصائص مُسَهِّلة قَويَّة أكيدة، ولَكنَّها لطيفة المَفعول. وقد تكون خصائص هٰذا النَّبات بفعالية أوراق السَّنَى أو بفعالية قِشر الجَلْهَم. ويُمكن استعمال النَّبات الكامل في التَّداوي (السّاق، الأوراق، الأزهار أو النِّمار) وبنوع خاص في نقيع مَغليّ بنسبة ١٠٠ غرام لكلّ ليتر ماء.

إنّ هٰذا القَرْدَب هو نَبات شائع في أوروبًا، حيث يَنبت في الدَّعْل والعِيص والسِّياجات الشّائكة؛ يَلْتَفِّ غالبًا حَول العَوْسج أو على بَعض الأشجار كالسَّنْط، ويَدِين بخصائصه الطِّبِيَّة إلى وجود أعْفاص هيتروسيديّة أو إلى هيتروسيديّة أو إلى هيتروسيدات أنتراكينونيّة.

مُلاحَظة - الأسماء المُقترحة هي ترجمة للاسم العِلميّ.

(۱) مُبَارَكَة، شُوْك مُبَارَك - ۲۰۷ Blessed carbenia (E) Chardon santo, Chardon bénit (F) Benedikten carbenia (D) Carbenia benedicta, Cnicus benedictus (S)

نَبات حَوْلِيّ زَغِب مُسْتَشوِك من فَصِيلَة المُركَبات، ساقُه فرعاء، مُنتصِبة، فُروعُه مُزَوّاة. أوراقُه قليلة الشَّوك، باهِتة اللَّون الأخضر، نِصالُها جِلدِيّة بَعض الشَّيء، عُروقُها بيضاء؛ الأوراق الجَذريّة مُعنَّقة، ريشيَّة التَّقطيع الّذي يَتَّجِه نَحو أَسْفل الوَرقة Roncinés؛ السّاقيّة لاطئة، الوَرقة Rhoncinés؛ السّاقيّة لاطئة، مُلتصِقة بالسّاق. أزهارُه في رُؤيس فرديّ، هاميّ، مَنْدُوف، أصفر اللَّون، فرديّ، هاميّ، مَنْدُوف، أصفر اللَّون، رائحته غير مُستحبّة تَذهب بالتَّجفيف. يُزهر قَبْل تموز. مَهدُه سواحل المُتوسِّط الغَربيّة.

المُركِّبات والاستعمال - من الأنواع التي أُعيد تسجيلها في فَرْماكوبيا العام ١٩٧٥. مَرارتُه مَردُّها إلى الكْنِيسِين الذي اكتشفه ناتيقًل عام ١٨٤١. وقد جَرت مُحاوَلة استعمال النَّبات في الحُمَّيات المُقْلِعة، ولكن عَمله المُقيِّئ كان عائقًا لهذا الاستعمال.

مُلاحَظة - إنّ الاسم الفَرنسيّ الذي يعني شوكة مُباركة يُطلق على عدّة أنواع من النّباتات الشّائكة التي تَنتمي إلى أكثر من جنس من فَصِيلَة المُركَّبات.

<sup>(</sup>١) كلّ التَّسميات للمؤلِّف ما عدا التَّسميتين الفرنسيَّتين والتَّسميتين اللاتينيَّتين.

<sup>(</sup>١) كلّ التّسميات للمؤلّف ما عدا التسمية اللاتينيّة.

Wolly safflower, Distaff thistle (E) عُنْتَر Chardon bénit, Chardon bénit des parisiens, Chardon jaune, Carthame laineux, Kentrophylle (F) Wolliges spornblatt (D) Cartamus lanatus (S)

نَبات حَولي من فَصِيلة المُرَكَّبَات يَعلو من ٥٠ إلى ٢٠سم. ساقُه مُوبرة، قُطنيّة. أوراقُه ريشيّة التَّقسيم، شائكة الحَوافي. قُلافتُه ذات قُنّابات شِكَيْلَة، الخارجيّة منها مُنبسِطة تُشبه الأوراق السّاقيَّة؛ التّاج أصفر اللَّون. رُؤيساتُه بَيضويّة الشَّكل المُنقلِب، شِبه رُباعيّة الزَّوايا.

الخصائص - نَبات مُرّ كان يَشتهر في أوروبًا كمُعرِّق، وطارد للحُمَّى، وطارد للدُّود.

نَبات بَرازيلي من فَصِيلة القَرْعِيَات، ساقُه مَدّادَة، ثمارُه بَيضانيّة، مُتوسَّطة أو صغيرة القَدّ، مُثالَلَة أم لا، خضراء القِشْرة التي تُصبِح بُرتقاليّة اللَّون الأصفر عند النُّضج. لحمها أصفر اللَّون، غَنيّ بالسُّكَر، مَرغوب جدًّا. البُزور قَويّة

الهَوامش، تَحتوي على ٣٠ بالمئة من النَّيت الذي يُدعى «زَيت الأرض» Huile النَّيت الأرض» de terre وعلى راتِنج حامِز يُدعى پَپُورازِين وعلى راتِنج حامِز يُدعى پَپُورازِين Péporésine عَملُها طارد للدُّود، تُستعمَل وهي طازَجة، مَدقُوقَة، بمقدار ٢٠ إلى ٢٠ غرامًا على شكل مُسْتَحلَب يُحَلِّ في الحَليب.

Musky gourd (E) قَرْع مِسْكِيّ -۲۱۱ Courge musquée (F) Moschuskürbis, Bisamkürbis (D) Cucurbita moschata (S)

نَبات حَولي من فَصِيلَة اليَقْطينيَّات. أوراقُه قلبيّة الشَّكُل، مُنفرِجة، مُسنَّنة، عابِقة اللَّون الأخضر، الرُّخَاميّ البُقَع، عُنقها عَريضة القاعدة. ثمارُه مُستَطيلة، أسطُوانيّة أو هِراويَّة. لحاؤها مُسْوَد اللَّون الأخضر، أصفر أو أحمر. أزهارُه وحيدة المَسْكَن، كبيرة القَدّ، إبطِيّة الارتكاز، صَفراء اللَّون.

المُرَكِّبات - لُوسين Leucine تِيروزين، بِيپُورَازين، قيتامين «ب»، يروڤيتامين «أ»، فُوسفور،...

الخصائص - مُغَذًّ، مُسكِّن، مُنْعِش، مُليِّن، مُسهِّل، مُبوِّل، صَدْرِيِّ.

الاستعمال - حالات الوَهْن، التهابات بَوْليَّة، ضَعْف كليويّ، بَواسير، عُسر هَضْم، التهابات المِعَى، ديسنتيريا، إمساك، إصابات قَلبيَّة، أرَق، سُكَّريّ.

طُرُق الاستعمال - من الدّاخل، يُؤكّل

<sup>(</sup>١) كلّ التَّسميات للمؤلِّف ما عدا التَّسميتين الفرنسيَّين والتَّسمية اللاتينيّة.

ق ش ط

الهيتروسيد المَوجود في رِعْي الحَمام الهيتروسيد المَوجود في رِعْي الحَمام المَخزَنيّ  $C_{17}H_{24}O_{10}$ . الأزهار والقنابات تَحتوي على سُكَّر دُعيَ سِلِّيتُول Scyllitol تَركيبُه الكيميائيّ  $C_6H_6(OH)_6$  قابل للتَّبلُّر ومُتَجاذِئ الإينُوزِيتُول.

الخصائص والاستعمال - القِشرة تشتهر كطاردة للحُمَّى. قِشرة الجَذر التي تُعرَف في صَيدليّات أمريكا باسم قِشرة القُرْنُوس تُعتبَر في أمريكا على أنّها مُتقارِبة جدًّا من الكينا بخصائصها المُقوِّية والطَّارِدة للحُمَّى. مَسحُوق من الكينا عرامات في اليوم. مُستخلص مائع من اللي عرامات في اليوم. مُستخلص مائع من اللي عرامات في اليوم. كُورْنِيْن من ١٠٥، إلى ٣٠ عرامات في اليوم.

٢١٣ - قِشْطَة سَهْفِيّة، قِشْطَة سكاموزا،
 سَفَرْجَل هِنْدِيّ

Custard-apple, Sugar-apple, Sweet-sop (E)

Anone écailleuse, Attier, Pomme cannelle, Corossol écailleux (F)

Honigapfel, Zuckerapfel (D)

Annona squamosa (S)

شَجَرة مُثمِرة من فَصِيلة القِشْطِيَّات مَهدُها أمريكا الاستوائيّة، تَعلو من ٢ إلى ٧ أمتار وتُزرَع على أبعادٍ تَبلغ ٦ أمتار، وهي شَجرة تُشبِه التُّفَّاح شَكلًا وقالبًا. أوراقُها بَيْضيّة الشَّكل المُستطيل. أزهارُها فُستُقيّة اللَّون. المُستطيل، أزهارُها فُستُقيّة اللَّون. الشَّكل، تُشبِه أكواز الصَّنوبَر، قُلبِيَّة الشَّكل، تُشبِه أكواز الصَّنوبَر، لُبُها أَبْيض المَادَّة، غَزير العُصارَة السُّكريّة.

نَينًا مع المُشَهِّيات أو في الحساء، أو يُؤخَذ مَكْمورًا à l'étoufée أو مَطبوخًا. عَصيره الطّازج مُسَهِّل فَعّال جدًّا إذا أُخذ بمقدار كوب كل صباح على الرِّيق. لُبُه يُحضَّر منه مُرَبِّى لَذيذ الطَّعم. من الخارج يُفيد لَصوقًا لمعالجة الحُروق والالتهابات والغَنْغَرينة الشَّيْخُوخيَّة.

۱۱۷ – قُرْنُوْس فلُورِيدا، قَرَانِيا فلُورِيدا Florida dogwood, Florida cornelberry, Florida dogberry (E)

Cornouiller de Floride (F)

Florida kornelbaum, Florida Hornstrauch, Florida korneliuskirschbaum (D)

Cornus florida, Benthamia florida (S)

شُجَيرة من فَصِيلَة القُرنُوسِيَّات تَعلو من ٥ إلى ١٥ مترًا. فُروعها خضراء، زَغَييّة. أوراقُها مُتقابِلة، بَيضيّة مُستديرة القاعِدة، بَحرِيّة اللَّون على صَفْحتِها السُّفلى، تُصبح حمراء اللَّون في الخريف. أزهارُها صغيرة تافِهة، رُؤيسيَّة التَّجميع، ولكنّها مُحاطَة بأربع في الرَّبيع، الشَّمرة عُنيْبَة زاهية اللَّون في الرَّبيع، الشَّمرة عُنيْبَة زاهية اللَّون الأحمر. مَهدها أمريكا.

المُركِّبات - في قِسْرة الجُدُور صَمْع ، راتِنْج ، عَفْص ، حامِض عَفْصيّ ، هيتروسيد يُدعى كُورْنِيْن اكتشفه جايْجَر عام ١٨٣٦ ومن ثمّ أثْبَت شايْمُول عام ١٩٣٧ أنَّه مُماثِل للقَرْبَانِيْن أي

التَّسميات الإنجليزيَّة والألمانيَّة للمؤلِّف.

ق ش ط

النَّمرة لا تُؤكل إلّا بَعد تَمام نُضجِها إذ تُصبح عندها لذيذة جدًّا. بُزورُها سَوداء كبيرة. شَجرَة لا تَنمو جيِّدًا إلّا في السُّهُول، وليست لها مُتَطلِّبات خاصّة بما يَعود إلى طبيعة التُّربة الّتي قد تكون جافّة نِسبيًّا وحتّى مُحجرة.

الخصائص - أوراقُها وثمارُها الخضراء تُعطى نُقاعاتٍ مُهدِّنة، مُضادّة للإسهال. للتَّشنُّج، قابِضة ومُضادّة للإسهال. جُدورُها مُسَهِّلة، ماسِطة بمقادير قوية، مُضادّة للإسهال بمقادير خَفيفة؛ أوراقُها في لَصُوقات تَصلُح لإنضاج الخُراجات وهي مُضادّة للحَكة الشَّديدة. بُزورُها المَسحوقة استُعمِلت كمبيد للحَشرات.

۲۱۶ - قِشْطَة شَبَكِيّة، قَلْبِ الثَّوْر Common custard-apple, Bullock's heart (E)

Anone cœur de bœuf, Cœur de bœuf, Cachiman, Chérimolier (F) Gustardappfel, Rahmapfel (D) Annona reticulata (S)

شَجَرة مُثمِرة من فَصِيلة القِسْطِيَّات، كَبيرة الحجم تعلو من ٧ إلى ٨ أمتار. أوراقُها مُستطِيلة، زَغبيّة الصَّفحة السُّفلى. أزهارُها كبيرة، بَيضاء اللَّون يَشوبُها شيءٌ من الخضار. ثمارُها كبيرة القَد، قَلبِيّة الشَّكل، حَمراء اللَّون. لُبُها جامِد المَادَّة، مُتوسِّط الصِّنْف، أبيض أو أحمر اللَّون. مَهدُها البيرو وخَط أو أحمر اللَّون. مَهدُها البيرو وخَط الاستواء، وبالرُّغم من ذلك فإن مُتطلباتها الزِّراعبّة لبست استوائبة.

ثمارُها أفضل إذا زُرِعت في مَناطق باردة وجافَّة نِسبيًّا. مَرغُوبة جدًّا، ولكنَّها تأتي بَعد الشَّريموليا والكاموزا. تُزرع على أبعادٍ من ٤ أمتار.

الخصائص - أوراقُها وثمارُها الخضراء تُعطي نُقاعاتٍ مُهدِّئة، مُضادَّة للإسهال. للتَّشنُّج، قابِضة ومُضادَّة للإسهال. بُزورُها ولحاؤها طارِدة للدُّود؛ نَقيع الجُدور المَغليّة نُصِح به ضِدّ التَّوْصِيم الحُمِّي أي وَجع وتَكَسُّر الجَسَد بسبب الحُمَّى، كما نُصِح بعصير الأوراق ضِدّ القَمْل. بُزورُها المَسحوقة استُعمِلت كَمُبيد للحَشرات.

مُلاحَظة - إنّ قَلْب التَّور أي القِشطَة الشَّبَكيَّة هي نوع مُتقارِب جدًّا من الشَّريموليا.

۱۱۵ - قَصْعِيْن، قُوَيْسَة تُفَاحِيَّة، قُوَيْسَة Sage apple (E) Sauge pommifère (F) Salbeiäpfel (D) Salvia pomifera (S)

جاء عنه في المَوْسُوعة في عُلوم الطَّبيعة: "نَوع من القُوَّيْسة يُقال إنَّ مَنافعه الصُّحِّيَّة عديدة. يَكثر في الأراضي البَرِّيّة المِذْحاة. ساقُه فرعاء تَعلو من ٣٠ إلى ٢٠سم. أوراقه إهليلجيّة قَلْبيّة القاعدة نَصلُها خَشِن المَلمس أَزْغَب البَشَرة. أزهاره وَرديّة اللَّون زُرق المُواج. ثماره تُفّاحيّة الشَّكل

<sup>(</sup>١) التُّسمية الثانية والثالثة للمؤلِّف.

حقِّية التّركيب».

مُلاحَظة - تَرْكَب أوراق قُويْسة العَفْص حَشَرة تُحْدِث وَخْزاتُها نوعًا من التَّدَرُّن (عَفْصَة) يُدعى «تُفّاحة القُوَيْسَة» التَّدَرُّن (عَفْصَة) يُدعى «تُفّاحة القُويْسَة» Pomme de sauge ou Baisonge وبالتّالي فإنّ العَزَقَان أي القُويْسة اللّبنانيّة تُصاب كذلك بحشرة تَرْكَب أوراقَها ورؤوس فروعها الفَتِيَّة فتُحْدِث فيها تَدَرُّنات تُشبه إلى حدٍّ ما التُّفّاحة الصَّغيرة، وهي تَدَرُّنات مَرضيّة عَفْصِيَّة على الأرجح كما هو الحال في على الأرجح كما هو الحال في

Coton iodé (F) - تُطْن يُودِيّ Gossypium iodatum (S)

السِّنديان والمَلُّول وسوى ذلك.

ونَظُنّ أنّ «الثِّمار التُّفّاحيّة الشَّكْل الحقّيّة

التَّركيب، المذكورة أعلاه، لَيست ثمارًا

بقدر ما هي تَدَرُّنات مَرَضيّة.

نُجَفَف قُطْنًا مَنْدوقًا من الصَّنْف الجَيِّد تَجفيفًا تامًّا في المِحَمِّ عند ٣٠سغ. نَأْخُد من هٰذا القُطْن ٢٥ غرامًا، ومن اليُود المَسحوق جَيِّدًا غرامين، ونُوزَع مَسحوق اليُود على القُطْن بشكل سَوِي قَدْر المُستَطاع. نَضع المَزيج في قارورة سِعتُها ليتر واحد، مُزوَّدة بفُتْحَة واسعة مَحْفوفة أو مَحكوكة Acode أيضًا يُمكن من الزُّجاج المَحكُوك أيضًا يُمكن الاحتِفاظ بها مُقفَلَةً بواسطة زُنْبَرَكٍ نابِض المَفتوحة الفارغة في ماء شِبه غالٍ طوال المَفتوحة الفارغة في ماء شِبه غالٍ طوال عِدَّة دقائق بهدف طَرد قِسم من الهواء

منها. نَضَعُ القارورةَ المُقفلَة جيِّدًا لمدَّة ساعتين على الأقلّ في حرارة تُقارِب المئة درجة سنتغراد؛ يَتَكثَّف اليُود المُبَخَّر على السلُّولُوز على غِرار مادَّة مُلوِّنة. يَجب عندها ألَّا نَفْتَح القارورة قَبْل أن تَبرد من جديد؛ كلّ اليُود، أي حَوالى ٨٪، يَبقى مُثبَّتًا على القُطْن.

إنَّ لهٰذا المُستحضَر يَجب أن يُحفَظ في قارورة مُقْفَلَة جيِّدًا.

المُواصَفات والخصائص - القطن أصبح بُنِّي اللَّون، قاسي الملمس، يَتَمدَّد ويَتَمطَّى بسهولة إلى صَفائح ويَمتلك رائحة اليُود القويَّة جدًّا. القُطْن اليُوديّ يَعمل بقوَّة أكبر على البَشَرة، حسب سماكة الصَّفيحة المَوضوعة عليها منه. ويُمكنُنا حتّى الحُصول على التَّنَقُط إذا غَطَّيناه بتَفْتَة مُصَمَّغة لكي نَمْنَع تَبْخير اليُود وتَصْعيدَه. بالمقابل، إنّ القُطْن اليُوديّ يَعمل بشكل أكثر انتظامًا من صِبْغَة اليُود.

القُطْن اليُوديّ يَجب أن يُحفَظ في قارورة مُقْفَلَة.

ر(۱) عُلُقاس القُدامَى، تَارُو(۱) Colocase des Anciens (۲), Caboué, Madère, Néré, Quiquisque, Songe, Tales, Taro (F) Colocasia antiquorum (S)

نَبات مُعمَّر من فَصِيلَة القُلْقَاسِيَّات يَعلو نَحو المتر. أوراقُه جَذريَّة،

IVO

<sup>(</sup>١) التَّسميتان للمؤلِّف.

<sup>(</sup>٢) التَّسمية للمؤلِّف.

واسِعة، مُنحنِية إلى الخارج، بَيضية الشَّكْل القَلْبِيّ، دَرَقِيّة، مُتَموِّجة النَّصْل، خضراء اللَّون المُتدرِّج إلى الأزرق، طولها من ٥٠ إلى ١٠٠سم وعرضها من ٣٥ إلى ٥٠سم، عُنُقها قَويّ، مُقوَّس، طويل، أنبوبيّ القاعدة الكبيرة. دَرنتُه كبيرة الحجم، مأكولة، عامُوديّة، لِفتيَّة الشَّكْل المُستدير، تَزِن من ١٠٥٠ إلى ٥ كيلوغرامات، لحمها أبيض، بنفسجيّ أو كيلوغرامات، لحمها أبيض، بنفسجيّ أو مُسود اللَّون. ضُروبه حَوالى ١٣ في تاهيتي، ٢٠ في كاليدونيا الجديدة، ١٠ في مَدَغسقر.

التَّسميتان: Caboué وُ Néré تُطلَقان عليه في كاليدونيا الجديدة، Madère في جزر الأنتيل، Quiquisque في غواتيمالا، Songe في مَدغسقر، Tales في جاڤا أو جاوا، Taro هو الاسم الذي يُطلق على الدَّرنات بنوع خاصّ. قُلقاس القُدامي هو تَرجمَة الاسم العِلميّ.

المُركِّبات والاستعمال - لُبابُه يَحتوي على مَواد آزوتية، مَواد دُهنيّة، مَواد مُون غَنيًا هِيدرُو كَربونيّة، وقد يكون غَنيًا بالحامِض الأقْصاليك. أوراقُه الفَتيّة تُؤكل كالسَّبانِخ؛ جُذوره ودَرناتُه حامِزة الطَّعم القارِص تُؤكل بَعد طَبْخِها أو نَقْعِها بالماء لإزالة ما فيها من المَواد الكاوِية. وهو نَبات يَتميَّز بظاهِرة مُلفِتة إذ إنّه يَفْرُز لَيلًا قَطَراتٍ من الماء النّقيّ الصّافي. عُصارةُ سُوقِه أو أوراقه قد تُستعمَل لتَهدِئة الحَكَّات المُتسبّبة عن نات مُقرِّص.

۱۱۸ - قُلْقَاس مَأْكُول، قُلْقاس زِرَاعِيّ Colocasia eatable arum, Egyptian arum, Egyptian colocasia (E)

Colocase comestible (Y), Taro, Mon, Madère, Arum colocasie, Arum d'Egypte (F)

Echte blattwarz, Agyptisches arum, Colocasie (D)

Colocasia esculenta, Colocasia antiquorum, Caladium esculentum (S)

نبات مُعمَّر من فَصِيلَة القُلْقاسِيَّات. أوراقُه كبيرة القَدّ عُنُقها طويل الشَّكل الدَّرَقِيّ، نَصلُها قَلبيّ الشَّكل طوله اللَّرن قِيّ، نَصلُها قَلبيّ الشَّكل طوله الأخضر، بَنفسجيّ أو إلى البُنِّيّ حسب الضّروب، تزيينيّة جدًّا، عُروقها بارزة. الضّروب، تزيينيّة جدًّا، عُروقها بارزة. ريزومه قد يَزِن من نِصف كيلو إلى عِدّة كيلوغرامات. يُطلَق عليه اسم Taro في پولينيزيا، وMadère في فيتنام، وMadère في الأنتيل الفرنسيّة. قُلقاس مأكول هو ترجمة الاسم العِلميّ.

المُركِّبات - لُبابُه يَحتوي على مَوادَّ أَزُوتيَّة ٢,٦٥٪، مَوادَّ دَسِمة ٢,٠٥٠٪، مَوادَّ دَسِمة ١٦,٨٢٪، قد يكون عَنيًّا بالحامِض الأقْصاليك.

الاستعمال - زراعتُه شائعة لدرناته المأكولة في جُزُر المُحيط الهادئ (تاهيتي، كاليدونيا) حيث يَأْكُل الأهالي الأوراق الفَتيَّة أيضًا على غِرار السَّبانِخ. دَرناته تُؤكل بَعد طَبخها أو نَقْعها بالماء

<sup>(</sup>١) التَّسميتان للمؤلِّف.

<sup>(</sup>٢) التَّسمية للمؤلِّف.

ق و ي

لزوال ما فيها من مَواد قارِصة كاوِية. وهو نَبات يَتَميَّز بظاهرة نادِرة ومُستغرَبة إذ يَفرز خِلال اللَّيل قَطَراتٍ من الماء النَّقيّ الصّافي.

٢١٩- قِمام عُنْكُولِيّ

Corymbiferous cranberry (E)<sup>(1)</sup>
Airelle à corymbes (F)
Doldenheidelbeere (D)<sup>(1)</sup>

Vaccinium corymbosum (S)

جَنْبة دَاغِلة من فَصِيلة الخَلَنْجِيَّات تَعلو من متر إلى ثلاثة أمتار. فروعُها سَرْحة، مُصْفَرَّة اللَّون الأخضر. أوراقُها عابِلة، كامِلة، مَرْطاء، عَريضة الشَّكل الإهليلجيّ، تَطول نحو ٧سم، نَصلُها مُغدَّد الصَّفحة، قَليل اللَّمْعة. أزهارُها بيضاء أو وَرديّة اللَّون، أسْطوانيّة الشَّكل، خُماسيَّة سُباعيَّة التَّجميع، الشَّكل، خُماسيَّة سُباعيَّة التَّجميع، عُثْكوليّة التَّرتيب، إبطيّة الارتكاز. ثمارُها مُسْوَدة اللَّون الأزْرق، مَأكولَة، وصِناعية كُحوليّة.

سَنَهُ عَاسِيَهُ، قُورُصَهُ قَاسِيَهُ، كُفُ -۲۲۰ Rough sage, Clary (E) الدُّبَ Sauge sclarée, Sclarée, Sauge écarlate, Herbe aux plaies, Orvale, Toute bonne, Sclareiam (1795) (F) Muskatsalvei, Muskateller salblel (D) Salvia sclarea (S)

نَبَات مُعَمَّر من فَصِيلَة الشَّفَوِيَّات يَعلو من ٣٠ إلى ١٢٥سـم. ساقُه قَويَّـة،

مُربَّعة، مُتفرِّعة. أوراقه مُعنَّقة، واسعة، بَيضيّة قَلْبيَّة الشَّكْل، خشنة، مُوبِرة، مُرْمَدَّة اللَّون، مُفرَّضة، مُحدَّبة النَّصْل، بارزة العُروق. أزهاره بيضاء ورديّة المُواج أو زَرقاء المُواج، في سُنْبُلة من المُواج أو زَرقاء المُواج، في سُنْبُلة من الدَّوّارات الّتي تُشكّل عُثكُولًا كثيفًا وديقًا، قُناباتها كبيرة عَريضة غِشائيّة، ورديّة اللَّون البَنفسجيّ، قلبيّة الشَّكْل، مُهدَّبة السَّكْل، مُهدَّبة السَّكْل لها العُليا مِنْجَليّة الشَّكْل، السُفلي مَثْنيّة. الشَّكل، السُفلي مَثْنيّة. اللَّون، المَعة، بزورها المععة. الأرومة اللَّون، المعة، بزورها المععة. الأرومة الطعم حارّ وحامِز.

المُرَكِّبات - زَيت دُهني، عَفْص، لُعاب، صابونين، كُولين، غلوكوسيد.

الخصائص - ذُكِر أنّ خصائصها هي خصائص القُويْسة المَخْزَنيّة ذاتها، وإن يَكُن بنسبٍ أقلّ منها بقليل: مُضادّة للتَّشنُج، مُضادّة للعَرَق، مُنظِّفة ، مُطمِثة، لائمة للجروح، مُنشِّطة، مُبيدة للبكتيريا. يُستعمَل منها الأوراق والرّؤوس المُزهِرة والبزور.

الاستعمال - نُقاهة، شُهاق، أوديما، طَمْث، قُرحة، قَيْء، عَيْنان...

طريقة الاستعمال - نُقاعة ٣٠ غرام أوراق وأزهار في ليتر ماء غالٍ يُغطّى عشر دقائق ويُؤخذ منه ثلاثة فناجين في اليوم. صِبْغة تُحضَّر بنَقْع ٢٠ غرام أزهار

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمؤلُّف.

ق و ي

مَرْهَم من:
أوراق قُوَيْسة٣٠ غ
أوراق كَفْنَة٣٠ غ
شحم حَيَوان ٢٥٠ غ
شمع أبيض
نَطبخ الكُلّ معًا ومن ثمّ نَسحب
النَّباتات ونَرميها. نَمسح القُروح
الخادِرة وقُرحات البَشَرة والكَدْمات
والالتواءات أوراق القُوَيسة القاسية
تُستعمَل اليوم كما كانت في الماضي
ضِدّ الشُّهاق. زَيتها الدُّهنيِّ العَسَليّ
القِوام يَحتوي على Sclaréol، يُستعمَلَ
في التَّجميل ومُنتَجاته لرائحته العَنْبَريَّة
الْعَذْبَة، كما يُستعمَل كدعامة في صناعة
المُطي

وأوراق في ٨٠ غرام كحول ٧٠ درجة
لمدَّة عشرة أيّام، يُؤخَذ منها ٢٠ إلى
٤٠ نُقطة، مَرّتان أو ثلاث في اليوم،
مع زهورات أو مع قليلٍ من الماء. من
الخارج نُحضِّر نَقيعًا من ٥٠ غرام أوراق
وأزهار في ليتر ماء يُغلى عشر دقائق:
مُنظِف مُمتاز فَعَال في تَسهيل لأم
القُروح والجُروح كما يُفيد لغسيل الفَم
والتَّمَ ضُمُض في الالتهابات
والقُلاعات في حال التَّوعُك
-
والانزعاج من التَّقَيُّؤ، يُؤخَذ فِنجان من
نُقاعة ٢٥ غرام رؤوس مُزهِرة في ليتر
ماء غالٍ يُغطَّى عشر دقائق. أمَّا لإخراج
قَذَى العَين من غَبائر أو أجسام غريبة،
فَنضع في زاوية العين الدّاخليّة المَقْذِيَّة
بزرة من بزور القُوَيْسة القاسية.

3

(۱) کاینْسَة، کاهِنْکَة، کاهِنْسَة Chicocke tree (E) Caïnça, Cahinca (F) Traubenformige, Kainzawurzel (D) Chicocca brachiata, Chicocca anguifuga (S)

شَجَرة حُرْجيَّة مُعمَّرة من فَصِيلَة الفُوِّيَّات مَهدها البرازيل وبَعض مَناطق أمريكا الاستوائية. ساقُها عارشة مُتسلِّقة فَرْعاء. أوراقُها مُعنَّقة، مُتقابِلَة، إهْليلَجيَّة الشَّكل. نَصلُها جلدي الصَّفْحة، قاتم اللُّون الأخضر الجَميل اللّامع. ازهرارُها عُنقودي التَّجميع. أزهارُها صغيرة القَدّ وَرديّة اللّون عديمة العَرْف. ثمارُها لَحميَّة، مُبَطَّطَة، عافِصة المَذاق، لا تُؤكل. جَذرُها مُتفرّع، يَتألّف من جُذَيرات تكون مُتَلوِّية الشَّكل في أكثر الأحيان، تَبلغ من قدر الإصبع الصغيرة إلى قدر أنبوب ريشة الكتابة. رائحتُها تَقرب بَعض الشِّيء من رائحة النّاردين. القِشرة مُخطِّطة، مُرْمَدَّة اللَّون، جسمُها لِيفِيّ أبيض؛ وهي مُرَّة جدًّا وتَحتوى على الجَوهر الفَعّال.

(١) التَّسميات العربيَّة للمؤلِّف.

المُركِّبات - تَحتوي الكاهِنْسَة على هيتروسيد مُتبلِّر يُدعى كايِنْسِيْن وهو غلو كوسيد جُذور النَّبات الَّذي كان يُدعى في الماضي حامِض كايِنْسِيك، تَركيبُه الكيميائيّ C40H64O18 ويُعطي بالانشطار كايِنْسَاتِين C22H34O3 وسُكَّر.

الخصائص - عُصارة الأوراق والثِّمار مُقوِّية وقابضة. الكايِنْسَة مُسهِّلة ومُقيِّئة قللة الاستعمال.

الاستعمال - إمساك، تَسمُّم، وَردَت الكايِنْسَة في دستور أدوية ١٨٦٦، وأُعيد تَسجيلُها في الإصدار التّاسع للفَرْماكوبيا الفَرنسيَّة الحَديثة عام ١٩٧٥.

طريقة الاستعمال - يُحضَّر من الكايِنْسَة نُقاعة في الماء الغالي أو نقيع يُغلى، بمقدار ٢٠ غرامًا في ليتر ماء. ويُحضَّر منها صِبْغَة كحُوليَّة، وشَراب سُكَّريّ؛ جُرعة مسحوقها هي غرام واحد أو غرامان في اليوم. تُستعمَل جُذورها في البرازيل ضدّ نَهْش الأَفْعى السّامّة التي تُسمّى «كَايِنَانَا» Caïnana. العُنْقُودِيَّة (١٠ كاينْسَة التي مُستعمَل الكاينْسَة مُعالَجة السّفْلِس والرّوماتيزم.

٢٢٢- كَبَابَة، حَت الْعَرُوس

Cubeb pepper (E)
Cubèbe, Poivre à queue (F)
Cubebenpfeffer (D)
Piper cubeba, Cubeba officinalis (S)

الكَبابَة هي ثُمرة فِلْفِل كَبابَة، وهو

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمؤلِّف.

شُجَيرة سَرْعِيّة، جَميلة الشَّكل والهندام، من فَصِيلَة الفِلْفِلِيَّات. مَنبتها مُختلَف المناطق الهندو-ماليزيّة، خاصَّة في سُومَطْرة، وأُدخِلت إلى سِيلان والهند (ساحل مالابار). أزهارها عَناقيد مُستطيلة مَرْجانيّة أو أرجُوانيّة اللَّون.

الكَبابَة ثَمرة تكون بحجم الفِلْفِل العاديّ، مُرْمَدَّة اللَّون البُنِّيِّ أو مُسودَّة اللَّون، مُجَعَّدة، تَجاعيدُها مُتواصِلة اللَّون، مُجَعَّدة، تَجاعيدُها مُتواصِلة مُتشايِكة Anastomosées وتبدو كأنَّها تُشكِّل شَبكةً من الزَّرَدات ذات الحُدود المُتعدِّدة الزَّوايا الجيِّدة الانتظام، ثمار الكَبابَة كُرُويَّة الشَّكْل، غالبًا ما تكون الكَبابَة كُرُويَّة الشَّكْل، غالبًا ما تكون مَاعِرًا يُقلِّد العُنُق ولكنَّه بالحقيقة استطالة ضامِرًا يُقلِّد العُنُق ولكنَّه بالحقيقة استطالة لغلاف الثَّمرة؛ إنّ ذلك العُنُق الكاذِب يَطول تَقريبًا بقدر القِسم الكُرَويّ من الشَّمرة؛ هذا ويَجب أن تُخلَّص منه النَّمار المُعدَّة للاستعمال الصَّيدليّ.

تَتمتَّع الثَّمرة بكاملها برائحة عِطريَّة خاصَّة. أمَّا طَعمها فحامِز خَفيف وحارٌ.

المُركِّبات - تَحتوي الكَبابَة علي ١٠ إلى ١٨ بالمئة من زَيت عديم اللَّون، يَغلي بين ٢٥٠ و٢٦٠ سغ، ثقله التَّوعيّ يغلي بين ٢٥٠ و ٢٩٠٠ ويُعطي بلَّورات من «كافور الكَبابَة» عندما يُنقَى ويُصفّى بالماء، وعلى واحد بالمئة راتنج يَحتوي خاصة على حامِض كُوبابيك (١)، وعلى اثنين بالمئة من جَوهر قابل للتَّبلُّر غير مُنتْرَج (كُوبابِيْن تركيبه الكيميائيّ

C<sub>10</sub>H<sub>10</sub>O<sub>3</sub>)، وهــو يَــنــصــهــر عــنــد ۱۲۰°سغ، وبتركيب أبسط من تركيب الـ پِيْپَارِيْن.

مُسحوق الكَبابَة، الَّذي يَكون بُنِّيَ اللَّون الأحمر اللَّون الأحمر الكَرْزِيِّ عِند مُلامَسَته للحامِض الكَبْريتيِّ SO<sub>4</sub>H<sub>2</sub>

الاستعمال - كانت الكبابة تُستعمَل في مُعالجة التَّعقيبة. ولكنَّها أيضًا دَواء مُنشَّط، ودَواء نافع للمَعِدة. أوْصِيَ بها ضِدّ السَّيلانات البيضاء.

صنع من الكبابة مسحوق كان يستعمَل جدًّا في الماضي محلولًا في قليل من الماء، أو على شكل بيلُولات، وكَبْسولات، وحَبّات مُلبَّسة، ومَعاجين مُؤَفْينَةٍ؛ وكان يُحضَّر منه مُستخلَص أثيري كُحوليّ، وصِبغة؛ واستُعملت نُقاعة الكبابة بنسبة ٢٠ بالألف، في جَروعات، وحُقَن شرْجِيّة، ولكنَّنا بذلك نُواجه احتمال حُدوث التَّقيَّوات والمَغْصات.

طريقة الاستعمال - يُعطى مَسحوق الكَبابَة بجرعات من ١٠ إلى ١٥ غرامًا في اليوم، تُؤخَذ بين الوَجبات. استعمال الكَبابَة العِلاجِيّ تَراجَع بشكل كبير؛ وهو اليوم شبه مَتروك ولم يُذكر في أقْرَباذين ١٩٤٩، ولكن أُعيد تَسجيلُه مُجدَّدًا في الكودكس عام ١٩٧٤.

مُلاحظة - بالإضافة إلى الكبابات الحقيقيَّة التي تَنتُج عن جَنْبَة طَوعيَّة أو

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمؤلِّف.

ك ح و

مُنحنِية، زَوْرَقُه مُقعَّر الطَّرف، مَقْطُوم. الأسدِية دِيادِلْف (ثُنائيّة الزُّرقة) الثَّمرة قرن خَطِّيّ جالِس طولُه ٦ إلى ٧سم، مُخَفَّف الطَّرفَين، مَضغوط، انخفاضاتُه بين البُزور مُنحنِية، بُزورُه ٣ إلى ٥، مَضغوطة، لونها إلى البُنِّيّ.

المُركِّبات - مَوادِّ أزوتيَّة ١٩ إلى ٢٠٪، مَوادِّ هيدروكَرْبُونيَّة ٦٢ إلى ٦٤٪، مَوادِّ دُهنيَّة ١٠١ إلى ١,٢٪.

الخصائص - قُرونُها الخضراء تُطبَخ كاللُّوبياء، حَبُّه النّاضج الجافّ صُلْب المادّة يُستعمَل بَعد سَحْقه. بُزورُه المأكولَة هي دافعة للسُّعال، قابضة، مُصرِّفة حالَّة، ومُبوِّلة شديدة الفعل. أزهارُها مُبوِّلة ونافعة للصَّدر. أوراقُها مُلبَّة.

٢٢٤ - كُحولة دُهن التَّربَنْتين، رُوح مُضادَة لليَرقان

Alcoolat d'essence de térébenthine, Esprit antiictérique (F)

مَزروعة، هناك عدد من أنواع الكَبابَة الكَاذِبة تَنتُج عن الأنواع التّالية:

Cubeba canina Blume Cubeba crassipes Miq. Cubeba clusii D.C.

وفي كلّ الأحوال، إنّ النَّوع القديم، أي الكبابة الحقيقيّة، هو الأغنى من سواه بكثير بالجَواهر الفَعّالة (حامِض كُوبابِيك)، ويَجب بالتّالي أن يُفضَّل على سواه.

٢٢٣ - كَجْنُوس كَاجَن (١)، كَجْنُوس
 هِنْدِي، قُرَيْناء، بِسِلَّة هِنْدِيَّة، لُوْبِيَاء
 سُوْدانِيَّة، بِسِلَّة الكُوْنْغُو

Doll, Pigeon-pea, Cajan-pea, Congopea (E)

Ambrevade, Pois d'ambrevade, Cytise des Indes, Pois de Congo, Pois d'Angole, Pois cajan, Pois pigeon (F) Catjang, Angolische erbse (D)

Cajanus cajan, Cajanus indicus, Cytisus cajan, Cajan inodorum (S)

شُجَيرة مَهدُها آسيا وأفريقيا الاستوائية من فَصِيلَة القَرْنِيَّات الفَراشِيَّة زغبيّة في كافّة أقسامها، مُنتصِبة تَعلو من ٢ إلى ٣ أمتار. أوراقُها دائمة، ثُلاثيَّة الوُرَيْقات السِّنانيّة الكثيفة المُتَلبِّدة، طولها السِّنانيّة الكثيفة المُتَلبِّدة، طولها ١٠سم. ازهرارُها عناقيد إبطيّة. أزهارُها عديدة، صفراء نَقيّة وأرجوانيّة، كأسُها جُرَيْسِيّة الأنبوب، قصيرة الأسنان. تأجُها مُتساوي البَتلات، عَلَمُه شبه مُستدير، مَلْوِيّ إلى الخارج، أجنحَتُه مُستدير، مَلْوِيّ إلى الخارج، أجنحَتُه

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمؤلِّف.

# العِطْرِي، رُوح العَسَل

#### Alcoolat de miel composé, Eau de miel adorante, Esprit de miel (F)

٠ ٣٢ غ	غَسَل
٠٢٠ غ	كزبرة
ن ٤٠	قشر ليمون حامض غض
٠٠٠ غ	كبش قرنفل
٠٠٠٠٠٠ غ	جوز طیب
٠٠٠٠٠٠ غ	بنجوان
-	أصْطُرَك فَحميّ
_	فانيلية
	ماء الورد
	ماء زهر البرتقال
١٩٢٠غ	کحول ۸۵ درجة
	نُقسِّم المَوادِّ بشكلِ
_,	في الكُحول لمدَّة ٣ أيّ
	العَسَل والمياه المُة
	والزَّهر) ونُقطِّر كلِّ ال
	يُضاف إلى هذه الكُحو
مُستحضَر عَذْب	في بعض الأحيان.
للنَّظافَة للنَّظافَة	الرّائحة جدًّا يُخصَّصر
	الحَسديّة.

## ٢٢٦- كُحولة القرفة، رُوح القرفة Alcoolat de cannelle, Esprit de cannelle (F)

٥٠٠٠ غ	قرفة مسحوقة
٤٠٠ غ	کحول ۸۰ درجة
شكل خَشِن ونَمرثها في	نَسْحَق القرفة بـ

٣٢٥ - كُحُولَةُ العَسَل المُركَّبة، ماء العَسَل الكُحولة لمدَّة ٤ أيّام، ثمّ نُقطِّرها في حَمَّام مَرْيم حتّى سَحْب كلِّ الكُحول (دستور ١٨٦٦). نُحضِّر بالطّريقة ذاتِها الكُمولات التّالية:

أنجليك، عود الوَجّ، باديان، خشب رودُس، عرعر، قرنفل، قشر جوز الطّيب، جوز طيب، ساصفرا.

٢٢٧- كُحُولَة الملْعَقيّة المُركَّبة، كُحُولَة مُضادَّة للحَفَ

Alcoolat de cochléaria composé, Alcoolat antiscorbutique (F)

أوراق مِلْعَقية غَضّة ..... فراق مِلْعَقية عَضّة جذر فجل خَيْل برِّيّ طازج

کحول ۸۰ درجة ..... ۴۳۵۰۰

نَمرُث لمدَّة ٣ أيّام في الكُحول ونَسْحَب بالتَّقطير مِقدار ٣٠٠٠غ من الكُحولة.

المواصفات - سائل صاف، عَديم اللُّون، لا يَضطُّر بإضافة مَرَّتَيْن حجمه من الماء (كودكس ١٩٣٧).

عيارُه الكُحوليّ عند

١٥°سغ ....٧٠ إلى ٧٥ درجة فُضالَة ثابتة عند ١٠٠°سغ .....صفر إنّ ٥٠ ملل من هذه الكُحولَة تُعطى راسبًا مُسْوَد اللُّون البُّنِّي من سُولفور الفِضَّة إذا أضَفْنا إليها ٥ ملل نُشادِر و١٠ ملل مَحلول نيترات الفِضَّة العِيَارِيّ العُشْرِيّ (N/10).

الخصائص - مُضاد قُوي لداء الحَفر.

الاستعمال - يُؤخَذ منه ١ إلى ٤ غرامات من الدّاخل، في سائل ملائم أو يُؤخذ في غَرْغَرات مُتكرِّرة. إنّ هذه الكُحولَة لم تَعُد مَذكُورة في كودكس ١٩٤٩.

٢٢٨ كُحولَة نُشادِريّة نَتِنَة، دُهْن مُضادّ
 للهستيريا

Alcoolat ammoniacal fétide, Essence antihystérique (F)

إفراز قُنْدُس ٤٠ غ
حِلْتيت۲۰
زيت فَيْجَن طيّار٥ غ
زيت سُبينة طيّار٥ غ
زيت كهرمان أصفر١٠٠٠ غ
كحول مُكرّر٨٠٠
نَمرُث ٤ أيّام، نُقطِّر في مُقطِّرة قَرْنِيّة
Cornue في حَمَّامِ مريم؛ نُعيد سَكْب
السَّائل فَوقَ الفُضالَة ونُضيف إليه:

كافور روح قَرْن الأيِّل التُشادِريّ غير

المُكرَّر من جديد حتّى الجَفاف كُور من جديد حتّى الجَفاف (كودكس باريس ١٧٥٨) parisiensis

الخصائص - مُضاد هستيري قَويّ فَعَال، إمّا في تَمسيدات على

الشُّرْسُوف، وإمّا استِنشاقًا في الأنف، وإمّا يُؤخَذ في نقاط تُضاف إلى سَوّاغٍ ما مُلائم.

ك ح و

يَتركَّب «الماء التَّين المُضادِّ للهستيريا» من: أُشَّق، حِلْتيت، مُرَّ، ناردين، زدُوار، أنجليك، نعنع، زعتر مَدّاد، بابونج، إفراز قُنْدُس، ماء مُكَحْلَل. نُقَطِّر. يَكون النِّتاج مُضطربًا أي عَكِرًا. إذا حَذفنا الحِلْتِيت والأشَّق، وأضَفنا إليه الفاشِرة والفَيْجَن والسَّبينة، نحصل تقريبًا على ما يُسمّى «ماء أو كُحولَة الفاشِرة المُركَّبة».

إِنِّ الكُحولَةِ النَّشَادِرِيَةِ النَّتِنةِ أَوِ الرُّوحِ النَّشَادِرِيَةِ النَّتِنةِ فِي الفَرْماكوبيا اللَّنْدُنيَةِ كانت تُحضَّر كما يلي: مِلح نُشادِر ٥٠٥، كَرْبُونات البُوتاسيوم ٥٠٠، كحول مُكرَّر ١٥٠٠، ماء ١٥٠٠، من حِلْتِيت ١٥٠٠. نُقطِّر مِقدار ١٥٠٠ من السّائل.

## ۲۲۹ كُحُولَتُور شُقّار الفِصْع Alcoolature d'anémone pulsatille (F)

يُحضَّر هذا الكُحولَتُور من أوراق وأزهار شُقَار الفِصْح الغَضَّة كما يُحضَّر كُحولَتُور أوراق الأكُونيت (المعجم الثاني، صفحة ٢٠٨).

سائل صافٍ مُصفر اللَّون الأخضر، بالكاد يَضطرب إذا أضَفْنا إليه حَجمه من الماء. عدد النُّقاط منه في الغرام الواحد هو ٥٤ نُقطَة (دستور).

خطر - الجدول Dangereux-Tableau C

الاستعمال - في مُعالجة النَّزْلَة الشُّعبيّة والرَّبُو بمقادير اعتياديّة من ٠,٥٠غ للجُرعة الواحدة، ومن ٠,٥٠ إلى ١,٥٠غ لكلّ ٢٤ ساعة للبالغين. لم يَعُد يُدْرَج في الدّستور بعد العام ١٩٤٩.

۲۳۰ كُحُولَتُور النّاردِين المُثَبَّت Alcoolature de valériane stabilisée (F)

أرومة وجذور ناردين غَضّة ١٠٠٠٠ غ كحول ٩٥ درجة ١٠٠٠ نسكُب الكُحول ٩٥ درجة في حَوْقَلة مُعَيَّرة يُمكِن وَصْلُها إلى مُبَرِّدٍ ارْتداديّ ونَغْليه بتسخين الحَوْقَلة في حَمّام مَريم. عندما يَبدأ الكُحول بالغَليان نَرمي فيه أرومة النّاردين كاملة، مع الانتباه إلى عدم انقطاع الغَليان. نُتابع العَمليَّة بَعد ذلك كما جاء في تَحضير كُحولتُور القَسْطَل هِنديّ المُثَبَّت (المعجم الثاني، صفحة ٢٠٨).

الخصائص - سائل فاتح اللَّون البُنِّي. مُسكِّن عَصَبي مُضاد للتَّشَنُّج يُؤخذ بمقادير من ٥ إلى ١٥ غرامًا، في جَرُوع أو في شَراب.

٢٣١- كَرَز الطَّيْر، كَرَز بَرِّيّ

Gean cherry, Hedge-berry, Sourcherry (E)

Merisier, Cerisier des oiseaux, Cerisier sauvage, Cerisier noir, Cerisier des bois, Guigne, Biguarreau (F)

Süsskirsche (D)

Prunus avium, Cerasus avium (S)

شَجَرة هَرَمتَة الشَّكْل من فصلة الوَرْدِيَّاتِ تَعلو ١٠ إلى ٢٠ مترًا وأكثر. لحاء جذعها مُطَلِّس ولامِع اللَّون البُنِّي يَتَقَشُّر عن سبور أفُقيَّة. إيراقُها قَلبا الكَثافة، أغصانُها صاعدة، فروعُها مُنسطة. أوراقُها كامدة اللَّون الأخضر، زغيَّة الصَّفحة السُّفلي، مُسنَّنة الحوافي، إهْليلجيَّة الشَّكلِ المُستَدقِّ الطَّرَف، طولها من ٥ إلى ١٥سم، مُزيَّنَة بغدد مُجَذَّعة. أزهارها بَيضاء، طويلة الزِّنادات، في حُزْ مات خَيمية الشَّكل وغير مُورقة. خَمْس كأسِيّات وخَمْس بَتَلات. النَّمرة نَوَوِيّة صغيرة بَيضانيّة الشَّكْل الكُرَوي، حمراء فسوداء اللُّون قطرها حوالي ٢سم. الأرومة غير رئْدِيَّة. الرّائحة مَعدومة. الطَّعم حُلو قليل المرارة. الأقسام المُستعمَلة هي الثِّمار والعَصير و الأعناق.

المُركِّبات - حَوامِض عُضوِيّة، عَفْص، أَنْزِيم، پروڤيتامين A. اللَّوزة تَحتوي على أَمُولْزِين، أمِيْغدالُوسيد، ٣٠ بالمئة زيت. ماء الثَّمار المُقطَّر فيه حامِض سِيانْهيدريّ.

الخصائص - مُبوِّلَة، مُسَهِّلة،

مُنعِشة، ماء الشِّمار المُقطِّر مُهدِّئ.

الاستعمال - التهاب المَفْصِل، إمْساك، عُسْر الهَضم، نِقْرِس، بَدانَة. ماء الثِّمار المُقَطَّر يَدخُل في صناعة المشروب الألمانيّ المُسمّى كِيرش Kirsh.

طريقة الاستعمال - في التهاب المَفاصِل يُؤخَذ فنجانان يَو مبًّا ولمُدّة ٣ أسابيع من نَقيع ٦٠ غرامًا من أعناق كَرَزِ الطَّيْرِ في ليتر ماء يُغلى ١٠ دقائق. في الإمْساك تُؤكِّل كَرزات الطَّيْر الطَّازجة. في عُسْر الهَضم نُحضِّر رَاتَافيا (في صحّتك) بمرث كيلو واحد من الكُرَز من دون أعناقها، والمَمعوسة مع عَجَماتها في ٣ ليترات كونياك لمُدّة شهرين. نُمرِّر بعدها في مُنخُل دقيق الفُتحات. نُضيف ٥٠٠ غَرام من السُّكَر لكُلِّ قِنِّينة ومن ثمّ نُقفلها ونَتركها للرّاحة. يُؤخَذ من هذا المَشروب بَعد الوَجبة. في مُعالجة النَّقْرس أو حتَّى البَدَانَة نُحضَّر نَقيعًا من ٣٠ إلى ٤٠ غرامًا من الأعْناق في ليتر ماء يُغلى ١٠ دقائق ويُؤخَذ منه ٣ فناجين في اليوم لعمله المُعَرِّق والمُبَوِّل.

### ٢٣٢- كَرَفْس لِفْتِي

Turnip rooted celery, Celery (E) Céleri-rave, Céleri-navet (F) Knoll-sellerie, Kohlrabiselleri, Selleriak (D)

Apium graveolens var. rapaceum (S)

نَبات مُحوِل من فَصِيلَة الخَيْمِيَّات يَنْتُج بالاصْطِفاء الزِّراعيّ الخُضريّ من

الكَرَفْس البَرِّي Ache كما هو الحال مع الكَرَفْس البَّبْطي، وهما ضَرْبان زِراعِيّان يَتَمتَّعان بخصائص الكَرَفْس البرِّيّ الطبيَّة ذاتها، وإن يكن بقدرٍ أقل مِنه بَعض الشَّيء.

كارف

المُركِّبات - فيتامينات «أ»، «ب»، «ث»، مَغْنازيوم، نُحاس، حَديد، يُود، صُوديوم، بُوتاسيوم، كَلْسيوم، فُوسفور، دُهْن، كُولِيْن، تِيروزِيْن، خامِض غلوتاميك، عَصيره غَنيّ بالقيتامين «E» المُوازِن للوظائف الجنسيَة.

الخصائص - مُشهِّية، نافِعة للمَعِدة، مُقوِّية عَصبيَّة وعامّة، مُنشَّطة للكُظْران، مُمَعْدِنَة، مُنعِشة، مُنقِّية الدّم، مُجدِّدَة دَمَويّة، مُضادَّة الملاريا، مُبوِّلة، مُضادّة الروماتيزم، مُصرِّفة رئويّة وكبِديّة، مُطهِّرة، مُضعِفة، لائمة.

الاستعمال - فقدان الشّهيّة، عُسْر الهَضم، وَهْن، إرهاق، نُقاهة، ضُعْف الكُظران، عَصَبيّة، ضُعف المَعادِن (سِلّ)، ضُعف جنسيّ، حُمَّيات مُقْلِعة، روماتيزم، نِقْرِس، رُمال بَوْليّ، مَعْصات كليويَّة، إصابات رِئويَّة، كُباد، صُفيراء، بَدانَة، كَظَة الدّم، قُروح، قُرْحات، سَرطانات، ذُبحات، إلخ.

طريقة الاستعمال - نيئًا في السَّلطات والأحْسِيَة والمَرَق؛ عصيره الطَّازج في عِلج مُكَثَّف للرَّوماتيزم، وحُمَّى الملاريا... (اطلُب كَرَفْس نَبَطى في

كرف

٢٣٢، والمُعجَم الرابع، صفحة ١٨٢، رقم ۲۳٦).

٢٣٣- كَرَفْس الماء العَرِيْض الوَرَق، سِيُوم عَرِيْضَ الوَرَقِ(١)، أَنْسَ النَّفْس، جرجير الماء

Latifoliate water celery(\*), Water parsnip, Water parsley (E)

Berle à feuilles larges, Ache aquatique, Ache d'eau (F)

Breiter merk, Wasser peterlein, Breitwassersellerie (D)(T)

Sium latifolium (S)

نَبات عُشبي طبِّي مُعمَّر من فَصِيلَة الخَيْمِيَّات يَكثر في المناقع والأراضي الرَّطية. أزهارُه يَنضاء. كأسُها خُماسيّة الأسنان. يَتَلاتُها يَبضاويَّة الشَّكلِ المُنْقَلِب، مُقوَّرة، مَلْويّة النَّصْل. أوراقُه رِيشيَّة التَّشريح. ثمارُه (مَرِيكارِپ) مَضغوطة جانبيًّا، خُماسيّة الضُّلُوعَ الخَطّية.

الخصائص والاستعمال - كان هذا النَّبات مُسجَّلًا في دستور أدوية ١٨١٨ بفضل خصائصه الطبَّة المُضادَّة لداء الحَفَر والمُدِرَّة للنول، وأعد تسجله في الفَرْماكوبيا الفَرنسية بإصدارها التّاسع عام ١٩٧٥. وكُتَب عنه إدوار غالب في «الموسوعة في علوم الطَّسعة »: أوراقُه وجذُوره مُضادّة للحَفَر ومُدِرَّة للبَوْل. بُزورُه مُنفِّطة كالخَرْدَل

المُعجَم الأوَّل، صفحة ١٤٤، رقم وهي مُهيِّجة للقُوّة الجنسيّة وقد تكون شابقة نَظرًا لما تَحواه من الفُوسفور والكلسيوم. وإذا رَعَتْه الماشية من غَنَم و ماعز و بقر كثر دَرُها و جاد صنفه.

٢٣٤- كَرْمَة حَمْراء، كَرْمَة الصَّبَّاغِيْن، كَرْمَة أَرْجُوَ انتَة (١)

Red grape vine, Purle grape vine, Dyer's vine (E)

Vigne rouge, Vigne pourpre, Vigne des teinturiers (F)

Purpurweinrebe, Weinrebe (D) Vitis vinifera (vigne) var. purpurea (Teinturier) (S)

جَنْبَة عارشة مُعَمَّرة من فَصِيلَة الكُوْ مِيَّات. سوقها تَطول حتّى ٢٠ مترًّا، ويبلغ قُطْرها حَوالي ٣٠سم. أوراقها دائرتة الشَّكْل، ثُلاثيَّة خُماسية الفُصوص، خفيفة الزَّغَب أو لِنديَّة الصَّفحة السُّفلي، مُسنَّنة الحوافي. ثمرة إهْليلجيّة أو كُرويّة الشَّكْل، سوداء، وَرديَّة أو مُصفَرَّة اللَّون الأبيض، شَفَّافة. الكَرْمَة الأرجوانيّة هي ضرب من الكُرْمة تكون أوراقه الفَتية حمراء والبالغة أرجوانيّة.

المُركِّيات - عَفْص، عناصر صياغيَّة، لَـفُـولـوز، سُـكّـارور، دَكْـسـتـروز، إينوزيتول، كُولين، ڤيتامين «ث»...

الخصائص - مُقوِّيَة وَريديَّة وشُعْرِيَّة، مُنظَمة للدُّورة الدَّمَويَّة، قابضَة، مُنعِشة، مُبَوِّلة .

<sup>(</sup>١) التَّسميتان للمؤلِّف.

<sup>(</sup>٢) التَّسمة للمُؤلِّف.

<sup>(</sup>١) التَّسميات العربيّة للمؤلّف.

الاستعمال – الأوراق: اضطرابات الدَّورة الدَّمويّة، عَواقِب الفلابِيْت أي التهاب الوريد، اضطرابات سِنّ القُعود، عُدَّة وَرديّة، قاريس، بواسير، آلام الطَّمْث، نَزارات، إسهال.

طريقة الاستعمال - مِلْعَقَة كبيرة في فِنجان ماء يُعلى ويُغَطَّى عشر دقائق ويُؤخَذ منه ٢ إلى ٤ فناجين في اليوم بين الوجبات. نُقاعة الكَرْمة والشاهترج في اضطرابات سِنّ القُعود والعُدَّة الوَرِديَّة. لمعالجة البَدانَة والسَّلُوليت، مِلْعَقَة صغيرة من الكَرْمة الأرجُوانِيَّة مع مِلْعقة صغيرة من الحَرْمة الأرجُوانِيَّة مع من الفَوْقَس الحَوْيصليّ في مِقدار فِنجان من الفَوْقَس الحَوْيصليّ في مِقدار فِنجان ماء يُعلى ويُعطّى ١٠ دقائق ويُؤخَذ منه ٤ فناجين في اليوم بين الوجبات. عصير البراعم الفتيّة يزيل النَّمَش والكَلَف.

۲۳۰ کرُوتُن الزَّیْت، حَبّ السَّلاطِیْن Croton-oil plant (E) Croton (F) Purgierkroton (D)

Croton tiglium (S)

جَنْبَة من فَصِيلَة اليَتُوعِيَّات مَنبتُها المُولُوك وسِيْلان والصِّين. تُستعمَل بُزورها في التَّداوي. تَتمَ عَمليّات شَحْن بُزور الكروتُن بنوع خاص في بُومْباي وكاشان، وتُرسَل إلى أوروبًا في صَناديق وطُرود وأكياس.

إنّ تلك البُزور الشِّبه مُربَّعة الزَّوايا، تَكون في العادة مَكْسُوَّة بقشرة مُصفرَّة اللَّون مُرقَّشة باللَّون البُنِّيّ، وتَكون في

بعض الأحيان سوداء، سويَّة اللَّون، صَقِيْلة. وهي تُبْرز من السُّرَّة وإلى الرَّأس عِرقَين جانِبيَّين ظاهرَيْن وهما يُشكِّلان حَدَبَتَيْن في القسم السُّفليّ. إنّ لهذه الصَّفة تُسهِّل تَمييزَها عن أنُوية الصَّنوبر المُثمِر وعن حَبّ الخَروع. أمّا حَجمها فبحجم حَبّات الفاصوليا الصَّغيرة.

المُركِّبات - إنّ بُزور كروتُن الزَّيت يَجب أن تُنقَل بحيطة واحتراس؛ وهي تَحتوي على ٥٠ إلى ٦٠ بالمئة من الزَّيت (زَيت الكروتن، اطلبه في المُعجَم الثالث، صفحة ١٠٤، رقم المُعجَم الثالث، صفحة غير مَعروفة تمامًا من جَواهر راتِنجيّة، مِنها الكُروتُونُولُ<sup>(۱)</sup> أي الكروتُن-راتِنج، وهو جَوهر مُيَامِن، والفُورْبُولُ<sup>(۱)</sup>، وهي جَواهر قد تَذوب في الزَّيت لصالح بَعض الحوامِض الدُّهنيّة وتَتمتَّع بخصائص مُنفَطّة فعّالة.

الخصائص - يَشتهر خَشب الكروتُن على أنّه دَواء مُعرِّق، وتُطلَق عليه أسماء «خَشب باڤان» أو «خَشب المُولُوك».

مُلاحظة - يَنتمي كذلك إلى جنس كروتُن ما يَتبع، وهي أنواع أعيد تسجيلها في كودكس ١٩٧٤:

- كرُوتُن عَنْبَريّ

- Seaside balsam (E), Cascarille (F), Kaskarillenstrauch (D), Croton cascarilla (S)

- كرُوتُن لَكِّيِّ<sup>(١)</sup>

IAY

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمؤلِّف.

كرى

- Croton porte-laque (F), Croton lacciferus (S)

## - طُرُنْشُول الصّبّاغين

- Turnesole (E), Maurelle (F), Färber-kroton (D), Chrozopbora tinctoria (S)

#### Chrysarobine (F) کرِیْز ارُوبِیْن -۲۳۶ Andira araroba (S)

يُطلَق اسم كريزاروبين، خِلافًا للأصُول، على الأراروبا المُصفَّى المُنَقَّى الذي يَحصَل من مادّة راتنجيَّة المَظهر تَرْكُد وتتَجمَّع في شُقوق الأنْديرا أرارُوبا، وهي شَجَرة من فَصِيلَة القَرْنِيَّات الفَراشِيَة.

مادة مُصفرَة اللَّون، عديمة الرّائحة، تَفِهة الطَّعم، غير قابلة النَّوبان في الماء، تَذوب في ٣٠ جزءًا من البنزان، وعلى السّاخن في ١٥٠ جزء كحول أو كلوروفورم. وتتحوَّل إلى حامِض كريزوفانيك في محلول قِلَوِي مُعَرَّض للهواء.

الخصائص والاستعمال - يُستعمَل الكريزاروبين من الخارج كعنصر مُحلِّل كيماويّ في مُعالجة الإصابات الجِلديّة (حَصَف، هَرَص، تَصَدُّف، أكزيما جافّة، سُقوط الشَّعْر، داء التَّعْلَب، عُقْبُولة)، وعلى شكُل مَراهم من ٢ إلى ٥ بالمئة ومحلول كلوروفورميّ بنسبة ١٠ بالمئة.

وقد يُحدِث الكريزاروبين، بعمله المُهيِّج جدًّا، ما يُسمَّى «التهاب جلديّ كريز وفانيك» Dermite chrysophanique،

والتهاب المُلتحِمة؛ لذلك يجب أن يتم استعماله تَحت المُراقَبة الطِّبِّيَة. الكريزاروبين يَصبُغ الشَّعر باللَّون البُرتُقاليِّ ويُبقِّع الثَّياب. ويَصلُح لتَحضير حامِض كريزوفانيك.

## ٧٣٧- كَسْتَنَة، قَسْطَل، شاهْبَلُوط

Sweet chestnut (E)
Châtaigner, Marronnier (F)
Echte Kastanie, Kastanienbaum (D)
Castanea vulgaris, Castanea sativa (S)

الكَسْتَنة شَجَرة حُرجيّة وزِراعيّة من فصيلة السَّوْمَلِيَّات تَعلو من ٢٠ إلى ٣٠ مترًا. ثَمرتُها هي الكَسْتناة أو الكَسْتنة، مَأكولة، مُغَذِّية، وَرَدَت خصائصها في المُعجم الثّاني صَفحة ٢١٣، رقم المُعجم الثّاني صَفحة ٢١٣، رقم والقُسُور والأوراق.

المُركِّبات والخصائص - يَحتوي خَشَب الكَسْتَنة ولحاؤها وقُشورها على ٧ إلى ٩٪ حامِض غَلُوتانيك (عَفْصيّ دبغيّ)؛ يُحضَّر من الخَشب ومن القُشور وكذلك من الأوراق مُستخلَصات صِباغيّة دابغة جيِّدة الصِّنف. نُصِح في أمريكا الشَّماليّة بالقِشرة ضدّ الدِّيسنتيريا ونُقاعة الأوراق ضِدّ الشُّهاق. تَصلُح الأوراق عَلفًا لعدد من الحَيوانات الدَّاجنة، وتُعطِي من ٥,٤ إلى ٨٪ من الرَّماد وتُعطِي من ٥,٤ إلى ٨٪ من الرَّماد الذي يَتكوَّن أكثر من نِصفه من الكلسيوم. إنَّ قُشور بَعض أنواع كَسْتَنة المَدولة. نُورد منها:

٢٣٨- كَسْتَنِيَّة ذَهَبِيَّة الوَرَق(١)، طِمْخَة - ۲۳۸ ذَهَبِيَّة الوَرَق<sup>(۲)</sup> Goldenleaves chestnut (E)<sup>(۱)</sup>

Goldblatt kastanie (D) (1) Castanopsis chrysophylla (S)

تَتَمَيَّز الكَسْتَنِيّة عن السِّنديان بقُدّات أزهارها الذَّكريّة المُتدلِّية، وعن الكَسْتَنة بأوراقها الدّائمة. وهي شُجَيرة تَعلو عِدَّة أمتار، حَمْلُها مُفَشْكَل، أوراقُها يَضويّة الشَّكا الحاد، كاملة، قاتمة اللَّه ن الأخضر من فَوق، ذَهبَّة اللَّون الأصفر على صَفحاتها السُّفلي. أزهارها وحيدة المَسْكِن، الذَّكريّة في قِدّات طولها ٢ إلى ٤سم. ثمارها ذات قِشرة شائكة جدًّا تُذكِّر بأشواك الكَسْتَنة. قُشورها أغنى بالعَفْص من قُشور الكَسْتَنة.

٢٣٩- كَسْتَنَة صَغِيْرة، قَسْطَل قَزَم (٣) Little chestnut tree (E) Châtaigner nain, Chincapin (F) Kleine kastanienbaum (D) Castanea pumila (S)

شَجَرة تَعلو حوالي ١٠ أمتار في مَوطِنها، وتَعلو ١٫٥ إلى مترين فقط في أوروبًا. حَمْلُها غير مُنتظِم. أوراقُها لِبْدِيّة الصَّفحة السُّفلي. ثمارها صغيرة القدّ، فَردية أو مُتَوأَمَة، بَيضانية الشَّكل،

مُستدقَّة الرَّأس، مَأْكولة. مُهدها كلا بنسلقانيا وفلوريدا وتكساس.

> قُشورها أغنى بالمواد العَفْصية من قُشور الكَسْتَنة، يُنصَح بها في أمريكا الشَّماليّة كعقّار قابض وطارد للحُمّى.

## · ٢٤٠ كَلادِبُون ثُنَائِي اللَّون (١) Caladium bicolore, Pédiveau bicolore (F) Caladium bicolor (S)

الكَلاديُون جنس نَباتات نَجْمِيّة مُعمّرة من فصلة القُلْقاسِيّات أرومتُها مُتَدرّنة. منها ما كانت أوراقُه غير دَرَقِيّة، ومنها الدَّرَقِيّ ومنها ما كانت أوراقُه سِنانيّة الشَّكل السَّهْمِيِّ أو حتِّي مُتطاولة الشَّكْل السَّضوي .

الكَلاديُون الثُّنائيّ اللُّون نَبات تَزيينيّ بأوراقه، وهي دَرَقيَّة، بَيضويّة الشَّكل القَلبي، سَهْمِيّة أو مُثَلَّثة الشَّكل البيضوي، فَصُّها الأساسي نصف بيضي الشُّكُل، يَخِفُّ تَدريجيًّا إلى رأس مُستدِق الطَّرف؛ الفَصّان الثَّانَويّان أقصر منه، بَيضويًا الشُّكُلِ المُنفرج. أزهارُه عِطريّة، غير تزيينيّة، سريعة الزُّوال، ثُنائيَّة المَسْكِن، الذَّكريَّة منها على رأس الجُباب، والأنثى على قاعدته تَفصلُها أعضاء عازلة. مَهد النّبات أمريكا الجَنوبية والأنتيل، وهو أصل كاقة الهُجُن المُلوَّنة المَوجودة بأصرامها العديدة جدًّا بألوانها وأشكالها.

الخصائص والاستعمال - أوراقه سامة

<sup>(</sup>١) التَّسمة للمؤلِّف.

<sup>(</sup>٢) التَّسمية لإدوار غالب.

<sup>(</sup>٣) كلِّ التَّسميات للمؤلِّف ما عدا التَّسميتين الفرنسيَّتين والتَّسمة اللاتسة.

<sup>(</sup>١) كلّ التَّسميات للمؤلّف ما عدا التّسمية اللاتينية.

وتُؤدِّي إلى العُقْم كما أظهرت ذلك أعمالُ بَحَاثَة أَلْمان خِلال الحَرب العالميَّة الثّانية. أوراقُه تُستعمَل في الطّبّ البيطريّ لمعالجة الإصابات الجلديّة باليَرقانات التي تَتَطوَّر وتَنمو في باليَرقانات التي تَتَطوُّر وتَنمو في الطَّبيعيّة، وذلك بفضل عملها المُبيد الطَّبيعيّة، وذلك بفضل عملها المُبيد لليَرقانة Larvicide. أمّا الإصابات الجلديّة المذكورة فتُدعَى Myases, Myiasis.

٢٤١ - كِلَايا الصَّابُون، كِلَاجَه الصَّابُون،
 شَجَرة الصَّابُون (١)

Quillaya, Quillaja, Arbre à savon, Bois de Panama, Ecorce de Panama, Ecorce de Quillaya, Bois de Chili (F)

Quillaja smegmadermos, Quillaja saponaria molina (S)

شَجَرة كبيرة، دائمة الخُضرة من فَصِيلَة الوَرْدِيَّات. أوراقُها بَيضويّة، مُسنَّنة، لامِعة، قصيرة العُنُق. أزهارها ضُرِيَّة، ثُنائيّة المسكن، ثُلاثيّة خُماسيّة التَّجميع، بَيضاء اللَّون، خُماسيّة البَسَتَلات. وهي شَجَرة تُقدِّم إلى البَسَتَلات. وهي شَجَرة تُقدِّم إلى الأسواق، وبأسعار مُنخفِضة، صَفائح كبيرة من القُشور اللِّيفيّة الغَنيّة بالصّابُونين (١٠٪).

القِشرة - تُستعمَل قِشرة الكِلَّايا بعد بَشْر يُنظِّفها من فِلِّينها القاتم اللَّون البُنِّيّ ومن سافاتها الخارجيّة؛ وتتَحوَّل بذلك

إلى طبقاتها النَّجَبيّة تقريبًا.

تكون صَفائحها طويلة بشكل عامّ، حتّى ٢٠ سم وأكثر، عرضها من ١٠ إلى ١٥سم، سماكتها حوالى سم واحد، وجهها الخارجيّ إلى اللّون الأبيض الوسخ، المُلطَّخ ببقع عريضة يكون لونها إلى البُنِّيّ إذا لم تُبْشَر بشكل كامل، ووجهها الدّاخليّ مُبيَض اللّون، دقيق الحُزوز الطّويلة.

مَكْسَر القِشرة لِيفيّ جدًّا، خاصة في الطَّبقات الدَّاخليّة الَّتي تَنثُر غُبارًا دقيقًا مُهَيِّجًا مُرَكَّبًا من بلُّورات صغيرة من أوكسالات الكلسيوم تنتج عن أنابيب مُولِّدة للبلُّورة Cristalligène.

مَقْطعها العَرَضيّ يُبرز نَسيجًا مُتَورَّقًا ومُثَلَّمًا بحزوز شُعاعيّة دقيقة (دستور الأدوية). إذا حَرَّكنا لهذه القِشرة في الماء سرعان ما تُعطي رَغْوة وافرة، بينما يكتسِب السّائل طعمًا مُرَّا.

المُركِّبات - كانت قِشرة الكِلاَجة، عام ١٨٧٠، موضع دراسة هامّة قام بها لُوبُوف LEBEUF الَّذي أشار إلى طريقة الحصول على الصّابُونين منها بإنهاكها بالكحول السّاخن؛ يَترسَّب الصّابُونين العديم الشّكل عند التّبريد. إنّ الكحول الّذي يَحتوي على هذا الصّابُونين يكتسب خاصيّة حَلّ أو استحلاب الشُّحوم وبَعض الرّاتِنجات والزُّيوت، إلخ.، وتَيْسير استحلابها النَّابت بالماء. ولقد تَوصَّل لُوبُوف بهذه الطَّريقة إلى تَحضير صِبْغة قَطْران الفَحْم الصّابُونينييّة. إنَّ هٰذا قَطْران الفَحْم الصّابُونينييّة. إنَّ هٰذا قَطْران الفَحْم الصّابُونينييّة. إنَّ هٰذا قَطْران الفَحْم الصّابُونينييّة. إنَّ هٰذا

<sup>(</sup>١) التَّسميات العربيَّة للمؤلِّف.

الكحول ذاته، المُشبَع بالصّابُونين، هو قابل لكي يَقسِم الزِّئبق إلى جُزَيئات دقيقة جدًّا.

طريقة الاستعمال - مَسحوق القِشرة، ٥ غرامات في اليوم (بالغون)، ٣ غرامات للأولاد، في نقيع من ١٠٠غ من المأراب السُّكَريّ. مِلْعَقة مُتوسِّطة كلّ ساعتين. مُستخلَص مائع من القِشرة، من ٣٠٠ إلى غرام واحد في اليوم بجرعات مُجَزَّأة. صِبْغَة المَقِشرة: ٣ غرامات في اليوم بجرعات مُجَزَّأة، للبالغين.

إنّ هٰذه الصّابُونينات هي سامّة بما فيه الكفاية، لذلك لا تُستعمَل من الدّاخل سوى نادرًا. كذلك تُستخدَم صِبْغة باناما كمادّة مُسْتَحْلِبَة للاستعمال الخارجيّ فقط.

تُستخدَم كمِّيّات ضَخمة من قِشرة باناما في الصِّناعة لتَنظيف أصواف المارينُوس وتَبييض الأصواف البيضاء التّاحمة. كما نُصِح بالتَّركيبة التّالية لتنظف الشَّعْر:

قِشرة كِلّايا مُسحوقة ٥٠ إلى ١٠٠غ كحول ٧٠ درجة دُهن البَرْغَمُوت (أو سواه) .....٢ نقطة مُلاحظة – أعيد تسجيل الكلّايا في الفرماكوبيا الفرنسيّة في إصدار ١٩٧٦.

الحديد کلُورُور حَدِیْدِيّ، مُورِیات الحدید Chlorure ferreux, Muriate de fer (F)

يَتُمّ الحُصول على الكلورور الحَديدي أو پروتو كلورور الحَديد المُمَيَّه بمعالجة المُعرام من بُرَادَة الحَديد بمقدار من عرام حامض كلورهيدريك مَخزَنيّ مُخفَفَّف بمقدار مَرَّتين حجمه من الماء المُقطَّر، يُبَخَّر المَحلول بوجود زيادة من الحديد حتى يقيس (وهو غالٍ) ١,٣٨ بالمِكْثاف، نُصفِّى ونَرك للتَّبلُّر.

ويَتم الحُصول عليه كذلك مُتبلِّرًا، ولكن لامائيًّا، بتسخين البَرْكلورور المُصَعَّد في مجرًى من الهيدروجين الحاف.

المواصفات - أخضر اللَّون ومَيُوع. يَحتوي على ٢٨,١٤ بالمئة من الحَديد؟ يَذوب (مع اضطراب خَفيف مُتسبِّب عن بَقايا أو كُسيكلورور مَحلولة من إضافة بَقايا حامِض كلورهيدريك) في ٢٧،٠ جزء من الماء عند ١٥٠ سغ، ويَذوب بما فيه الكفاية في الكحول ولا يَذوب في الأثير.

الاستعمال - استُعمل ضِد اليَرقان وضِد حالات فَقْر الدّم، بمقدار ١,١٠ إلى ٣,٣٠ غرام في اليوم. لم يَعُد يَظهَر في دستور الأدوية.

٢٤٣ - الكَنْكِيْنا (وخَصائصها الطِّبِيَّة) Quinquina (et usage thérapeutique) (F)

كنك

الكينوتانيّك الّذي يَختلِط فيها جُزئيًّا مع القِلَوِيْدات. كما أنّ العَمَل المُقوِّي مَرَدُه أيضًا إلى الكينوڤين. أمّا خصائص القِشرة المُضادَّة للحُمّى فَمردُها بشكل رئيسيّ إلى الكينين. قِلَوِيْدات أخرى تَتَحلَّى بخصائص مُماثلة، لكن بدرجة أدنى، وهي بالإضافة إلى ذلك مُخلِّجة: وهي بالإضافة إلى ذلك مُخلِّجة: كينيدين، سِينْكُونين، سينْكُونيدين.

الكَنْكينات الرَّماديّة والصَّفراء والحَمراء تَدخل في عددٍ كبير من الأدوية المُركَّبة. في جَنوب فَرنسا يُستعمَل مُستحضر من الكَنْكينا بنجاح ضِد الحُمَّيات المُقلِعة، يُدعى راتِنج الكينا أو مُستخلص الكينا أو مُستخلص الكينا الرّاتِنجيّ أو ماجيْستير الكينا؛ طريقة الحصول على هذا المُستحضر هي كما يتبع:

راتنج الكينا: نُنْهِك الكينا الصَّفراء في كحول ٨٥ درجة، ونُقَطِّر حتّى نَسْحَب القسم الكحوليّ بكامله. نَجد في حَمّام مريم سائلًا لبَنِيًّا يَطفو فَوق كُتلة مادّةٍ لا تذوب. نَفصِل هٰذه عن ذاك، نَغسلها ونُجفِّفها؛ إنّ هٰذا باختصار هو فُضالة مُستخلَص الكينا الصَّفراء الكحوليّ المُرسَّب والمَغسول بالماء. يبدو هٰذا الرَّاتنج الكينيّ المَزْعُوم أنّه يَتركَّب من الأحمر السيْكونيّ (أي الكينيّ) المُختلِط مع نسبة قويّة من قِلي الكينا. نَحصل على راتنج الكينا الرَّماديَّة بالطَّريقة على داتيج الكينا الرَّماديَّة بالطَّريقة وفقًا للطَّريقة أمُون بُوليه، وفقًا للطَّريقة المُسمَّاة طريقة مُون بُوليه،

وذلك بإنهاك الكينا أوَّلًا بالماء، ومن ثمّ بمعالجة الحُثالَة الباقية بكحول قَويّ، نقَطِّر لكي نحصَل على الكحول ونَغسُل الفُضالة بالماء، ومن ثمّ نَصْهَرها ونَصبُها في كُتلة.

إنّ ما يُسمّى سائل الكينا المُضادّ لألم العصب أو ما كان يُسمّى بدُهن الكينا، هو نُقاعة بسيطة للكينا بالماء السّاخن لفترة طويلة. نُعالج مَسحوق كنكينا كاليزايا الخَشِن بالماء المُقطَّر السّاخن، نُمرِّر السّائل ونُبخِّره في حرارة ٥٦ سغ على الأكثر، حتى القِوام الشَّرابيّ. إنّ هٰذا اللّيكور لا يُحفَظ جيّدًا، ولكن بالإمكان تأمين حِفظه بإضافة جزء من بالإمكان تأمين حِفظه بإضافة جزء من مئة (١/١٠٠) إليه من الأثير.

طريقة الاستعمال – ٧ – ١٠ – ١٢ – ٢٠ نُقطة وحتّى أكثر، ٣ أو ٤ مَرّات في اليوم.

تَضادًات الاسْتِطْباب - إنَّ مُستحضرات الكنكينا، وبسبب القِلَوِيْدات والعَفْص الخاص التي تحتوي عليها، هي مُضادّة للاسْتِطباب لعددٍ كبيرٍ من المَوادّ الكيميائية أو المُستحضرات المَخزَنيّة، مِثال: الحوامِض المُركَّزة، القِلَى، أملاح الحديد، سُولفات الزِّنك، نيترات الفِضَّة، سُلَيْماني أكال، مُقيِّئ؛ نُقاعة البابُونَج، والكُولُومْبُو، والرّاوَنْد، والكاشو، العَفْص، الأنتي يبرين (راسب يَذوب في الحوامِض الخفيفة وفي الخوامِض الخفيفة وفي العُصارة المِعَويّة)، بَوْرَق (باستثناء العُصارة المِعَويّة)، بَوْرَق (باستثناء المُصارة المِعَويّة)، بَوْرَق (باستثناء المَصارة المِعَويّة)، بَوْرَق (باستثناء المُعَويّة)، بَوْرَق (باستثناء المِعَويّة)، بَوْرَق (باستثناء المُعَلَيْمِ المُعَادِيْمَة المُعْمِويّة)، بَوْرَق (باستثناء المُعَلَيْمُ الْمُعَادِيْمِ الْمُعَادِيْمِ الْمِعْرِيْمِ الْمِعْرِيْمُ الْمِعْرِيْمُ الْمُعْرِيْمُ الْمِعْرِيْمُ الْمُعْرِيْمُ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْرِيْمُ الْمِعْرِيْمُ الْمِعْرِيْمُ الْمِعْرِيْمُ الْمِعْرِيْمُ الْمِعْرِيْمُ الْمُعْرِيْمُ الْمِعْرِيْمُ الْمِعْرِيْمُ الْمِعْرِيْمُ الْمِعْرِيْمُ الْمِعْرِيْمُ الْمِعْرِيْمُ الْمُعْرِيْمُ الْمُعْرَاقِهُ الْمُعْرَاقِمُ الْمُعْرَاقِمُ الْمُعْرَاقِمُ الْم

وجوده مع الغليسرين)، سالسيلات الصوديوم، صِبغة القِرْفَة، شَراب قِشر البُرتُقال المُرّ، شَراب جِيْبَرْت، البيراميدون، إلخ.

مُلاحظة - إنّ زراعة أنواع الكنكينا بَدأت منذ العام ١٨٥٠، خاصّة في الهند النّرلَنْديّة، ذلك بواسطة بزور أرسَلَها وَدَّل Weddel إلى مُتْحَف باريس. إنَّ تأصيل أنواع الكنكينا سَمَح بتحسين نسبة القِلَوِيْدات ونسبة الكينين. إنَّ كمِّيّات الإنتاج المُختلِفة قد تَبلغ إنّ كمِّيّات الإنتاج المُختلِفة قد تَبلغ يُراوح ٨٪ من الكينين في قُشور النَّوع يُراوح ٨٪ من الكينين في قُشور النَّوع . C. Ledgerina

٢٤٤- كَنْكِينا كَالِيْزايا، كَنْكِيْنا صَفْراء مَلْكِيَّة (١)

Quinquina calisaya, Quinquina jaune royal (F)

Cinchona calisaya (S)

تَنبُت في ضَواحي كاراباقا البُوليقِيَّة، وعلى الأكثر في جَنوب بُوليقيا . وهُناك صِنْفان من الكاليزايا، واحد يَقع في قُشورٍ مُسَطَّحة والكاليزايا المَلفُوفَة: دستور أدوية ١٩٤٩. أعيد تسجيلُها في الإصدار التّاسِع للفَرْماكوبيا عام ١٩٧٤.

الوَصْف - إنّ الصّنف الأوَّل هو قِشرة كثيفة جدًّا يَبلغ سمكها ٨ إلى ١٠ ملم. إذا تَنَظَف وجهها الخارجيّ من فِلِّينة يُبْرِز عددًا كبيرًا من الأثلام الطُّوليّة الإصْبعيّة

المَفْصُولة بحوافٍ بارزة تُكسبها مَظهر قاتم قِشرةٍ نُظفَت بالسِّكِين. لَونها أصفر قاتم أو بُنِّي، مَكسرها العَرَضيِّ لِيفيِّ بشكل بارز ثابت على كامل السَماكة، تمامًا من ناحية الوجه الخارجيِّ كما من ناحية الوجه الخارجيِّ كما من ناحية الألياف المِجْهَرية ال Prurientes. الطَّعْم مُرَّ وقابض صراحة. الأصناف الجيِّدة منه يجب أن تُعطي ٦٪ من القِلَويدات العامَة يجب أن تُعطي ٢٪ من القِلَويدات العامَة على الأقل (دستور الأدوية) ويكون حوالي نصفها من الكينين.

أمّا الكَنْكينا المَلفُوفة فتقع في أنابيب مُزَوَّدة ببشَرتها العميقة التَّشُقُّق. وبهذا الشَّكُل تَقع كَنْكينات جاڤا الّتي يُطلَق عليها اسم Lodgeriana Javanica mœns؛ يُمكن الخَلط بينها وبين كَنْكينا هُوانُوكُو ولكنّ أطراف الكاليزايا تكون مَقطوعة ولكنّ أطراف الكاليزايا تكون مَقطوعة الهُوانُوكُو مُنحَنِية جدًّا. وأخيرًا، لا تُوجد إطلاقًا على الهُوانُوكُو اللّازَهْرِيَّة المَحمراء الَّتي تُدعى Hypochnus والّتي تُوجد غالبًا على الكاليزايا.

إنتاجها من الكينين: ٣ إلى ٣,٥ بالمئة.

المَسْحُوق - يكون مَسحوق كَنْكينا كاليزايا ذا صِبغة قاتمة اللَّون الأصفر، وهو لون أنسجة القِشرة الحَشْويّة؛ ويبدو قسم هامٌّ من لهذا المسحوق تحت المِجْهَر أنَّه مُؤلِّف من ألْياف نَجَيِيَّة مُمَيَّزة جدًا؛ ويكون الكثير منها كبيرًا نِسبيًّا

<sup>(</sup>١) التَّسميتان العربيّتان للمؤلّف.

ومُكَسَّرًا؛ ويختلف عرضها من ٣٠ إلى ٤٠ ميكرونًا، جَوانبها سميكة، دقيقة التَّحزيز والتَّنْقيط؛ وتُشاهَد أنابيب صغيرة مَثْقُوبَة (دستور ١٩٤٩).

الخصائص والاستعمال - الكَنْكينا الصَّفْراء طاردة للحُمّى بنوع خاص. يُستعمَل مَسحوقُها في أقراص أو بيلُولات بمقادير من اللي ١٠ غرامات، المُستخلَص يُؤخَذ في جَرُوعات أو بِيلُولات، بمقادير من اللي ٤ غرامات للبالغ، ومن ١٠٠٠ إلى ١٠٠٠غ لكلّ سنة من العُمر للولد. الزُهورات بمقدار ٢٠ بالألف في نُقاعة تدوم ساعة كاملة.

٢٤٥ - كُوْشِيَة المَكَانِس، هَيْثَم هَرَمِي،
 لِحْيَة مار الياس، هَيْثَم المَكانِس<sup>(١)</sup>
 Belvedere, Summer-cypress, Mock-cy-

Belvedere, Summer-cypress, Mock-cypress (E)

Chénopode à balais, Kochia, Belvédère (F) Kochie, Sommer-cypresse (D) Kochia scoparia, Chenopodium scoparium (S)

نَبات حَولي من فَصِيلَة السَّرْمَقِيَّات. جَذره وَتَديّ وهَزيل. ساقُه مُنتصِبة تَعلو من ٤٠ إلى ١٥٠سم، فَرعاء جدًّا، مُبيَضَّة أو مُحمرَّة اللَّون، مُتَلبِّدة أو مُستَمرَطة، فُروعها مَشيقة، دقيقة، مُنتصِبة. أوراقُه سِنانيّة أو خَطيَّة، قَصيرة العُنُق، مُستلِقة الرّأس، مُسطَّحة، كاملة، طولها ٢سم، مَكسُوَّة بوبْر

لاصق، ومن ثمّ تُصبِح مَرطاء. الأوراق الزَّهريّة أصغر، مُهدَّبة الحَوافي. أزهارُه فَرديّة أو جَنُويَّة التَّجميع الشَّحيح الزَّهر؛ الأنثويّة صغيرة، على إبط الأوراق السُّفلى أو في سَنابل جانبيّة؛ الأزهار الخُنثويّة أقوى، على الأوراق العُليا. يَنمو طَوعيًا في إيطاليا وفرنسا، أمّا في لُبنان فغالبًا ما يُزرع في الحدائق للزِّينة ويُسمّى شَعبيًّا لِحية مار الياس.

الخصائص والاستعمال - الكُوشِية نَباتات تُستعمَل في صِناعة المَكانِس، ومن هنا أحد أسمائها مكنسة الجَنّة؛ كما تُستعمَل لتربية دُود القَرِّ كالشِّيح. اليابانيّون يَستعملون كُوشية المَكَانِس كنَبات طارد للدّود.

۲٤٦ - كِينُو (أصناف الـ) Kinos, Gomme, Suc ou Extrait de Kinos (F)

صَمْغ الكينُو، عَصير الكينُو أو مُستخلَص الكينو، أعيد تَسجيلُها في الفَرْمَاكوبيا الحديثة عام ١٩٧٥. منها ما يتبع:

كِينُو، غَمْبِير مُكَعَّب، كَاشُو غَمْبِيْر Kino, Gambir cubique, Cachou Gambir (F) هو مُستخلَص يُحضَّر من أوراق غَمْبِيْر أَنْكَارِيَا (1) Uncaria gambir من فَصِيلَة الفُوِّيَّات.

<sup>(</sup>١) التَّسميات العربيّة للمؤلّف.

كِيْنُو الهِند، كِيْنُو مَلَبَار، كِيْنُو أَمْبُوَان Kino de l'Inde, Kino de Malabar, Kino d'Amboine (F)

هو عَصير مُجفَّف من تُوْز مَلَبَار: Pterocarpus marsupium من فَصِيلَة القَرْنِيَّات. وهو عَصير أدخِل إلى المادّة الطبيَّة حَوالى العام ١٧٥٨.

يَختلِط تاريخ أصناف الكينُو، في العديد من النقاط، مع تاريخ أصناف الكاشو. فهي مِثلُها تَحتوي على كاتَشِين أو خامِض نُوْكلاييك أو نُوْكلاييك Naucleique أو كاتشِيك، وإضافة إلى ذلك تَحتوي على مادّة مُلوِّنة. إنّ الكينُوات ليست مُستخلَصات بمعظمها؛ عددٌ كبيرٌ منها هو عَصير طبيعيّ حَقيقيّ يُجفَف في الشَّمس.

يَدخل عددٌ كبير من المَوادّ المَسحوبة من نَباتات مُختلِفة الفَصائل في مجموعة الكينوات. الأصناف النَّموذجيّة منها هي التي تَنتمي إلى فَصِيلَة القَرْنِيَّات، وبنوع خاص إلى جنس تُوْز: Pterocarpus. أمّا الصِّنْف الّذي يُوصف منها على أنّه مَخزَنيّ فهو كينو تُوز مَلَبَار أو كينو الهِند. . . وهو عَصير الشَّجَرة المُجفَّف في الهواء الطّلق. يَصل هذا الصِّنف إلى الأسواق في قِطع صغيرة لا يَتخطّى قَدُّها عجم حَبّة البازيلا. وهي قِطع مُزوّاة، مُمرَّكَة بحزوز مُتوازية على أحد وجوهها، مُسودَّة اللَّون الأحمر، وجوهها، مُسودَّة اللَّون الأحمر، لا يَعفَ، شفّافة إذا كانت في صُفَيحات لامِعة، شفّافة إذا كانت في صُفَيحات

رقيقة، فتبدو والحالة لهذه ياقوتيَّة اللَّون ك ي ن الأحمر.

مادَّتُها فَتوتة جِدًّا وتَنقسم بسهولة تَحت ضَغط الأصابع، عديمة الرّائحة الخاصة، طعمها قابض؛ تَذوب بقدرٍ كبيرٍ في الماء البارد وتُكسبُه لَونًا أحمر؛ تَبقى فُضالَة باهتة اللَّون، نَديفيَّة المَظهر، تَذوب بكاملها في الكحول.

المُركبات - يَتألَّف الكينو على الأكثر من الحامِض الكينوتانيك (٨٠٪)، ومن يتاج أكسدته: أحْمَر الكينو للتَّقطير الجافّ Kino أذا أخضِع الكينو للتَّقطير الجافّ فإنّه يُعطي الهيروكاتشين على غِرار الكياشيو، إذا عُولج بالحامِض الكلورهيدريّ، في أنبوب مَختوم، فإنّه يُعطي أستير مَتِيل - كلورهيدريك، وحامِض عَلَيك، وبيروكاتشين. إذا صُهر مع البوتاس، نَحصل على حامِض صُهر مع البوتاس، نَحصل على حامِض يروكاتشيك وعلى فلوروغلوسينول.

الخصائص - قابض مُقوًّ يُوضع في مَصَافَ الكاشو، ولكنه أقل منه استعمالًا.

تَضَادّاته - حوامِض مَعدنِيّة، دواء مُقَيِّئ، جيلاتين، أملاح الفِضَّة والرَّصاص والحديد.

مُلاحظة - وَرد في بعض المَراجع العَربيَّة العِلميَّة أَنَّ التُّوزِ المَخْزَنيِّ هو Pterocarpus draco أي دَم الأُخَوَيْن، فاقتضى التَّنويه.

0

۲٤٧- لَامِينَارِيا جِرَاحِيَّة، رَفَّائِق Chirurgical lamina (E) (۱) جِرَاحِيَّة (۲۶) Laminaires chirurgicales (F)

تُشكَّل السّاق المُجفَّفة، المُنظَّفة والمَفروكة، بالمِخْرطة Tour حتى الحصول على أسطوانة مالِسة البَشرة، مُستديرة في أحد طرزفيها ومُزوَّدة في الطَّرف الآخر عمومًا بخيط يَسمح بسحبها بسهولة من الفجْوة الّتي تُدْخَل الها كمادَّة للتَّمدُد.

إِنَّ الرَّقائِق المُجفَّفة تَكون خَشِنة، ولكنّها تَمتلِك خاصِّية زيادة حجمها كثيرًا عندما نُبلِّلها بالماء، على أثر انتفاخ مُحتوَى قَنُواتها اللَّعابيّة Canaux يكون طولها عادة ٦,٥ سم ولكنّه قد يصل إلى ١٥سم استثنائيًا. يختلف قطرها من ملمتر واحد إلى عشرة للرَّقائق الّتي تُدعى «مَملوءة»،

وهي الأكثر استعمالًا، ومن ٣ إلى ١٠ ملم للرَّقائق الّتي تُدعى «مُجوَّفة» أي ذات الثُّقوب المِحوريّة.

تُحفَظ الرَّقائق عمومًا مَعزولة في أنبوب من الزُّجاج المَختُوم بَعد أن تكون قد تَعَقَّمت في بُخار الكحول في المِحَمِّ عند ١٢٠ سغ، ولمدَّة نِصف ساعة. ويُشار إليها عادة برقمها الاصطلاحيّ. وهي تُصْنَع في العادة من الرقم ٣ الذي يُقابل قُطرًا يَبلغ ملمترًا واحدًا، إلى الرقم ٣٠ الذي يُقابل قُطرًا من من ١٠ ملمترات (سَلَاكة شاريير)؛ إن العُبور من الرَّقم إلى التّالي يُقابله زيادة في القُطر تَبلغ ثُلُث الملمتر.

ملاحظة - إنّ اللّاميناريا الجراحيّة يَجب ألّا تُسَلَّم من الصَّيَادِلة سوى إلى الاختصاصيِّين المُؤهَّلين لممارسة الطِّب، وبناء على طلب خَطِّي، للاستعمال المِهنيّ وبَعد تسجيلها على سِجِل الوَصْفات (مرسوم قانون ٢٩ مرور و ١٩٣٦).

إنّ استعمال اللّاميناريا الجراحيَّة هو في تَراجُع بسبب ظهور مَوادِّ جديدة تُوجد في السّائل المَنَوِيّ وتُدعى "بروسْتاغلَنْدين" Prostaglandines، وتُستعمَل في عِلم القِبالَة أو فَنّ التَّوليد، ولأهداف مُختلِفة.

<sup>(</sup>١) كلّ التَّسميات للمؤلِّف ما عدا التَّسمية الفرنسيّة.

٢٤٩ - لِسَانُ الحَمَلِ السِّنانِيِّ، آذان الكَبْش Great ben plant, Rib-grass, Ribwort, Lanceolate plantain, English plantain (E) Plantain lancéolé, Oreille de lièvre, Herbe à cinq côtes, Herbe à cinq coutures, Petit plantain (F)

Spitzwegerich (D)

Plantago lanceolata (S)

نَبات بَرِّيّ مُعَمَّر مُستمرط أو زَغَبيّ من فَصِيلَة الحَمَلِيَّاتِ، قَدُّه مُختلِف جدًّا قد يَبلغ ٣٠ (٦٠)سم. أوراقه ضَيِّقة الشَّكْل السِّناني أو ضيِّقة الشَّكْل الإهليلجي، طولها من ١٠ إلى ٢٥ (٤٠) سم، عرضها نحو ٣ (٥)سم، مُخَفَّفة الطَّرفين بشكل طويل، حادة الرّأس، مُعنّقة القاعدة، مَرْطاء (var. lanceolata)، أو مَكْسُوَّة نوعًا ما بالأوبار (var. dubia). شمراخه مُنتصب، ۱۰ إلى ۳۰ (۲۰) سم، مُزَيِّن بأوبار بيضاء مُتفرِّقة. سُنبلة أَسْطُو انيّة مَخروطيّة (var. (lanceolata أو أقصر، بَيضاويّة، وحتّى شِبه كُرَويَّة (بَقيَّة الضُّروب). قُنّابات عريضة الشَّكل السَضاوي، مُخفَّفة الرَّأس، مُزورَقَة، حافتها مُتأكّلة ومُتموّجة، ٤ إلى ٥ ملم. كأسيّاته تطول نحو ٣,٥ ملم، مَرْطاء أو مُتَلِيِّدة الحاقة، مُزورَقة، الكأسيَّتان الخَلفيَّتان مُلتَحمتان عادة. فُصوص التّاج بَيضاويّة مُستدقّة الرّأس. العُليبة مُتطاولة. من لهذا النّوع ضَربان في لُبنان.

المُركِّبات - بكتين، أوكُوبيْن، عَفْص، صابُونين، كبريت،

## لَوْقَة بُنِّيَّة اللَّون، لَوْقَة مَحروقة

زُيت زَيتون ......زيتون .... شُخْم خنزير .....شخم خنزير وَدَك مُصَفِّي .....ق شُمع أصفر ..... أصفر مَرْ تَك مُسحوق .....م قَطْر ان أسود مُصَفّى .....قطر ان نَضَع المواد الشَّحميَّة في دَسْت نُحاسي كبير، ونُسخِّنها حتَّى تَبدأ بالتَّدخين؛ نُضيف إليها عندئذ المَرْتَك المسحوق بكمِّيّات صغيرة مُنفصِلة مع التَّحريك المُستَمِرَ بمِلْوَق خَشبيّ، ونُتابع التَّحريك حتّى تكتّبب المادَّة لَونًا بُنَّيًّا داكنًا؛ عندها نُضيف إليها القَطْران الأسود المُصفّى، ونَخلط، نَرفع عن النّار، وعندما تُصبح اللَّزقة نِصف باردة، نَصُبُّها في وعاء أو في قُوالب من الورق.

إنّ هٰذه اللَّزقة هي مِثال اللَّزْقات المَحروقَة، إذ إن اللُّون البُّنِّيِّ يُشير إلى تَلَف احتراريّ (١) Pyrogénée للمَوادّ الدَّسمة.

إنّ هٰذه العَمليّة تَتَطلّب الكثير من الحَذَر، فقد تَمتَد النّار إلى المادّة.

لَزْقة مُنْضِجَة ومُسَيِّلة للقَيْح من أكثرها . Wlazzul

<sup>(</sup>١) التَّسمة للمؤلِّف.

ل س ا

غلوسيدات، لُعاب، أملاح مَعدنيّة قِلَويّة.

الخصائص - مُنقِّ للدّم، مُنقِّ للرِّئتين، مُنقِّ للرِّئتين، مُنقِّ للرِّئتين، مُنقِّ للمَعِدة، قابض، مُليِّن، مُلطَّف، يَزيد خُنُوريَّة الدّم، مُضاد لأمراض العَين، مُبوِّل، مُقشِّع، لائم، مُصرِّف.

الاستعمال الذاخلي - ضعف عام ، هُزال، تأخُّر نُمُو الأولاد (حيث يُشبَهه البعض إلى زَيت كَبِد المُوريه)، نَزيفات (الرَّحِم، الرُّعاف، نَفْث الدّم...)، المَزاج النَّزفي (هيموفيليا)، سِلّ، برونشيت مُزمِن، التهاب البُلعوم أي دُغام، التهاب الحنجرة، التهابات لكلية، إسهالات، إمساك، ديسنتيريا، سيّلان المَهْبِل.

الاستعمال الخارجي - التهابات المُلتحمة، الرَّمَد، التهاب الجُفون، قُروح، جُروح، قُرحات السّاق، التهابات اللَّنة، قُوبات، حَبّ الشَّباب، أمراض جِلديّة قِشْرِيّة، رُحام (التهاب الرَّحِم عقْبَ السولادات)، وَخْرز الحَمْرات، لَدْغ الأفعى، رُعاف، التهاب الوريد (فلابيت).

طريقة الاستعمال الدّاخلي - مَرْث ٣٠ إلى ٦٠ غرامًا من الأوراق في ليتر ماء، نَغلي دقيقة واحدة، نُغطّي كلّ اللَّيل، نَشرَب الكمِّيَّة خلال ٢٤ ساعة. نُقاعة في ليتر ماء غالٍ يُغطَّى عشر دقائق، ويُؤخَذ منه ٢ إلى ٤ فناجين في اليوم. عصير النَّبات الغَضّ،

من ٤٠ إلى ١٠٠ غرام في حالات نَفْث الدّم وسَيلانات المَهْبِل. مُستخلَص رَخُو الدّم وسَيلانات المَهْبِل. مُستخلَص رَخُو الدي ٢ غرام في اليوم في بيلولات. مُستخلَص مائع ٢ إلى ٣ غرامات في اليوم.

طريقة الاستعمال الخارجي - المَرْث أو النُّقاعة أو النَّقيع في غَرْغَرات وحَمَّامات للفَم (التهاب الحنجرة، عُصابات سِنِّيَة)، غسيل العَين المُتكرِّر (التهاب العَين)، حُقَن أو غسيل مَرْجي (سَيلان المَهْبل).

الأوراق الغَضَّة المَهروسة هي ضماد مُمتاز على الجروح، وقُرحات السّاق، ولَدْغ الأفاعي. والأوراق المَهروسة تُفرَك بها وَخْزات الحشرات من نَحْل وزُنْبُور وبرغش... الأوراق الغَضَّة الفَتية تُؤكل مع السَّلطات.

البزور مُبوِّلة تُزيل الأوريا، والحامِض البَوليّ، وأملاح الكلور، إذا غُليت بمقدار ١٠ غرامات في ليتر ماء؛ وهي البزور الّتي تُدعى «بزر قاطونا أشقر» «Psyllium blond» تَمييزًا لها عن بزر قاطونا الأصليّ؛ تَحتوي على ٦ إلى ٨٪ من اللُّعاب.

أوراق لهذا النَّوع مُسجَّلة في الفَرْماكوبيا الفَرنسيّة الحديثة، إلى جانب أوراق لسان الحمل الكبير والمتوسِّط.

ملاحظة - يَحكي القُدامي أنّ السَّراعيب كانت تتَمرَّغ في أوراق لسان الحمل قَبْل صراعها مع الأفاعي بقصد

۲۵۰- لَصُوقات طبَّيَّة بَيْطَرِيَّة، كِمادات بَيْطَرِيَّة (Cataplasmes vétérinaires (F

## لَصُوق بلَادُونِيّ:

## لَصُوق قابض:

## لَصُوق قابض:

يُمكن استبدال أبْيض إسبانيا (كربونات الكلس) وطحين الشَّعير بالتُّراب الصَّلْصَاليّ.

الخصائص - استعمالات اللَّصوق السَّابق ذاتها.

لَصُوق قابض ضدّ سُخونَة الأوتار: أَبْيض إسبانيا .....الله المانيا المساليا المساليا

## Mucilages (F) لُعَابِ النَّباتات - ۲۰۱

إنّ اللّعابات هي، من الوجهة الكيميائية، مَوادّ تَنْتُج عن تحويل الأغشية النّباتية، وهي مَوادٌ نادرًا ما تكون بَسيطة (پَكْتُوزِيّة، سَلُّولُوزِيّة، سَلُّولُوزِيّة، ولكنّها تَكون في غالب الأحيان مُختلَطة، سَلُّولُوزيّة وپَكْتُوزيّة بسَكل عام (خَرْدَل، كاراغاهين، سَفَرْجَل، كَتَان). وهي تُعطي بالتَّحليل المائي سكاكر (پَنْتُوزات وهَكْزُوزات)؛ وتُعطي بالتَّاكسُد النيتريكي حامِض وتُعطي بالتَّاكسُد النيتريكي حامِض مُوسِيْك يَتشكَّل على أنقاض الغَلْكُتُوز.

اللُعابات من الوجهة الغالينوسية هي أدوية قوامُها دَبِق نوعًا ما مَردُه إلى جَواهر صَمْغيّة أو لُعابيّة، تارةً تَذوب في الماء وطورًا تَنتفِخ به فقط. نَحصل على اللَّعابات بالمَرْث، والانهضام، أو الغَليان. إنّ اللُّعابات النَّباتيّة تُوجد في عددٍ كبيرٍ من النَّباتات لدرجة تُدعى معها النَّباتات أحيانًا بالنَّباتات اللُّعابيّة. ونَجد النَّباتات اللُّعابية. ونَجد اللَّعاب في الأعضاء المُختلفة جدًّا، اللَّعاب في الأعضاء المُختلفة جدًّا، كالأزهار (خُبّازة، خُبَيْزة)، والأوراق كالأزهار (خُبّازة، فُبيْزة)، والأوراق (حِمْحِم، كُزْبَرَة البير)، والبُزور (كَتّان، سَفَرْجَل، بَزْر قَطوناء)، وفي الأَبْصال (إشْقيل، بَصَل، سَحْلَب)، إلخ. إنّ

اللَّعابات الّتي تُستعمَل في الصَّيدليّات ليست فقط مزيجات من الجواهر المفرَّقَة المُتشابهة، بل تَحتوى أيضًا على مَواد غريبة كالبروتينات النَّباتية، لَعُوق تَرْبَنْتيني (كَرْمَايْكل) وبوجهِ عامّ، كلّ الجَواهر الَّتِي تُرافقها وَتكون قابلة للذُّوبان في الماء.

> إنّ اللُّعابات لا تُستعمَل وحدها قَطّ تقريبًا، ولكنها تُستخدَم لِرَبْط بَعض المواد الّتي نُريد إكسابها شكلًا مُعيَّنًا خاصًا، كالأقراص المُحَلَّاة مثلًا، أو تَدخل في أشكالِ صيدليَّة أخرى، كالقَطُّراتُ. تُستخدَم اللُّعابات أيضًا لاستحلاب الزُّيوت والرّاتِنجات، أو للاحتفاظ بجواهر أخرى غير قابلة للذُّوبان مُعلُّقة في محلول (بَنْزونَفْتُول، أملاح البيموت، قِرْمِز أو كِرْمِس، إلخ.).

> أدَّت إلى اختفاء لهذا الشَّكل الغالينوسيّ. غير أنّ مَحلول صَمْع الكُثَيْراء المُعلُّق ومحلول الصَّمْغ العَرَبِيِّ المُعلِّق لم يزالا مَذكورين في دستور أدوية ١٩٦٥.

#### ٢٥٢- لَعُوق Looch, Lok (F)

## لَعُوق أخضر، لَعُوق الفُسْتُق فُسْتُق (حلبي) ..... شَراب البَنَفسَج السُّكَّري ....٣٠غ زَيت لَوز ......زَيت لَوز صَمْع كُثيراء .....٨٠٠ غ صِبغة زَعْفَران .....ال غ (١) السَّمية للمؤلِّف.

ماء زَهْر البُرتُقال ....٨غ ماء شائع ...... ١٢٥

دُهن تَربَنْتين .....١٦ غ صَفار بَيض .....

نَمزُج ونُضِيف:

مُستحلّب لَوز حُلو .....١٢٥ غ دُهن القِرفَة .... إلى ٤ نقاط شَراب قِشر البُرتُقال السُّكَّريِّ ٤٤.... ٢٤ غ

## لَعُوق طارد للدّود

نُقاعة طُحلُب كورسيكا .....١٢٥ غ ٠٦٠ زَيت خُروع شَراب الدُّرَاق السُّكَّريّ ....٣٠ غ زئبق حُلو ......,۲٫۰ غ إنَّ التِّقنيّات الحَديثة لِتعليق المحاليل رَاوَنْد .....

## ۲۵۳- لَكَ (راتِنْج)

### Laque (Résine), Lacca, Gomme laque (F) Gummi laccae (S)

هو غَيْر صَمْغ اللَّك.

يَنْتُج اللَّك على الأغصان الفَتيَّة وفُروع نَباتات مُختلِفة، أكثر ما نُلاحظ من بينها أثْأَب الهند أو تِين المَجوس Ficus religiosa وتين النُّغال religiosa، والعُنَّاب Zizyphus jujuba، وألُوريْت اللَّكَ (۱) Aleurites laccifera أي كروتُن اللَّكُ(١)، ونَبات يُدعى Schleichera

trijuga إلخ. سبب هذه المادَّة هو حَشَرة من رُتَّبة نِصفِيّات الجناح اسمها العِلميّ من رُتَّبة نِصفِيّات الجناح اسمها العِلميّ Taccardia lacca. تَتَجمَّع إناث هذه الحَشرة على أطراف الفُروع، وتَتَثَبَّت عليها مُتَراصَة الواحدة جَنْب الأخرى وتَتَغطَّى بنَتْح راتِنجيّ يجمد حَولها ويُشكِّل على الفُروع الصَّغيرة أنواعًا من الكُمَيْمات الخَشِنة المَظهر.

نُمَيِّز اللَّكَ في الأسواق بحالات مُختلِفة: تارة يُؤخذ الغُصْن الكامل، الخَشَب والرّاتِنج معًا، وهذا ما يُسمّى لكّ القُضبان Laque en bâtons. مَرّات أخرى تُفْصَل الأسطوانات عن محورها الخَشبيّ، وهو بذلك لَكُ العَناقيد Laque الخَشبيّ، وهو بذلك لَكُ العَناقيد Laque وأي وقطع صغيرة فتُعطي لَكَ الحَبّ en grappes Laque en وتُكسر الأسطوانات إلى قطع صغيرة فتُعطي لَكَ الحَبّ grains. الشّكل الآخر من اللَّك هُو لَك الصَّفائح أو الألواح المُستديرة، الذي Button-lac.

اللَّك الحَرْشَفِي أو الوَرَقِي يَحصل من الأصْناف السّابقة، الّتي تُصْهَر، تُمَرَّر وتُصَبّ في صَفائح رَقيقة. ونُميِّز مِنه في الأسواق الأشقر، والأحمر أو البُنِّي. وهو يَحتوي من المَواد المُلوِّنة أقل من الأصناف السّابقة. اللَّك الأشقر يَنصهر بسهولة وينثر رائحة لطيفة تُذكِّر برائحة الوانيليا؛ وهو يَذوب في الكحول، والأسيتون، والكحول الأميليك، والكحول الأميليك، والنَّسَادِر؛ ذَوَّاب بسهولة في الصُّود النَّسُادِر؛ ذَوَّاب بسهولة في الصُّود الكاوي الذي يَصبُغُه بالبَنفسجيّ، يَذوب الكاوي الذي يَصبُغُه بالبَنفسجيّ، يَذوب

جُزئيًّا في الأثير، وفي S2C، والبَنزين، ودُهن التَّربَنْتِين.

إِنِّ لَكَ الأَثْابِ أِي التِّين، من فَصِيلَة الخُبْزِيَّات، وأنواع البُوتيّة من فَصِيلَة الفَراشِيَّات، ولَكَ الشلايْشَارا(۱) من فَصِيلَة السَّذَابِيَّات، يَصل بكمِّيّات كبيرة، بنوع خاص من الهند وبرمانيا؛ أما لَكَ أنواع السُمّاق والـ Melanorrhea من فَصِيلَة البُطْمِيَّات، فمن تُونْكَن من المُقاطعات المجاورة، ولكي يُوشَّى والمُقاطعات المجاورة، ولكي يُوشَّى اللَّكَ أحيانًا بِنقاط مُذَهَبَة اللَّون، يُمزَج اللَّال أي الزَّرنيخ مع مسحوق رَهْج الغار أي الزَّرنيخ الأحمر.

إِنِّ التَّحَوُّلات الَّتِي تَطرأ على العُصارة خلال تكوين اللَّك قام بدراستها برتراند. وهي تَحوُّلات تَنتُج عن اللَّكّاز Laccase، وهي خميرة مُؤكْسِدَة مُباشرة، تُؤثِّر على المُركِّبات البُولى فينوليكية.

إنَّ راتِنج الأسواق الأبيض يَحصل إمّا من إزالة لون اللَّك الطَّبيعيّ بواسطة الصُّود هيپوكلوريت الكلس، أو بواسطة الصُّود الَّذي يُضاف إليه القليل من حامِض كلورهيدريك مُخفَّف، وإمّا بتَصَبُّنه ومن ثُمّ إزالة القِلَى بواسطة حامِض. بعد التَّبيض، نُضيف إلى المحلول الّذي يَكون خفيف الغَبَشيَّة، القليل من يكون خفيف الغَبَشيَّة، القليل من سُولْفِيت الصُّوديوم، ومن ثُمَّ كمِّية الحامِض الكلورهيدريك اللّازمة حَصْرًا الحي يترسَّب الرَّاتِنج.

يَحتوي صَمْغ اللَّكَ على ٧٠ إلى ٩٠٪

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمؤلِّف.

ل و ت

من المواد الرّاتنجيّة، ٤ إلى ٦٪ من الشَّمْع المُحمَر اللَّون الأصفر المُؤلَّف من كحول ميريستيك، ومن القليل من الحامِض السَّارِيليك والأستيرات الميريسيكية. إنّ هٰذا الشَّمع هو إفراز خاص للحَشَرة.

يَحتوي صَمْع اللَّك أيضًا على مادَّة مُلوِّنة مُماثِلة لمادَّة القِرْمِز.

٢٥٤ لُوْتِيا نافِعَة، أَنْثِليس الجُرْح،
 حَثِيْشَة الجُرْح، حَثِيْشَة الدُّب

Kidney-vetch, Lady's fingers, Woundwort (E)

Vulnéraire, Anthyllide vulnéraire, Anthyllide, Trèfle jaune des sables, Triolet jaune (F)

Wundklee, Hasenklee, Gelber hasenklee (D)

Anthyllis vulneraria, Anthyllis prior (S)

نبات عُشبيّ صغير مُحوِل أو مُعمَّر من فَصِيلَة القَرْنِيَّات الفَرَاشِيَّة يَعلو من ٥ إلى ٤٠سم. سُوقُه نائمة أو صاعِدة. أوراقه الأرُومِيَّة ضُمِّيَّة التَّجميع، السُّفلي وحيدة الوُريقة، الباقية مُرَكَّبة من ٣ إلى ٦ أزواج من الوُريقات، الهامِيَّة هي الأكبر. من الوُريقات، الهامِيَّة هي الأكبر. أزهاره صفراء اللَّون (أزهار النَّوع اللَّبنانيّ زاهِية اللَّون الأحمر الأرجوانيّ) على طَرَف ساقٍ زَهْرِيَّة مُنتصِبة، بازهرادٍ كُرُويّ الشَّكُل تُحيطه قُنابات خضراء كُرُويّ الشَّكُل تُحيطه قُنابات خضراء اللَّون. الكأس مُوبِرة جدًّا، مُزدوجة الشَّفاه، مُنتفِخة كالمَثَانة. التّاج فَراشيّ الشَّفاه، مُنتفِخة كالمَثَانة. التّاج فَراشيّ الشَّكُل، قصير الرّاية (أي البَتَلة الشّاذة). قَرْن ضِمنيّ يَضمّ بزرة واحدة الشّاذة). قَرْن ضِمنيّ يَضمّ بزرة واحدة

أو بزرتين. طَعم النَّبات مُرِّ. الأقسام المُستعمَلة هي النَّبات الكامل، الأزهار، الجذر، الازهرارات، تُجفَّف في الظِّل وبطبقات رَقيقة وتَلافي تَحريكها قَدْر المُستطاع حتى نَتلافى سُقوط الأزهار.

المُرَكِّبات - عَفْص، صابُونُوسيدات، فلاقُونُويدات، لُعاب، سكاكر، فلاقُونُويدات، لُعاب، سكاكر، خضابات. البزرة تَحتوي على زَيت أخضر اللَّون، غير مُجفِّف، كثافته أخضر اللَّون، غير مُجفِّف، كثافته بينها الرَّفِينُوز Raffinose بتركيب كيميائي بينها الرَّفِينُوز C<sub>18</sub>H<sub>32</sub>O<sub>16</sub>.

الخَصائص - قابِضة، مُنَقِّبة، شافِية للجُرح، مُسهِّلة، مُطهِّرة، دافِعة للسُّعال.

الاستعمال - نُقاعة، نقيع، لَصُوق، صِبغَة، مُستخلَص سائل. كدمة، رَضَّة، جرح، قرح، داء الدَّمامِل، التهاب التَّجويف الحَلْقيِّ، اللَّثة، اللَّوزَتين، الأكزيما.

طريقة الاستعمال - على الكدمات والرَّضّات نَضع كماداتٍ مُشرَّبة من نَقيع والرَّضّات نَضع كماداتٍ مُشرَّبة من نَقيع ماء يُغلى عشر دقائق ويُغطَّى عشرة، وتُغسَل بمائه القُروح والجُروح. نُقاعة يُغطَّى عشر دقائق وجُذور في ليتر ماء غالٍ يُغطَّى عشر دقائق وتُغسل بها القُروح والجُروح. لتنشيط الجسم وتسهيل والجُروح. لتنشيط الجسم وتسهيل ملاعق من الرُّؤيسات المُزهِرة في مِقدار ملاعق من الرُّؤيسات المُزهِرة في مِقدار ملاعق من الرُّؤيسات المُزهِرة في مِقدار

۲۵۰ غرام ماء غالٍ يُغطّى ربع ساعة ويُؤخَذ خِلال النَّهار. تَكميد أو غَسيل القُروح المُلَوَّثة أو الدَّمامِل أو الأكزيما، والتَّغرغُر في حال التهابات التَّجويف الحَلْقيّ واللَّنة واللَّوزتين، بنُقاعة من حَوالى ٦ ملاعق رُؤيسات مُزهِرة في مِقدار ٢٥٠ غرام ماء غالٍ يُغطّى ربع ساعة.

أوراق اللَّوتيا النّافِعة في خليط من أوراق الفرمبواز والشَّيْلَك وأزهار الخوخ الشّائك أو البُرقُوق الشّائك والأنْثِليس كانت تُستَهلَك في الماضي كبديل للشّاي. هذا، وتَدخل اللُّوتيا في عدد كبير من تركيبات وخَليطات يُطلَق عليها السم «شاي سويسريّ» أي Falltrank. اللُّوتيا النّافِعة تُناسب تمامًا كَعَلف للماشية أخصّها الخِراف والماعز. الاسم العِلميّ من كَلمتين يُونانيّتين الاسم العِلميّ من كَلمتين يُونانيّتين السامة رَهْرة، Ioulos رَغَب.

٧٥٥ - لِيْنَارِيَة عَادِيَّة، حَبَاحِب مَبْذُول، مِكْنَسَة، مُخَلِّصة، جَوْز أَرْمَانِيُوس

Butter and eggs, Dragon-bushes, Toad-flax (E)

Linaire commune, Linaire vulgaire, Lin sauvage, Gueule de lion jaune, Chassevenin, Mûflier bâtard, Mûflier linaire (F) Flackskraut, Leinkraut, Frauenflachsleinkraut (D)

Linaria vulgaris (S)

نَبات بَرِّيِّ عُشبيِّ مُعَمَّر مُنتَصِب من فَصِيلَة الخَنَازِيْرِيَّات. ريزومُه صغير جدًّا، مُتَفرِّع وصغير الجُذَيرات. ساقُه

أَسْطُوانيّة تَعلو من ٣٠ إلى ٨٠ سم وأكثر. أوراقه تُشبه ورق الكتّان، كريهة الرّائحة، مُتَعاقِبة، لاطِئة، خَطِيَّة، سِنانِيَّة، قليلة العدد، نَصلُها ضَيِّق، ثُلاثيّ العُروق، بَحريّ اللَّون. أزهارُه كَبْرِيتيّة اللَّون الأصفر، هامِيَّة التَّجميع السُّنْبُليّ، مِهمازِيَّة المُؤخِّرة، يَعلوها عند قواعدها مُواج أَسْفَع. الثَّمرة إهليلجيّة الشَّكُل، بُزورها مُفَلطَحة وغشائِيّة. ازهراره من حزيران إلى أيلول.

المُركِّبات - في هذا النَّبات هيتروسيدان مُتقاربان هُما پَكْتُولِينارِيْن، ولِينارِيْن، ولِينارِيْن، مَوجُودان في الأزهار إلى جانب حوامِض دُهنيّة، مَنيت، سَكاكر، فيتُوستارول (١٩٠٦)، مادَّة صِباغِيَّة مُشتقَّة من الـ Scutellaréine، صفراء اللَّون، عَفْص، لُعاب. أُعيد تَسجيل هٰذا النَّبات في الفَرْماكوبيا الفَرنسيّة عام ١٩٧٥.

الخصائص والاستعمال - مُضادة لللبواسير، مُنَقِّية، مُضادة للالتهاب، عَيْنِيَّة، مُدِرّة للبَوْل. استُعمِلت قديمًا لدَرّ البَوْل بنوع أخص فأطلق عليها الأطبّاء القُدماء اسم Urinalis. استعمالها في البَواسِير، الأمراض الجِلدِيّة، القُوبات، الصُّفَيراء، الجُروح: نُقاعةً وصِبغةً ومَسحوقًا ولَصُوقًا.

طريقة الاستعمال - في الأمراض الجِلدية والقُوبات والصُّفَيراء، نَقيع ١٥ إلى ٢٥ غرام نَبات كامل في ليتر ماء يُغلَى ويُغطَّى ويُؤخَذ منه ٣ فناجين في

ل ي ن

اليوم. لمُعالجة البَواسير نَضَع فَوقها لَصُوفًا من ٥٠ غرامًا من النَّبات المَسلوق بالحليب. النَّبات الرَّبيعي كمادات من النَّبات الغَض المفروم على الطَّريِّ الغَضِّ يُؤكل مطبوخًا في بعض الجروح. المناطق الأوروبِّيّة. مَرْهم من الأزهار

للعَين المُتهيِّجة. كذلك يَعمد أهل الرِّيف الأوروبِّيّ أحيانًا إلى وَضع 939

الحفظ - في مكان بارد، بمعزل عن الضُّوء، في أوعية غير مُقفَلة تمامًا. كما يجب أن تُسَلِّم في أوعية مُزوَّدة بجهاز يَمنع حُصول ضَغْط داخليّ، ولكنّه يَكون مُبْتَكرًا بطريقة تَمنع السّائل من الانسكاب إلى الخارج.

إنّ لهذا الجهاز يُمكن أن يَتكوَّن من أنبوب شَعْري من الزُّجاج يَخترق سَدّادة الوعاء. كما تَمَّ اقتراح حِفظ البرهيدرول في قارورات مَطْليّة من الدّاخل باليرافين الَّذِي يَمنع العَمَلِ المُحَلِّلِ الَّذِي تحدِثُه القِلَى على الزَّجاج.

خطِر - جَدُول Dangereux-Tableau C

٢٥٧- مُحمَّدات، خَثيرات Jelly (E) Gelées (F) Gelee (D)

مَلتُوت الحَزاز السُّكَريّ ....٧٥٠ غ نَعْلَى قليلًا، نَرفع الرَّعْوة ونُعطَّر بواسطة ١٠ غرامات ماء زهر البُرتقال؛

إنَّها المُجمَّدة الخالية من المرارة بالذّات الّتي تُعطى دائمًا إذا ذُكرت من دون تحدید ما.

لتحضير ٢٥٠ غرام مُجمَّدة (١٨٨٤).

حَزاز إسْلندَة .... ٤٦٠.....

٢٥٦- ماء مُتَأَكْسِج (مُذَابَة - مُرَكَّزة)، يَرْ هِيدُرُول

Soluté concentré d'eau oxygénée, Soluté concentré de peroxyde d'hydrogène, Perhydrol (F)

إِنَّ مُذَابَة الماء المُتَأكسِج المُركَّزة هي محلول مائتی یَحتوی علی حَوالی ۳۰ بالمئة بالوزن من ييروكسيد (فَوْق أوكسيد) الهيدروجين (H2O2) وقابل لكى يَنْثُر ١٠٠ إلى ١١٠ مَرّات مِقدار حجمه من الأوكسيجين الغازي. وهو مُجمَّدة حَزاز إسْلَنْدَة يَتَمثَّل على شكل سائل عديم اللَّون يَجِبِ أَن يُعطى، إذا خُفِّف بنسبة واحد إلى عشرة (١/١٠) بالوزن، محلولًا يُمثِّل صِفات مُذابَة الماء المُتأكِّسِج المَخزَ نِتَّة .

> يُمكن حِفظ المحلول بإضافة «مُثَبِّتِ» مُلائم. فيجب والحالة لهذه، أن تَحمل البطاقة المُلْصَقَة عِبارة «مُثَبَّت».

المُعَايَرَة - إجراء المُعايرة كما أشير بذلك لمُذابَة الماء المُتَأكْسِج المَخْزَنيَّة، وذلك بالعَمَل على ملليتر واحدٍ من مُجَمَّدَة حَزاز مُرّة مَحلول مائتي بنسبة ١٠ بالمئة.

نَعْلَي في كمِّيَّة كافية من الماء لمدَّة ساعة واحدة، نُمرِّر مع العَصْر، نَترك للرّاحة، نُصفِّق؛ نُعيد السّائل إلى النّار، نُضيف إله:

سُكَّر ١٢٥ غ غِراء سَمَك ...... ٤٣. غ

نُحرِّك حتِّى الغَليان ونُتابع الغَليان حتِّى التَّركيز المُناسب. نُمرِّر ونُبرِّد. إنَّ هٰذا المِيةِ دار يُعطي حَوالي ٢٥٠ غرام مُحمَّدة.

كان دستور ١٨٨٤ يَصف ٥ غرامات حَزاز يَغليها ٥ دقائق في كمِّية كافية للحصول على ١٥٠ غرامًا من النَّقيع الذي كان يَحل مَحل ١٥٠ غرام ماء شَروب في تركيبة مُجمَّدة الحَزاز.

إِنّ مُجمَّدة الحَزاز بالكينا أو مُجمَّدة الحَزاز المُقوِّية تَحصل باستبدال سُكَّر مُجمَّدة الحَزاز المُوَّة بمقدار ١٨٠ غرامًا مِن شَراب الكينا السُّكَريّ؛ أو بواسطة: مَلتُوت الحَزاز السُّكَريّ ٧٥غ؛ شَراب الكينا السُّكَريّ ١١٠غ؛ ماء ١١٥غ. لكلّ ٢٥٠غ مُجمّدة (دستور ١٨٨٤).

Granulés (F) مُحيّبات -۲۵۸

## مُحَبَّبات ذات تحرير مُعَدَّل

إنّ المُحبَّبات المعَدَّلة التَّحرير هي مُستحضرات تَمَّ تَصوُّرها بهدف تَعديل، وبشكل عام تقليل سُرعة تَحرير الجَوهر أو الجَواهر الفَعّالة في المجرى الهَضميّ.

## مُحَبَّبَات ذات تَلبيس مُقاوِم مِعَويّ

إنّ هٰذه المُحبَّبات تكون مَكسوَّة بطبقة أو أكثر مُخصَّصة لكي تُقاوم عَمَل العُصارة المِعَويّة وألّا تَتَفَتّت إلّا في العُصارة المِعَويّة. للحُصول على هٰذه النَّتيجة، تُستعمَل مَوادّ مُختلِفة مِثال أستيل فْتالات السَّلُولوز، الغلوتين، المُكثِّفات الأنْيِوُنِيّة المُشتركة المُشتركة ولأستيراته...

## مُحَبَّبات فائرة

إنّ المُحبَّبات الفائرة تحتوي بالوقت ذاته على مَوادّ ذات تَفاعُل حامِض وعلى كربوناتات أو على هيدروجينو كربوناتات قابلة أن تَتفاعل بسرعة بوجود الماء لكي تَنْثُر ثانى أوكسيد الكربُون.

## مُحَبَّبات مُلبَّسَة

يَكُونَ سطح المُحبَّبات المُلبَّسة مُغطَّى بطبقة أو أكثر من مَوادِّ مختلِفة كالمكَثَّفَات الطَّبيعيَّة أو الاصطناعيّة، والسّكاكر، والبُوليولات Polyols، والشُّموع، ومَوادِّ مَعدنيّة غير قابلة للذَّوبان، ومَوادِّ مُلوِّنة، ومَوادِّ مُطهِّرة. عندما يَكُونَ التَّلبيس رقيقًا جدًّا، يُقال إنَّ المُحبَّبات هي مُغَشّاة: Pelliculés.

المُواصفات - المُحبَّبات المُلبَّسة لها مظهر مالس، غالبًا لَمّاع: وَتكون في أكثر الأحيان مُلوَّنة. إذا فُحِصَت بالمكبِّر، فإنّ مَقطعها يُظهِر كُتلةً مَرْكزِيَّة

مُحاطَة بطبقة مُختلِفة الرُّقعة والنَّسْج.

٢٥٩- مَحْلَب، شَجَر أَدْرِيْس

Perfumed cherry, Ste Lucie cherry (E) Cerisier mahaleb, Mahaleb, Cerisier Sainte Lucie, Canon (F)

Lucienholz, Steinweichsel, Weichselkirsche (D)

Cerasus mahaleb, Prunus mahaleb (S)

شَجَرة صغيرة من قَصِيلَة الوَرْدِيَّات تَعلو من ١٠ إلى ١٢ مترًا. أغصائها قصيرة، لَدْنَة. فُروعُها الفَتيَّة لِبْدِيَّة. أوراقُها مُستديرة طُولُها ١٩٠سم. أزهارُها عِطرِيّة في عُنقود طولُه من ٣ إلى ٤سم، قَليل الوَرق في قاعدته. يثمارُها حِرِّيفَة الطَّعم، سَوداء اللَّون، طولُها حَوالى ٢ ملم. قُشورُها عِطريّة. مَهدُها أوروبًا وآسيا الغَربيّة. والمَحلَب مُطعَّم مُمتاز للكَرز في الأراضي الكلسيّة والأراضي الكلسيّة والأراضي الكلسيّة والأراضي الكلسيّة المُنخفِضة.

الخصائص والاستعمال - يُستعمَل المَحْلَب في لُبنان في تَحضير بَعض المُعجَّنات وبَعض الحلويات كالكَعْك، والمُعمول وسوى ذلك. خَسْب المَحْلَب يَرغبه النَّجَارون والخَراطُون لصنع الأثاثات البَسيطة الخَشِنَة، وهو خَسْب أَشْقر اللَّون غالبًا ما يُطلَق عليه في أوروبًا وعن خطأ اسم "خَشَب كَرز الطَير» Bois de Mérisier. وجاء عن المحلب: "ثماره مُفَرِّحة مُقوِّية للحواس المحلب: "ثماره مُفَرِّحة مُقوِّية للحواس مُطلقًا، تَمنَع الخَفقان والبَهر وضيق

النَّفَس والبَلْغَم، وتُنقِي المَعِدة وأوجاع م ح ل الكَبِد والكِلى والطِّحال والحَصى وعُسْر البَوْل شُربًا. ويُطلى به فيخفي الكَلَف والجَرَب. » ويُوجد في كافّة أنواع الكَرَز خضاب أنْتُوسيانيّ.

## Pastilles (F) مُحلَّيات -٢٦٠

 Pastilles de réglisse
 السُّوس

 عَصير السُّوس
 عَصير السُّوس

 صَمْغ عَربي
 ١٦٦

 سُكر
 ١٦٦

 سَوْسَن
 ١٥

 ماء
 كمِّيَة كافية

إِنَّ ما يُسمَّى أقراص مُقشَّعة سَوداء: Tabellæ bechicæ nigræ كانت مُركَّبة من بَلْسَم تُولُو ١٨غ، سَوْسَن ١٨غ، صَـمْخ كُتَيسراء ٤غ، سُكِّر ١٥٨غ، مُستخلص السّوس ١٠٦غ. نُقسَّم الكُتلة إلى أقراص من غرام واحد.

قون مُونز يُعطي: سُكَّر مَصهور على النّار ١٦ جزءًا؛ مُستخلَص سُوس جزء واحد.

يُشير عدد من الفَرْماكوبيات الأوروبيَّة باسم تروشِيْسْك أي مُحلَّى السَّوس إلى مُستحضرات لا تَختلِف عن المُستحضر السّابق سوى بالأفاويه والمَنِّ أو بالأفْيُون.

#### م ر ا

## مُحَلَّيات الفِلْفِل المُرَكَّبَة

Pastilles de	poivre	composées
--------------	--------	-----------

قِرْفَة١٥٠ غ
فِلْفِل ٢,٥
عُود الوَجّغود الوَجّ
قِشر جَوْز الطِّيب
جَوز الطِّيب
كَبَابَةكبابة
قَرَنْفُل٢غ
خُوْلَنْجان (غالَنْغَا)٢ غ
هال (مَسحوق)هال (مَسحوق)
قِشْرة بُرتُقال طازجة ٢٠٠٠٠٠٠ غ
قِشْرة حامِض طازجة ٤ غ
نُحضِّر مَسحوقًا مُتجانسًا ونُضيف:
لَوز حُلُو مُنظَّف١٥٠ غ
سُكَّر محلول في ماء النَّعنع ٥٠٠ غ
سادر معمول في ماء العليم
قِشرة حامِض مُربَّبة٣٠غ

## Pommades (F) مَراهِم

للرِّيح، نافعة للمَعِدة، مُلَعِّبَة. لذكرى

التاريخ.

ئبق	مَرْهَم پروتو يُودور الزِّ
اغ	پروتو يُودور الزِّئبق
۲۰	شَحْم خنزير بَنْزَوينيّ
قُرحات زُهَرِيّة .	دستور أدوية ١٨٦٦.
يا هذا المَ هم ضدّ	کان هاردی نستعم

حَبِّ الشَّباب، مع كمِّيّات پروتو يودور تبلغ ٠,١٠ غرام إلى غرام واحد. لذكرى التاريخ.

## مَرْهَم بيودور الزَّئبق

بيودور الزِّئبق .....۱ غ شَحْم خنزير ......٤٥ غ

قُرْحات زُهَرِيّة. ضِدّ حَبّ الشَّباب (هاردي) مع كمِّيّات أقوى من البيودور (من ٠,٠٥ إلى ٠,٥٠ غرام لكلّ ٣٠ غرامًا من الشَّحم). لذكرى التاريخ.

## مَرْهَم جياكوميني

## مَرْهَم دَالِيبُور. - كتاب الوصفات الوطنيّ ١٩٧٦.

أورد كتاب الوصفات في مُلحقه

ماء مُنَقِّى .....١٠ غ

الڤازلين ونَهرُس حتّى الحصول على لانولايين ..... ٤٠٠٠ غ مزيج مُتجانِس. قازلين .....قازلين مُطهِّر. بالإمكان تحضيره كذلك نَصهر مزيج اللّانولايين والڤازلين في حرارة تُقارب ٦٠ °سغ. نَحُلَ الكافور في حَوالي ١٠ غرامات من السَّوّاغ مَرْهَم زِنْجَفْر شَمْعِيّ، مَرْهَم شَمْعِيّ أَحْمَر المَصهور؛ نُضيف أوكُسيد الزِّنك إلى Cérat de minium بقيَّة السَّوَّاغ. نُبرِّد، ومن ثمَّ نَمزُج مَرْهم شَمعيّ بَسيط .... ٢ أجزاء المَرْهمين. نُضيف بَعدها مَحلول زنْجَفْر .....زنْجَفْر السُولفاتات مع الماء. مَرْهَم زِنْبَقِي شَمعي مَرْهم جامِد، لونه أبيض خفيف Cérat mercuriel (F.H.P. الاخضرار. دِهان ناپُولي .....۳۰۰۰ غ هُناك عدد كبير من التَّركيبات لمراهم مَرْهَم شُمعيّ أصفر ....٩٠ داليبور، كذلك تركيبات لكريمات؛ وفيما يلي تركيبة مَرْهم مُستشفى من كتاب وصفات مستشفيات القدِّيس لويس. باريس. للقُرحات الزُّهَريّة. سُولفات النُّحاس ......ب۱۱،۰ غ دِهان نابّولی ..... ٤ أجزاء سُولفات الزِّنك .....ب١٢٠٠ غ مَرهم شُمْعيّ بالصّابون ..... أجزاء كافور ..... جزء نَجِعل كُتلَة مُتجانِسة. لانولين .....٧ غ مَرْهَم سِيْرِيلُو قازلين، كمِّيَّة تكفى لمقدار .....١٠٠ غ سُليماني أكّال ..... ٤ غ مُعالجة الحَصَف، والأكزيما. شُخْم حيوان ..... عيوان مَرْهَم دُهْن النِيَاوْلي دستور الأدوية القديم. دُهن نِيَاوْلي ....٢غ نُذوِّب الملح في قليل من الماء. قازلين .....٩٨ غ وحسبما قال جُوردان، فإنّ سِيريلُو انتهى كتاب الوصفات الوطنى ١٩٧٤. به الأمر بإضافة القليل من كلورهيدرات الأُمُّونياك؛ وذَكَر بَعض كتب الوَصْفات نَهرُس دُهن النِّياولي مع ٥ مرّات وزنه

من القازلين، ومن ثمّ نُضيف باقى

هٰذه الإضافات. وفي هٰذا المَرْهم يُمكِن

م ر ا

استبدال الشَّحم بزيت اللَّوز الحُلُو أو بالشُّحم البِّلْسَميّ. لذكرى التاريخ.

مَرْهَم شَمْعِيّ باللُّودَانُم Cérat laudanisé مَرْهَم مَرهم غالينُوس الشَّمعيّ ....٩٠ غ لُودانُم سِيدِنْهام ....١٠٠٠٠٠ غ فى دستور أدوية عام ١٨٨٤. فى كتاب وصفات مُستشفيات باريس كان يُستبدَل المرهم الشَّمعيّ الأبيض بالمرهم الشَّمعيّ الأصفر.

## مَرْهَم شُوْكَران

أوراق شُوْكَران غَضَّة مَهروسة ...١٠٠ غ ۱۰۰ غ شَحْم حَيَوان

ذنُسخِّن أوراق الشَّوْكران في الشَّحم على نار هادئة حتى تَنَاثُر بخار الماء بكامله ونُمرِّر. في عدم وجود أوراق غَضّة، بالإمكان تَحضير هٰذا المَرْهَم من الشُّحم ومُستخلِّص الشُّوكَران المائتي أو الكُحولتي.

يُمكن أن نُحضِّر بالطَّريقة ذاتها مَرْهَم البلَّادون ومَرَاهم نَباتات مُخَدِّرة أخرى. لذكرى التاريخ.

## مَرْهَم ضِدّ الأكزيما

غ	۲.							 		ي	ون	به نتر	٤	ژبد	تر
غ	٤	٠.						 		ن	وا	حَيَ	۴	بُدُ	ů
غ	١.						 	 i	ولأ	أفي	ر	لَص	خ	<u> </u>	و ۵

الماء.

## تركيبة أخرى هي التّالية:

كافور مُسحوق ومَنخول .....١ غ حامِض سالِسيليك مسحوق .....١ غ أوكسيد الزِّنك ..... غ كبريت مُرَسَّب ..... غ زَيت الكاد التَّقيّ ....١٠ فازلين مُتعادَل ..... فازلين مُتعادَل

يُمكن استبدال نِصف أوكْسيد الزِّنك بالطُّلْق، والڤازلين بمزيج من اللَّانُولِين والزَّيت النَّباتيِّ.

## مَرْهَم ضِد تساقط الشّعر

شَحْم حَيُوان .....۳۰ قَطْران النَّروج .....ع زُبْدة جَوْز الطِّيب ..... غ بَنْجُوان ..... بَنْجُوان .... بَلْسَم الكوو مَنْدور ....٣غ مِسْك ..... فيسْك .... ﴾ بَلْسَم فيوراڤَنْتي .....٣غ

نَحُلّ البَنْجُوان بهرسه في قليل من الكحول، نُضيف البَلاسِم ونَخلُط الكُلّ نَحُلّ المُستخلَص في نُقط قليلة من في مَرْهَم القَطْران المُحضّر سَلفًا في حَمّام مريم.

مَرْهَم كالُوت، عَجينة كالُوت	مَرْهَم ضِدّ السَّيَلان الزَّهَميّ البّسيط
يُودوفورم١٠	لانُولين٧غ
فينول مُتبَلِّر٥ غ	قازلينافازلين
کافورکافور	زيت الكاداكاد
نَفْتُول بيتا	زَيت البَّتُولا١ غ
غَيَّاكُولُ نَقْتِي١٠	تُرْبُث مَعدنيّا
لانولين٠٥ غ	كَبريت مُرَسَّب١غ
أبيض البال	وإمّا:
with the art and large files	زَيت الكاداکاد
مَرُّهَم مُكَوفَر (كتاب الوصفات الوطنيّ ١٩٧٦)	زَيت البَّتُولا١ غ
كافور طبيعتي أو اصطناعتي	كَبريت مُرَسّب ٥٠،٠ إلى ١ غ
مَبروش۲۰ غ	ريزورسين ٥٠,٠ إلى ١ غ
شَمْع أبيض١٠	حامِض بيروغَلِّيك ٠,٥٠ إلى ١ غ
شَحْم حَيَوان بَنْزَوينيّ٧٠غ	زُبدة كاكاوه إلى ١٠ غ
نُسَيِّل الشَّمع والشَّحم في حرارة لطيفة،	قازلينقازلين
نُضيف الكافور ونُحرِّك حتى يَذوب وحتى	نُبدِّل مِقدار زُبدة الكاكاو تبعًا
يبرد المرهم جزئيًا (دستور ١٩٤٩).	للحرارِةٍ، نُقلِّل الكَبريت وحامِض
نظرًا لتَبخُّريَّة الكافور، من المُستحسَن	الپيروغُلُيك عند المَرْضي القابلين
سَكب الشُّمْع والشُّحْمِ على الكافور	للإصابة بالأكزيما الزَّهَمِيّة.
المُقَسَّم، في وعاء مُقْفَل من الحُث	مَرْهَم القَطْران (أمَرِي):
(حَجَر رَمليّ) أو الخَزَف الأسطوانيّ، المُستطيل، الّذي لا نَملأه سوى إلى ٣/	قَطْران ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
المستطيل، الذي لا تماره سوى إلى ١٠ ٢ أو ٣/٤ حتى نَتَمكَّن من خَضَّه جيِّدًا	مَرْهَم شَمعي١٥٠ غ
والحُصول بالتّالي على مَرْهم مُتجانِس.	شَحْم حَيَوان١٥٠ غ
•	ماء كولونيا١غ
مَرْهَم مُكُوفَر	في تَمسيدات صباحًا ومساءً، ضِدّ
شَخْم حَيُوان	الإصابات الجِلديّة المُزمِنة، وبنوع
مُسحوق کافور۳۰	أساسي ضد الحَصَف والتَّصدُّف، وضِدُّ
نُصهر في حَمَّام مريم.	تَساقُط الشُّعرِ.

مرا

نُحرِّكُ حتِّى بَذُوبِ مَسحوقِ الكافور، عندها نُبرِّد. ضِدّ الخُدوش والخَمْشات والقُروح، والآلام.

#### مَرْهَم يُودور البُوتاسيوم، مَرْهَم مُيَوَّد

يُودور البوتاسيوم .....١٠٠٠ غ شُحْم خنزير بَنْزَوينتي .....٨٠ غ تَيُوسُولفات الصُوديوم .....١٠٠٠ غ ماء مُقطَّر ..... نُذوِّب الأملاح في الماء، نُضيف شحم الخنزير ونهرس الكل للحصول

على مَرْهَم مُتجانِس. (لوقته) (دستور

إنّ غليسّرولّة يُودور البوتاسيوم (يودور بوتاس مُسحوق ١، غليسرين ٢) تُحفَظ لعدة أشهر من دون أن تَتْلَف وتَمتزج جيِّدًا إلى الشَّحْم؛ إذا مَزَجنا ٦ من الغليسرولة مع ١٢ من الشَّحم الطَّازج أو البَنْزَويني، نَحصل خلال دقائق قليلة على مَرْهَم يُحفظ جيِّدًا. في مَرْهَم يُودور البوتاسيوم بالغليسرين الّذي وضعه تيرولت يستبدل الشّحم بمزيج من الغليسُّرين والصابون، فنحصل على غليسرولة يُودور البوتاس الصُّلْبَة الَّتي تَتَركُّب كما يتبع:

يُودور بوتاسيوم .....١٠٠٠ غ صابون حَيوانتي ....٢٠ غ غليسّرين نَقيّ من ٢٨ إلى

٣٠ درجة ٨٥ مرُوخ ضِدّ التهاب الأذن

الغليسرين، نُضيف اليُودور المسحوق، ونَخْفُق بقوَّة في الهاوَن؛ نُعطِّر بكمِّيَّة كافية من دُهْنَ اللَّوز المُرَّ. إنَّ لهذا المرهم يُحفَظ طويلًا.

يَحدُث في مختلف مَراهم يُودور البوتاسيوم تَلْوين بنِّيّ بعد مُضيّ بعض الوقت. ولتلافى ذلك يُضيف دستور الأدوية تَيُوسولفات الصوديوم.

كان يُلوَّن بالأحمر ويُباع كدواء مُتخصِّص في الشَّرَث.

نُحضِّر بالطُّريقة ذاتها مَراهم يُودور الحديد، ويُودور الزِّنك.

#### مَرْهَم يُودور كلورور زِئبقي

يُودور كلورور زِئبقيّ ....٧٥٠٠٠ غ شُحْم حيوان .....٠٠٠ غ ضِدّ العُدَّة الوَرْديّة. لذكرى التاريخ.

#### ۲۶۲- مَروخ Liniment (F)

#### مَرُوخ ريشاردان

كافور ..... كافور نُشادر .....۲۰ كحول مُكرَّر .....كحول مُكرَّر دُهن البابُونَج ..... غ دُهن العَرْعَر ..... فهن العَرْعَر على العَرْعَر على العَرْعَر العَرْعَر العَرْعَر العَرْعَر العَرْعَر العَرْعَر في الشُّرَث والخَصَر.

نَصهر في حَمّام مريم الصّابون في مُستخلَص بلّادُون ..... غ

900	تَمْسيدات البَطْن. نَجعل لهذا المَرُوخ	بَلْسَم ترانكيل٥ غ
	أكثر فَعالية بنقع حصّ ثوم في زَيت	ماء لِتَقطير المُستخلَصكمِّيَّة تكفي
	حشيشة الشُّفاء لمدُّةٍ طويلة.	نخض قَبْل الاستعمال. يُدخَل في
	ر و در ا	تعص قبل الاستعمال. يدخل في تمجرى السمعيّ الخارجيّ بواسطة
	مَرُوخ مُبَوِّل	قُطْنة. يمكن استبدال بَلْسَم ترانكيل
	صِبغَة الإشْقِيْل ٢٠ غ	بالغليسرين.
	دِيجيتال١٠	ب عمیسریل ،
	في تمسيدات على البَطن أو على	مَرُوخ ضِدّ الزُّونا
	في تَمسيدات على البَطن أو على الفَخْذَيْن في الاسْتِسْقَاء.	زَيتَ لَوز حُلو٢ غ
		كلوروفورم غ
	مَرُوخ مُتَرْبَن مُؤَفْيَن	
	دُهن تَربُنْتين١٠ غ	نَمزُج. نَضع في لهذا المَرُوخ ٥ أو ٦
	زَيت بابُونَج٣٠غ	مرّات في ٢٤ ساعة. يُمكن رَفْع المِقدار
	لُودانُم سائل۲ غ	من ٤ إلى ٦ غرامات، حسب حِدَّة الأوجاع.
	أمراض مَفصِليَّة، عِرْق النَّسا.	(0, 3)
	المراس منجية بالرق	
		مَرُوخ ضِدّ النَّقْرس
	مَرُوخ مُحَوِّل (بيطريِّ)	
	مَرُوخ مُحَوِّل (بيطريّ) نُشادره غ	ماء الكَرَز الغاريّ١٦ غ
	مَرُوخ مُحَوِّل (بيطريّ) نُشادره غ دُهن تَربَنْتينه غ	ماء الكَرَز الغاريّ ١٦ غ أثير سُولفوريك ٢ غ
	مَرُوخ مُحَوِّل (بيطريّ) نُشادره غ دُهن تَربَنْتينه غ ماء كولونياه غ	ماء الكَرَز الغاري
	مَرُوخ مُحَوِّل (بيطريّ) نُشادر ٥ غ دُهن تَربَنْتين ١٠٠ غ ماء كولونيا ١٠٠٠ غ كحول مُكَوْفَر ٢٠٠ غ	ماء الكَرَز الغاري
	مَرُوخ مُحَوِّل (بيطريّ) نُشادره غ دُهن تَربَنْتينه غ ماء كولونياه غ	ماء الكَرَز الغاري
	مَرُوخ مُحَوِّل (بيطريّ)  نُشادر ٥ غ دُهن تَربَشين ١٠٠ غ ماء كولونيا ١٠٠ غ كحول مُكَوْفَر ٢٠٠ غ كُحولَة الخُزَامي ١٥٠ غ نَضعه في فَرْكات بواسطة فلانيلّة.	ماء الكَرَز الغاري
	مَرُوخ مُحَوِّل (بيطريّ)  نُشادر ٥ غ دُهن تَربَنْتين ١٠ غ ماء كولونيا ١٠٠ غ كحول مُكَوْفَر ٢٠ غ كُحولة الخُزَامي ١٥ غ نَضعه في فَرْكات بواسطة فلانيلّة . عند الكَلْب، ضِد الالتواءات العَضليّة ،	ماء الكَرَز الغاريّ ٢ غ أثير سُولفوريك ٢ غ مُستخلَص البلّادُون١ غ مُستخلَص البنّج١ غ مُستخلَص البنّج١ غ في المَروخ المُضادّ للرّوماتيزم، يُستبدَل مُستخلَص البنّج بلُودانُم رُوسُو.
	مَرُوخ مُحَوِّل (بيطريّ)  نُشادر ٥ غ دُهن تَربَشين ١٠٠ غ ماء كولونيا ١٠٠ غ كحول مُكَوْفَر ٢٠٠ غ كُحولَة الخُزَامي ١٥٠ غ نَضعه في فَرْكات بواسطة فلانيلّة.	ماء الكَرَز الغاريّ ٢ غ أثير سُولفوريك ٢ غ مُستخلَص البلّادُون ١٠٠٠ غ مُستخلَص البنّج ١٠٠٠ غ في المَروخ المُضادّ للرّوماتيزم، يُستبدَل مُستخلَص البّنْج بلُودانُم رُوسُو. مُرُوخ طارِد للدّود
	مَرُوخ مُحَوِّل (بيطريّ)  نُشادر	ماء الكرز الغاري ٢ غ أثير سُولفوريك ٢ غ مُستخلَص البلادُون ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	مَرُوخ مُحَوِّل (بيطريّ)  نُشادر	ماء الكرز الغاري ٢ غ أثير سُولفوريك ٢ غ مُستخلَص البلادُون ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	مَرُوخ مُحَوِّل (بيطريّ)  نُشادر	ماء الكرز الغاري ٢ غ أثير سُولفوريك ٢ غ مُستخلَص البلادُون ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٣	مَرُوخ مُحَوِّل (بيطريّ)  نُشادر	ماء الكرز الغاري ٢ غ أثير سُولفوريك ٢ غ مُستخلَص البلادُون ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ليكور بُوْيْل المُدَخِّن ٢٠٠٠٠٠٠ غ صِبغَة القِرْفَة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ غ

لجُرعة واحدة تُكرَّر كلِّ ربع ساعة، ضِدَّ الإسهال المُزمِن.

#### مَزيج مُدِرّ السُّوائل

# ۱٦٤ مَزيج بُونَان، مَزيج بُونان المُبَنِّع Mixture de Bonain, Mélange anesthésique de Bonain (F)

نَضع كلورهيدرات الكُوكايين والمَنْتُول والفينُول في قارورة صغيرة واسعة الفُتْحَة؛ نَخُض جيِّدًا حتى يَتم المَرْج. إنّ التَّسْييل يَتم تلقائيًّا، ويُمكن تَسريعه بوضع القارورة في حَمَّام مَريم.

سائل عَديم اللَّون، شَفَاف، شَرابي القِوام، رائحته رائحة المَنْتُول. وهو سام يَخضع لنظام الجَدولَيْن B و C (دستور الأدوية).

عام ١٩٤١، اقترح كُوردُونييه، خلال فترة نَقص كلورهيدرات الكُوكايين، استبدال هٰذا الملح بالقاعدة المسحوبة من مِلح الپروكايين المُقابل، وهو ملح يكون الحُصول عليه أسهل وتكون كلفتُه بالتّالى أقلّ من الأوّل.

يَجب ألّا يُضاف إليه الماء، ولا الكحول. إنّ الفينول الموجود فيه، ونَظرًا لخصائصه الكاوية والمُزيلة للألم، يُحضِّر ويُقوِّي عَمل الكوكايين وعمل المَنْتُول.

م ز ي

إنّ هذا المَزيج هو محلول مُشْبَع بكثافة بمركّباته، واشتراك كلورهيدرات الكوكايين والفينول اللّذين، إذا ظهرت جراثيمهما في صَيدليّة، يمكنُها أن تُؤدِّي إلى تماسك سريع في كُتَل صُلْبَة لكلّ المُستحضرات. نتلافى ذلك باستبدال كلورهيدرات الكوكايين جُزئيًّا بالقاعدة الحُرَّة.

إِنَّ هٰذَا السَّائل أكثر ما يُستعمَل في مَبْحَث الأذُن وأمراضها Otologie لتبنيج الطَّبْلَة المُسمَّكة بواسطة نسيج ليفي أو بواسطة نُتوءات فُطْرية، قَبْل البَرْل.

#### الجدول Tableau B

إنّ لهذا المَزيج لم يَزل يُستعمَل حتّى اليوم.

- ۲۹۰ مُزِيل الشَّعْر، ناتف Dépilatoire (F)

#### نَاتِف مارتان، هيدروسولفات الكلسيوم

إنّ لِكَبريتُور الكلسيوم المُكَبْرت، وعلى كلّ المَنتُوجات الشَّعْريّة في الجِسم (شَعر، وَبْر، زَغَب) سُرعة في العَمل ونَقاوة مُدهِشتَين وغير مُتَوقَّعتَين. وهو يُفضَّل على كاقَّة المُستحضرات الّتي تَحتوي على الزَّرنيخ لأنّها لا تَخلو من

الخُطورة. نُحضِّره كالتَّالي: كلس مُطْفَأ حديثًا ومَخْسُوف

الكُربُون جيِّدًا .... جزء ماء ..... جزء

نُوصِل إلى هذا اللَّبن الكِلسيّ السَّميك غاز الحامض السُّولْفهيدريكي، وحتى الإشباع: يَجب حَرْك اللَّبَن أثناء العَمليّة غالبًا حَتَّى يَتَشبَّع بشكل سَوِيّ وكامِل من الغاز.

إنّ العَصيدة المُحضّرة كما ذَكرْنا تَتَلوَّن بِالأخضر المُزْرَقِّ الَّذي يَعود سببُه إلى الحديد الموجود طبيعيًّا في الكلس والَّذي يَكُون قد تَكَبُّرَت أثناء العَمليَّة. عِند الرَّاحة يَركُد القِسم الصُّلُب من اللَّبَن ويَطفُو القِسم السَّائلُ. لذلك تَجب إعادة التَّجانُس إلى الكُتلَة عند الاستعمال. رائحة لهذا المستحضر كرائحة البَيْض العَفِن.

طريقة الاستعمال - نُغطِّى القِسم مُسْتحلَب مُهَدِّئ المُشْعِر الّذي نُريد نَتْفَه بطبقة من ١ إلى ٢ ملم. بَعد مُضيّ ٨ إلى ١٠ دقائق، وحتى أقل من ذلك، تُصبح الكُتلَة، التي كانت رَخْوَة في البداية، صُلْبَة. نَعْسُل بالماء البارد أو السّاخن، فنجد أن الجلد أصبح عاريًا تمامًا وأكثر ممّا قد يكون عليه بعد أفضل آلة للحلاقة ومن دون حُدوث أيّ تَهيُّج فيه.

#### مُسْتحلب بَلْسَم تُولُو

بَلْسم تُولُو ..... جزء صِبغَة كيلايا .....١٠ كُحول ٩٠ درجة ....٠٠٠٠ جزء ماء ساخِن ٧٨ جزء نَحُلّ بَلْسَم تُولُو في الكحول، نُضيف صِبْغة الكيلايا، ومن ثمّ الماء (١٨٨٤). نُحضِّر بالطُّريقة ذاتها مُستحلّبات بَلْسَم الكُوبايُو، والقَطْران، وزَيت الكاد.

#### مُستَحلب راتِنج الغَيّاك، حَليب عُود الأنباء

راتِنج غَيّاك .....الله غ صَمْغ عربيّ ..... ع ماء .....ماء على ماء ....

لُعاب صَمْع عَربتي ....لاع زَيت البلّادون ....١١٠٠ إلى ٢ غ شراب كلورهيدرات المورفين ٣٠٠٠٠٠ غ نُحضِّر مُستحلِّبًا من المادَّتين الأوليين، نُضيف المادة الأخيرة. اعتُمد هذا المُستحلب في حالات البرونشيت والسُّعال العَصَبيّة (قان دَن كُوريُوت).

Extraits, Evaporation du liquide extra-

بَعد الحصول على المُذابات العِلاجيّة، يَبقى أن نُبخِّرها. وإذا كانت كمِّيَّة إنتاجها تَتعلَّق بالطَّريقة المُتَّبعة في تَحضيرها بشكل أساسي، فإن نَوعيّة الإنتاج تَتعلّق بنوع خاصّ بطريقة التَّبخير. إنَّ هٰذه العَمليّة هي إذًا الأهمّ بلا مُنازعة. وفيما عدا المُستخلَصات التي تُحضَّر بالتَّبخير البسيط في المِحَمّ في صُحون، فإنّ كلّ المُستخلّصات الباقية تُحضّر بواسطة آلات مُعقّدة نوعًا ما. إنّ الطّريقة التَّحضيريّة القديمة الّتي كانت تُتمّ على النّار العارية أصبحت مُهمَلة تمامًا. فبتأثير الحرارة المُرتفِعة، وتأثير الهواء، كانت تَتَشكّل نسبة مُرتفِعة جدًّا من ال«مُسْتَخْرَج المتأكْسِج».

### تبخير في الهواء الطُّلق

يُمكن اللَّجوء إلى لهذه التَّقنية عندما يَتمَ الاستخراج بواسطة الماء؛ ولكن في كلّ حالات الاستخراج بالكحول أو بمزيج من الكحول والأثير، من المهمّ جدًّا استعادة الحال المُستعمَل قدر المُستطاع ولذلك فهو يُستخدَم في آلات تَسمح بتكثيف الحال بهدف استرداده.

إن التَّبخير في الهواء الطُّلْق أكثر ما يَتمّ في حمّامات مريم أو في دُنّات تسمح بَسَيلان البُخار في جوانب داخليَّة مُزدوجة. يَجِب تلافي التَّسخين على نار

مكشوفة لأنّها تَشوى المَوادّ التي تَتَرسّب م س ت خلال عَمليّة التَّبخير وتتثبَّت على جوانب الدَّنَّ؛ نُخفِّف من هذه السَّيِّئة بتركيز نظام آلي للخضّ يَحفظ المَوادّ المُترسّبة في سائل مُعَلِّق.

> آلات أخرى تسمح بالتّبخير في الهواء الطُّلْق بطريقة أكثر ملاءمة؛ نستعمل عَدَسات تُسخِّن داخليًّا بالبخار، تَستقبل السّائل الاستخراجيّ وتُبخّره بسرعة؛ ولكنّ التَّقنية الأكثر شيوعًا في المجال الصِّناعيّ تَقنيَّة الأسطوانات الرَّحَويَّة الدّائرة؛ تُسخَّن هذه الأسطوانات داخليًّا بواسطة بُخار؛ يَتوزَّع السّائل المُراد تَبخيره على سطحها بطبقة رقيقة ويجفّ بسرعة فائقة، فيفصل كاشيط ثابت المادة المُجفَّفة بشكل أوتوماتيكتى؛ تُملأ الأسطوانة الدائرة بالسائل بطرق مُختلِفة؛ فيمكن أن تُغَطَّس جُزئيًّا في خزّان يَحوي المُسْتَخْرَج؛ فينصبّ المحلول بطبقة رقيقة على الأسطوانة بواسطة الدُّوران، وعندما يَجفّ المحلول يُكْشَط بواسطة سِكّين مُثَبَّت؛ يمكن كذلك توزيع المحلول بواسطة مَغْرَز أنبوب الجَلْب الّذي يُسَاوَى على جَوانب الأسطوانة بواسطة مِدْحاة، وعندما يَجفّ المحلول يُكْشَط النِّتاج المُجفَّف بواسطة سكّين؛ هناك أيضًا أجهزة مُؤلّفة من مِدْحَاتين رَحَويّتين مُسَخِّنَتَين، تَدوران معًا باتِّجاهين مُعاكسين ويسيل المحلول، الَّذي يُوضع فَوقهما، في الفُسحة الحُرَّة بين المِدْحاتين المُتقاربتين نوعًا ما.

#### تبخير في المِحَمّ

يُوضع السّائل الاستخراجيّ بطبقة رقيقة على صَفائح مُسطَّحة بالأفضليّة؛ يَتمّ التَّبخير سريعًا ويأتي المُستخلَص على شكل شَذْرات؛ إنّ هذا الجهاز يَسمح بالعمل في الفراغ؛ يَتأمَّن التَّسخين بواسطة غِلاف مُزدوج يُسخَّن بالبُخار أو بواسطة قناديل ذات أشعَّة بَحت الأحم.

# ٢٦٨ مُستَخْلَصات كُحوليَّة أو مُستَخْلَصات هيدرو كحوليَّة

Extraits alcooliques ou Hydro-alccoliques (F)

#### مستخلص الحنظل المركّب Extrait de coloquinte composé (F)

١٥٠ غ	لَحْم (لُبّ) الحَنْظَل
۳۰۰ غ	أَلْوَة، صَبْر
١٠٠ غ	سَقَمونيا
٥٢ غ	هال مُسحوق
١٠٠ غ	صابُون حَيَوانتي
٤ ليترات	كحول ٦٠ درجة
	نَمرُث الحَنْظَل أوّلًا في
	نُمرِّر؛ نُضيف بَقيَّة المَو
طانيا).	بإضافة الهال في النِّهاية (بريه

إنَّ تركيب لهذا المُستخلَص يَختلِف باختِلاف الفَرْ ماكوبيات.

مُسهِّل قوي، ماسِط، مُدِرِّ السَّوائل. يُعطى على شكل بيلولات مُعيَّرة من ٠,٠٣ إلى ٠,١٥ غرام.

#### مُستخلَص جَوْز القَيء دستور ١٩٤٩ (F) Extrait de noix vomique Codex 1949

سُكّر الحليب .....كمّيّة كافية ماء مُقطِّ غال ....كمِّيّة كافية نَمرُث المسحوق لمدّة ٢٤ ساعة في ٨٠٠ غرام كحول، نَضعه في آلة تَقطير، نُضيف الكحول كما في عمليّة التَّأشين، بعد مُضيّ ٢٤ ساعة، نَدع السائل يسيل وننهى الاستنزاف ببقية الكحول المطلوب على أن نَضع جانبًا أوَّل ألف غرام من السّائل الحاصل. نُقطِّر السَّوائل لكي نَسحب منها الكحول على ألَّا نُضيف أَوَّل ألف غرام التي استُبعِدت إلّا في نِهاية العمليّة. نُبخّر الفُضالَة في وعاء صغير مُعيّر بالوزن حتّى إنقاص إلى حَوالى ١٥٠. نَسكُب هذه الفُضالَة في قارورة سعتها ١٥٠ ملل. نَغسُل الوعاء الصَّغير بواسطة ٥٠ ملل ماء مُقطّر غالٍ. نَجمع هٰذه المياه المُستعملَة للغسيل في قارورة. نَتركها تَبرد. نُحرِّك السّائل المائتي مع ٥٠ ملل أثير مع تَلافي تَشكيل مُستحلِّب، نَرفع الأثير ونُكَرِّر لهذه العَمليّة مَرَّتين أخريين. نرمى المحاليل المُؤثيرة التي تَحتوى بنوع خاص على مَادّة الحبوب الدَّسِمة. نُبخِّر السَّوائل المائيّة في حَمّام مَريم بحرارة أدنى من ٥٠°سغ، وبضغط مُخفَّف، ومن ثمّ في المِحمّ بطريقة

نَحصل معها على مُستخلَص جاف، يُسْحَق فيما بعد. نُجفِّف من جديد في المِحَمِّ ونَضع في قارورة مُقفلَة جيِّدًا.

المواصفات - نَحصل بذلك على مُستخلَص ذَرُوريّ، بُنِّيّ اللَّون، طعمه قَويّ المرارة، وهو اسْتِرطابيّ جدًّا، يُعطي مع الماء مُذابَة مُضطَّربة (دستور يُعطي مع الماء مُذابَة مُضطَّربة (دستور إنّ المُستخلَص الجافّ المُحدَّد يَجب ألّا يَحتوي إلّا على ١٦٪ من القِلَويْدات، وكذلك، لكي نَعرف كمِّية سُكَّر الحليب الواجب إضافتها للحصول على هذا العيار، من الضّروريّ تَحديد كمِّية القِلَويْدات العامّة الّتي يَحتوي عليها كما القِلَويْدات العامّة الّتي يَحتوي عليها كما يُشير الدستور إلى ذلك.

#### سام – جدول Toxique - Tableau A

الخصائص والاستعمال - مُهيِّج للمحور السّنجابيِّ البَصليِّ النُّخاعيِّ، يُستعمَل مُستخلَص جَوز القَيء في يُستعمَل مُستخلَص جَوز القَيء في الحالات الوَهْنِيَّة، ضَعْف الحَيويَّة، نَهَك نَفْسانيَّ، عَجز جنسيَّ، خَلْفَة. في بَرْشام، بيلولات بمقادير اعتياديَّة من بَرْشام، بيلولات بمقادير اعتياديَّة من ٢٠,٠٤ لجرعة ومن ٢٠,٠٤ لكلّ ٤٢ساعة. وبمقادير قُصوى من ٢٠,٠٤ لجرعة ومن ٢٠,٠٤ لكلّ ٤٢ساعة لجرعة ومن ٢٠,٠٠٤ لكلّ ٤٢ساعة (بالغون).

#### مُستخلَص الغاريقُون الأبيض (١) Extrait d'agaric blanc (F)

غاريقون أبيض مسحوق

بخشونة ...... ٢٠٠٠ غ كحول ٦٠ درجة .....

نَمرُث لمدّة ١٠ أيّام الغاريقون الأبيض في مِقدار ثلاثة أرباع كمّيّة الكحول؛ نُمرِّر مع العَصْر؛ نُصفّي. نسكُب على التُّفْل بقيَّة الكحول، وبعد مرور ٣ أيّام نَعصر من جديد ونُصَفّي. نَضُمّ الصِّبغَتين؛ نُقطِّرهما في حَمّام مَريم لسحب كافّة القِسم الكحوليّ منهما، ونُبخر حتّى قِوام المُستخلَص الرَّخُو (١٨٦٦).

الخصائص والاستعمال - مُضادّ للتَّعرُّق بمقدار ۰,۰۰ إلى ۰,۲۰ غرام؛ مُسهِّل قَويِّ بمقدار ۰,۳۰ إلى ۰,٦٠ غرام.

نُحضِّر بالطَّريقة ذاتها مُستخلَصات: الذُرَّاح، عُصارة الخَسَّ، الكُولُومْبُو، الخشخاش الأبيض (الجِراء)، الحَنْظَل، الزَّعْفَران، مَخاريط الجُنْجُل.

مُستخلص كَسْكارا سَغْرادا(۱)، مُستخلَص نَبْق سَغْرادا(۱)

Extrait de cascara sagrada (F)

قِشرة كَسْكَارا في مَسحوق نِصف دقيق (منخل ٢٦) ...... كحول ٦٠ درجة ......

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمؤلِّف.

م س ت

نبلل المسخوق بشكل متجانس بواسطة ٤٠٠غ. كحول. بعد ساعتين منِ المُلامسة في وعاء مُقفَل، نَضع الكُتلة في راؤوق. نُضيف الكحول وفقًا لقواعد التّأشين، وعندما يُبدأ الكحول بالسَّيلان، نُقفِل الفُتحة السُّفلي ونُغطِّي الآلة. نَترك لمرثٍ يَدوم ٢٤ ساعة. نُباشر التَّأشين مع ما بقى من كحول، ونَضَع جانبًا أُوَّل ألف غرام من السّائل. نُقطِّر السّائل الكحوليّ ولا نُضيف الـ ١٠٠٠ جزء المُستبعَدة جانبًا إلَّا في نهاية العمليّة. نُركِّز في حَمَّام مَريم حتّى ٥٠٠ غرام. نُبرِّد السَّائل، نُصفّى، نُركِّز مُستخلَص العُنْصُل أو الإشْقِيْل الفُضالَة تحت ضغط مُخفَّف ويحرارة أدنى من ٥٠°سغ، وحتّى المُستخلّص الجامد.

> المواصفات والخصائص - مُستخلَص قاتم اللُّون البُّنِّي، يُعطى مع الماء مُذابّة مُضطربة، مُرَّة جدًّا. وهو يَذوب بكامله تقريبًا في ٢٠ جزء كحول ٦٠ بالمئة. يُعطَى مُستخلص الكَسْكَارا كمسهِّل قوي ومُدِرّ للصّفراء بمقادير اعتياديّة من ٠,١٠غ. لجرعة واحدة ومن ٣٠,٠٠غ. لكلّ ٢٤ ساعة؛ وبمقادير قُصوى من ٠٥,٥٠غ للجرعة ومن ١,٥٠غ لكلّ ٢٤ ساعة، للبالغين (دستور).

> مقادير الفَرْماكوبيا الفَرنسيّة، للبالغين عن طريق الفِّم، مقادير اعتياديّة: ٠,١٠غ لجرعة واحدة، ٣٠,٠غ لكلّ ٢٤ ساعة؛ مقادير قُصوي: ٠,٥٠ للجرعة، ١,٥٠غ لكلّ ٢٤ ساعة.

يُعطى كدواء مُقوِّ مُرّ بمقدار ٠,٢٠ إلى غرام واحد في بيلولات.

كذلك يكون الأمر مع: «مُستخلَص الفُشّاغ» (دستور ۱۹۳۷) Extrait de salsepareille. وهو مُستخلَص رَخُو، يُعطى، إذا حُلَّ في مِقدار ١٠ مرّات وزنه من الماء، مُذابَة مُضطَّربة، تُعطى بالخض رَغْوَة دائمة. استُعمل هذا المُستخلَص كدواء مُنقِّ ضد السِّفلس، الرّوماتيزم، النِّقْرس: ٠,٢٠غ في دفعة واحدة، ٤ غرامات.

## Extrait de scille (F)

يَتم الحُصول عليه كذلك بالطّريقة ذاتها، بتَبْليل الـ١٠٠٠ غرام مسحوق مُسبقًا بواسطة ٢٥٠ غرام كحول. مُستخلَص رَخُو، مُحَمّر اللّون، حامِز الطَّعم، يُعطى مع الماء مُذابَة مُضطربة.

#### خطر جدول Dangereux - Tableau C

مُبوِّل قوي في البَيْلة الأزوتيّة Azoturie يُعطى في بيلولات بجرعات قُصوي (دستور): ٠,٢٠غ لجرعة واحدة، ٠,٥٠غ لكل ٢٤ ساعة (للبالغين).

#### مُستخلص الكُولا (جاف)

#### Extrait de kola (sec) (F)

حُبوب كُولا مُسحوقة ....١٠٠٠ غ كحول ٦٠ درجة .....كمِّيّة كافية

نُحضِّر لهذا المُستخلَص بتأشين الحبوب المسحوقة بشكل مناسب مع

كحول ٦٠ درجة حتى الاستنزاف الكامل. نُرَكِّز السُّوائل الحاصلة تَحت ضغط مُخفَّف وبحرارة دُنيا حتَّى القِوام المطلوب. نتابع التَّجفيف في المِحَمّ تَحت ضغط مُخفَّف من دونَ تَخَطِّي حرارة ٥٠ سغ أو بواسطة ال تَسْدِيْم (١) أو ال تَضْبِيْب (١): Nébulisation حتّى الحصول على مُستخلَص جاف.

وخلافًا لذلك، نسحق مع لاكْتُوز ونَنْخُل. نُعَيِّر الكافَيين ونُصحِّح إلى عيار ١٠٪ من الكافيين اللَّامائتي.

مَسحوق مُحمَر اللَّون البُّنِّي رائحته رائحة الكُولا، طعمه مُرّ وعَقول، يُعطى مع ١٠ مَرّات وزنه من الماء مُذابَةً مُضطربة جدًّا.

إنّ عيار هذا المُستخلص الجاف هو ضعف عيار المُستخلِّص الجامد، دستور . (%0) 1989

#### مستخلص مضاض أسود Extrait de fusain noir pourpré, Extrait d'Evonymus atropurpureux (F)

قِشرة وجَذْر مُضاض أسود

مُسحوقة (٢٦) .....١٠٠٠ غ كحول ٦٠ درجة .....٢٠٠٠ غ سُكَّر حليب مَسحوق ....٢٠ غ ماء مُقطِّر .....كمِّيّة كافية

نُبَلِّل مُسحوق المُضاض بشكل سوى بمقدار نصف وزنه من الكحول. بعد

ساعتين من البَلِّ في وعاء مُقفَل، نَضَع م س ت المسحوق في راؤوق. نُضيف الكحول وفقًا لقواعد التَّأشين ونَتركه مَمروثًا لمدّة ٢٤ ساعة. نُنهى العمليّة بواسطة ما بقى من الكحول على أن نَضع أُوَّل ألف غرام من السّائل جانبًا.

> نُقطِّر السوائل الكُحوليّة الحاصلة هكذا على ألّا نُضيف الـ١٠٠٠ غرام المُستبعدة إلَّا في نهاية العمليّة؛ نُصفّى فُضالَة التَّقطير ونُبخِّر في حَمَّام مَريم حتى قِوام المُستخلَص الرَّخُو، بحرارة أدنى من ٤٥°سغ وفي ضغط مُخفَّف.

> نَستعيد بالماء المُقطَّر، نُصفِّي ونُبخِّر من جدید فی حَمّام مَریم حتّی قِوام المُستخلص الجامد قليلًا. عندها نُضيف سُكَّر الحَليب المسحوق، نَمزُج جيِّدًا ونُنْهِي التَّجفيف في المِحَمّ. نسحق النَّاتِجِ المُجفَّف، ونَحفظه في قارورات جافَّة تمامًا نُقفِلها بإحكام.

المواصفات - مُسحوق فاتح اللّون البُنِّي، طعمه خفيف المرارة، يُعطي مع الماء مُذابَة شبه صافية بُنِّيَّة اللَّون.

الخصائص والاستعمال - يُستعمَل كمُسهِّل وكمُفْرز للصَّفراء، في بيلولات وفي جُروع بمقادير اعتياديّة من ٠,٠٥غ إلى ٠,١٠غ للجرعة الواحدة، وبمقادير قُصوي من ٠,١٠غ لجرعة واحدة وإلى ٠٠,٢٠غ لكل ٢٤ ساعة (للبالغين).

<sup>(</sup>١) التَّسمة للعولَّف.

#### Extraits fluides (F)

#### مستخلص الكوكا المائع Extrait fluide de coca (F)

أوراق كُوكا مسحوقة نِصف

کحول ۵۰ درجة كافية

دقيقة (٢٦) .....١٠٠٠ غ

نُرطِّ المسحوق بشكل سَوي بواسطة ٤٢٥غ كحول. بعد مُضى ساعتين من البَلِّ في وعاء مُقفَل، نَضعه في رَاوُوق. نُضيف الكُحول، وفقًا لقواعد التَّأشين، ونتركه مَنقوعًا لمدّة ٤٨ ساعة. نُتابع العَمليّة كما هو مَذكور في تَحضير مُستخلَص الزُّعرور المائع، باستعمال كحول ٥٠ درجة، بطريقة نَحصل معها على ١٠٠٠ غرام من المُستخلَص المائع الَّذي نَتركه يَرتاح طوال ٤ أيَّام في مكان بارد ونُصفّي.

المُواصفات - سائل مُصفر اللّون البُنِّي، طعمه مُرّ وعِطريّ؛ إذا حُلَّ في ١٠ أجزاء من الماء، يَضطرب بقوَّة، لم يَعُد واردًا في دستور ١٩٦٥. مُستخلَص الكوكا المائع يَجب أن يَحتوي على حَدّ أدنى ٠,٥٠٪ من القِلَويْدات العامّة الّتي تَذُوبِ في الأثيرِ.

#### يظام الجدول Régime du Tableau B

الخصائص والاستعمال - مُستحضر كان يُستعمَل كدواء مُقوِّ ومُزيل مَوضعيّ للألم ضدّ ألم المَعِدة بمقادير اعتياديّة من

٠٠,٥٠غ للجرعة الواحدة ومن ٣غ لكلّ ۲٤ ساعة، وبمقادير قصوى (كودكس) من غرام واحد للجرعة، ٨غ لكلّ ٢٤ ساعة (للبالغين). (غرام واحد يُساوى ٥٤ نقطة).

#### مُستخلَص الكُولا المائع Extrait fluide de kola (F)

حُبوب كولا مسحوقة دقيقة

(منخل ۲٤) .....(۲٤ غ كحول ٦٠ درجة .....كمِّيّة كافية نُرطِّب المُسحوق سَويًّا بواسطة ٥٠٠ غرام كحول ٦٠ درجة. بعد ساعتين من البَلِّ في وعاء مُقفَل، نَضعه في راؤوق. نُضيف الكحول تبعًا للقواعد المُتَّبعة في التَّأْشِينِ؛ نَتِر كه مَمْ وثًّا لمدّة ٤٨ ساعة.

نُتابع العمليَّة كما هو مَذكور في مُستخلِّص الزَّعرور المائع مع الانتباه إلى استعمال كحول ٦٠ درجة لإيصال وَزْن المُستخلَص إلى ١٠٠٠ غرام. نَترك للرّاحة لمدّة ٤ أيّام ونُصفّى. نُصَحّح إلى ١,٢٥٪ من الكافيين، ١,١٥ إلى ١,٢٥٪ من الكافيين اللّامائي.

المُواصفات - سائل قاتم اللّون الأحمر، طعمه مُرّ وعَقول. إذا خُفِّف في ١٠ أجزاء ماء، يُعطي راسبًا مُصفرٌ اللُّون البُنِّي: إذا صُفِّي، نَحصل على سائل مُحمَر اللُّون الأصفر يَترسَّب بوفرة إذا أضفنا إليه العَفْص.

الخصائص والاستعمال - مُنَشِّط ومُقوٍّ قَلبيّ بمقدار غرام واحد إلى غرامين في

جَروعات، خُمور مُرَكَّبة. (غرام واحد يُساوى ٥٥ نُقطة).

٢٧٠- مُستخلَصات مائيَّة

Extraits aqueux (F)

مُستخلَص الأَفْيُون، لُودانُم صُلْب Extrait d'opium, Extrait thébaïque, Laudanum solide (F)

أفْيُون مَخزَنيّ ٠٠٠٠٠ غ ماء مُقطِّر .....

نُقطِّع الأَفْيُون إلى شرائح رقيقة جدًّا ونُقسِّمه في مِقدار ثُلثَي الماء المُقطَّر جَروعات، شراب سُكَّريّ. البارد حتى نَحصل على مَرَق خفيف. نَمرُث لمدّة ٢٤ ساعة، نُمرِّر بالقماش ونَعصُر؛ نُكرِّر العمليَّة من جديد مع ما بَقى من الماء؛ بعد مُضى ١٢ ساعة، نُمرِّر مع العَصْر؛ نَضُمّ السُّوائل، نُصفّي ونُبخًر في حَمام مَريم حتى قِوام المُستخلص الرَّخُو. نَستعيد لهذا المُستخلَص بحوالي ١٠ مَرّات وَزنه من الماء البارد، نُذوِّب، نَترك للتَّركيد؛ نُصفّى ونُبخِّر نهائيًّا إلى المُستخلّص

> المواصَفات والاستعمال - مُستخلّص مُحْمَرٌ اللُّون البُنِّي، مُغْثي الرّائحة الَّتي تُذَكِّر برائحة الأفْيُون. إذا حُلُّ في مِقدار ١٠ مَرّات وَزنه من الماء المُقطّر فإنّه يُعطى مُذابَة مُعتَكِرة بَعض الشَّيء.

لهذا المُستخلَص يَجب أن يَحتوي على ٢٠٪ من المُورفين (اتِّفاق دُوَلتَ). وفي

كلّ حال، إذا كان يُحوي أكثر، يُعاد م س ت إلى العيار المطلوب بإضافة الكمّيّة الضَّروريّة إليه من مُستخلّص يكون عياره أخفّ، أو، بعدم وجود هكذا مُستخلَص، إضافة مُستخلَص الثيّل. ومن ثمّ نُعيِّر الماء، والمُستخلَص المائيّ الكلستي، والمُورفين، كما هو مذكور في دراسة «الأفْيُون المَخَزنيّ».

> يَعمَل مُستخلَص الأَفْيُون بنوع خاصّ بواسطة المُورفين الّذي يَحتوي عليه. وهو يُستعمَل كدواء مُضادّ للإسهال أو كدواء مُسكِّن للسُّعال في بيلولات،

مُخَبِّل - جدول Stupéfiant-Tableau B

طريقة الاستعمال - المقادير الاعتياديّة للبالغين عن طريق الفم والشُّرج ٠,٠٢ إلى ٠,٠٠ غرام لجرعة واحدة ولكل ٢٤ ساعة؛ المقادير القُصوى ٢٠,١٠غ. للجُرعة الواحدة، ٠٠,٢٥غ. لكلّ ٢٤ ساعة. للأولاد عن طريق الفَم والشَّرْج نَتلافي لهذا العِلاج من عمر صفر إلى ٣٠ شهرًا. ٠,٠١ غ إلى ٠٠,٠٥غ. من ٣٠ شهرًا إلى ١٥ سنة ولكلّ ٢٤ ساعة.

إنّ هذه المقادير الولّاديّة لم تَعُد مُعتمَدة في الإصدار الأخير للفَرْ ماكوبيا.

مستخلص الراتانيا

Extrait de ratanhia (F)

جَذْر الرّاتانيا المسحوق دقيق

(منخل ۲۶) .....۱۰۰۰ غ

777

م ص ط

ماء مُقطَّر .....٨٠٠ غ

نُحضِّر مَرْثًا أَوَّليًّا بمقدار ٥٠٠٠ غرام من الماء لمدَّة ١٢ ساعة. نُمرِّر بالعَصْر. فُرِخًا نُحضِّر من الثُّفُل وما بقي من الماء مَرْثًا ثانيًا طوال الفَترة ذاتها. نَجمع السّائلين، نَجعلهما يَغليان، نُصفيهما وهما ساخِنين. نُبخِّر حتى قِوام المُستخلص الرَّخُو، في حَمَّام مَريم بحرارة أقل من ٥٠ سغ، وبضغط مُخفَّف، ونُتابع التَّجفيف في المِحجم، بطريقة نَحصل معها على مُستخلَص جافّ.

المواصفات - مُستخلَص أحمر اللَّون البُنِّي، طعمه عَقول جدًّا، يُعطي مع الماء السّاخن بنسبة ٥٪ (وزن على حجم) مُذابَة صافية تَعْتَكِر بالتَّبريد.

الاستعمال - شراب الرّاتانيا السُّكَّريّ. تحاميل من مُستخلَص الرّاتانيا (دستور ١٩٤٩). يُستعمَل هٰذا المُستخلَص كدواء قابض ورَقُوء بمقدار ١٠,٥٠ إلى ٣غ في بيلولات، جَروع، تحاميل.

۲۷۱ مُصْطَقَى، مُصْطَكَاء، رَاتِنْج
 المُصْطَكَاء، كمكام

Mastic, Résine de mastic (F) Resina lentisci (S)

المُصْطَقَى هو رَاتِنج يَسيل من حَزّات تُجرَى على سُوق وأغصان البُطْم الشَّرقي: Pistacia lentiscus، في الشَّرق واليُونان وبنوع خاص في شِبه جزيرة يُونانيّة تُدعى شِيتُو ويَدْعوها الأتراك

جزيرة العِلْك أو جزيرة المُصْطكاء: Sachis adassina أمّا القُرى الّتي يَهتم أهلُها حَصْرًا بجمع ذلك الرّاتِنج فتُدعى قُرى العِلْك أو المُصْطكاء: قُرى العِلْك أو المُصْطكاء: Masticochôra والبُطْم الشَّرقيّ أو بُطْم المُصْتَكي هو شَجَرة صغيرة من الفُسْتُقِيَّات وفَصِيلَة البُطْميَّات تَشيع طُوعيًّا على الجِزام السّاحليّ اللّبنانيّ.

دُموع صغيرة بَيضانيَّة الشَّكْل مُصفَرَّة اللَّون، نِصف شفّافة، عَذْبة الرّائحة، تَلين وتَرتَخي تَحت الأسْنان تاركة طعمًا عِطْريًّا خَفيفًا.

يعود اسم هذا الرّاتِنج إلى الماضي حيث كان يُستعمل جدًّا كعلك لتعطير النَّقَس وتقوية اللَّثة. العَرَب يَستعملونه حتى اليوم للهدف ذاته وللوقاية من داء الحَفَر. وهو في ذلك يُستعمل نَقيًّا أو مُشترِكًا مع مَواد أخرى. وتُستعمل نَقيًّا أو نُقاعة المُصْطكاء في الشَّرق ضِدّ الإسهال عند الأولاد في فترة بُروز الأسنان؛ ويُستعمل في اليُونان على شكل ويُستعمل في اليُونان على شكل لصُوقات (Krasocôma) تُصنَع من النَّبيذ الأحمر ومن الخُبْز.

المُواصَفات - المُصْطكاء لا يَذوب في الكحول سوى جُزئيًّا، ولكنَّه يَذوب بكامله في دُهْن التَّرْبَنْتين، والأثير، والبَنْزين؛ قليل الذَّوبان في سُولفور الكربون، لا يَذوب في الحامِض الأستيك وفي الصود الكاوي. الكحول على درجة يَحل منه على البارد تِسعة أعشار (٩/١٠) وَزْنِه من راتِنج (هو

مَزيج من حامِض مَسْتِسِيْك، وحامِض مَسْتِكولِيْك، وحامِض مَسْتِكُونِيْك) ويَترك مادّة بيضاء، لَدْنَة قابلة للسَّحْب، تَذوب في الأثير وفي الكحول الغالي، تُدعى مَسْتِسِيْن.

إنّ المحلول المُؤثير يُشكّل ما يُسمَّى فأودُنْتُويد بيلارد لِتَرصيص الأسنان. ولأجل ذلك نُشَرِّب منه قُطْنَة صغيرة ونُدخِلها في السِّنّ المُجَوَّف؛ عندما يتبخَّر الأثير، يترك كُتْلَة جامِدة. إنَّ محلول المُصْطكاء في الغُريَّاء هو الأفضل. إنّ ما يُسمّى مِلاط تَاڤو الأنسِدادي: Ciment oblitérique هو المحلول ذاته يُضاف إليه الألمينيوم اللّامائيّ.

إذا صَنَعْنا كُتلَة بيلُوليّة من ٣٢ غرام مُصْطَقَى دُموع ومن كمِّيّة كافية من شراب السُّكَر، وقَسَّمْنا الكُتلَة إلى ٦٤ كُريَّة أو إلى ١٢٨ بيلُولَة هي البيلولات التي أوصِيَ بها ضِدّ سَلَس البَوْل اللَّيليّ، يُمكن استبدال الشَّراب بالعسل الذي يُمكن عمنه دواءً عَسليًّا يُعطَى في خُبْز فطير Azyme.

يُمكن استخدام المُصْطَقى لتَلبيس البيلولات.

في عالم الفُنُون، يُستخدَم المُصْطَقى لصُنع أنواع البَرْنِيق.

البُطْم الشَّرقيّ يَشيع جدًّا في الجزائر، تَحتوي ثماره على ٢٠ إلى ٢٥٪ من زَيت دَسِم أخضر اللَّون، يَستعملُه العَرَب في التَّغذية والإنارة. وتُصنَع من مُستخلَصه

۱۷۷۲ مُضَاض أَسْوَد، مُضَاض أَرْجُوانيّ Black spindle tree, Purple spindle tree, Prick-wood, Wahoo (E)

Fusain noir, Fusain pourpré, Fusain d'Amérique (F)

Schwarzspindelbaum, Purpurspindelbaum, Pfaffenhütchen (D)

Evonymus atropurpurea, Euonymus atropurpureus (S)

جَنْبَة صغيرة مُعَمَّرة من فَصِيلَة القَاتِيَّات تَعلو من ٩٠ إلى ٢٠٠سم. أوراقُها بَيضويّة الشَّكُل، حادّة الرّأس، دَقيقة التَّسنِين، صَفَحاتها السُّفلى خَمْلِيَّة الرَّغَب النّائم. أزهارُها صغيرة القَدّ، أرجُوانيّة اللَّون، من ٧ إلى ١٥ زَهرة في سَنَمات مُتفرَّعة إبْطيّة الارتكاز، تُزهر في حُزيران. ثمارُها عُلَيبات رُباعيّة الفُصوص، قِرمزيّة اللَّون، كذلك أريْل الفُصوص، قِرمزيّة اللَّون، كذلك أريْل البزور. مَهدُها أواسِط أمريكا. مادَّتها الطبيّة هي قِشرة الجُذور التي يُطلِق الطبيّة هي قِشرة الجُذور التي يُطلِق عليها هُنود أمريكا اسم "وَاهُو" Wahoo ويَعتبرونها دواء لا يُضاهي ضِدَّ أمراض الكَبِد وضِدَ الاسْتِسقاء.

الخصائص والاستعمال - مُسَهِّل قَويِّ للمَّفواء، مُقَوِّ لعَضلات المَعدة والأمْعاء، يُستعمَل في حالات الإمساك العادية، وبالأخص عند الذين يَشكون من حالات العجز الصَّفراويّ.

المُرَكِّبات - بَيَّنَت التِّحاليل المِخبريَّة التي قام بها عدد من العُلماء الأمريكيين

أنّ قِسْرة جذور المُضاض الأسود تَحتوي، على مَن بين ما تَحتوي، على هيتروسيد خاص قابِل للتَّبَلُّر دعاه وَنْزَل إيقُونيمِيْن، وعلى حامِض إيقُونيك. وتَبَيَّن حَديثًا أنّ في القِشرة عِدة كَحولات منها اله إيقُونيمول، أَتْروبُورُول، إيقُونيسْتَارُول... الدُّولْسِيت الذي كان يُسمَّى في الماضي إيقُونيمِيت، حامِض سارُوتِيك، سُكَّر، بقايا زَيت، إلخ.

ولقد تَحقَّق الأطبّاء الأمريكيُّون بأنّ نقيع قِشرة الجُذور هي أفْعَل من قِشرة الأغصان والفُروع وقالوا بأنَّه من المُفيد إبدال النَّقيع المَذكور بمُستَحضر أطلقوا عليه اسم إيقُونيمِين Évonymine. هذا، ويُسلِّم الأمريكيُّون مُستحضراتٍ مُختلِفة الخصائص والمَظْهَر بذلك الاسم عَينه يمكن توزيعها في مَجموعاتٍ ثَلاث يُمكن توزيعها في مَجموعاتٍ ثَلاث مُستخلصات الأبحاث الفرنسيَّة أنها مُستخلصات مائيَّة كُحوليّة، وبأنّ أفْعَلها وأنْفَعها هو الإيقُونيمين البُنِّي المُستخرَج من المُضاض الأسود، وهو الذي يُفضَّل من المُضاض الأسود، وهو الذي يُفضَّل استعماله على سواه، والذي كان مُسجَلًا

المَقادير - تَختلِف جُرعَة المُستخلَص المَائِيّ الكُحوليّ أي الأيقُونيمين البُنِّي من ١٠٠٥ غرام. نُضيف إلى ١٠٥٥ غرام. نُضيف إلى هذه المقادير أحيانًا كمِّية خَفيفة من مُستخلَص البَنْج. المقادير الاعتياديّة التى يُعطيها الكُودَكُس هي ١٠٠٥ غرام

إلى ١٠،٠ غرام لجُرعة واحدة والمقادير القُصوى تكون من ١٠،٠ غرام للجرعة و ٢٠،٠ غرام للجرعة و ٢٠،٠ غرام لكل ٢٤ ساعة للكبار، أمّا بمقادير قَويَّة فيُصبح هذا المُستحضر ماسِطًا أي مُسهِّلًا عنيفًا كما يكون له عملٌ سامٌ على القَلْب. إنّ الأنواع عملٌ سامٌ على القَلْب. إنّ الأنواع التَّداؤبِيَّة للمُضاض الأسود هي الألْوَة أي السَّوْلَع، الرّاوَنْد أي الرّيباس، قِشر عَنْبَر أي الكرُوتُن العَنْبَريّ، والهُودُوفيلُن.

الله مُشَاض أورُوبِّيّ، مُضَاض مَبْذُول – ۲۷۳ European spindle tree, Priests'cap (E) Fusain d'Europe, Fusain commun, Bois à lardoire, Bonnet carré, Bonnet de prêtre (F)

Europaïsche spindelbaum, Pfaffenhütchen, Priester kappe, Barett (D)
Evonymus europæus, Evonymus vulgaris (S)

جَنْبَة مُعَمَّرة من فَصِيلَة القَاتِيَّات تَعلو من ٢ إلى ٤ أمتار. لحاؤها مالِس، مُخضَر اللَّون، فُروعها الفَتيّة مُربَّعة الزَّوايا. أوراقها مُعبِلَة، مُتقابلة، قصيرة الأعناق، سِنانِيَّة، دَقيقة التَّسْنِين، بَحريَّة اللَّون على صَفحاتها السُّفلَى، صفراء أو حمراء اللَّون في الخريف. أزهارها باهتة اللَّون الأخضر، ٢ إلى ٤ زَهرات في خَيْمات كاذِبة، مُنتصِبة الزِّناد على إبط الأوراق في الفُروع الزَّهرِيّة. ٤ إلى ٥ كأسِيّات وبَتَلات وأسْدِيَة. الشَّمرة عُلَيْبَة كأسِيّات وبَتَلات وأسْدِيَة. الشَّمرة عُلَيْبَة اللَّب، مَرْجانيّة اللَّون الوَرديّ، حُجراتها اللَّب، مَرْجانيّة اللَّون الوَرديّ، حُجراتها ٤ أو ٥ تَضمّ ٤ إلى ٥ بُزور بُرتُقاليّة اللَّون الوَرديّ، حُجراتها ٤ أو ٥ تَضمّ ٤ إلى ٥ بُزور بُرتُقاليّة اللَّون الوَرديّ، حُجراتها ٤ أو ٥ تَضمّ ٤ إلى ٥ بُزور بُرتُقاليّة اللَّون الوَرديّ، حُجراتها

الأصفر. الرّائحة مُغْثِيَة غير مُستحبَّة. طَعم الثِّمار حامِز ومُغثِ. الأقسام المُستعملة البزور والأوراق والقُشور.

المُرَكِّبات - عَفْص، مَوادٌ دَسِمة، حَوامِض عُضويّة، قيتامين «ث»، خضابات، قِلَويْدات. وَجَد Kubel خضابات، قِلَويْدات. وَجَد Cambium خضابات، قِلُويْدات. وَجَد Cambium مادَّة سُكَّريّة دَعاها إيقُونيمِيت وهي مادّة مُتَجازِئة المَنِّيت أو مُشابِهة للدُّولْسِيت حَسب جِيلْمَر. وتَحتوي الشَّجرة على إيقُومُونُوسِيد وهو هيتروسيد مُقوِّ للقَلْب يَنصه ر عند ٢٤٠ سغ، تَركيبُه للقَلْب يَنصه ر عند ٢٤٠ سغ، تَركيبُه للقَلْب يَنصهر عند ٢٤٠ سغ تَركيبُه للقَلْب يَنصهر عند ٢٠٠ سغ تَركيبُه للقَلْب يَنصهر عند ٢٠٠ سغ تَركيبُه للقَلْب. دَيله مُقوِّ المَقْلِ المَدَّلِية مَدَركيبُه المَدَّلِية وَيُوسِيد كذلك مُقوِّ للقَلْب.

الاستعمال - الجَرَب، التَّقَمُّل، القُوحَة (الجِلديّة).

الخصائص - مُدِرّ للصَّفراء، مُنظِّف، مُقيِّئ، مُبيد للحَشرات، مُسهِّل عنيف، مُزيل احتقان الكَبد والمَرارة.

طريقة الاستعمال - نَفرُك المكان المُصاب بالنَّعنع الغَض ومن ثمّ نَغسل المُصاب بالنَّعنع الغَض ومن ثمّ نَغسل المكان أو نَمسحه بنقيع ١٥ غرامًا من ثمار المُضاض في ليتر ماء يُغلى ٤٥ دقيقة ومن ثمّ يُضاف إليه كُوب من الخَلّ. في مُعالَجة القَمْل، يُقص الشَّعْر الجلْد الذي يُسبِّه القَمْل، يُقص الشَّعْر قصيرًا، يُزال الوَبْر ومن ثمّ يُغسَل المكان بشمْبوان مُحَضَّر من نَقيع ٥٠ غرامًا من الثَّمار المجقَّفة في ليتر ماء غرامًا من الثَّمار المجقَّفة في ليتر ماء

يُضاف إليه كوبٌ من الخَلّ ويُغلى ١٠ دقائق. لقُرحَة البَشَرة نَغسل بلُوسيون من خَلّ المُضاض الذي نُحضِّره من نقيع ٨٠ غرام أوراق في ليتر خَلّ يُغلى ٥ دقائق، يُغطَّى ٥ دقائق ويُمرَّر.

مُلاحظات - المُضاض سامٌ بكلّ أقسامه لذلك يُخَصَّص للاستعمال الخارجيّ فقط. ولقد أبرزَت ذلك الدِّراسات الفَرْماكُولُوجيَّة لدرجة أنّها ذَكَرَت انْزعاج الخَرّاطين الذين يَعملون في خشبها من جَرّاء تَنَشُّقِهم لنشارة الخَشَب الطّازجة. أمَّا خَشب المُضاض الذي يُفَحَّم في وعاء مُقْفَل يُعطي فحمًا الذي يُفحَّم في وعاء مُقْفَل يُعطي فحمًا الفَحْمييَّة التي تحمل اسمه آقلام الرَّسم الفُدامي جَهلوا الخصائص ولكنّهم القُدامي جَهلوا الخصائص ولكنّهم انكبُّوا على وَصْف عوارض التَّسمُّم التَّسمُّم ومعالجتها.

#### Opiate (E) مَعَاجِيْن الأَفْيُون - ٢٧٤ Opiats (F)

إنّ القُدماء يَعنُون بكلمة Opiat بنوع خاصّ، وكما سنرى ذلك في كلمة خاصّ، وكما سنرى ذلك في كلمة Electuaire أي مَعجون عَسَليّ، يَعنون صنفًا من المَعاجين العَسَليّة الّتي يَدخل في تركيبها الأفْيُون. إنّ لهذه التَّسمية لم يَعُد لها اليَوم أيّ مَعنًى دقيق: فهي تَسمية تُطلَق تارةً على مُستحضرات لا تَختلِف بشيء عن المَعاجين العَسليّة، وطورًا بشيء عن المَعاجين العَسليّة، وطورًا على أمْزِجة بسيطة قِوامُها قِوام العَجينة الرَّحْوَة الّتي تَخلو من أيّ شيء يمكنه أن

189

180

يُميِّزها أو يُلحِقها بمجموعةٍ ما من التَّركيبات الدَّوائيّة، سوى أنَّها تُخَصَّص دائمًا للاستعمال الدّاخليّ.

التركيبات التالية هي لذكرى التاريخ.

مُسَهِّل قَويّ	مَعْجُون أَفْيُون طارِد للحُمَّى
٥٢١غ	كينا
٠٦ غ	جَلَب
٤٦٠	مُعلَّب الوَرد
كمِّيَّة كافية	شَراب الشيكورية المُركَّب
	مَعْجُون أَفْيُون طارد لللُّود
١٥ غ	أثيو بس (١) مَعدنيّ
٤١٥.	بُزور دَاذِي
١٥٠ غ	بُزور فَيْجَن
د ۱٥	نُ ور أُسُنت

برور فيجن بُزور أَبْسَنت ١٥.....١٥ غ بُزور حشيشة الدّود ١٥.....كمّية كافية شراب الأبْسَنت السُّكَريّ كمّية كافية يُؤخَذ منه غرامان صباحًا ومساءً مع نقيع مَغليّ من السَّرخَس الذَّكر.

## 

(۱) أثيريس Ethiops: من كلمتين يُونانيَّتين بمعنى أثيرييّ أي حَبشيّ وأحْرَقَ. وهو اسم كان يُطلَق في الماضي على بعض الأوكسيدات أو السولفورات الممعدنيّة، بسبب لونها الأسود. Ethiops

نُعطِّر بكمِّيّة كافية من دُهن النَّعْنَع. يُؤخَذ من ٨ إلى ١٦ غرامًا في اليوم، مع خبز فطير.

#### مَعْجُونَ أَفْيُونَ مُضادّ للتَّعْقِيبة (كليرك)

كَبابَةكبابَة
كُوباهُوكُوباهُو
كاشو مُسحوق٥غ
مُعَلَّب الوَرد (مربّى)كمِّيّة كافية
يُؤخَذ مَرَّتين في اليوم، بقدر البُنْدُقة
يُؤخَذ مَرَّتين في اليوم، بقدر البُنْدُقة كلّ مَرَّة، في خُبز فَطير؛ أو يُؤخَذ
مُقَسَّمًا إِلَى ٨٠ كُرَيَّة : ٤ إِلَى ٦ في اليَّوم.

# مَعْجُون أَفْيون مُنَظِّف أسنان، مَعْجون أَفْيُون مُنظِّف أسنان بالمرجان، دَواء عَسَليِّ مُنَظِّف أسنان

١٢٥	مَرْجان أحمر
خ ۳۰ Seic	عَظم حُبّار أي سَبّيدج he
٤٦٠	كريما التَّرْتَر (دُرْدِيّات)
۴	قِرْمِز
۲ غ	Çâ
۴۰۰غ	عَسَل أبيض

نَسْحَق القِرْمِز مع الشَّبِ في قليل من الماء، نُضيف العَسَل، ومن ثمّ بَقيَّة المَواد في مسحوق دقيق، ونُعطِّر أخيرًا حسب المُراد (دُهن القرنفل أو دُهن النَّعنع).

كان دستور أدوية ١٨٨٤ يُعطي التَّركيبة التَّالية:

مَسحوق مُنظِّف أسنان حامِض ٤٠٠٠ غ

مغ ا	مَعْجُون اللَّوز العَسَليِّ المُعَلَّب، إعداد	غليسّرين مَخزَنيّغليسّرين مَخزَنيّ
	اللوز	عَسل أبيضعَسل أبيض
	لَوزِ حُلو۲۵۰ غ	
	سُكِّر	يُعطي عددٌ كبير من كُتُب الوَصْفات،
	صَمْغ عَربيّ عَ	وَصْفَات لا تَحْتَلِفُ عَنِ التَّركيبتينِ
	نُحضِّر مُعجونة مُتَجانسة.	السّابقتين سوى بإضافة المُرّ، وصَمْغ اللَّك، والحَجَر الخَفّان، أو باستبدل
	إنّ خليط اللُّوز يُحضَّر بحَلّ ٦٠ غرامًا	العسل بشراب التوت السُّكَري، أو
	من هٰذا المُركَّب في ١٠٠٠ غرام ماء فاتر	أخيرًا بإلغاء عُنصُر أو إثنين من العناصر
	وتمرير السّائل.	المذكورة أعلاه. المذكورة أعلاه.
	أعطى جيوردانو، باسم زُبْدَة اللَّوز،	
	التَّركيبة التّالية:	مَعْجُون الكُوباهُو الأفْيُونيّ
	وَثَن لَوز خُلو (خَشَب الثَّمرة) ٤٠ غ؛	كُوباهُو كُوراهُو
	سُكُّر ٤٤ غ؛ ماء زَهْر البُرتُقالِ ٨ غ.	كُسْبَة لَوز حُلو٥ غ
	سَاوْندَرْز يُضيف إلى ذلك زَيت اللَّوز.	سببه تور حنو
	Glycéré (F) مُغَلْسَرَة -۲۷٦	۲۷۵ معجون عَسَليّ       Eléctuaire (F)
	مُغَلْسَرة بكلورات البُوتاسيوم	مَعْجُون عَسَليَ عِطريّ ، إعداد عِطريّ
	كلورات البُوتاسيوم ٢غ	قِرْفَة ع
	غليسرين١٠٠٠ غ	جَوز الطِّيب
	أشار البَعضُ إلى مُغَلْسَرة عُشْرِيَّة	
	(١/١٠)، ولكنّ كلورات البُوتاس لا	كَبْشْ قَرَنْفُل
	تَنْحَلُّ عند لهذا الْمِقدار وتبقى مُعَلَّقة في	هال
	المحلول.	زَعْفَران٢ع
	مُغَلْسَرة كادِيَّة (دكتور بروك)	طَبْشور مُحَضَّر٤٨٠ غ
		طَبْشُور مُحَضَّر
	مُغَلْسَرة كادِيَّة (دكتور بروك)	سُكَّر ٧٤٠غ
	مُغَلْسَرة كادِيَّة (دكتور بروك) زَيت الكاد الحقيقيّناكاد الحقاقيّ	سُكَّر ٧٤٠غ نَصنَع مَسحوقًا نُحضًر بواسطته، وعند
Ą.	مُغَلْسَرة كادِيَّة (دكتور بروك) زَيت الكاد الحقيقيّ ١٠٠ غ مُستخلَص پاناما المائعاع	سُكَّر ٧٤٠غ

کحول ۹۰۸غ	حامِض سالِسيليك غ
نَمزُج.	دُهْن كَبْش القَرَنْفُل١٠ غ
مُغَوَّل السِّنْكُونِين، صِبْغَة السِّنْكُونِين	مُغَلْسَرَة كادِيَّة خفيفة
Alcoolé de cinchonine	غليسَّرولة النَّشاء٨٨ غ
سُولفات السِّنْكُونِين٠٠٠ غ	مُستخلَص پاناما المائع٢ غ
كحول ٨٦ درجة ٣٠	زَيت الكادناغ
نُذوِّب.	0.0
	مُغَلْسَرة كلسِيَّة
مُغَوَّل المُورِفِين، صِبْغَة المُورِفين، مُذابَة	هِيدرات الكلس ع
المُورفين الكُحوليّة	أثير كلورهيدريك مُكَلْوَر٣ غ
Alcoolé de morphine	_
أستات المُورفينا	غليسًرين ١٥٠غ
كحول ٥٦ درجة٤ غ	ضِدّ الحُروق.
نُذوِّب، يَحتوي هذا المُغَوَّل على	مُغَلْسَرة مُكَوْفَرَة
٠,١٠ غرام من أستات المُورفين في كلّ	ماء حَياة مُكُوفَر، غليسَّرين بالتَّساوي
٤ غرامات منه، كما هو الحال في	44.5
محلول المُورفينِ المائيّ لدى	Alcoolé (F) مُغَوَّلُ -۲۷۷
Magendie، ولكنَّه يُحفِّظ بشكل أفضل	
منه. مِقداره كما في مُستحضَرات اللُّودانُم.	مُفَوَّل الإيلاتَرِين، صِبْغَة إيلاتَرين مُورُّوس Alcoolé d'élatérine
مُغَوَّل النُّشادِر، رُوح مِلْح النُّشادِر الخَمرِيّ النُّشادِر الخَمرِيّ Alcoolé d'ammoniaque	إيلاترين
نُشادِر سائلاغ	
كُحول ٩٠ درجة	كوبُ ماءٌ مُسَكَّر، كمُسهِّل قَويّ.
مُهَيِّج، مُعَرِّق قَويّ، من ٢٠ إلى ٤٠ نُقطَة في سَوّاغ مُلائم.	مُغَوَّل الحامِض الكلورهيدريك، رُوح مِلْح مُلَطَّف، كُحول كلورهيدريك
إنّ ليكور دْزُونْدِي النُّشادِريّ: Spiritus	Alcoolé d'acide chlorhydrique
ammoniaci caustici dzondii کان بمثابة	حامِض كلورهيدريك ٢٢°١ غ

هذا المُستحضَر تَقريبًا، ولكنّه كان يُحضَّر ﴿ nafé ، هو مَعجون أزهار البُرتُقال المُلبَّس بإيصال غاز الأمُّونياك إلى الكُحول بالسُّكُّر. مُناشرة.

> مُغَوَّل النُّشادِر العَنْبَرِيّ، كُحول نُشادِريّ عَنْبِرِيّ Alcoolé d'ammoniaque ambré

> مُغوَّل النُّشادِر .....٢٨ غ صِبْغَة العَنْبَر ....١ غ

> ٢٧٨- مُلَبَّس بالسُّكَّر Candy (E)

Candis (F)

يُطلَق اسم مُلبَّس بالسُّكُّر على مَوادّ نَباتيَّة أو على مُستحضّرات أخرى تُغلّف ببلُّور السُّكُّر. ولكى نُقَنِّد مَادَّة ما، نَضعُ شبكاتٍ مَعدِنيّة في أوعية أو في قوالب من الصَّفيح أو التَّنك، قد تُدعى «مُقَنِّدات» Candissoires، ونَضعُ عليها المَواد المُراد تَقنيدُها؛ ونَسكُب فَوقَها الشَّراب السُّكَّريِّ المَطبوخ جدًّا؛ ونَضع الكُلِّ في المِحَمِّ؛ نُخرج المَوادِّ من المِحَمّ عِندما تَتَغطّى كِفاية ببلّورات السُّكُّر، ونَتركها تَتَصفّى ومن ثمّ نُنْهى عَمليَّة التَّجفيف مُجدَّدًا في المِحَمّ.

إذا لم تَكْفِ هذه العَمليّة الأولى، نُعاودُها ثانية.

نُقنِّد الصَّمْع (صَمْع سُكِّري)، ومَعجونة الصَّمْغ (مَعجونَة صَمْغ مُلبَّس بالسُّكِّر)، ومَعاجين العُنَّابِ والخُبِّيزة والحزاز، والمعاجين النّافِعة للصّدر، إلخ. ، كما نُسَكِّر الأزهار، والثِّمار الَّتِي تكون تَربَّيت سَلفًا. إنَّ المَعجون المُسمَّى

#### ۲۷۹ - مَنِيُوك (١) ، مَنِيهُوت

Mandioc plant (E) Manioc, Manihot (F) Manioka (D) Manihot (S)

م ن ي

جنس أشجار مُعمَّرة أو جَنْبات صغيرة دائمة الأوراق من فَصِيلَة الفَرْبِيُونِيَّات يَضمّ نَحو ١٢٠ نوعًا يَنتشر مُعظمُها في البرازيل، وينمو الباقي منها في المناطق الاستوائية وحتى المكسيك. أوراقُها مُتَادَلة، مُعنَّقة، راجيَّة، ثُلاثية إلى سُباعية الفُصوص. أزهارها وحيدة المسكن، عُنقوديّة أو عُثكوليّة التَّجميع، هاميّة أو إبطيّة الارتكاز. ثمارها عُلَيبات ثُلاثيّة الأخْبية تَنْفَلِق عن ٦ مَصاريع.

من أشهر أنواع لهذا الجنس نوعان زراعِبّان غِذائيّان يَعتبرهما بعض علماء النَّبات على أنّهما، وبكلّ بساطة، ضَربان لِنَوع واحد؛ إلَّا أَنَّهما يَتَميَّزان بصفاتهما وبخصائصهما. وهما ما يلي:

#### ۲۸۰ - مَنِيْهُوت حُلُو ، مَنِيُوك حُلُو<sup>(۱)</sup> Manioc doux, Cassave (F) Manioc aipi (S)

جُنيبة من فَصِيلَة الفَرْبيونِيَّات، أصغر حجمًا من النَّوع السَّابق، سُوقُها مُنتصِبة عادِمة التَّضْليع. أوراقُها مُستطيلة

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمؤلَّف.

م ن ی

الأُذَيْنات والأعناق الخُضر. جُذورها لحمية نَشويّة غِذائيّة خالية من حامض السيانيدريكي.

زراعة وتكثير - تُنتشِر زراعة المَنْيُوك في كُلِّ البلاد الأميركيّة الحارّة من البرازيل وحتى الأثتيل منذ أبعد الأزمنة؛ كما تُنتشِر في أفريقيا، ومنذ زمن حديث نسبيًّا انتشرت زراعته في آسيا. ويسهل تكثير المنيهوت باعتماد العُقَل اللِّيفيَّة الَّتِي تُؤخَذ بطول ٣٠سم تقريبًا وتُزرَع على أَبْعاد تُقارب المتر. يُصار إلى جمع المحصول بعد مُضيّ ١٨ شهرًا على الزَّرع.

الاستعمال - الجذور الغَضّة الطَّازجة يُمكنها أن تَحلّ مَحلّ البطاطا، وضمن حُدود مُعَبَّنة، بعد سَلْقها بالماء أو شوبها تَحت الرَّ ماد. كما أنَّها تُعطى التَّبيُّوكا بعد مُعالَجة صِناعيّة، إضافة إلى الأرُورُوت المُسمّى «أرُورُوت البرازيل».

۲۸۱ - مَنِيهُوت مُرّ، مَنِيُوك مُرّ (۱) Manioc amer, Cassave amère (F) Manioc utilissima (S)

جَنْية صغيرة من فَصيلَة الفَوْسُونِيَّات تَعلو من ٢ إلى ٤ أمتار. أوراقها مُتبادَلة، راحبة التَّفصيص، خُماسية إلى سُباعيّة الفُصوص بُنّيّة الأعناق. أزهارها صغيرة، مُصفرَّة اللَّون الأخضر، عُنقوديّة التَّجميع؛ جُذورها لَحيمة، يَبلغ مُتوسّط طولها من ٣٠ إلى ٥٠سم.

ولكنُّها قد تَطول حتَّى المتر، وقد يَتعدَّى وزنها ٣ كلغ. وهي جُذور غَنيّة بمادّة نَشَويّة تُستعمل لصنع التّبْيوكا بعد تحميصها. ولكنها جُذور سامّة نظرًا لاحتوائها على حامض السيانيدريكى؛ إلَّا أَنَّ هٰذَا السمِّ يَزول بسهولة بفعل الماء أو نفعل الحرارة.

#### ٣٨٧ - مَوْزِ الجَنَّة، تِين آدم

Paradise banana, Adam's fig (E) Bananier du paradis, Figuier d'Adam (F)

Paradiesbanane, Adamfeige (D) Musa paradisiaca (S)

نَبات عُشبيّ مُعمّر من فَصِيلة المَوْزيّات يُشبه المَوْز المَبذُول بحَمْله وأوراقه ولكنّه أقلّ منه ارتفاعًا. أرومتُه مُعِقَّة . سُوقُها أسطوانية الشَّكْل ، خضراء اللَّون، تَعلو من ٣ إلى ٥ أمتار. أوراقُها كسرة القد جامدة الصَّفحة. كِنَاسَتُها مُتدلِّنة عديدة الأمشاط، أزهارُها الطَّ فيَّة مُخفِقة وتَيْبَس بينما تُعطى أزهارُها القاعديّة ثمارًا مُستطيلة، غليظة، مُجنَّحة الأطراف، طولُها من ١٥ إلى ٢٠سم، ولكنَّها لا تُؤكِّل إلَّا مَطبوخة.

الاستعمال - لباب الثَّمرة غزير المادّة النَّشويَّة الغِذَائيَّة يُصنَع منه بعد التَّجفيف والسَّحْق دَقيق شائع الاستعمال يُدعى دقيق المَوْز.

#### Eaux minérales (F)

#### ماء بَلُّوسْت

سائل كان يُستعمل في الماضي كدواء مُصرِّف ومُركَّب بالتَّساوي من حامِض كلورهيدريك ومن ماء حياة؛ بالإضافة إلى الزَّعفران، مع أو من دون إضافة ماء.

#### ماء الدّكتور أومِيارا

نَجيل الهند ٤ غ
غِرْدِيبِ١٥٠ غ
قرنفل۴۰٠ غ
سَوْسَن,٠٠٠ غ
كُزْبَرةئ
شِنْجار٠٠٠٠ غ
دُهن نَعنع١٢ نقطة
دُهن بَرْغَمُوت نقاط
گُحول ۹۰ درجة٩٠ غ
نَمرُث لمدَّة ٨ أيَّام، نُصفِّي.

في إضافة سابقة للإجازة المُعطاة لهذا الماء، كان يُشار إلى زيادة ١٢ نُقطة من الكريوزوت لكلّ ٣٠ غرامًا من السّائل، واستبدال دُهْني النّعنع والبَرْغموت بدُهني الحامِض واليانسون، وأخيرًا إلى استبدال الشّنْجار بنبتة أخرى تُعطي صِبغةً خضراء اللّون.

الاستعمال - مُنظِّف أسنان من رتبة كريوزوت بيلارد. ۱۸۳- مَوْز الحَبَشَة، مَوْز أَثْيُوبِيا Abyssinian banana, Ethiopian banana (E)

Bananier d'Abyssinie, Bananier d'Ethiopie (F)

Abessinischbanane, Äthiopischbanane (D) (1)

Musa ensete (S)

نَبات عُشبي مُعمّر من فَصِيلَة المَوْزِتَاتِ حَمْلُه ومَظْهِرُه كالمَوْز المَبِذُول ومَوز الجَنَّة ولكنّه أعْلى منه. أرومتُه لا تَعُقّ. ساقُه تَعلو من ٣ إلى ٧ أمتار، وقد تُصل إلى ١٠ أمتار (في الجزائر) وهي ضَخْمة الجَذْع. أوراقُه قصيرة العُنُق القَوى، حَمراء الصَّفحة السُّفلي وكذلك العِرْق، طولُها ١٥٠ إلى ٢٥٠سـم (ذُكر ٤٠٠ إلى ٦٠٠سـم) وعرضُها ٥٠سم (ذُكر ٨٠ إلى ١٢٠سم)، نِصالُها مالِسة جامِدة جَميلة اللُّون الأخضر، ضُلوعُها غَليظة جُؤويّة اللُّون. ازهرارُه سُنْبليّ التَّجميع. أزهارُه نَنفسجيّة كبيرة القدّ، كِياسَتُه مُجنَّحة مُتدلِّية. ثمارُها ناشِفة لا تُؤكل، تَضمّ بزرة إلى ٤ بزور كُروية سوداء مالسة، حجمها كالبُنْدُقة، صالحة للتَّكاثر. مَهده الحَيشة.

الاستعمال - يُزرع لهذا المَوز من أجل لُباب ساقه الّذي يُستعمَل استِعمال الدَّقيق. زراعتُه تَدوم ٤ سنوات تَنتهي بكَسْح السّاق لاستخراج لُبابها؛ وقد يَجري ذلك قَبْل الازهرار بنحو ٥ أسابيع.

<sup>(</sup>١) التَّسميتان للمؤلُّف.

م ي ا إذا أُحرقت فُضالة الصِّبغة فإنّ رَمادها العِطريّ يُشكِّل ما يُسمَّى مَسحوق أومِيَارا ونُضيف المُستخلَص. المُنظِّف للأسنان؛ إلَّا أنَّ هذا المسحوق يَكُون ورديّ اللُّون.

ماء رَقوء بالشَّيْلَم المُصاب بالأرْغُوت

أَرْغُوت مَجروش ١٠٠ غ مُكَوفَر، بكمّيّات مُتساوِية.

ماء غال ٠٠٥ غ

كحولَة الحامِض ....كمِّيَّة كافية في استعمالات خارجيّة فقط.

ماء سَانُه رُو

سُولفات الزِّنك .....اغ سُولفات النُّحاس .....٤ غ ماء مُقطَّر، كمِّيّة لكى تكفي ١٠٠٠ غ استعمال خارجتي.

ماء شَرْقِيَّة ، دو لَابَار

كحول ......١٢٥ غ زَيت نعنع طيّار .....زيت نعنع طيّار .... زَيت وَرْد طيّار ...... غ قِرْمِز ......قِرْمِز هِ.،٥٠٠ غ مِلح دُرْدِيّ الخَمْر .....م.٠٠ غ نُصفّي بَعد ٤٠ ساعة من المَرْث. مُنظِّف أسنان.

ماء ضدّ الجَرَبِ (رَنْك)

عائِق جَبَليّ ............... ١٥ غ نَمزج ونُصفِّي. مُستخلَص الخَشْخاش المُنوِّم ..... ٨ غ إنّ تركيبة لهذا الدّواء ليست محلّ

نَعْلَى العائق الجَبِلِيّ في ليتر ماء، نُمرِّر

في لوسيونات ضدّ الجَرَب.

#### ماء ضد الشَّقيقة

نُشَادِر سائل، دُهن سَعْتر البَرّ، قِنْديد

يُستخدَم هٰذا الماء في امتصاصات نُعالج التَّأْشين، ونُضيف إلى السَّائل: وفي كمادات تُوضَع على الجبين.

يُمكن تَقريب لهذا الماء، وكذلك الماء التّالي، اللّذين نَجدُهما في كُتُب الوَصْفات القديمة، من ماء رَسْيَايل المُسكِّنة، واللَّذين كانا له نَموذَجين على

الأرجح. ٠٦٠ غ كافور

٥٠٠ غ كحول

نُشادر سائل .....١٢٥ غ دُهن اليانسون .....١٥٠ غ

ماء ضد النَّتانَة، ماء ضدّ التَّدعُص (بوفور)

حامِض كبريتيك ..... ع ٥٠٠ غ

ماء القَرَبينة (تادَن)

خلّ .....خلّ كحول .....كحول

٥٧٧ غ سُکّر ۶ ۳ · ٠ حامِض كبريتيك خفيف

إجماع: عددٌ من المؤلِّفين يَستبدِل الحامِض الخَلِّي بعصير الحُمَّيضة أو الحُمَّيض، بَعضُهم الآخر لا يَضَع فيها السُّكَر، أحدهم يَستبدِل السُّكَر بالعَسَل ويُشير إلى نِصْف كمِّيَة الكحول.

الخصائص والاستعمال - قابض شافٍ للجرح ومُطهِّر. من الدّاخل، ٢٠ إلى ٣٠ نقطة في سَوّاغ مُناسِب؛ من الخارج، في لوسيونات على القرحات المُتَقيِّحة، والكَدْمات، والنَّزيفات.

#### ماء قَطْران (دستور ۱۹۳۷)

قَطْران نَباتتي مُنقَّى .....٥ غ رَمْل صَوّانتي مَحروق قليلًا .....١٥ غ ماء مُقطَّر .....

نُقسِّم القَطْران بخلطه جيِّدًا مع الرَّمْل المَخسول والمُجفَّف سَلفًا، ونَتركه مَمروثًا لمدَّة ٢٤ ساعة في الماء، مع الخَض المُتكرِّر من وقت لآخر؛ نُصفّي.

اقترح الدكتور جورج بَرْكيلاي، مُطران كُلُويْن، عام ١٧٤٤، ماء القَطْران كدواء مُضاد للنَّتانَة وضد التَّدَعُص.

للحصول سريعًا على ماء قَطْران ذو تَركيب أكثر ثُبوتًا، أَدْخَل لوفور في زجاجة من ٣,٥ إلى ٤,١ غرامات قَطْران نِصف سائل، مَغسول سَلفًا بالماء البارد، ومن ثمّ سَكب فيها ٣ ليترات ماء مُقطَّر مُسخَّن حتّى ٥٠ أو ٢٠ سخ، أَقْفَل الوعاء وخَضَّ بقوَّة من وقت لآخر طوال ١٥-٢ ساعات، ومن ثمّ صَفَّى وحَفظ في

المواصفات - يكون ماء القَطْران خفيف الغَبَشيَّة عندما يكون قد حُضِّر في ماء مُحتوٍ على سُولفات الكلسيوم، ويُعطي رائحة SH<sub>2</sub>، وهذا ما لا يَتطابَق مع دستور الأدوية.

مهما تكن الطّريقة المُتبَعة، إنّ ماء القطران يَجب أن يَكون حامِضًا، عَطِرًا وقليل الطّعم المُرّ؛ إنّ نِسبة المَواد الّتي يَحتوي عليها محلولة لا يمكن أن تكون أدنى من ٣٠، غرام في اللّيتر. استنتج لوفور أنّ ماء القطران كان يَحُلّ ١٠٪ من وَزنه من اليُود؛ السّائل، الأحمر اللّون في البداية، يَصْفَرّ خِلال ٢٤ ساعة ولا يُعطي أيًّا من التّفاعُلات المُميّزة باليُود، الذي يَكون فيه إذًا مَخْفيًّا مُسترًا ومَحلولًا.

إنَّ هذا المُستحضَر لم يَحتفِظ به دستور أدوية ١٩٤٩.

إنّ سَوائل القَطْران المُحضَّرة بواسطة الكَربونات القِلَوِيَّة، والقِلَوِيَّات المُميَّهة، يُمكنها أن تمتلك خصائص طبَّيَّة مُفيدة، ولكن يَجب ألّا تَحُلّ مَحلّ ماء القَطْران.

الخصائص والاستعمال: مُستدِرّ العَرَق الغَزير. في الأمراض الجلديّة، البَلْغم المَثانيّ.

#### ماء كَرْسِتان ضِد التَّعْقِيبَة

م ي ا

۶٦٠ غ نَعنع سَوْسَن ..... عَ أَيضًا كَقَطرة للعين.

بُزور الفَيْجَن .....٧٥ غ ماء هِيدرومُكَبْرَت

نَبيذ أبيض ......نبيذ أبيض نُقطِّر النِّصف في حَمّام مريم.

يُؤخَذ ٤ ملاعق في اليوم، وفي جُرِغتينِ .

إنّ ما يُسمّى ماء ريڤيير البّلسميّ أو رُوح ريڤيير البَلسميّ هو الماء الّذي استُبدِلَت فيه بُزور الشُّمرة ببزور الإرْثِد.

#### ماء لازَوَرْدِي، ماء سَفِيري

أسِتات النُّحاس .....اللَّحاس النُّحاس نُشادر سائل .....كمِّيّة كافية لتذويب المِلح؛ نُضيف:

ماء مُقطَّر .....ماء مُقطَّر يومين.

#### ماء مار يُوحنّا

سُولفات الزِّنك ..... غ سُولفات النُّحاس .... ع إنَّ الفَسادات الَّتِي تُكابِدها المياه سِمات الزَّعْفران ..... ١٠,٢٥ غ كحول مُكُوفَر ٣٦٠غ ماء مُقطَّر، كمِّيّة لكي تكفي ١٠٠٠.. غ نُذوِّب المِلحين في الماء، نُضيف الزَّعفران والكحول المُكُوفَر، ونَترك الكُلّ مَنقوعًا لمدَّة ٤٨ ساعة؛ نُصفّي ونَحفَظ في وعاء مُقفَل للاستعمال.

الاستعمال - لُوسبونات، تَبخبرات،

نَقيّ أو مَقطوع بالماء، ضِدّ الفكوش والالتواءات والكسور. يمكن استعماله

محلول مائتي من حامض السولفهيدريك يحتوى على مَرّتين حجمه من الـ SH<sub>2</sub> (دستور أدوية ١٨٣٧).

رقم۳	رقم۲	رقم۱	ماء يُوديّ للمَشروب
۰٫۱۰غ	۰٫۰۸ع	۶۰٫۰٦	يُودور البُّوتاسيوم
ه٠,٠٥	٤٠,٠٤	۴۰٫۰۴غ	يُود
۱۸۰غ	١٥٠غ	١٢٥غ	ماء مُقطَّر

الرقم ١ هو للأولاد، الرقم ٢ للمُراهِقين، الرقم ٣ للبالغين؛ في مُدَّة

#### ٧٨٥ - مِياه مَعْدِنيّة اصْطِناعِيّة

#### Eaux minérales artificielles (F)

المَعدِنيَّة المَحمولَة بَعيدًا في تركيبها خَلَقت فَنَّا جديدًا، هو فَنّ تَقليد المياه الطّبيعيّة. ولقد وصل الحماس بالبعض إلى القول «بأنّ الفَنّ، في هذا المِضمار، قد تَخطّى الطّبيعة». إلّا أنّ الواقع العِلميّ يَقول، وعلى عكس ما تَقدُّم، أنَّ المياه المَعدِنيّة الطّبيعيّة يَجب أن تُفَضَّل دائمًا على المياه الاصطناعية الَّتِي يُمكن أن يُؤخَذ عليها أنَّها لا تُمثِّل م ي ا

بدقة تركيب المياه الطبيعية. وإذا تم التوصل، عن طريق التحليل، إلى تقدير العناصر المعدنية المحلولة في الماء، ولكنه لم يتم التوصل بعد إلى تحديد تجمع هذه العناصر فيما بينها. وحتى إذا تم ذلك فعلا، إلا أنه لا يُمكن تقليد أو إحداث المواد العضوية التي تحتوي عليها والتي قد يكون دورها مُعمًا.

وخلافًا لذلك، هُناك حالات يَجب فيها تَفضيل المياه الاصطناعيّة: ماء سَلْتز فيها تَفضيل المياه الاصطناعيّة: ماء سَلْتز وفي كثير من الحالات، لتسهيل الهضم، من الماء الطبيعيّ؛ إنّ زِيادةً من الغاز تَجعل المياه الحَديديّة أيضًا، والمياه المِلحيّة، أقلّ نُفورًا واستِهجانًا، وأكثر هضمًا من قِبَل المريض، ومن دون إضعاف خصائصها الأخرى. ويُذكر في لهذا المجال أنّ بَعض مالكي الينابيع

الفرنسية بَدأ، لهذا الهدف، بشحن مياهه بالغاز عند إخراجها من النَّبع، وحَصل بذلك على مياه يمكن تسميتها مياه مَعدِنيَّة مُخْتلَطَة مُغَوَّزة.

يَبدو أَن فَنَ تقليد المياه المَعدِنيّة يَعود تاريخًا إلى القرن السّابع عَشر عندما استحصل رَجُلان إنكليزيّان لأوَّل مَرّة على رخصة لصنع المياه الحديديّة، ولكن تلك الصّناعة الجديدة بَقيَت في حالة فُتور إلى أن أعطاها المَدعُوّ سُتروڤ الدَّفْع الّذي كان لها مُنذ حَوالى أكثر من ٨٠ عامًا، والّذي فقَدَتْه عندما بدأت مُعظم المياه المَعدِنيّة الطَّبيعيّة بُعمَل وتُنقَل بسهولَة بعيدًا عن اليَنابيع.

إِنِّ صِناعة المياه الاصطناعيّة الشَّريفة الدَّقيقة الحَيَّة الضَّمير تُواجه صُعوباتٍ بسبب عدد الأجسام الكبير الّذي يُمكن إضافته إلها.

الشَّجَرة هو غذاء شُهيّ رَهِيف.

6

مُفرَدَة النّواة، بَيضانيّة، مُثلَّنة، مُتطاوِلة بَعض الشّيء، يَبلغ قطرها أحيانًا ٣٠سم، وقد تَزِن عِدّة كيلوغرامات. لُبُّها Mésocarpe لَحميّ وليفيّ، يُصبِح صُلْبًا وجافًا مع الوقت وتُشكِّل أليافُه ما يُسمَّى في عالم الصّناعَة Coïr أو Bastin أي الحَبْل الخفيف. إنّ هٰذا اللَّبِ ولُبِّ بَعض أنواع النّخيل الأخرى يُستخدَم لتحضير الفَحْم المُفعَل.

الثُّمرة أي النّارَجيلة أي جَوزة الهند

جَوزَة الهِند هي عَجَمة غلافها الدّاخليّ صُلْب جدًّا يَحتوي، قَبْل نُضجِها، على سائل سُكَّريّ الطَّعم، مُرْمَدّ اللَّون الأبيض، أغْبَش بَعض الشَّيء، طَعمه لذيذ مُستَحب، يُعرَف باسم حَليب النَّارجيل.

عندما تنضج النَّمرة يَتَحوَّل هٰذا الحَليب جُزئيًّا إلى مادَّة مُتماسِكة هي السَّوزة Amande التي تَحتوي على الجَنين النَّباتيّ وتَفرش الطَّبقة الدّاخليّة للقِشْرة تاركة بذلك فجُوةً في وسط البزرة.

قِشرة جَوزة الهند قد تُستعمَل كَوعاء أو آنِية أو تُستخدَم في الأشغال الخِراطِيّة. في الهند يُقطِّرون هذه الغِلافات بهدف الحُصول على زَيت شياطيّ يُستعمَل ضِد وَجع الأسنان، والحُصول على فَحْم دَقيق جدًّا يُستعمَل في الرَّسم والدِّهان. دَنِيجاس Denigès وَجَد في حَليب جَوز الهِند خميرة ٢٨٦- نَارَجِيْل مَعْرُوف، جَوْز الهِنْد، رَانِج، شُعْصُور، حِشْرِج

Cocoanut palm (E)
Cocotier, Cocotier commun (F)
Kokospalm, Indianischer nussbaum (D)
Cocos nucifera (S)

لُقُّب التّارَجيل بملك النّباتات رُبّما لأنّه من أنفعها؛ فهو يُعطى بالواقع نسعًا سُكَّريًّا إذا تَمَّ تَخميره يُعطى خمرًا، وكُحولًا (عَرَق)، وخَلًا، وزيتًا، وسُكَّرًا، وصَمْغًا؛ وهو بالتّالي يُنْتِج النّارجيل أي جَوز الهند، والحليب، والقِشدة، والزُّبدة، والحِبال، والنسيج، والأواني، والخشب، والبواري (بوريّة أو بورياء أي حصير والبواري (بوريّة أو بورياء أي حصير منسُوج)، إلخ، وباختصار يُعطي كلّ ما هو مُفيد ونافِع لحياة العَشائِر والقبائل التي تَستوطن المناطق الاستوائية.

جُذور النّارجيل باقات وخُصَل حامِزة الطَّعم، تُستعمَل لمحاربة الدِّيسنتيريا في الهند. ساقُها تَعلو حتّى ٦٠ مترًا، صفراء اللَّون، تَحتوي في داخلها على لُبِّ مَاكول، سُكَّري الطَّعم، لذيذ المَذاق المُستحبّ. البُرعُم الذي يَنتهي به رأسُ

۱۸۷- نَدْغ إِكْرِيتِيّ، نَدْغ صَعْتَرِيّ، شاطِرِيّة Savory of Crete, Candian savory (E) Sarriette de Crète (F)

ن د غ

Kretisches bohnenkraut, Candische saturei (D)

Satureia thymbra, Micromeria thymbra, Thymus tragoriganum, Thymus graveolens (S)

جُنيبة صغيرة ليفيّة مُعَمّرة من فَصِيلَة الشُّفُويَّات، كثيرة الفُروع، ليفيَّة القاعدة والسُّوق، السُّوق الأَفْتَى مُنتصِبة تَطول من ٣٠ إلى ٥٠سم، مُبيضَّة اللَّون وخَسْنة. أوراقُها مُستطيلة، يَبضيّة، مُزَوَّاة القاعدة، مَثْنِيَّة، طولها من ٥ إلى ١٥ ملم، رَماديّة اللّون الأخضر، حُزْميّة التَّجميع العَقيم، الكثيف نَحو أسفل الفُروع. دَوَّاراتها الكثيفة مُتعدِّدة الأزهار اللاطُّئة. أوراقُها الزَّهريّة لا تَتَخطَّى الأزهار، مُنبسطة أو شِبة مُنْحَرفة القاعدة. قُنابات مُستطيلة، مُستدقّة الطَّرَف، مُساوية للكأس، زَغَبيَّة خَثينة، مُشرَّمة Fimbriée الحافة. الكأس نَحو ٤ ملم، مُتساوية الأسنان الّتي تَتَخطّى قليلًا طول الأنبوب، سنانتة مِخْرَزية. التّاج نَحو ٨ملم، أنبوبه قليل البروز وشفاهه بالطّول عينه تَقريبًا. ازهرارها يَدوم تقريبًا على مدار السَّنة. أعيد تسجيله في فرماكوبيا ١٩٧٤.

نَبات شائع جدًّا في لُبنان من المُفيد جدًّا تحليله المخبريّ للوقوف على مُركِّباته الكيميائيّة وكشف خصائصه الطبيّة والإفادة منها.

مُؤَكْسِدة يُمكن كشفُها بواسطة الماء المُتأكْسِج فقط؛ كما وَجد المؤلِّف عَينُه فيها الكُولِيْن بواسطة تَفاعُل فلُورَنْس (وهو تَفاعُل بمحلول يُوديّ يُودوريّ).

لَوزة جَوز الهند يَيضاء اللَّون تَتَكوَّن من سُوَيداء زَيتيَّة جدًّا يُستَحسِن مَذاقَها عددٌ وافرٌ من النّاس وتُستعمَل في صِناعة الحَلْويات. إذا قُسمت السُّويداء إلى حُصَص وشَرائح وجُفِّفَت فإنَّها تُصبح ما يُسمّى «لُبّ النّارجيل» Coprah الّذي يُستعمَل جدًّا لاستخراج مادّة دَسِمة لها مكانتها الهامّة جدًّا في صِناعة الصّابون لسهولة تَصَبُّنها وسُرعته. إنّ زَيت جَوز الهند هذا، أي زيت لُت النّارجيلة الأبيض، أو القليل الصَّفار، هو زيت يَزْنَخ بسهولة، لذلك يُعادَل ويُعالَج بالفَحْم لتَنقيته، فنحصل بذلك على زُبدة نَباتيَّة تسمَّى كُوكُوز أو فجيتالين، جَيِّدة الحِفظ، تَنصهر عند ٢٤°سغ، كثيرًا ما تَحُلّ، في المَطبخ الفَرنسي، مَحلّ الزُّبدة أو مَحَلِّ الزَّيتون، وهي من أشهر السُّمون النَّاتية.

مُلاحظة - إنّ جَوز هِند السّيشَل ومَكاسّار يُبرِز تَصَلَّبات فَريدة ونادِرة تَتَالَّف من كَربُونات الكَلْسيوم ومن نسبة ضَئيلة جدًّا من مادّة عُضْويّة، ويُطلَق عليها اسم لآلئ جَوز الهِند، وهي تَصَلُّبات مُقدَّرة جدًّا من قِبَل الهُنود الذين يُسمُّونها بدورهم Mastika kelapa ويَحملُونها كأحجار كريمة.

Mountain savory, Asse's pepper (E)

Sarriette des montagnes, Sarriette vivace, Sarriette sauvage, Savourée, Pébré d'aï, Poivre d'âne, Poivre de Provençaux, Herbe de St Julien (F)

Gebirgpfefferkraut, Bergsaturei, Eselpfefferkraut (D)

Satureia montana (S)

جُنْيَة صغيرة لنفتة القاعدة من فصلة الشُّفُويَّات تَعلو من ١٠ إلى ٤٠سم. ساقُها صاعدة أو مُنتصبة، فروعُها جامِدة، أوراقُها جلديّة النَّصْل، لا مِعة، مَرْطاء، ضَيِّقَة، حادة الرّأس، مُهدَّية الحَوافي. أزهارُها بيضاء، ورديّة أو لَيْلَكِيَّةَ اللَّونَ فِي سُنْبُلَةً مُورِقَةً، هَامِيَّةً، وحيدة الاتِّجاه. كأسها أنبُوبيّة، خُماسيّة الأسنان الشِّيه مُتساوية. التَّاج بارز ومُزدوج الشِّفاه، الشَّفَة العُليا مُنتصِبة، السُّفلي ثُلاثية الفُصوص «الوُسْطي منها هي الأكبر». الأسدية أربعة. البزرة رُباعية الأكنات. رائحة النّبات عطريّة، طعمه مُرّ وحارّ. أقسامه المُستعمَلة هي الرَّؤوس المُزهرة وكامِل النَّبات وزيته الدُّهنيّ. نَبات أُوروبِّيّ له مُماثل في حالنا.

المُرَكِّبات - زَيت دُهنيِّ عِطريِّ يَحتوي على پينان، كَرْڤاكرول حتِّى ٤٠ بالمئة، سيمان من ٢٠ إلى ٢٥ بالمئة، تَرْپينات حَوالى ٥٠ بالمئة، سينايُول، بَعض التِّيمُول، خميرة كَرْبُورات، فينُول مُنتَرْج.

الخصائص - الدّاخليّة: هاضِمة، مُنشَطّة فكريّة وجَسديّة، ومُنشَطة خاصَة للقُسُور الكُظْرِيّة Surrénales، ناعِظة أي مُنشَطّة جِنسِيَّة، مُضادَّة للتّشَنُّج، طارِدة للرِّيح، مُطهِّرة قَويّة، مُضادَّة للتَّعفُّن، طاردة للدّود، مُقشّعة. الخارجيّة: لائمة، مُصرِّفة، نافعة للمَعِدة.

الاستعمال - الدّاخليّ: عُسر هَضم، كَسَل الهَضم، وَهْن فِكريّ وجِنسيّ وجَسَديّ، آلام المَعِدة العَصبيّة، تَقلُّصات الأمعاء، تَخَمُّرات الأمعاء، تَطبُّل البَطْن، طُفَيليّات الأمعاء، رَبُو، برونشيت، ذُبحة، إسهال، برود جِنسيّ؛ الخارجيّ: قُروح، طَرَش، عَقْص الحَشرات.

طريقة الاستعمال - نُقاعة ٢٥ إلى ٤٠ غرامًا من الرّؤوس المُزهِرة في ليتر ماء غالٍ يُعطَّى عشر دقائق ويُؤخَذ منه ثلاثة فناجين يَوميًّا، قَبْل أو بَعد الوجبات. فناجين النّبات الدُّهنيّ يُؤخَذ منه ٣ إلى ٥ نقاط مع العسل، ثلاث مَرّات في اليوم وفي نهاية الوجبات. أمّا في الاستعمال الخارجيّ فنُقاعة من حَوالى ٣٠ إلى ٤٠ غرامًا من النّبات المُجقَف في ليتر ماء غالٍ يُعطَّى عشر دقائق ويُستعمل في غالٍ يُعطَّى عشر دقائق ويُستعمل في لوسيونات وكمادات على القُروح. في مُعالجة الطَّرش يُوضَع في الأذن ٣ أو ٤ مُعالجة الطَّرش يُوضَع في الأذن ٣ أو ٤ مَرّات في اليوم، منها واحدة عند النّوم.

F قیار T اآن

> إنّ الاسم الفرنسيّ من Fecula ، تصغير Fex، أي ثُفْل، حُثَالة، ثُمَالَة، كَدَر، راسِب، وهي مادَّة تُوجد في كلّ النَّباتات تقريبًا، ولكن بكمِّيّات تَخْتلف تبعًا للنّبات، كما تُوجد بالتّالي في بعض الأعضاء أكثر منها في البَعض الآخر. وهكذا فهي تكثر في حُبوب الزُّروع (فهي نَشاء القَمْح والْشَّعير والشُّوفان والشُّيْلَم والذُّرة الصَّفراء والرُّزّ)، وفي حُبوب القَرْنِيّات (بازيلا، فاصوليا، فول)، وفي جذع أنواع السِّيكاس Cycas والكثير من أشجار النَّخْل (نَخْل النَّشا أي شَجَرة السَّاغُو، نَخْل الدُّهْنِ أي إلْويس) وفى دَرَنات البطاطا والسَّحْلَب والمَرَنْطَة والأروم والمَنْيُوك أي المانيهوت والإنْيَام والسُّوسَن والفَّاشِرا، إلخ. وهناك شيء جدير بالملاحظة، وهو أنّه في الكثير من الأحيان، يكون النَّشا، في الجُذور وفي الدَّرنات، مَصحوبًا بجوهر حامِز وسام (أروم، إنْيام، مانيهوت مُرّ، إلخ.).

> وفيما عدا حالة النَّشاءات السّامّة، إنّ السّاءات تَختلِف بمظهرها الفيزيائيّ أكثر ممّا تَختلِف بخصائصها الكيميائيّة الّتي هي خصائص المَوادّ النَّشويّة ذاتها.

يكون النَّشاء النَّقيِّ على شكل مَسحوق أبيض يَصرِّ عندما نَضغطه، وهو يُبدي، إذا فَحصناه بالمجهر، حَبَّات شَفَّافة كُرَويَّة، بَيضَويَّة أو مُزَوَّاة، تَختلِف

قياساتُها وأحجامُها حسب نَوع النَّبات الّذي يُعطيها.

إنَّ تَمييز تلك الحُبوب يُمكن أن يَتمّ بسهولة تَحت المجهر.

إنّ النّشاء عَديم الرّائحة والطّعم، لا يَفسد في الهواء. كثافته حوالى ١,٥٣. اذا جُفّف في الهواء، يبقى حاويًا على ١٢ إلى ١٨٪ من الماء الّذي يَفقده جُزئيًّا إذا جُفّف في حَمّام مَريم. عندما يَكون مُشبَعًا بالرّطُوبة فإنّه يَحتوي من الماء مِقدار ٣٥٪.

تَركيبِ النَّشاء وخصائصه وَردَت في دراسة كلِّ من أنواعه (أطلبها). وهو لا يَذوب في الحالات المُتعادَلة العَادِيّة. إذا غُلِيَ مع الماء فإنّ حُبيباته تَتَفتَّع، وتَنحَل جُزئيًّا، وتَعود فتُشكِّل، عندما تَبرد، مُجَمَّدة (صمغ خفيف) يُلوِّنها اليُود باللَّون الأزرق. وهو كاشفُها الأكثر بُروزًا. تَختلِف حرارة تَشكيل صَمْغ النَّشا Empois باختلاف النَّبات الذي يُستخرَج منه.

إذا حُمِّص النَّشا عند ٢٠٠ إلى ٢٣٠ سغ فإنّه يَكتسِب خاصَّة صَيرورته قابلًا للذّوبان وذلك بتحوُّله إلى نوع من الدَّكْسترين (خاصّة أريترودكسترين). وهو نَشا يُستعمَل والحالَة هذه باسم والحالَة هذه باسم وتنّشِيتِها) حيث يَحلّ مكان الصَّمْغ.

ولقد اكتشف بُويُون لاغرانج هذا التَّأثير النَّاتج عن التَّحميص على النَّشا.

إنّ عمل دياستاز المَلْت يُمكنه كذلك

ن ش

أن يؤثّر في النّشا؛ ولهذا ما يتم في تحضير سُكَّر سُوكُسْلَت أو النوترامَلْت. نَجعل المَلْت يَعمل في محيط مائيّ فاتر على نَشا البَطاطا أو على نَشا المَنْيُوك؛ ولكنّ عملَ الخمائر «الحَالّة للنّشا»(۱) بالغَليان، بهدف الحصول على مادّة بالغَليان، بهدف الحصول على مادّة بالمَلْتُوز. وإذا جُفّفت، فهي تتَمثّل على شكل مسحوق أبيض يَلْتَقِف اللّسان شكل مسحوق أبيض يَلْتَقِف اللّسان ويكون طعمه بالكاد مُسكَرًا.

### ٧٩٠ نَشَاءُ الذُّرَة الصَّفْراء

Amidon de mais (F)

Amylum maydis (S)

يُستخرَج هٰذا النَّشاء من ثَمرة أو حَبَة (بُرَّة) الذَّرة الصَّفراء Zea Mays من فَصِيلَة النَّجيليّات. تكشف هذه النَّمرة، على سَطحها الخارجيّ، عن سُويْداء قَرْنيّة، وفي قلبها عن سُويداء بَيضاء اللَّون وطَحينيّة جدًّا. يَبدو نشاءُ الذُّرة الصَّفراء تَحت المِجْهر على شكلِ حبوبٍ الصَّفراء تَحت المِجْهر على شكلِ حبوبٍ مُزَوّاة صَفّاحِيّة من ٢ إلى ٣٣ ميكرون، وحُبوبٍ أخرى مُستديرة الشَّكل من ٢٥ مِنَّرة أو إلى ٣٢ ميكرون، وتَتكوَّن الحُبوب من سُرَّة مَرْكَزِيَّة مُؤلَّفة من فجوة مُميَّزة أو من ٢ إلى ٥ شُقوق نَجْمِيَّة الشَّكل من من ٢ إلى ٥ شُقوق نَجْمِيَّة الشَّكل من ومُجرَّدة من الخُطوط المُتراكِزة. وتُبدي ومُجبوب تَحت المِجْهَر بوضوح، وفي إضاءةٍ مُسْتَقْطَبَة، ظاهرة الصَّليب الأسود إضاءةٍ مُسْتَقْطَبَة، ظاهرة الصَّليب الأسود

المُركّز على السُّرّة.

- أُطلُب: نَشاءات مَخْزَنِيّة (في المُعجَم الثاني، صفحة ٢٧٩، رقم ٣٤٢).

Wild mint (E) ظُفْراء Wild mint (E) ظَفْراء Menthe sauvage, Menthe sylvestre (F) Wildminze (D) Mentha microphylla, Mentha sylvestris var. stenostachya, Mentha canescens, Mentha sieberi (S)

نَبات لُبناني بَرِّي مُعَمَّر من فَصِيلَة الشَّفَويَّات، وهو كبير الشَّكالَة في كُلِّ أقسامه، نَفَّاذ الرّائحة التي تَفتقِر إلى العُذُوبة. سُوقُه تَعلو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقُه لاطِئة، تَكون في العادة رصاصية اللُّون الأخضر، أسنانها غير مُنتظِمة ومَحْنِيَّة كالمِنْجَلِ أحيانًا، طُولها من ١,٥ إلى ٣سم، استثنائيًا ٦سم، عَرضُها ٢سم، أزهاره في سَنابل ضَيِّقة ومُتَقَطِّعة في القاعدة غالبًا. الزُّنيدات أطول بكثير من الكأس التي لا تَتخطَّى ٢ إلى ٣ملم، أسنانها حادة. التّاج وَردي اللُّون، مُنْبَسِط النَّصْل، الأسْدِية قَويّة البروز. نَبات لُبناني شائع جدًّا مَيَّزَتْه فلورا لُبنان عن النَّوع Mentha . longifolia

- خصائصه هي خصائص النَّعْنَع العامَّة واستعمالاته.

الماء، فُوتَنْج الماء، حَبَق الماء، فُوتَنْج الماء، فُوتَنْج الماء، حَبَق التَّمْساح، ضَيْمُرَان، مشكطرا، مشكطرا مشيرزور Water mint, Brook mint, Fish mint (E) Menthe aquatique, Menthe blanche, Mentastre, Baume d'eau, Calament des marais (F)

Wasser minze, Rotminze (D)
Mentha aquatica, Mentha hirsuta,
Mentha rotundifolia (S)

نبات مُعَمَّر شِكِيل من فَصِيلَة الشَّفَويَّات مُخْتِلِف القَد الذي قد يَبلُغ المتر. سُوقُه مُوبِرة مُنْتَفِشَة وكذلك الأوراق، وهي مُعنَّقة، بَيضويّة، طولها ٥ إلى ٢٠ملم، مُعنَّقة، مُستديرة أو شِبه قَلبيّة القاعِدة، مُستَمرِطة أو زَغَبِيَّة في أكثر الأحيان. مُستَمرِطة أو زَغَبِيَّة في أكثر الأحيان. الزهاره في شبه دَوّارات قليلة العدد، هامِيَّة الارتكاز، الأخيرة بَيضانيَّة الشَّكُل. الكأس عديدة العُروق، مُوبِرة، ضَيقة الكراس عديدة العُروق، مُوبِرة، ضَيقة البَنفسجيّ في داخِله حَلقة من الأوبار. الكرابِل مُثَالِلة. الرّائحة قويّة. يَرغب المَناقع والأتربة الرّطبة ومَجاري الماء.

- خصائصه هي خصائص النَّعْنَع العامّة واستعمالاته.

۲۹۳ - نَفَل البَرّ، رِجْل الأرْنَب Field clover, Hare's foot clover, Stone clover (E)

Trèfle des champs, Pied de lièvre (F) Feldklee, Hasenpfötchenklee (D) Trifolium arvense (S)

نَبات عُشْبِيّ حَوليّ من فَصِيلَة القَرْنِيَّات

الفراشِيَة مُبْيَضَ اللَّون وطري الأوبار. ريزومه وَتَدي. ساقُه مُنتصِبة، مُتفرِّعة، تكون قزمةً في الجبال أحيانًا، تَعلو من تكون قزمةً من ألجبال أحيانًا، تَعلو من مُرَكَّبَة من ثَلاث وُريقات خَطِّية الشَّكُل وصغيرة الأسنان. رُؤيساته فَردِيّة، بَيضاويّة الشَّكُل الإهليلجيّ، كثيفة، بَيضاويّة الشَّكُل الإهليلجيّ، كثيفة، تُصبح بعد الازهرار مُستطيلة الشَّكُل الأسطوانيّ. أزهارها وَرديَّة اللَّون الأبيض. الكأس كَثيفة الهُلْب، أسنائها الأبيض. الكأس كَثيفة الهُلْب، أسنائها مَلْبية ريشيّة الشَّكُل، فضيّة اللَّون، من الأنبوب، وهي مُنتصِبة مُنبسِطة. من الأنبوب، وهي مُنتصِبة مُنبسِطة. المُنْق مَفتُوح. ازهراره من نيسان إلى متوز في المناطق اللَّبنانيّة.

المُرَكِّبات - عَفْص، راتِنْج، أملاح مَعدِنيّة، زَيت دُهنيّ، مادَّة صِباغيَّة، غليسريدات.

الخصائص - مُضادّة للإسهال، شافية للجُرح، مُضادّة لسَيلان المَهْبِل.

الاستعمال - نُقاعة، نَقيع. الفَم واللَّنة، جروح، قُرْحات دَواليّة.

طريقة الاستعمال - حَمّامات للفَم لتقوية اللَّتين الدّاميتين وتَلطيف السَّيلان الصَّديديّ أو النَّجيج. من الخارج يَصلح النَّبات المَدقوق رَقُوءًا بوضعه مباشرة على القُرحات الدَّواليّة الّتي تَميل إلى الانْدمال والشِّفاء إذا ما داوَمنا على وضع الكمادات واحتفظنا بها لمدَّة طويلة.

يُحتفظ بهذا الاسم (نقاط) لمُستحضرات علاجيّة دُعيت هكذا من واضعيها، وخُصِّصت لكى تُؤخَذ بنقاط على سُكّر أو في سوائل مُخصّصة. عدد كبير من لهذه المُستحضَرات هو في الواقع صِبغات حَقيقيّة.

يُخصَّص بَعضُها، كنقاط الأقُونيطُن، والنَّقاط السِّنِّيَّة، للاستعمال الخارجيّ. أمّا التّركيبات الواردة أدناه فلذكرى التّاريخ.

#### نقاط أقونيطن

أكُونيتين .....١غ كحول مُكرَّر ..... ٨غ

نُذوِّب. استعمال خارجيّ. سامّ جدًّا. في تَمسيدات وراء الأذُن، أو في مُعالَجة المجرى السَّمعي، وضِدّ أمراض الأذُن العَصيّة. إنّ هذا الدّواء قد تُطلق عليه التَّسمية الفُضلي: كمادة أو رفادة.

نُحضِّر بالطَّريقة ذاتها نقاط الخَرْبُوقِيْن ونقاط الدَّلفِيْنِ.

#### نقاط إنكليزيّة غير ناجعة

۴	جَذْر أَسَارُون
۴	ساصَفرا
١٥	خَشَب الألْوة
۲۱غ	أفيون
غ ٥٠٠	کحول ۸۵ درجة

كَربُونات الأمّونيوم .....٤غ نُصفِّي بعد مرور ٢٠ يومًا من المَرث. من ٣ إلى ٢٠ دسغ، في الصَّرْع، الهستيريا.

#### ٢٩٥ - نِيْقَالِيْنِ، غَلَنْتَامِيْنِ برومُهِيْدُرات Nivaline, Galanthamine bromhydrate (F) Galanthus (S)

النِّيْڤالِين هو قِلَويد يُستخرَج من نَبات من فَصِيلَة النَّرْجسِيَّات دَعَوْناه دَمِيْكَة القُوقاز، زَهْرَة الثَّلْج القُوقازيَّة: Perce-. neige du Caucase

الخصائص - الغَلَنْتامِيْن هو دُواء مُضاد كُولينَسْتَرازي (١) قَوي له مَفعول مُشابه لمفعول الأزارين ولْكنَّه أقلَّ مِنه سُمِّيَّة. وهو يُفَعِّل تأثير الأستيل كُولِين على العَضَلات، ويَزيد تَهَيُّجيَّة مَراكز ارتكاسات البَصَلَة والنُّخاع بإثارة مَركز التَّنَفُّسِ.

الاستعمال - يُستعمَل في حالات الحَثْل الاغْتِذائيّ Dystrophie العَصَبيّة العَضَلِيَّة، التهابات الأعْصاب الوَجْهيَّة، التهابات الأعصاب، التهابات النُّخاع الشُّوكيّ، العُضَالات Myasthénies، وهى أمراض تُصيب العَضَل بوَهْن شديد؛ زَرَق العَيْن. لم يَعُد مُسَوَّقًا.

طريقة الاستعمال - أمْبُولات من ملِّيليتر واحد ذات ٢٥ إلى ٥٠ ملغ؛ قَطْرة بنسبة واحد بالمئة. جُرعة البالغ

<sup>• •</sup> ٥ غ (١) التَّسمية للمؤلِّف.

الصَّرْع.

Anticholinestérasique: الكُولينَسْتَراز هُو وهي بالتّالي سامَّة جدًّا.

٠,٠٢٥ غرام في اليوم، في زَرْقات تَحت أنْزيم أي خميرة تُحدِث تَحليلًا مائيًا في ني ف الجِلْد. أمّا تَضادّات الاستطباب فهي أسْتيرات الكُولِين الى حامِض وإلى خَفْق القَلْب البَطيء، الرّبُو الشّعبيّ، كُولِين. هناك عدد كبير من المُشتَقّات العُضويّة المُفَسْفَرَة هي كابِتَة قويّة وغير \* مُضاد كُوْلينَسْتَرازِي مُنْعكِسة التَّفاعُل على الكولينَسْتَرازات،

2

ال ذَكر، قَاقُلَّة ذَكرِيَّة، خَيْربُوَا — ۲۹٦ Meleguetta pepper, Grain of paradise (E) Maniguette, Malaguette, Méléguette, Méliguette, Graines de paradis (F) Malaguettapfeffer, Malaguetta (D) Amomum granum paradisii, Amomum meleguetta (S)

نَوع من الهال يَأتي بَعد الهال الصَّغير والمُتوسِّط والكبير. ثماره بقدر حَبَّة الحُلْبَة، مُحمرَّة إلى مُسمَرَّة اللَّون، مُزَوَّاة، تَضُمَّ لَوزة بيضاء اللَّون، طعمها حامز ولاهب مُماثل لِطَعْم البَهار. رائحتها مُكَوفَرة، مُستحبَّة، تَجعلها مَرغوبة في صِناعة العُطور. مهده أفريقيا الشَّرقيَّة ومَدَعْشقر. كان في الماضي يَغُشَّ النَهَار.

مال کَبِیْر، هَال سِیْلَان، هال طَوِیْل –۲۹۷ Cardamome grand, Cardamome de Ceylan, Cardamome long (F) Cardamomum longum, Cardamomum zeylanicum, Elettaria major (S)

طُولُه من ٣ إلى ٤ سم، عَرضُه من ٧ إلى ١٠ ملم، مُثلَّث الشَّكْل، دَقيق الطَّرفين، لَونُه إلى الأشْقر البُنِّي،

مُحَزَّز، ثُلاثيّ الفُصوص؛ بُزوره عديدة تَحصَل من النَّوع .Elettaria major Sm .

إنّ ثِمار الهال الصَّغير والمُتوسِّط والكبير هي عِطريَّة كانت شائعة الاستعمال فيما مضى. الشَّعب الإنكليزيّ يَستهلك منها كمِّيّات كبيرة، وهي تَدخل في تركيب التِّرياق، وفي تركيب التِّرياق، وفي تركيب السيحمَل كتابل في الهند، كما تُستخدَم لصُنْع المَسْروبات الرُّوحيَّة (الليكورات). الثِّمار هاضمة وطارِدة للرِّيح ومُنشَّطة.

المُركِّبات - حَبُّ الهال يَحتوي على زَيت دُهنيّ من ٢ إلى ٦٪، راتنج، مادّة دَسمة، نَشاء، ألُورُون، أَمِيْلُودَكْسترِين. الزَّيت الدُّهنيّ مُركَّب من تَرْپينَايُول، أَسِتات التَّرْپينيل، سِينايُول.

#### ۲۹۸ – هَال مُتَوَسَط، قَاقُلَّة مُتَوَسَطة Cardamome moyen (F) Cardamomum medium (S)

الهال جنس نباتات ريزُومية طبية عطرية من قبيلة الهاليّات وفَصِيلَة الزَّنْجَبِيلِيَّات. ريزُوماتُها لبوبيّة التَّركيب. سُوقُها مُنتصِبة، عديمة الفُروع. أوراقُها عمديّة الانتشاب مُتعاقبة. أزهارُها سُنبُليَّة التَّجميع أو عُثكُوليَّة. ثمارها عُليبات ثُلاثيّة الحُجرات. بُزورها تُدعَى حَبُّ الهال، يُستخرَج منها أدْهان عِطريّة طيّارة المُستعملة في التَّحنيط. لُبُوب ريزوماتِها المُستعملة في التَّحنيط. لُبُوب ريزوماتِها وبُزورها وأدهانها هاضِمة ومُنبَهة للقلْب

هند

العَرضيّ يَكون مُبْهَم الشَّكُل السُّداسيّ. زَيت البُزور يَصلُح لصناعة الصّابون فقط لأنّ ابتلاعه يُحدِث المَغْص. زُنُوج غَمْبيا والسّنغال يَستعملون خشب الزَّكُون لصُنع المِدَقّات وأيدي الهاون والهَواوين والأَجْران.

مُلاحظة - الهَلَج نَبات أَفْريقيا الاستِوائيّة، يُوجد في مِصْر وفِلَسطين والسُّودان والعَرَبيّة السَّعُودِيّة وفي أفريقيا الفَرنسيّة الغَرْبِيَّة السَّعُودِيّة وفي أفريقيا في أحد المَراجع أنَّها تُسهِّل المَعِدة قَبْل إِذْراكها، سُكَّرِيَّة الطَّعم مَأكولة عند نضجها، وهي ثمار أُعيد إدراجُها في الفَرْماكوبيا الفرنسيَّة بإصدارها التّاسع عام ١٩٧٥. يُستخرَج من عَجمها مَأكول يُستعمل استعمال الزيت.

٣٠٠- هِـنْدَب مَخْزَنِيّ، طَرَخْشَقُون مَخْزَنِيّ، هِنْدَب أَسْنَان الأسَد، طَرَخْشَقُون أَسْنَان الأسَد(١)

Blow-ball, Canker-wort, Dandelion (E) Pissenlit officinal, Dent de lion, Florin d'or, Laitue de chien, Salade de taupe, Couronne de moine, Pissenlit commun (F) Löwenzahn, Echte kuhblume (D)

Taraxacum officinale, Syn.: Taraxacum officinarum, Taraxacum dens leonis, Taraxacum vulgare, Taraxacum kurdiciforme, Taraxacum laxum, Leontodon officinale, Leontodon taraxacum (S)

نَبات بَرِّيَ عُشبي مُعَمَّر كبير الشَّكَالة من فَصِيلَة المُركَبات. أوراقه قَويّة

وللقُوَّة الجِنسيَّة، مُضادَّة للتَّشنُّج، طارِدة للرِّيح، مُسكِّنة للمَغْص ومُدِرَّة للطَّمْث. أشهر أنواعه الصَّغير والمُتوسِّط والكبير. أمّا الهال المُتوسِّط فَهو أقص من

امًا الهال المُتوسَط فهو اقصر من الهال الكبير أي هال سِيلان ولكنّه يَتَحلّى بكلّ صِفاته وخصائصه الطبّيّة.

۲۹۹- هَلَج، هَلِيْج، هَجْلِيْج، زَكُون، زَكُون، بَلَح الصَّحْراء

Zachum oil tree, Egyptian balsam, Thorn tree (E)

Balanite, Balanite d'Egypte, Hagueleg, Soump ou Sump, Zacon, Zaccon (F) Zachunbaum, Ägyptischer zahnbaum (D) Balanites ægyptiaca, Ximenia ægyptiaca (S)

شَجَرة صغيرة شائكة الأغْصان والفُروع من فَصِيلة الغَرْقَدِيَّات أي القِدَّيْسِيَّات تَعلو من ٥ إلى ٦ أمتار. القِدَّيْسِيَّات مَعنَّقة، ثُنائيَّة الانتِشاب، بَيضيَّة الشَّكل، مُستطيلة. نَصلُها جامِد الصَّفحة، باهت اللَّون الأخضر. الصَّفحة، باهت اللَّون الأخضر. أزهارُها مِحورية الارتكاز. ثمارها نوويَّة تُذكر بالبَلح، حامِزة، مُرَّة، يَرغبُها أهلُ البلاد بَعد تَجفيفها. تُعرَف الشَّجَرَة أيضًا البلاد بَعد تَجفيفها. تُعرَف الشَّجَرَة أيضًا باسم: Sump ou Soump el héglig.

المُركِّبات - صابُونِين في القُشور، زَيت حَوالى ٤٠ بالمئة في البُزور.

الخصائص والاستعمال - القُشور سامَّة للأسْماك Ichtyotoxique بسبب الصّابُونين على الأرجَح. ثمارُها مَأْكُولة، وهي تُشبِه التَّمْرَة ولكنّ مَقطعها

<sup>(</sup>١) التَّسميات العربيَّة للمؤلِّف.

التَّقطيع حتى العِرْق الوَسطيّ، مَرْطاء النَّصْل، تكون أعناقها أحيانًا مُحمرَة اللَّون. قُلافات الرّؤيسات الفَتية والسّوق قليلة الوَبْر. صَفْحة القُنابات القُلافيّة السُّفلى تكون في العادة أفتح لونًا من الصَّفحة الخارجيّة. أكناته بُنيَّة اللَّون إلى طغيرة الأشواك. انتشاره اللَّبنانيّ خاصّة من ارتفاع ١٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ متر عن سطح البحر. في لُبنان، إضافة إلى الهِنْدب المَخزَنيّ، هناك اثنا عشر نَوعًا الهِنْدب المَخزَنيّ، هناك اثنا عشر نَوعًا على الأقلّ.

المُركِّبَات - يَخْضُور أي كلوروفيل، پُوْلَكْس استخرج منه مادة مُرَّة تُدعى تَرَكْسَاسِيْن، إينولين (من ١٠ إلى ٤٠٪ في الجذر وحسب الموسم)، قِلَويْدات، حامِض هيدروكسي سينّاميك، سكاكر، لَقُولُوز، مَنِّيتُول، أَسْپَراجِيْن، كُولِين، ستيرولات، تَركساستيرول، تَكْسَاسَارِيْن، بقايا زَيت دُهنتي، جَزَرين، حامِض فُوليك أي ڤيتامين «ب٩»، حوامِض دُهنيّة، خضاب، ڤيتامينات: «أ»، «ب»، «ث»، دياستازات أو خمائر، بَقايا تيروزينَاز، في الأزهار فلاقِين مُماثل لفلاقين الحليب (اللّبن) وهو أوَّل فلاڤين مَعروف من مصدر نَباتي، من ٥ إلى ٨٪ أملاح: كلسيوم، بوتاسيوم، حديد، مغنازيوم، فوسفور، صَوَّان أي سيليسيوم، صُوديوم، كبريت، مَنغانيز، راتِنج.

الخصائص العامّة - نَبات صفراوي،

مُذَوِّب، صديق الكَبِد: «يَشطُف فيلتر الكُلية، ويَعصُر إسفنجة الكَبِد»؛ مُقوًّ مُرّ، مُشَةً، مُصَرِّف كبدو-صَفراويّ، مُزيل الاحتقان، مُنقِّ دَمويّ، مُبوِّل أزوتيّ، مُضاد للتَّعفُّن، مُضاد لداء الحَفْر، دَمويّ دَوريّ.

الاستعمال الدّاخلي - بنوع خاص في الانسدادات الحَشْويَّة، التهاب حاد أو مُزمِن في المجاري الصَّفراويّة داخل الكبد أو خارجه Angiocholite ضعف الكبد، احتقان الكبد، صُفيراء، رُمالات صَفراوية وكليوية، زيادة الكولسترول الدَّموي، المَرض الشِّريانيّ Athéromatose ، الأمراض الجلديّة عند مُصابى الكَبِد، قُوبات، أكزيما، حَبّ الشّباب، داء الدّمامل، روماتيزم، نِقْرس، حَصى، تَنَتْرُج الدّم، نَزارات البَوْل، ضَعْف الكلية، إمساك، تخمُّرات الأمعاء (التهابات المِعَى والقُولُون)، اضطرابات دَموية دَورية: ازْرقاق البَشرة Cyanose وڤاريس، بَواسير، فَقْر الدّم، وَهْن، أَسْقربُوط، نَجيج، سِمنة وبَدانَة، التهاب النَّسيج، كَظَّة الَّدّم.

الاستعمال الخارجي - وَدَق في قَرْنيّة العَين، ثُؤْلُول، كَلَف ونَمَش.

طريقة الاستعمال الدّاخلي - مُستخلَص الأوراق المائيّ (دستور ١٩٣٧) هو الشّكل الأكثر استعمالًا، ومن الخطأ أن يَعتبره البّعض خالٍ من الفّعالية. نُقاعة كمشة (٥٠غ) من الأوراق والجذور المَفرومة في ليتر ماء

يُغلى دقيقتين ويُغطَّى عشرة ويُؤخَذ منه ٣ فناجين يَوميًّا قَبْل الوجبات. عصير الجُذور الخَريفيّة: عصير الجذور الغَضَّة ١٠٠غ، كحول ٩٠ درجة ١٨غ، غليسرين ١٥غ، ماء ١٧غ. يُؤخَذ من هٰذا المَزيج مِلْعَقة كبيرة أو مِلْعَقتان في اليوم. مُستخلص رَخُو في بيلولات من اليوم، مُستخلص رَخُو في بيلولات من الوجبات. المُستخلص المائيّ ١ إلى ٥غ، وهو يُستخدم أيضًا كسَوّاغ لدواء آخر. صبغة من ١٥ إلى ٢٠ نُقطة، ٣

طريقة الاستعمال الخارجيّ - العُصارة اللَّبنيَّة البَيضاء في قَطْرة للعَيْن وفي مُعالَجة الثَّولول. نقيع السوق والأوراق والبراعم لمعالجة وَدَقات القَرْنِيّة، ولترويق العين. ماء الهِنْدَب المُقطَّر في غسيل لمعالجة تَبَقُعات الوَجه. الهِنْدَب بأوراقه وجذره أعيد تسجيله في الفَرْماكوبيا الفَرَنسيّة عام ١٩٧٥.

مرّات في اليوم.

٣٠١- هُوْرا مُفَرْقِعَة، شَجَرَة الشَّيْطان، جَوْز الحَماييك(١)

Sandbox, Possumwood (E)
Sablier, Arbre du diable, Bois de sable,
Noyer de la Jamaïque, Hure (F)
Sandbücksenbaum (D)
Hura crepitans (S)

الهُورا جِنْس أشْجار بَرِّيَّة وحُرجيّة من فَصِيلَة الفَرْبِيُوْنِيَّات. أنواعها المَعروفة

(١) التَّسميات العربيَّة للمؤلِّف.

ه، أعطانها البلاد الاستوائية الحارة.
 هوش أوراقُها مُعنَّقة مُتعاقِبة. نصالها قَلْبيّة الشَّكل، مُستدِقَّة الطَّرف. ثمارها مجموعة من الفُصوص الثُّنائيّة الفَلْقَة تَحضُن بُزورًا لُبَابُها سامّ. الهُوْرا المُفَرْقِعَة من الهند، وتُزرَع في الأنْتيل.

المُرَكِّبات والخصائص - تَحتوى الهُورا على عُصارة كاوية جدًّا تُستخدَم كما هي في البلاد الّتي يُنبت فيها هذا النّبات. النَّمرة، الّتي تَكون عُلَيْبة، بحجم التُّفّاحة، تَنْفَجر تَلْقائيًّا عند إدراكها التام مُحدِثة فَرْقَعة، وهذا ما أكْسَبِها الاسم العِلْميّ Crepitans، تَحتوى على بُزور هي مُقَيِّي وماسِط عَنيف، إذ إنّ مِقدار ٠٠,١٠غ منها تُفرغ المَعِدة تمامًا بقدر ما تَفعله ٢ إلى ٣ غرامات من الجَلبة. ومع ذلك يَستخدِمُها الزُّنوج كمُسَهِّل قَوي. يُستخرَج منها كذلك زيت هو بدوره مُسَهِّل قَوي، ولكن بدرجة أقلّ بكثير (بمقدار ٥ إلى ١٠ غرامات). استخرَج ش. ريشيه من الهُورا جَوهَرين نَشيطين جدًّا دعاهما هُوْرِيْن وكرايبتِيْن.

# ٣٠٢- هُوْشِيْرًا أَمْرِيكَيَّة (١)

American heuchera, Alun root (E)
Heuchère, Racine alumineuse (F)
Alunwurzel (D)
Heuchera americana (S)

نَبات مُعَمّر مُنتصِب من فَصِيلَة

<sup>(</sup>١) التَّسمية لإدوار غالب.

السَّفْرَسِيَّات شَماريخه تَعلو نحو ٥٠سم. أوراقُه جَذْرِيّة، طويلة الاغناق، بَيضويَّة إلى مُستديرة الشَّكُل، خُماسيّة أو سُباعيّة الفُصوص المُسنَّنة الحَافة، نَصلُها خَمليّ البَشرة على صَفحتيه. أزهارُه عُثكوليّة التَّجميع، صَغيرة القُدّ، مُخضَرَّة اللّون الأبيض ثمّ تَنحرِف إلى الحنطيّ. كأسُها خُماسيّة الفُصوص. النَّمرة عُلَيبة مُزدوِجة المَصاريع.

نَبات أمريكا الجنوبيّة حَيث يُستعمَل جَذره كعقّار قابض قَويّ، وهو نَوع مَعقُود التَّعريف على اسم الطبيب النَّمساويّ هُوْشَر (١٦٧٧-١٧٤٧).

ملاحظة - إنّ الاسم الإنكليزيّ Alun ملاحظة - إنّ الاسم الإنكليزيّ root يُطلَق أيضًا على الجيرانيوم المُبَقَّع . Q. maculatum

## ٣٠٣- هَيْطَمَان، فُجُل الخَيْل

Common horse-radisch (E)

Raifort, Cran de Bretagne, Cochiéaria de Bretagne, Cranson, Grand raifort, Raifort sauvage, Moutarde des moines, Moutarde des capucins, Moutarde des Allemands, Radis de cheval (F)

Meer-rettig (D)

Cochlearia armoracia (S)

نبات مُعَمَّر من فَصِيلَة الصَّلِيْبِيَّات. أوراقه كبيرة جدًّا، إهليلجيّة، مُسئَنة، مُعَرَّقة، يَبلغ طولها من ٤٠ إلى ٥٠سم. شمراخه يَحمل أزهارًا صغيرة بيضاء. الجَدر، وهو القِسم الوحيد المُستعمَل، غليظ، لَحْميّ، نام جدًّا، مُصفَرِّ اللُون غليظ، لَحْميّ، نام جدًّا، مُصفَرِّ اللُون

الأبيض، يَبلغ طوله ٧٥سم وقُطره ٥سم؛ ويَعرض وينقسم في قسمه العُلوي إلى فُروع عديدة قصيرة تُكَلّلها ضمّة من الأوراق. سطحه مُصفَرّ اللّون، مالس. إذا مَزَّقنا جَدْر الهَيْضَمان طُوليًا، لا نجد له رائحة مُمَيَّزة بارزة؛ ولكن إذا كَسَرْناه عَرْضيًّا وسَحَقْناه، يَنمو فيه دُهن طعمه حامِز وكاو يُمكننا سحبه بالتَّقطير؛ إنَّه دُهن أثقل من الماء، فاتح اللّون الأصفر ويَحتوي على كبريت؛ وهو اللّون الأصفر ويَحتوي على كبريت؛ وهو لللّون الأصفر ويَحتوي على كبريت؛ وهو اللّون المحبة على غرار دُهون الخَرْدَل واللّوز المُرّ، إلّا بوجود الماء وبتأثير خميرة.

المُرَكِّبات - يَحتوي جَدْر فُجْل الخيل على خميرة تُدعى مِيْرُوزِيْن، وعلى ٣ إلى ٥٪ من هيتروسيد مُكَبَّرَت يُدعى سينيغروسيد أو مِيْرُونات البوتاس. إنّ الميروزين يَتَمَوْضَع حَصْرًا في خلايا خاصة من النسيج الحَشَوِيّ القِشْرِيّ، واللَّيفيّ وفي الشُعاعات اللَّبِيّة.

دُهْن فُجُل الخيل الّذي يَتشَكُّل يَتركُب من حَوالى ٧٠٪ سانيڤول ألّيلي، أي إيزوسولفوسيانات الأليّل المُماثِل لما يُوجد في دُهن الخَردَل، وزيادة على ذلك من سانيڤول فَنيل پروپيليكيّ وسانيڤول أثيليكيّ، ومن المُركّبات أيضًا: مَغنازيا، صُوديوم، بُوتاسيوم، أوكسيد الحديد، حامض كلورهيدريّ، واعض كربُونيك، حامض كربُونيك، حامض كربُونيك، حامض كربُونيك،

مِقدار ١٩٥ ملغ من الفيتامين ٢ مُقابِل كُلُّ منة غرام من المادّة الخضراء.

الخصائص - إنّه أقوى النّباتات الّتي تتصف بأنّها مُضادّة لداء الحَفَر. وهو يُعتبر، بالإضافة إلى ذلك، مُضادّ للنّقرس، مُبُوّل، نافع للمَعدة، مُنْشط قوي الفَعَالية. وذُكِر أنّه مُنَشَط لعَمليّات التّغلية، مُقَشَّع، مُضادّ للتّشلّج، مُدرّ الصّغراء، مُسَهّل قوي؛ من الخارج الصّغراء، مُسَهّل قوي؛ من الخارج يستعمَل كعقار مُحَمَّر للبَشرة ومُنفَظ.

الاستعمال - الجَلْر الطّازج المَبْشور يُوكَل كتابل، وهو يَحتوي على حامِض أسقوربيك وعلى قيتامين الله، فقر الدّم، لمُفاوية، كَسَل هَضمي، فُقْدان الشّهية، نقص أو فُقدان المَعادِن الجَسديّة، داء الحَفر، سِل خادِر، داء الخنازير، رَبُو، برونشيت مُزمِن، رُوماتيزم، نِقْرِس، رُوماتيزم، نِقْرِس، رُمال بَوْليّ، حالات شَلَل، اسْتِسْقاءات، سَيّلان المَهْبل.

عَدَّم الاستعمال - فَجُل الخيل مُضادَّ للاسْتِطْباب مع الكَربونات والبيكربونات القِطَّة، ونُقاعة الكينا، القِطَّة، ونُقاعة الكينا، وثاني كلورور الزَّئبق، إنَّ جلر فُجُل الخيل لا يُستعمَل بشكل مُناسب سوى بعد سَنَة من الزَّرع، ولا يُستعمَل بعد مرور سَنتين على ذلك.

طريقة الاستعمال الذّاخلي - مُسحوق الجُدْر المُجفَّف ٢ إلى ٤ فرامات في اليوم؛ شراب مُضادٌ لداء الحَفْر ٢٠ إلى ١٠٠ فرام؛ شراب فُجْل الخيل المُيَوَّد

(دستور ۱۹۶۹) ۲۰ إلى ۱۰۰ غرام؛ شراب پُوْرتال المُضادِّ للحَفَر ونبيد مُضادِّ للحَفَر (دستور ۱۸۸٤) ۲۰ إلى ۱۲۰ خرامًا؛ كحولة حشيشة الملاعق المُركَّبة (دستور ۱۹۳۷) في نقاط، للاستعمال الخارجيّ. لذكرى التاريخ.

يُمكن تحضير سُكُرور فُجُل الخيل، ذلك بِدَق الهَيْضَمان الطّازج مع السُّكر، وتجفيفه مع بَعض الحيطة. كذلك: نقيع 10 إلى ٣٠ غرامًا في ليتر ماء يُغلى ٥ دقائق ويُترك مَنقومًا لمدّة ١٢ ساعة. فنجانان في اليوم بين الوَجُبات. شَراب فُجُل الحُيل السُّكريِّ المُسرِّكِ، أو شَراب مُضادً لداء الحَفْر (دستور): ٢٠ شَراب مُضادً لداء الحَفْر (دستور): ٢٠ إلى ٥٠ غرامًا في اليوم. للأولاد: ١٠ إلى ٥٠ غرامًا في اليوم (يحتوي أيضًا الماء). شَراب فُجُل الخيل المُضاف إليه على حشيشة الملاعق، والقرّة، ونَفَل الماء). شَراب فُجُل الخيل المُضاف إليه اليوم (دستور) يُعطى منه ٢٠ إلى ٤٠ غرامًا في اليوم للسُعال (٢٠ غرامًا

شَراب فُجُل الخيل: نَقطَع جُدور النَّبات إلى دوائر رقيقة، نَضعها في طبقات على شاشة مُعَلَّقة فَوق صَحْن، نُغطِي القِطَع بالسُّكَر، يُعطى من السّائل الشَّرابيّ الذي يَسيل مِقدار مِلْعَقة كبيرة أو مِلْعَقتين في اليوم.

نَبيد مُضاد للأَسْقَريُوط: جَدَّر فُجُل الخيل الطَّازج ٣٠غ، أوراق فُجُل الخيل الغَضَّة ٣٠غ، أوراق القُرَّة الغَطَّة ١٥غ، أوراق نَفَل الماء الغَطَّة ١٥غ، مَسحوق

ه ي ض

ه ي ض

بزر الخَرْدَل الأسود ٧غ، كُحولة حشيشة الملاعق المُركَّبة ١٦غ، نَبيذ أبيض ليتر واحد. يُعطى من ٣٠ إلى ١٠٠ غرام في اليوم.

طريقة الاستعمال الخارجي - إنّ فُجْل الخيل لا يَفقد خصائصه بالتَّجفيف إذا تَمّ التَّجفيف بالطُّريقة الملائمة (لوياج). ويَكْفي أن نُضيف الماء إليه حتّى يَتُولَّد الزَّيت الطَّيّار فورًا. وقد تَوَصَّل الفَرْماكولوجيّ جِيزُور Gisors إلى اقتراح استعمال مسحوق الهَيْضَمان في كلّ الحالات الّتي يُستعمَل فيها مُسحوق الخُرْدُل. للحصول على مُسحوق الهَيْضمان المُصَرِّف، نُقَطِّع الجَذْر إلى قِطَع من ٨ إلى ١٢سم، ونُجفِّفه في حرارة صَيْفيّة، أو في فُرْن أو مِحَمّ ضعيف التَّسخين، نَخلُط مع الجَذْر الجافّ خُمْس (١/٥) وزنه من يزر الخَرْدَل الأبيض (الغَنيّ بالخميرة)، نَسحق المادَّتين معًا ونُمرِّر على مُنْخُل. لكى نَستعمل لهذا المسحوق، نَتَّبع القواعد المُتَّبعة في تحضير لصُوقات الخُرْدَل العاديّة ذاتها. إنّ هٰذا المسحوق يتطلب بشكل محسوس مَرَّتين أكثر من الماء مِمّا يَتُطلّب الخَرْدُل.

ولكي نَستبدِل كحولة فُوْرِيْه Fauré الخَرْدَليَّة كأَبِيْتَام (۱) Épithème مُحَمِّر للبَشَرة، اقترح لوباج بأن نمْرُث لمدّة البَشَرة، جزءًا واحدًا من المَسحوق

المُصَرِّف في جُزئين من الماء، ومن ثمّ نُضيف: ٣ أجزاء كحول ٩٠ درجة. نُحرِّك المزيج تكرارًا وطوال ٥ إلى ٦ ساعات، نَعْصُر ونُصفِّي.

لُبّ فُجْل الخيل في لَصُوقات (عمله يَفُوق عمل الخَرْدَل): إصابات رئويّة، نِقْرس، آلام روماتيزم؛ لَوْك الجَدْر لمعالجة تَعْرِيَة الأسنان وتَثبيت اللَّنة وتَقويتها.

ملاحظة - زَيت الهَيْضَمان الطَّيّار هو سام لدرجة أنّ العُمّال الّذين يَتعاطون حَمْلَه يَتعرَّضون لنَوبات من السُّعال الحاد وآلام في الرّأس وضعف مؤلم يُصيب أطرافهم وتَهيُّج في العُيون قد يُؤدِّي إلى العَمى.

## ۱۹۰۶ هیُوسِیَامِیْن (برومهیدرات) Hyoscyamine (bromhydrate d') (F)

 $C_{17}H_{23}O_3N$ . HBr = 370,2.

بِلُّورات مَوشُوريَّة الشَّكل تَفْسُد في الهواء، تَذُوب في ۴٫۳ جزء من الماء، جزءي كحول ۹۵ درجة، ۱٦٠٠ جزء أثير عند ۲۵°سغ و۲۰۰ جزء كلوروفورم.

وسَالِسيلات الهيوسيامين:  $C_{17}H_{23}O_3N$ .  $C_7H_6O_3 = 427$  عديمة اللَّون، تَذوب في الماء وفي الكحول.

خصائص الهيوسيامين وطرق استعماله - هي خصائص الأثروپين وطرقه. يُوصَى به بنوع خاص ضِدّ

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمؤلِّف.

الشَّلَلِ المُرَعِّشِ وضِدٌ مَرضِ الرَّقْصِ يُحدثُه الأتروپين: قَطْرات من ٠,٠٥ هي و

بمقادير من ٢/١ملغ. يُحدِث غرام سُولفات الهيوسيامين في ١٠ملل الهيوسيامين تمدُّد الحَدَقَة أَسْرع مِمّا من الماء.

٣٠٦- وَرُخَة الحُقُول، وَرُخَة البَّواسِير(١) Chardon des champs, Sarrète des champs, Serratule hémorroldale (F) Serratula arvenala, Cnicus arvenala, Ciralum arvense (S)

وَرْخَة الحُقول كانت تَشتهر في الماضي لمعالجة البواسير، نَفْتقر إلى مُواصفاتِها البُوتانيكيّة النّوعيّة، وهي تَنتمي إلى جئس نباتات مُعمَّرة بَرُيَّة صباغيّة من فصيلة المُركّبات هو جنس Serratula أي وَرْخ.

نَماتات أوراقُها جلديّة، مُتعاقِبة، مُستَّنة، رَبابيّة أو ريشيّة التَّفليق، منشارية الأسنان، سوقُها فَوديّة أو فَ عاء، مُنتصبة، رؤيساتُها فَردية أو عِذْقَيَّةُ النَّجميعِ الواسِمِ. قُلافَة مُتعدِّدة القُنَابات الرَّقيقة الشِّهَافَة المُّد اكبة بقرُّة. رُهم اتُها أنويتة، يَنفسجتة، أرْجُوانيّة أو سَمْاء اللَّهِ نِ. أَكِناتُها مَ طاء، ذات خُىلُوع طُولَيَّة، وسُرَّة جانبيَّة، قُلُزُعتها من الأوبار الدُّقيقة الأسنان. من هذا الجنس في لبنان نوع نَجْمَى أي عَديم السّاق. (اطلب رسمة في هذا المُعجم).

٣٠٧ - ونْكًا لُبْنَانِية، مِنَاقِيّة لُبْنَانِيّة، قَطَياب كثنانق Lebanon periwinkle (E) Pervenche du Liban (F) Libanesin sinngriin (D) Vinca libanotica. Vinca herbacea var. libanotica (S)

نَبَاتَ بَرِّي عُشبيَّ طبِّنَّ مُعَمِّر من فَصِيلَة

٣٠٥- وَات الحَبَشَة، فُلَفُل السُّودان، جَهُ زَةَ الشُّرْكِ، فَلَفُل فَيْنِيا

African pepper tree, Guinea pepper (E) Xylople d'Ethiopie, Poivre d'Ethiopie, Poivre de Guinée (F)

Athlopischer pfefferbaum, Mohrenpfeffer (D)

Xylopia athiopica. Unona piperita, Unons athiopica, Halzebia athiopica (S)

شَجَرة مُتوسطة الفَدّ من فصيلة القشطيات مهدها الساحل الأفريقي الغَربيّ. أوراقُها مُتعاقِبة، كاملة، مُعنَّقة، نصلها إهليلجيّ الشُّكُل جلديّ الصُّفحة، قصير العُنُق. أزهارُها فرديّة التَّجميم، إبطيّة الارتكاز، عديدة التَتَلات البَيضاء، ثمارها عُنَسات مُستطيلة تَجتمع في باقات من ٨ إلى ١٠، وتُعلُّف صَفًّا واحدًا من البزور الأجانية الشُّكُل.

الخصائص - الثِّمار واليُّزور من التُّوايلِ المُنشِّطةِ. إنَّ لُبِّ غِلافِ النُّمِ ة يتحلّى بمذاق لاذع، عِطري ومسكيّ بَعض الشِّيء، وهو يُستعمل استعمال النِّهَادِ ات.

الدَّهُلِيَّات وهو قريب جدًّا من الوِئكا المُسَطَّحة، حَمْلُها ذاته ولكنّه أقوى منه قَدًّا. أوراقه صغيرة السُّويقات جدًّا، حَوافيها مَلْساء ومَرْطاء، كذلك حَوافي الكاس. التّاج أكبر بقليل من تاج الوِئكا المُسَطِّحة، فُصوصُه حَادة أكثر.

يُزهِر لهذا النَّوع من نَيسان إلى خُزيران، في الجبال والصَّحراء وحسب الارتفاع عن سَطع البَحر، ويَنْبُت في الجبال السُّفلى والمُتوسَّطة، من ٣٠٠ إلى ٢٠٠٠ متر.

الخصائص - ذكر أنّ أوراقه الخَضراء لا تَخلو من المَنافِع الطبَّيّة أخصّها في السَّيلان وانقطاع الطَّمْث. وقد تَحوي بَعض القيتامينات الكثيرة النَّفع (الموسوعة).

مُلاحظة - مِن المُفيد جدًّا تَحليل هٰذا النَّبات اللَّبنانيّ بَحثًا عن قِلَوِيْدات الْواع الوِيْكا المُختلِفة، وخاصة عن احتمال وُجود القِنْكَامين، قِلَوِيْد الوِئْكا الصَّغيرة بنوع خاص، الَّذي يَلْقَى رَوَاجًا تجاريًّا بارزًا وأكيدًا منذ سَنوات عديدة نَظرًا لقُوائده الطبيّة المُتميّزة.

5

٣٠٨- يَلانْج يَلانْج، يُنُون عَذْب، كَانَنْهَا عِطْرِيَة

Ylang-ylang tree, Macassar-oil tree (E) Ylang-ylang, Ilang-ilang, Hilang-hilang, Alangilan, Canang des Molluques, Unone odorant, Arbre d'huile de Macassar (F)

Canangabaum (D)

Cananga odorata, Unona odorantissima, Artabotrys odoratissimus (S)

شَجَرة من فَصِيلَة القِشْدِيَّات تُزرَع بِسُكل عام حَول المساكن في آسيا الاستوائيّة نظرًا لرائحتها الذَّكِيّة الشَّديدة العُذوبة التي تُذكِّر برائحة الياقُوتيَّة والقرنفول. مَهدُها مَدَغَسْقر وتَنتشر في جاوا، سُومَطْرَة، الفيليبين، ماليزيا، الاتّحاد، الكُومُور؛ أزهارها خضراء اللّون ولكنَّها جميلة جُريسيَّة الشَّكُل، اللّون ولكنَّها جميلة جُريسيَّة الشَّكُل، يَمرثها الهنود في زَيت النّارجيل لكي يَصنعوا منها كريمة مُعطَّرة يَمسحون بها أجسادهم وشَعْرهم، وهي أزهار تُعطي بالتَّقطير المائيّ ٢ بالمئة من الزَّيت اللَّهنيّ الطَّيَّار الشَّديد العُذوبة.

المُرَكِّبات - زَيت دُهنيّ من تَقطير الأزهار بالبُخار، يحتوي على لِينالُول

حُرّ ومُوَسْتَر Estérifié، سافْرول، أوجينُول، جيرانيُول، پينان، كادينان، الموشين تَرپان، بَنْزُوات البَنْزيل، حامِض أستيك، حامِض بَنْزُويك، حامِض فُورميك، حامِض سالسيليك، حامِض ناردينيّ مُرَكَّب... يَختلِف الزَّيت حَسب الضُّروب. كثافته تَتَقارب من حَسب الضُّروب. كثافته تَتَقارب من وهو يذوب بكامله في الأثير. تَصبُّنه بواسطة البوتاس يُعطي الحامِض بواسطة البوتاس يُعطي الحامِض النَنْزُويك.

الخصائص - مُخَفَّفة للتَّوتُّر التَّنَفُسيّ Hyperpnée ومُخَفِّفة لإسراع القَلْب، مُهدَّئة مُنْقِصة للتَّوتُّر الشِّريانيّ، مُهدَّئة للانفعاليَّة والتَّهيُّجيَّة الانعكاسيّة مُقوِّية للباه، مُضادَّة للتَّشنُّج.

الاستعمال - رَفَّة القَلْب، ارتفاع تَوَتُّر الشِّريان (الضَّعْط)، إصابات الأمعاء، إفرازات مُتَقيِّحة، عجز جنسيٌ، برود جنسيّ.

طريقة الاستعمال - من الدّاخل: دُهْن الكاننْغا من ٢ إلى ٥ نقاط، ثلاث مَرّات في اليوم، مع العسل أو في مَحلول كُحوليّ. من الخارج: الدُهْن في مُسْتَحْلَب مائيّ Émulsion أو في محلول كُحوليّ. الكاننْغا العِطريّة تُستعمَل جدًّا في صناعة العُطور وبتصنيفات وأسماء عديدة، تبعًا لقيمة الزّيت الدُهنيّ المُستعمَل ومصدره النّباتيّ.

۱۹۰۹ بُوپُون، شاي كارولينا، بَهْشِيّة Yaupon, Thé de Caroline (F) كاسِّيْن (۱) العد cassine (S)

يُوپُون هو الاسم الّذي يُطلِقه هُنود أمريكا الجَنوبيّة على أوراق بَهْشيَّة كاسيّن، من فَصِيلَة البَهْشِيّات. وهو نَبات يَخلطونه مع أنواع أخرى من الفَصِيلَة ذاتها: كَبَهْشِيّة داهُون (٢) Ilex (٢) والبَهْشِيَّة المُقَيِّنَة (٢) Dahoon والبَهْشِيَّة المُقيِّنَة (٢) vomitoria ويُحضّرون منها مَشروبًا يأخذونه كمُنشِّط وبَديل للمشروبات يأخذونه كمُنشِّط وبَديل للمشروبات المُسْكِرة، كالماتي أي شاي البَراغواي. البُويُون يَحتوى على كافيين.

## ٣١٠- يُود ومُشْتَقَاتُه

#### Iode et ses dérivés (F)

الخصائص الدّاخلية - ١° إنّ عمل السيُود ومُ شستقاته (يُودورات، يودَالْبُومينات، إلخ.) على الجريان الدَّمويّ يَختلف باختلاف الظُّروف الّتي تَتمّ فيها مُراقبته (فرق عمل يُودور البوتاسيوم وبَقيَّة المُركَّبات المُيَوَّدَة، مقادير عِلاجيّة ومقادير سامّة، حالة الفَرْد الصِحِّيّة أو المَرضيّة، تَجربتُه على الإنسان أو على الحيوان، إلخ.). ومع ذلك، فإنّه من المقبول عمومًا أنّ اليُود ومُشتقاته تكون، بمقادير عِلاجيّة، مُوسَّعة عُروقيّة (خافِضة الضَّغط مُوسَّعة عُروقيّة (خافِضة الضَّغط

الشِّريانيِّ) تُنَشِّط وتُعدِّل بذلك الجَريان الرَّئويِّ، والجَريان الرِّئويِّ، والجَريان الرِّئويِّ، والجَريان الرِّئويِّ، والجَريان الرِّئويِّ، والجَريانات الحَشَوِيَّة، وتُخفِّف تبعًا لذلك من عَمل القَلْب، ومُختلَف ضُروب القُلاب المُزمِن (التهاب العَضَلة القَلبيَّة)، وفي مُعالجة التهاب الوَتِين المُزمِن، وفي أَمْدَمَات Anévrismes الموتين أي الشريان الأورْطِيِّ، وفي المَوتين أي الشريان الأورْطِيِّ، وفي تَصَلُّب الشَّرايين بشكل عام (ما عدا فترة الأوديمات).

Y° إنّ الأدوية المُيوَّدة تَعمل على التَّنفُس بتَسْييل النُّتاحات الشُّعبيَّة الرِّئويّة وإحداث التَّقشُّع من جرّاء ذلك؛ ومن هنا وصفها في الرَّبُو المَصحوب بانتفاخ الرِّئة، وفي التهاب الشُّعَب المُزمِن، إلخ.

" إنّ اليُودِيّات (١) بتنشيطها القَوي لوظائف الأعضاء أو بتنشيطها القَوي لوظائف الأعضاء أو الأنسِجة اللَّمْفاوِيّة والأغشية المَصْلِيّة وهنا خاصِّيّتها العِلاجيّة الجَوهريّة وهنا تَفاعُلات الدِّفاع الجَسديّ؛ وهي تُنشِط بنوع خاص إنتاج الكُريْضات الأُحادِية الخَلِيّة الّتي يَبدو أنّها تَتَدخَّل في القضاء على البكتيريات المَرَضِيّة (بَلْعَمة Phagocytose) وتَقضي بالتّالي على توكسيناتها. ومن جهة أخرى إن تأثيرات اليُوديّات الجيّدة مَعروفة منذ تأثيرات اليُوديّات الجيّدة مَعروفة منذ زمن طويل، وبخاصة تأثيرات اليُودوعَفْصِيّات في مُعالجة اللَّمْفاوِيّة ومُعالجة اللَّمْفاوِيّة أي العِقْدة الخَزيريّة .

ي و د

<sup>(</sup>١) التَّسميات العربيَّة للمؤلِّف.

<sup>(</sup>٢) التَّسمية للمؤلَّف.

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمؤلِّف.

8° تعمل اليُوديّات أيضًا كأدوية مُغَيَّرة للتَّغذِية؛ فهي تزيد نَشاط التَّبادُلات المِخْدَائيَّة، وبنوع خاص تَزيد نَشاط تَطوُّرات أو سِياق تَنْكِيْث الهَيُولِيّات أي تَضادَّ تَمَثُّل المِروتيدات (فَرْط البَيْلة الأَرُوتيَّة: Hyperazoturle) وبَعض الأَرْوتيَّة التَّكُوُّن مِثال الصَّموغ النبيجة الحديثة التَّكُوُّن مِثال الصَّموغ والعَرَنات السَّفلييَّة أي الأورام المَظيية والعَرنات السَّفلييَّة أي الأورام المَظيية مُعالجة هذه الحوادث النُّلاثيّة أَفْعَل مُعالجة هذه الحوادث النُّلاثيّة أَفْعَل

بكثير من بَقيَّة اليُودورات أو المُركبات المُيَّادة).

إنّ اليُود ومُشتقاته، أخيرًا، تُنمّي إفرازات مُعظم الغدد وتزيدها (الغدد اللّمابيّة، الدَّمعيّة، والعَرَقِيّة)، غير أنها تُقلّل الإفراز اللَّبنيّ.

إِنَّ ازدياد النَّشاط لهذا ربَّما يكون مَردَّه إلى التَّهيُّج الَّذي يُحدِثه اليُّود في الأعضاء التي تميل عندها إلى التَّخلُس منه.

# ملاحق / Appendices ملاحق

```
    الفصائل النّباتية
    عربين = فرنسين - إنجليزي = لاتينين
    المُركّبات الكيميائية في النّباتات
        فرنسين - عربين
    الوصفات الطّبّيّة
        فرنسين = إنجليزي - عربين
    المُصطلحات الطّبّيّة
        فرنسين - إنجليزي - عربين
    المُصطلحات عربين
    بيوهرافيا
    بيوهرافيا
    فرنسين - عربين
```

# ١ - الفَصَائِلُ النَّبَاتيَّة

# عَرَبِيّ - فَرَنْسِيّ - إنجْليزيّ - لاتِينيّ

Tamaricacées (F) Tamaricaceæ (ES)	أَثْلِيَّات
Araliacées (F) Araliaceae (ES)	أَرَالِيَّات
Méliacées (F) Meliaceæ (ES)	ٳڒ۠ۮؘڔؘڂ۠ؾؽٙٵؾ
Passifloracées (F) Passifloraceæ (ES)	آلاميّات (غ)
Combrétacées (F) Combretaceae (ES)	إِهْلِيلَجِيَّاتَ
Solanacées (F) Solanaceae (ES)	بَاذِنْجَاْنِيَّات
Caricacées, Papayacées (F) Caricaceae (ES)	بَبّاياوِيّات
Berbéridacées (F) Berberidaceae (ES)	بَرْ بَرِيسِيَّات
Typhacées (F) Typhaceæ (ES)	بِرْكِيَّات، بُوْطِيَّات
Polygonacées (F) Polygonaceæ (ES)	بَطْبَاطِیَات
Anacardiacées (F) Anacardiaceæ (ES)	بُطْمِيَّات
Violacées, Violariacées (F) Violaceæ (ES)	<u>ب</u> َنَفْسَجِيَّات
Ilicacées (F) Ilicaceæ (ES)	بَهْشِيًّات
Polygalées (F) Polygaleæ (ES)	بُولُوغالِنيَّات
Moracées, Morées (F) Moraceæ (ES)	تُوْتِيَّات
Orobanchacées (F) Orobanchaceæ (ES)	جَعْفِيْلِيًّات
Borraginacées (F) Borraginaceæ (ES)	حِمْحِمِيَّات
Plantaginacées (F) Plantaginaceae (ES)	حَمَلِيّات
Renonculées (F)	حَوْذَانِيَّات (سبط شَقِيقِيَّات)
Phœophycées (F)	ختّ أَسْفَع
Rhodomélacées (F)	خُتُيَّات خُمْر

Papavéracées (F) Papaveraces (ES)	خشخاشهات
Éricacées (F) Ericacea (ES)	خَلَنْجِيَّات
Scrofulariacées (F) Scrophulariacea (ES)	خَنَازِيْرِيَّات
Caprifoliacées (F) Caprifoliacem (ES)	خَيْمانِيَّات
Ombellifères (F) Umbellifers (ES)	خُپُوپّات
Hypericacées (F) Hypericaces (ES)	دَاذِيًّات
Dipancées (F) Dipances (ES)	وبساسيات
Apocynacées (F) Apocynaces (ES)	ولمليئات
Dioscoréacées (F) Dioscoreacem (ES)	<b>ڊ</b> يُوْسْقُورِيَّات
Primulacées (F) Primulaces (ES)	رٌ بِيْمِيَّات
Aristolochiucées (F) Aristolochiuces (ES)	زَرُ اوَ نُدِيّات
Lilincées (F) Liliacen (ES)	زَنْبَقِيَّات
Zingibéracées (F) Zingiberaces (ES)	زُنْجَبِيْلِيُّات
Méliacées (F) Meliaces (ES)	زِنْزَ لَحْنِيَّات
Oléacéen (F) Oleaceæ (ES)	زُيْنُونِيَّات
Sapindacées (F) Sapindaces (ES)	سَابَنْدِيّات
Sapotacées (F) Sapotaces (ES)	سَبُوْتِهَات
Orchidacées, Orchidées (F) Orchidaces (ES)	سَحْلَبِيَّات
Rutacées (F) Rutaces (ES)	سَدًابِيًّات
Chénopodiacées (F) Chenopodiaces (ES)	سَرْمَلِيًّات
Cupressinées (F)	سَرْوِيًّات، سَرْوِيَّة
Cypéracées (F) Cyperaces (ES)	سُفْلُويّات
Saxifragacées (F) Saxifragaces (ES)	سَفْرَسِيَّات
Pédaliées, Pédalinées (F) Pedaliz (E)	سَمْسَقِهَات
Mimosées (F) Mimosa (E)	سَنْطِيَّات (قبيلة)
Fagacées (F) Fagaces (E)	سَوْمَلِيًّات
Lécanoracées, Lécanorées (F) Lecanoraces (ES)	شخويات
Labiées (F) Labiate (ES)	شَفُويًّات
Cactacion (F) Cactacon (ES)	صَبّاًريّات

Salicinées (F) Salicacea (ES)	متفصابيات
Asclépiadacées (F) Asciepiadacea (ES)	صْفْلابِئَات
Crucifères (F) Cruciferæ (ES)	صَليبيَّات
Ficoïdacées (F) Ficoidaceæ (ES)	ظَهْرِيَّات
Mesembryanthémacées (F)	طَهِيْرِيَّات هي الطُّهْرِيَّات
Zygophyllacées (F) Zygophyllaces (ES)	<b>هَرُ قَدِيَّات</b>
Eupatoriées (F)	<b>فَفْ</b> یُّات (قبیلة مُركِّبات)
Euphorbiacées (F) Euphorbiaces (ES)	فَرْ بِيُوْ نِئًات
Pipéracées (F) Piperacea (ES)	فِلْفِلِيَّات
Fucac <del>ées</del> (F) Fucaceæ (ES)	فَوْ لَسِيًّات
Rubiacées (F) Rubiaces (ES)	كُورُيَّات
Célastracées (F) Celastracea (ES)	فَاتِيًّات
Urticacées (F) Urticacem (ES)	فْرَّ اصِبًات
Cucurbitacées (F) Cucurbitaces (ES)	فَرْجِبَّات
Cornactes (F) Cornacea (ES)	فُرْ نُوْسِيًّات
Légumineuses (F) Leguminoseæ (ES)	<b>فَرْنِيًّات</b>
Annonacées (F) Annonaces (ES)	<u> ف</u> ِثْدِيًّات
Annonacées (F) Annonaces (ES)	فِشْطِيًّات
Aracées (F) Aracem , Aroldacem (ES)	كملقاسيئات
Cannacées (F) Cannacee (ES)	لمُنَويّات
Ampélidacées (F) Ampelidacem (ES)	كُرُّ مِبَّات
Laminariacées (F) Laminariaces (ES)	لامِيْنَارِيَّات
Convolvulacées (F) Convolvulaces (ES)	لَبْلابِيَّات
Loganiacées (F) Loganiaces (ES)	لُوْخَانِيَّات
Thyméléacées (F) Thymeleacee (ES)	مارْزُوَ انِيَّات
Crassulacées (F) Crassulaces (ES)	مُخَلِّدَات
Composées (F) Composite (ES)	مُرَكُّبَات
Magnoliacées (F) Magnolacem (ES)	مَفْنُولِيَّات
Musacées (F) Musaces (ES)	مَوْزِيًّات

Monimiacées (F) Monimiaceæ (ES)	مُوْنِيْمِيَّات
Rhamnacées (F) Rhamnaceæ (ES)	نَبْقِيَّات
Graminées (F) Graminaceæ (ES)	نَجِيْلِيَّات
Palmacées, Palmiers (F)	نَخُلِيَات
Amaryllidacées (F) Amaryllidaceæ (ES)	نَرْجِسِيَّات
Hémiptères (F) Hemiptera (ES)	نِصْفِيّات الجَنَاح
Amomées (F)	هَالِيَّات (قبيلة زَنْجَبيلِيّات)
Rosacées (F) Rosaceæ (ES)	<b>وَ</b> رْدِيَّات
Cucurbitacées (F) Cucurbitaceæ (ES)	يَقْطِينيَّات

# ٢- المُركّباتُ الكيميَائِيَّة في النّبَاتات

# فَرَنسيّ - عربيّ

- أقاسيا ، سَنْط –

- Acacia (Écorce)

- قشرة أقاسيا

قشرة تؤخذ من عِدّة قَرنيّات من جنس أقاسيا تحتوي على مادّة دابغة مُقدَّرة جدًّا ومُؤلَّفة من حوالي ٣٥٪ من العَفْص. مثال: قشر الميموزا.

- Acacia (Essence)

- دهن أقاسيا

زيت دُهنيّ عطريّ يُستخرج من أزهار عدّة أنواع من الأقاسيا عن طريق الاستنزاف في الشَّحم السّاخن. مثال: أقاسيا العنبر . Acacia farnesiana willd. الميموزا، سَنْط شائع

- Pseudo-acacia (Essence)

- دهن أقاسيا كاذبة

زيت دُهنيّ عطريّ يُستخرج من أزهار الأقاسيا الكاذبة أي الروبينيا ويحتوي على أنْتر انيلات المتيل، لينالول، نارول، ألفاتَرْ بينايول.

2- Achillée noble (Essence)

- أخيليا ظريفة (دُهن)

زيت دُهنيّ يُستخرج من النّبات المُزهِر Achillea nobilis، وهو مُركّب من بورنيول، كَمفان، كَربُور تركيبه  $C_{10}H_{16}$ . يُستخدم كدواء شعبيّ وكمادّة مُعطّرة للمشروبات.

- أكونيت – أكونيت

الاسم الشائع للأكونيت الهَرَميّ (غ) أو قاتل النَّمر .Aconitum napellus L الشائع، من فصيلة الحوذانيّات.

- Alcoolature d'aconit

- كُحولتور الأكونيت

سائل مُخضر اللَّون البِّتي عندما يكون طازجًا، يميل إلى بنِّي اللَّون الأحمر بعد

(غ) التَّسمية لإدوار غالب.

770

فترة من الزَّمن، يتمّ الحصول عليه من مَرْث أوراق الأكونيت الغَضّة في مقدار وزنها من كحول ٩٥ درجة لمدّة ٨ أيّام.

- شراب الأكونيت - شراب الأكونيت

يحصل من مزج صبغة جذور الأكونيت ١٠غ، مع شراب سُكّر بسيط بمقدار ٩٩٠ غ.

- Teinture d'aconit

سائل بنّي اللّون الأصفر، يحتوي خاصّة على الأكونيتين ويَحصل من مَرْث بارد لمسحوق جذور النّبات في كحول ٩٠ درجة.

- حِرَيف، حامِز - حِرَيف، حامِز

نَعت تعريفي يُطلق على مذاق أو طعم بعض الموادّ عندما يكون لاذعًا وحاتًا أو أكالًا، ويتمركز الإحساس غير المُستحبّ به في الحَلْق خاصّة.

5- Aden (gomme d') – عَدَن (صمغ)

صنف من الصَّمغ العَربيّ يقع في حبوب قاتمة اللَّون الأصفر وتكون ممزوجة مع بقايا كِسرات نباتيّة. وهو غَنيّ بالخمائر المُؤكْسِدَة.

- كُثَيراء - كُثَيراء

صمغ يَقع في صفائح أو في شريط دقيق، لُعابُه جيِّد التَّماسُك، ينتج مختلف أنواع الأسطراغالُس ويُستَعمل كمادة لاصقة أو مادّة مُسْتَحلِبَة.

7- Aegicérine – آجیسارین

صابونين غير واضح التَّحديد، تركيبه:  $C_{22}H_{30}O_4(OH)_6$ ، يُستخرج من لحاء وبزور الآءة الكبيرة أو السَّرْحة الكبيرة $^{(1)}$ . Aegicera majus Gaertn.

- أَهُو ايين – أَهُو ايين

مادّة تركيبها الكيميائيّ  $C_{10}H_{19}O_{10}$  تُستخرج من بزور التَّڤاتيا الدّفليّة الورق Thevetia neriifolia، أو ما يُسمّى بالدِّفلي الصَّفراء.

- حامِض، حازِر

نَعت تعريفيّ يُطلق على كلّ ما له مَذاق أو طعم لاذع يزعج الأسنان أي يُضْرِس. كلّ ما له المذاق الحامض.

<sup>(</sup>١) التَّسميتان للمُؤلِّف.

10- Ailanthine – إيلانْتِين

جوهر مُرّ تركيبه الكيميائيّ  $C_{36}H_{50}O_{10}$ ، يُستخرَج من قشرة جافّة لشجرة السّماء أي الإيلائتُس Ailanthus altissima glandulosa .

# 11- Albumineuse (eau) – زُلاليّ (ماء)

دواء وترياق ضدّ بعض حوادث التَّسمُّم المعدنِيّة، وهو دواء مُركَّب من ٤ بياضات بيض تُحَلِّ في ليتر ماء مُعطَّر بمقدار ١٠ غرامات من ماء زهر البرتقال المُقطَّر.

## - مَنّ الأَشترغار – مَنّ الأَشترغار – مَنّ الأَشترغار

صنف من المنّ له مظهر العسل، تفرزه أوراق الأشترغار Alhagi maurorum . Tourn؛ وهو مزيج من الملازيتُوز ومن السُّكَروز.

## 13- Alkanna (teinture d')

نقيع مائيّ كحوليّ من جذور الحِنّة Lawsonia alba أو جذور الكَنْهان الصّباغيّ المسّباغيّ Alkanna tinctoria أو الشّنجار الصّباغيّ Onosma tinctoria؛ يحتوي النّقيع على جوهر صباغيّ يُدعى Alkannine أو Anchusine يُستخدم في تلوين الحُمرة ومساحيق التّجميل والكريمات المُختلِفة.

## - كِبْرِيتَة ، عُود ثِقاب - كِبْرِيتَة ، عُود ثِقاب

حُطَيبة من الخَشب مُزوَّدة الرَّأس بخليط قابل للاشتعال بواسطة الحرارة أو الاحتكاك.

- كبريتة بالفوسفور الأبيض: تُشَرّب الحُطَيبة وتُشبَع بالكبريت أو البرافين وتُغطَّس في مزيج فوسفور ٣ أجزاء، بيوكسيد الرَّصاص ٢ جزءان، رمل ٢ جزءان، صمغ ٣ أجزاء، ماء ١,٢٥ جزء.
- كبريتة بالفوسفور الأحمر: تُشَرَّب الحُطيبة بمزيج من كلورات البوتاسيوم ١٠٠ جزء، سولفور الأنتيموان (الكُحل) ٨٠ جزءًا، غراء ٢٠ جزءًا، وتتألّف المِدْلَكَة من فوسفور أحمر ١٠٠ جزء، سولفور الأنتيموان ٨٠ جزءًا، غراء ٢٠ جزءًا.
- العجينة التي تشتعل على أيّ مساحة خشنة، تتألّف من سَسْكي سولفور (P2S3) ٦ أجزاء، كلورات البوتاس ٢٤ جزءًا، أوكسيد الزّنك ٦ أجزاء، مُغْرة حمراء (أي تراب صَلْصاليّ Ocre) ٦ أجزاء، زجاج مسحوق ٦ أجزاء، غراء ١٨ جزءًا، ماء ٣٤ جزءًا.

- فتيلة من القطن تُطلى بمزيج من الستيارين والشَّمع: الشَّمعة.

- أَلْوِين – أَلْوِين – أَلْوِين

اسم جِنسيّ يُطلق على جواهر مُتبلِّرة، طعمها مُرّ، ومُؤلَّفة من هيتروسيدات من المجموعة الأنتراكينونيكيّة المُستخرَجة من مُختلف أنواع الألْوَة Aloès. كما يُطلق على مادّة مخزَنيّة في الصَّيدليَّة البريطانيَّة مُركَّبة من مزيج تلك الهيتروسيدات المُستخرَجة من مُختلف أنواع ألْوَة الكاب أو الكُوراساو.

- أمُورفيجانين – أمُورفيجانين

مادّة تركيبها الكيميائيّ C<sub>22</sub>H<sub>22</sub>O<sub>7</sub> تنصهر عند ١٩١ درجة؛ تُستخرج من النّسْتَر المُشْجَر Amorpha fruticosa .

- أُمُورفِين - أَمُورفِين

غلو كوسيد تركيبه الكيميائيّ C<sub>33</sub>H<sub>40</sub>O<sub>16</sub>، ينصهر عند ١٥١ درجة، يُستخرج من النَّسْتَر المُشَجَّر Amorpha fruticosa .

- أنيمونين، كافور الأنيمون

مادة تُعزَل من مُختلف أنواع الحوذانيّات، تركيبها الكيميائيّ  $C_5H_4O_2$ . دواء ضدّ الرّبو، الشُهاق وعُسر الطّمث.

19- Baptifoline – باتیفُولین

قلويد ينصهر عند ۲۱۰°، تركيبه الكيميائيّ  $C_{15}H_{20}O_2N_2$ ، يُعزَل من النَّخْرِط Baptisia perfoliata .

- برغاميول، دهن البرغموت الاصطناعيّ - العرضوت الاصطناعيّ

أستات اللّيناليل المُستعمَل في صناعة العطور لرائحته التي تُشبه رائحة البرغموت.

21- Bergamote (Essence)
 برغَموت (دُهن الـ)

زيت دهنيّ يُستخرج من ثمار النّارنج أي أبو صُفَير Citrus vulgaris، يتركّب من برغَبْتان، د-ليمونان ٤٠٪، أستات اللّيناليل ٣٥٪، نيرول ودييَنْتان.

- بَتُولا (قشرة) 22- Bétula (écorce de)

**NFY** 

اسم يُطلق على زيت دُهنيّ يُستخرج من قشرة البَتولا Betula lenta، وهو سائل

عديم اللَّون أو باهت اللَّون الأصفر، يتركَّب من سالِسيلات المتيل ٩٩,٨٪، ترياكُونْتان ومن پرافين. المرادف: دهن قشر البتولا.

## - قَمْح ، حِنطة (زيت الـ) Blé (huile de)

زيت يُستخرج من رُشَيْمات الحنطة .Triticum sativum L ويحتوي على القيتامينات «أ»، «ب»، «ه»؛ وعلى فيتوستارول، لاستين، حامض أولاييك، لينولاييك، يالميتك، ستياريك، أراشيديك، لينوساريك.

#### 24- Boehringer (oléandrine de)

- أوليانْدرين بُوارِنْجَر

غلو كوسيد مُقوِّ للقلب تركيبه وC31H48O9 ، عُزل من الدِّفلي.

- كامازولان – كامازولان

كربور تركيبه الكيميائيي C15H18، وهو الخضاب الأزرق في زيت البابونج.

26- Caméline (huile) – كاملين (زيت ال

زيت ذهبيّ اللَّون الأصفر، لاذع الرائحة والمذاق، يُستخرَج من بزور النَّضار المزروع Camelina sativa (سمسم ألمانيا).

#### 27- Camellia (huile de)

- كاميليا (زيت الـ)

زيت يُستخرج من بزور شاي يُدعى Thea sasanqua. زيت الشاي.

- كَامَلِّين – كَامَلِّين

غلو كوسيد مُرَّ تركيبه الكيميائيِّ  $C_{18}H_{32}O_{7}$  يُستخرج من بزور الكاميليا اليابانيَّة . Camellia japonica

- كَمْبَستارول – كَمْبَستارول

فيتوستارول ينصهر عند ١٥٧-١٥٨°، تركيبه الكيميائيّ C<sub>28</sub>H<sub>48</sub>O، عُزل من بزور السَّلْجَم (Brassica campestris (Colza).

# - كندا (بَلْسَم) - كندا (بَلْسَم)

مادة راتنجِية يَفرزها تَنُوب كندا: Abies canadensis miller. يحتوي هذا البلسم على بينان، ليمونان، تَرْبينايول. استعمالاته الصَّيدليَّة في التقنيَّات المِجهريَّة، ويُستعمَل في علم البَصَريَّات لتلصيق الزُّجاجات والنيكول Nicols أي بِلُورات إسْلندا، إلخ.

معجون كندا أو مِلاط كندا هو خليط من كربونات الكلسيوم والإسبيداج Céruse والمَرْ تَك أي أوَّل أوكسيد الرّصاص وزيت الكتّان.

#### 32- Cananga odorato (Essence)

# - يَنُون، يَلانج (دُهن)

زيت دُهنيّ يُستخرج من أزهار اليَلانِج Ylang؛ يحتوي على بينان، جيرانيول، لينالول، كادينان، فينول، پ- كريزول. يستعمل في صناعة العطور.

## عناري (زيت) – كناري (زيت) – كناري (زيت)

زیت یُستخرج من بزور الکناریوم الشّائع (۱۱ Canarium Commun L. شجرة من البَخّوریّات. یَترکّب من حامض پَلْمیتیك، ستیاریك، أولاییك، لینُولاییك. مرادفه: زیت لوز جافا.

## عناريوم (دُهن) - كناريوم (دُهن) - كناريوم (دُهن)

زيت دُهنيّ يُستخرج من اللَّبايَة Élémi التي تنتجها كناريوم لُوسُون (١) Canarium (يَتركَّب من ألامِيسِين، فلَّانْدران، ديپنْتان. (لُوسُون هي جزيرة في الفليين).

## عَرْفَة (دهن قشور الـ) – قِرْفَة (دهن قشور الـ)

دُهن سائل باهت اللَّون الأصفر يُستخرَج من قرفة سيلان ويحتوي على ٥٨ إلى ٧٦٪ ألدَهيد عَبْهَريّ، ٤٪ أوجينول. دهن قرفة العين يحتوي على ٨٠ إلى ٩٠٪ ألدَهيد عَبْهَريّ.

## - قرفة (دهن الأوراق) 36- Cannelier (essence de feuilles)

دهن سائل برائحة القرفة والقرنفول، غنيّ بالأوجينول (٧٠ إلى ٧٥٪)، يُستخرَج من أوراق قرفة سيلان.

# - بَيْلُون، قِرْفَة بيضاء (دهن) معرَّفَة بيضاء (دهن) - عَيْلُون، قِرْفَة بيضاء (دهن)

زيت دهنيّ يُستخرج من قشر البَيْلُون أي القرفة البيضاء (من جزر الأنتيل) . Canella alba murr. يحتوي على أوجينول، سينايول، دييَّتان، بينان، كاريوفيلان.

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

- قَنْتاريدين – قَنْتاريدين

جوهر مُنفِّط يتم الحصول عليه من حشرة الذُّرّاح Cantharis وحشرة النَّافِطة . C<sub>10</sub>H<sub>12</sub>O<sub>4</sub> . تركيبه الكيميائي C<sub>10</sub>H<sub>12</sub>O<sub>4</sub>.

## - قَرْع ، يقطين (زيت الـ) - قَرْع ، يقطين (زيت الـ)

زيت يُستخرج من بزور القرع واليقطين Cucurbita pepo، يحتوي على حوامض: يالويتيك، ستياريك، أولاييك ٣٧٪، لِينولاييك ٤٤٪.

- كرابين – كرابين

جوهر مُرْدٍ يُستخرَج من السَّرَغَة الهِنْدَبيّة الورق<sup>(١)</sup> Crepis taraxacifolia.

- كُوراساو – كُوراساو

ليكور يُصنَع من قشر البرتقال والسُّكّر وماء الحياة.

- داتورة (زيت الـ) – داتورة (زيت الـ)

زيت يُستخرج من بزور الداتورة الشائكة Datura stramonium، وهو زيت مُجَفِّف Siccative مُخضر اللَّون الأصفر.

43- Dégueline – داغلین –

مُبيد حشرات تركيبه الكيميائيّ  $C_{23}H_{22}O_6$  يُستخرَج من الحُوَيْراء السّامة (١٠) Tephrosia toxicaria Pers. ومن جذور أنواع مُختلِفة من الدَّرِّيس.

- دالُوزِين – دالُوزِين

Delphinium قلوید ترکیبه  $C_{25}H_{41}O_8N$  یُستخرَج من بزور عائق الحقول consolida .

45- Delphisine – دَلْفِيزين

Delphinium قلوید ترکیبه  $C_{31}H_{50}O_7N$  یُستخرَج من بزور العائق الجَبليّ staphisagria .

- دِیکا (زبدة) – - دِیکا (زبدة) – - الله (beurre de)

مادّة بيضاء اللّون، مُميَّزة الرائحة، تَنصهِر عند ٣٨°، تُستخرَج من بزور إرْفَنْجِية الغابون (١٠). Irvingia gabonensis Baill. (١١)، أولايك، مِيرِسْتيك. مُرادِف: زيت أوبا Huile d'Oba.

TVI

<sup>(</sup>١) التَّمية للمُؤلِّف.

نتاج يحصل بالتّقطير الجافّ للبقايا الحَيوانيَّة كالقرون والجلد والشَّعر، إلخ. أو الأُكْسِبة من بعض النَّباتات؛ وهو سائل زيتيّ المظهر، لاهِب المذاق، يحتوي على يريدين. مُرادِفه Huile de Jepell.

Alstonia scholaris قلوید ترکیبه  $C_{16}H_{19}O_2N$  یُستخرَج من قشرة ألسْتُونیه . Muelb

## - دريوفَنْتِين - حريوفَنْتِين

مادة تركيبها الكيميائي C23H28O15 تُستخرج من عَفْصَة أوراق الملُول والسِّنديان المُزَنِّد Quercus pedunculata .

## - أُطُوم، زالِخَة (زيت) 50- Dugong (huile de)

زيت يُستخرَج من وَدَك (شحم) أطُوم أستراليا(۱) Halicore australis، وأطُوم الهِنْد (۱) Halicore indicus ، مادّته غير المُتَصبِّنة هي ٣,٧٤ بالمئة.

والأَطُوم أو الزّالِخة أو المَلِصَة هو من الحِيتان البَحريّة اللَّبونة العاشِبة. لحمها مأكول. جلدها يصلح للنِّعال.

## 51- Élatérinoside – أيلاتَرينُوسيد

مزيج من جِسمين مُتَجازِئين ألفا وبيتا، تركيبه الكيميائيّ C<sub>28</sub>H<sub>38</sub>O<sub>7</sub> وُجدا في عصير القِنّاء البرِّيّ أي فَقُوس الحَمير Ecballium elaterium Rich. مُسهِّل ماسِط عنيف مُرادِفه أيلاتيرين Élatérine.

## - أَمُودِينَ، أَمُودُول 52- Émodine, Émodol

مادّة تركيبها الكيميائيّ  ${
m CH}_3$  -  ${
m CH}_3$   ${
m CH}_3$   ${
m CH}_3$  مادّة تركيبها الكيميائيّ غلو كوسيدات الأَلْوَة والجلهم والرّيباس. دواء مُسهّل.

## - مُزِيل الحِبر – مُزِيل الحِبر

نعت تعريفي يُطلق على مواد تُيُوسُولفات الصّوديوم مع بَرمَنْغَانات البوتاسيوم بإمكانها إزالة بُقع الحِبر.

(١) التَّسمية للمُؤلِّف.

144

مزيج من السَّكاكر المُختلِفة كالسَّكّاروز والوانيلين والحامض الوانيليّ، وهو مزيج يحصل من فَصْد القيقب الأبيض Acer saccharinum بواسطة المِشْعَب أو المِثقاب Vilebrequin .

## - أَرْغُوت (زيت الـ) 55- Ergot (huile d')

سائل باهت اللَّون الأصفر، غير مُجفَّف، يُستخرَج من أرغُوت الشَّيْلم أي فطر الدَّابرة Claviceps purpurea. يحتوي الزَّيت على غليسارول، كولسترول، حوامض: أولايك، پَلميتيك، بوتيريك، أستيك.

## - أريفارون (دُهن الـ) – أريفارون (دُهن الـ)

سائل باهت اللَّون الأصفر، برائحة الكَمُّون، يُستخرج من أزهار أريغارون كندا Erigeron Canadens L. يحتوي على سيترونَلُّول، ليمونان، تَرْبِينايول.

# - شَمار، شُمرة، شُومار (ماء الـ) - شَمار، شُمرة، شُومار (ماء الـ)

محلول مائتي مُشبَع بواسطة زيت الشومر الدُّهنيّ (ملحق الكودكس).

### - Essence de fenouil من الشمار – دُهن الشمار

زیت دهنیّ یُستخرَج من بزور الشومر .Fæniculum vulgare Mill، یحتوی علی أنیتول، د- پیتان، فلّانْدران، فَلّانْدرال، أنْدرُول، فَنْشون.

### - Essence d'herbe de fenouil - دهن عشبة الشمار

سائل عديم اللَّون، برائحة الطَّرخون، يُستخرَج من فروع وأوراق الشومر . Fæniculum capillaceum Gilibert

## 58- Fenugrec (huile de) – حُلْباء (زیت الـ)

## 59- Fraise (huile de) – شَيْلُك (زيت الـ)

زيت مُجفِّف جدًّا يُستخرَج من بزور الفريز. يحتوي على حامض لينولاييك، حامض لينولانيك.

- مُرّان (زيت الـ)

60- Frêne (huile de)

## 61- Gatillier (essence de) – إِرْثِد (دُهن الـ)

زيت دُهنيّ يُستخرَج من أوراق الإرثد Vitex agnus - castus، وهو سائل ليمونيّ اللَّون الأصفر، نَفّاذ الرّائحة، يحتوي على سِينايول، سابينان وكينون. إرْثِد، سَرْساد، شجرة إبراهيم.

62- Gelsémine - جَلْسامِين

قلويد يُستخرَج من ريزوم الأرْطاة Gelsemium sempervirens، تركيبه الكيميائيّ C<sub>20</sub>H<sub>22</sub>O<sub>2</sub>N<sub>2</sub>، وهو دواء ضدّ العُصابات السِّنيَّة. ويُطلَق الاسم أيضا على مُستخلَص مسحوق يُحضَّر من النّبات ذاته.

## - عِطر، عَيْهُون العِطر (دهن) – عِطر، عَيْهُون العِطر (دهن)

دهن الجيرانيوم هو سائل عديم اللّون، عذب الرّائحة، يُستخرَج من أزهار العطر Pelargonium capitatum Ait.

# - فِيكُوس، بَدَح (شَمْع الـ) – فِيكُوس، بَدَح (شَمْع الـ)

شمع يُستخرَج من حِلباب فيكوس الشَّمْع (١٠) Ficus ceriflua Jun، يحتوي على فيكوساريلات الفِيكوساريل. استعمالاته: في صنع الشُّموع.

## 65- Hédérique عَدَرِيك -

نَعت تعريفيّ يُطلَق على حامض تركيبه الكيميائيّ C15H26O4 يُستخرَج من بزور العَشْقَة Hedera helix .

## - قارِيَة (زيت الـ) 66- Hickory (huile d')

زيت يُستخرَج من ثمرة القارِية الزَّيتونيَّة Carya olivæformis يحتوي على الحوامض التالية: أولاييك، لينولاييك، ميرِسْتيك، پالميتيك، ستياريك، أراشيديك، وعلى لاسِتين، وعلى فيتوستارول.

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

زيت دهنيّ، سائل بُنِّيّ اللَّون، يُستخرَج من أوراق الخَمان الصَّغير Sambucus . وفي . ebulus L.

#### 68- Houblon (essence d')

- جُنْجُل (دهن الـ)

زيت دهنيّ سائل باهت اللّون الأصفر إلى الأحمر البنّيّ، عطريّ الرائحة، يُستخرّج من الأكراز أو من الأوبار الغدّيّة في حشيشة الدّينار . Humulus lupulus L يحتوي على ديهنّتان، ميرسان، لينالول، حامض إيزونونيليك، ألفا وبيتا كاريوفيلّان.

- هُومُولُون – هُومُولُون – هُومُولُون

اسم يُطلَق على حامض مُرّ الطَّعم يوجد في الجُنْجُل ويعطي بالتَّحويل راتنج ألفا. وهو حامض تركيبه الكيميائيّ C21H30O5. مُرادِفه: حامض لُويُولينيك.

70- Ilexanthine - أَيْلَكُزَ نْتين -

اسم يُطلق على مادّة صِباغيّة صفراء اللّون يتمّ الحصول عليها من أوراق عود الخير أي بَهْشيّة الدّبق، تركيبها ،C17H23O1 .

- أَيْلَكْسِيك – أَيْلَكْسِيك

نَعت تعريفيّ يُطلق على حامض يتمّ الحصول عليه من أوراق بَهْشيّة الدِّبق Ilex .aquifolium

- أَمْبَرِيالين – أَمْبَرِيالين – أَمْبَرِيالين

قلويد تركيبه الكيميائيّ  $C_{35}H_{60}O_4N$  يُستخرَج من درنة العَرار القَيصريّ أو إكليل الملك. Fritillaria imperialis L.

## 73- Inule odorante (essence d') (دُهن الـ)

زيت دُهني، سائل بنّي اللّون، مُخضَرّ الاستشعاع، يُستخرج من الرّاسن العطريّ Inula graveolens. يحتوى على أستات البورنيل.

## - راسَن دَبِق، طَيُون (دهن الـ) – راسَن دَبِق، طَيُون (دهن الـ)

زيت دُهنيّ، سائل فاتح اللّون البنّيّ برائحة الأوكاليِتُوس، يُستخرَج من عشبة الطُّبّاق أي الطّيون Inula viscosa. يحتوي على سينايول.

جسم يُستخرَج من ثمار أنواع مُختلِفة من السّمّاق Rhus بواسطة العَصْر السّاخن أو بواسطة غليان الثّمار المجروشة في الماء. يَتقارب شمع اليابان من الموادّ الدّسمة أكثر منه إلى الموادّ الشَّمعيّة.

مُركِّباته هي غليسَّريدات الحامض النَّخليّ والحامض اليابانيّ: Ac. japanique مُركِّباته هي غليسَّريدات الحامض النَّخليّ والحامض الأقمشة أي صقلها وتَنْشِيتها، ويُستعمَل كذلك لصنع كريمات للأحذية.

#### 76- Jasmin (essence de)

- ياسمين (دُهن الـ)

- لادَن، لاذَن

زيت دُهنيّ يُستخرَج من أزهار الياسمين الإسبانيّ .Jasminum grandiflorum L. يحتوي على أستات البّنزيل، كحول بَنْزيليك، لينالول، أستات اللّيناليل، پ-كرازول، جيرانيول، إنْدُول، أنْترانيلات المّتيل، جَسْمُون.

- كارابين – كارابين

اسم يُطلق على مادّة راتنجيّة تُستخرّج من الدِّفْلي تركيبها الكيميائيّ C<sub>21</sub>H<sub>49</sub>O<sub>6</sub>.

78- Kermès – قرمز

القرمز هو جسم حشرة مُجَفَّف تعيش على سنديان بُلاخ أو بَلْخ Chêne kermès. يحتوي على مادّة صِباغيّة حمراء اللّون البنِّيّ القَويّ، تُستعمَل في صباغ الجلود بإضافة مُرْسِخ من الشَّبّ. القرمز النّباتيّ هو عَفْصَة الملّول المُستعمَلة في الصّباغة.

– لَكْتُوسارول – لَكْتُوسارول

اسم يُطلق على كُحولَين مُتجازِئين ألفا وبيتا، تركيبهما الكيميائي C<sub>18</sub>H<sub>30</sub>O، يُستخرَجان بشكل أسْتَرات خَلِّية من الخَس السام .Lactuca virosa L

## 80- Ladanum, Labdanum

راتنج أسود اللّون برائحة العنبر، يُوجَد على فروع وأوراق اللّادَن الإكريتيّ . Cistus creticus L.

## - لادَن، لأذَن (دهن الـ) – الأدَن (دهن الـ) – الأدَن الـ

سائل أصفر اللَّون البنِّيّ، رائحته مُكوفَرة، يُستخرَج من اللَّادَن الإكريتيّ، يتركَّب من أسيتوفينون، غايول،...

بلسم مائع مُصفَرّ اللّون، ثقله النّوعيّ ٠,٩٥، رائحته بلسميَّة مُسكِّنة وطعمه مُرّ، يذوب في الكحول، الأثير، الأستون، ويُستخرّج من شجرة Balsamodendron.

#### 83- Lanoléine, Lanoline

## - لانُولايين، لانُولين

جسم دسم غَنيّ بأستيرات الكولسترول، يُعزَل من المياه الصّابونيّة التي تُستعمَل في غسيل الصوف. يُستعمَل كمادّة حالَّة. ويُستعمَل كسَوّاغ.

- مَناسِين – مَناسِين – A4- Manacine

قلوید یُستخرَج من أوراق المَنککَة $^{(3)}$  Brunfelsia hopeana ترکیبه الکیمیائی  $C_{22}H_{32}O_{10}N_2$  أو  $C_{15}H_{22}O_5N_4$ .

### 85- Mandarine (essence de)

# - مَنْدَرين (دُهن الـ)

زيت دُهنيّ ذهبيّ اللّون الأصفر، يُستخرج من اللّيمون أفَنْدي أو يوسف أفندي . Citrus nobilis Lour. يحتوي على أنْترانيلات المَتيل، سيترال، نارول، سيترونيلّال، جيرانيول، مَتيل هَپتيل سَاتون.

#### 86- Mandragorine

## - مَنْدر اغورين، يَبْروحين

. قلوید ترکیبه الکیمیائتی  $C_{15}H_{19}O_2N$  یُستخرَج من الباذنجانیّات

#### 87- Mangiférine

## - مَنْجيفارين، مَنْغيفارين

مادّة تُستخرَج من أوراق المَنْغا أو الأنْبَج Mangifera indica تركيبها الكيميائي . C10H18O11

#### 88- Margosa (huile de)

## - مَرْغُوزا (زيت الـ)

زيت يُستخرَج من بزور الزِّنْزَلَخْت . Melia azedarach L يحتوي على الحوامض التالية: ستياريك، بالمِتيك، لُوريك، قالريانيك، بُوتيريك، وعلى بقايا زيت دُهنيّ مُكَبْرَت.

#### 89- Margosine

## - مَرْغُوزين

قلويد يُعزل من قشرة الزِّنْزَلَخْت.

<sup>(</sup>غ) التَّسمية لإدوار غالب.

90- Margosique – مَرْغُوزِيك

نَعْت تعریفی یُطلَق علی حامض دسم ترکیبه الکیمیائی C<sub>22</sub>H<sub>40</sub>O<sub>2</sub>، یُستخرَج من «المَرْغوز» زیت المَرغوز الدُّهنی، یُرَجَّح أن یکون حامض أولاییك غیر نقی.

# 91- Marjolaine (essence de)

زيت دُهنيّ سائل مُصفَرّ اللّون يُستخرَج من أزهار المردكوش Majorana زيت دُهنيّ سائل مُصفَرّ اللّوبينايول والتّربينان.

92- Naucléine – نُكْلايين –

قلوید ترکیبه الکیمیائیّ  $C_{21}H_{26}O_4N_2$  عُزل من نبات یابانیّ یُدعی «فَوْفَل شامخ» (۱) . Nauclea excelsa

93- Nériine – نارِیین –

غلو كوسيد سام يُوجَد في عُصارة الدِّفلي اللَّبنيَّة Nerium oleander.

- ناريودُورايين – ناريودُورايين

غلوكوسيد سام يُوجَد في عُصارة الدِّفلي اللَّبنيَّة مُشترِكًا مع النَّاريودُورين.

95- Néroli (essence de) حُهن النّارَنْج

دُهن أزهار البرتقال. إنّ الدُّهن الاصطناعيّ هو عِطر أساسُه أنْثرانيلات المتيل. أمّا دُهن البرتقال فيُستخرَج من أزهار البرتقال Citrus aurantium.

النَّبِق المُسْهِل هو شجرة حرجيَّة لبنانيَّة. أمَّا المقصود هنا فاسم يُطلَق بالفرنسيّة على مادّة صِباغِيّة تُستخرَج من النَّبْق المُسْهِل Rhamnus cathartica. تصلح لتحضير «أخضر الصِّين» الذي يُستعمَل في صنع البرنيق الصّينيّ.

- Huile de nerprun – زيت النَّبْق

زيت يُستخرَج من بزور النَّبق المُسهِل Rh. cathartica، يحتوي على الحوامض التالية: ستياريك، يالمِتيك، أولاييك، لينولايك، لينولانيك، إيزولينولانيك.

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

بَلْسَم نرڤال هو مرهم يُوصى به ضدّ الآلام الروماتيزميّة، أساسه نخاع التَّور، زيت الخَشخاش المُنوِّم وزبدة جوز الطيب.

98- Œnanthe safranée (essence)

- أُخْدَريّة زَعْفَرانيّة (١) (دهن الـ)

زيت دُهنيّ يُستخرَج من الأخْدَريّة الزَّعْفَرانيّة ل.Œnanthe crocata L يحتوي على فُورفُورال.

– مَخْزَنيّ – officinal

نَعت تعريفي يُطلَق على كلّ دواء ثابت يَرد ذكره في دستور الأدوية (كودكس)، وهي أدوية تكون عمومًا مُحضَّرة سلفًا في الصَّيدليّة.

- مَخْزَن – مَخْزَن

مُختبَر ومَخْزَن الصّيدليّ حيث يبيع الأدوية. صيدليَّة. فَرْمَشِيّة.

101- Oignon (essence d')

- بَصَل (دُهن الـ)

زيت دُهنيّ سائل مُصفَرّ اللّون، مُنفِر الرائحة غير المُستحبّة، يُستخرَج من البَصَل Allium copa L.

- أولِيَنْدرين – أولِيَنْدرين

هيتروسيد مُقَوِّ للقلب يُستخرَج من الدِّفلي، تركيبه الكيميائيّ وC32H48O9.

- يَيّايين، بَباظين - يَيّايين، بَباظين

خميرة تَحلَّ البروتينات تُستخرَج من البَباظ الزِّراعيِّ Carica papaya وتعمل على الهَيولينات الطَّبيعيَّة في مُحيط مُحايد مُتَعادِل وتحلَّها مائيًّا إلى بَيْتُون (هَضْمون).

104- Paradis (huile de noix de) حَنَّة (زيت جوز الـ)

زيت عديم اللّون، تَفِه الطَّعم، خفيف اللّون الأصفر، يُستخرج من بزور «لَطّ زابُوكاجو»(١) Lecythis zabucajo Aubl. (يت جَوز اللَّطّ.

- پَر افِين – 105- Paraffine

كتلة بيضاء اللُّون، شَفَّافَة، عديمة الرّائحة، تَفِهة وعديمة الطُّعم، تحتوي على

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

كَربُورات عديدة وتحصل بواسطة تقطير قطران النَّفط، والخشب، والتَّيْرَب، واللِّينيت، والنَّشيد Schiste. يَنصهر عند ٥٠٠؛ مُرادِف: كربُور مُشْبَع.

- بَتْشُولي (دُهن الـ) – بَتْشُولي (دُهن الـ)

زيت دهنيّ سائل فاتح اللّون الأصفر، مُستحبّ الرائحة، يُستخرَج من عشبة البَتْشولي .Pogosteman patchouli Pell يحتوي على بَتْشولان، أوجينول، كادينان، أزولان، ألدَهيد بَنْزَويك، ألدَهيد عَبْهريّ .

- ماميثا صفراء (زيت الـ) ( الله عنو الـ الله عنو الله عن

زيت فاتح اللّون الأصفر، يُستخرَج من بزور الخَشخاش المُقَرَّن Glaucium وهو المامثا.

- دُرّاقة (دُهن الْ) – دُرّاقة (دُهن الْ)

هو أستات الفانيلاتيل.

**YA** •

- أسود الدّرّاقة –

هو خضاب أسود يتمّ الحصول عليه بواسطة إحراق أنْوية الدّرّاق في وعاء مُقْفَل (مخلوطة عمومًا إلى أنْوية ثمار أخرى).

- درّاق (زیت ال) – درّاق (زیت ال)

زيت مُصفَر اللّون الباهت، رائحته سيانْهيدريّة، يُستخرَج من لوز ثمار الدُّرّاق . Prunus persica

110- Pectique (matière) – هُلاميّ (مادّة) – هُلاميّ (مادّة)

نَعت تعريفي يُطلق على اسم جنسيّ لموادّ نباتيّة غلوسيديّة الطَّبيعة وشديدة التَّركيز، خاصِّيَّتها أَنَّها تُعطي مع الماء، وبفضل خمائر خاصّة أو حوامض مُخفَّفة، أمزجة تَتماسك فتصبح مُجَمَّدات.

- پَلَاتيارِين – پَلَاتيارِين –

Punica أيستخرج من الرُّمّان  $C_8H_{15}ON$  يُستخرج من الرُّمّان granatum L. . كذلك قلويد صلب تركيبه الكيميائي  $C_9H_{15}ON$  .

- بَايونِين، أورِين - بَايونِين، أورِين

قلويد مُضادّ للتَّشنُّج يُوجَد في ريزوم الفاوانيا: Pæonia officinalis.

بَريلًا هو الاسم الهنديّ. زيت دهنيّ سائل، باهت اللّون الأخضر، رائحته فريدة فَذّة، خاصّة Sui generis، يُستخرج من أوراق بَاريلًا نانْكِن (١٠) Perilla nankinensis Decne؛ يحتوي على ألدَهيد دِيهيدروكومينيك.

## - بَرِيلًا<sup>(غ)</sup> (زيت الـ) 114- Périlla (huile de)

زيت يُستخرَج من جَوز .Perilla acymoïdes L، طعمه ورائحته هي بطعم زيت الكتّان ورائحته . يُستعمَل في التّغذية وفي صناعة البرنيق.

- پَرْلُولِين – بَرْلُولِين – بَرْلُولِين

Lolium perenne قلويد تركيبه الكيميائي  $C_{36}H_{22}O_3N_4$ ، يُعزَل من الزُّوان المُعَمَّر L.

- پَرْفِنْسِين – پَرْفِنْسِين

قلويد ينصهر عند  $^{\circ}$ ۲۰۱ $^{\circ}$ ، عُزل من الونكا الصَّغيرة Vinca minor تركيبه الكيميائي  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 0CH3، مع مجموعتين  $^{\circ}$ 0CH3.

# - كَبْر اشو (مُستخلَص) 117- Québracho (extrait)

مادّة دابغة تحصل من خشب الكبراشو Aspidospermum quebracho بواسطة النَّقع أو المَرْث، وتُستعمَل في البراغواي بنوع خاصّ. تحتوي على ٣٢ بالمئة من الموادّ الدّابغة القابلة للذَّوبان والحَلّ.

– كَرْساتِين – كَرْساتِين

مادّة مُلوِّنة صفراء اللَّون البنِّيّ تُستخرَج من سنديان أمريكيّ، تركيبها الكيميائيّ . C<sub>15</sub>H<sub>10</sub>O<sub>7</sub>

- راتافیا، فی صِحَّتك - ماتافیا، فی صِحَّتك

اسم يُطلَق على ليكورات يتمّ الحصول عليها بواسطة النُّقاعة، من دون تقطير.

- هَيْضَمان، فجل الخيل (زيت) (يت - مَيْضَمان، فجل الخيل (زيت)

ريت يُستخرَج من بزور الفجل البرِّيّ (الفُجَّيْلَة) .Raphanus raphanistrum L. مُر ادِفه Raphanistre .

<sup>(</sup>غ) التَّسمية لإدوار غالب.

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

زيت دهنيّ سائل أصفر اللَّون يُستخرَج من ثمار وأوراق الرافَنْسارا العِطريّة Ravensara aromatica ، برائحة الأوكالِيتُوس ويحتوي على تَرْبانات وعلى ألْدَهيد عَبْهريّ.

#### 122- Ravison (huile de)

- سَلْجَم (زيت الـ)

زيت يُستخرَج من بزور السَّلْجَم الحَقْليّ (الكولزا) البَرِّيّ: Brassica campestris.

- رَغَسْترول – رَغَسْترول

اسم يُطلَق على عُصارة السوس Glycyrrhiza glabra مع نسبة ٦٪ من حامض غليكورونيك. دواء لمُعالَجة التهاب المَعِدة والقرحة المِعويّة العَفَجيّة.

- ساغُو، دقيق النَّخْل - 124 Sagou

دقيق نَشويّ يُستخرَج أو يُحضَّر من لُبّ جذوع بعض أنواع النَّخيل مِثال السّاغُوتيّة أو شجرة السّاغُو Sagou rumphii، ساغُوتيّة كوَنْتجي (١) S. Koentgii، ساغُوتيّة لاڤيس (١) S. farinifera، ساغُوتيّة الطَّحين (١) S. farinifera. إلخ.

السّاغو الخام Sagou brut هو نتاج يحصل بواسطة نَخْل لُبّ السّاغُوتيَّة وغسله. أمّا السّاغو اللُّولؤيِّ Sagou perlé فيقع في حبوب مُستَديرة كُرويَّة من جراء المنخل وخفيفة التَّحميص.

- سَحْلَب – macking Salap

اسم يُشير إلى درنة نبات السَّحْلَب Orchis التي تتألّف من حوالى ٢٥ بالمئة من النشاء، والتي تُعطي خَلاياها الحَشَويّة مع الماء لُعابًا يُمكِنه أن يتحوَّل إلى غلوكوز. أمّا استعمالات السَّحْلَب ففي تحضير عَصائد ومُجَمّدات مُكثِّفة.

السيلات – سالِسيلات – سالِسيلات

اسم جِنسيّ يُطلق على أملاح وأستيرات حامض سالِسيليك HO-C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>-CO<sub>2</sub>M مثال سالِسيلات الأميل للعطور برائحة النَّفَل، سالِسيلات البَّزيل لتثبيت العطور، سالِسيلات الأثيل هو عِطر رائحته عذبة كرائحة الوَثير Wintergreen، سالِسيلات المتيل هو دواء مُزيل للألم ومُضاد للروماتيزم، ويُكوِّن بالتالي زيت الوَثير الدُّهنيّ الاصطناعيّ. سالِسيلات الصوديوم هو دواء مُضاد للروماتيزم.

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

- سَلْسُولين - سَلْسُولين - سَلْسُولين

اسم يُطلق على قلويد يُستخرج من حُرْض رِشْتر (۱) Salsola richteri أو أشْنان  $C_{11}H_{15}O_2N$ 

- سَلُقَان – 128- Salvène

اسم يُطلَق على كَربور تركيبه C10H18 يُعزل من زيت المريميّة المَخزَنيّة الدُّهنيّ Salvia officinalis.

- سَمْبُوسِين - سَمْبُوسِين

هو قلويد يُوجَد في قشور البَيْلَسان Sambucus.

- سَنْتَالِين ، صَنْدَلِين – سَنْتَالِين ، صَنْدَلِين

مسحوق أحمر اللّون تركيبه الكيميائيّ C15H14O5 يُستخرَج من خشب الصَّنْدَل، وهو يَصبغ الصوف ويُلوِّن إكسيرات مُنظِّفة للأسنان.

- أخيليا مُنعِشة (دهن الـ) – أخيليا مُنعِشة (دهن الـ)

زيت دهنيّ سائل قاتم اللّون البنّيّ برائحة حشيشة الشِّفاء Tanaisie يُستعمَل كمُبيد حشرات. يحتوى على سَنْتُولينانُون ألفا وبيتا، وعلى سَتُون آخر مُكَبْرَت.

ا الله عابُونِين – عابُونِين – عابُونِين – عابُونِين

اسم يُشير بنوع خاص إلى غلو كوسيد تركيبه الكيميائي C<sub>32</sub>H<sub>54</sub>O<sub>18</sub>، يُستخرّج من حذور الصّاب نتّه Saponaria .

133- Tanghinine, Tanghine

هيتروسيد مُقوِّ للقلب تركيبه الكيميائيّ  $C_{32}H_{46}O_{10}.5H_2O$  ينصهر عند ١٣٠° ويُستخرَج من الطَّنْغينية السّامَّة $^{(4)}$ . Tanghinia venenifera

- عَفْص ، دِبْغ ، دِباغ – 134 Tanin, Tannin

اسم جنسي يُطلَق على مواد نباتية غَروانيَّة، رائحتها خاصّة، طعمها قابِض، تَتميّز بخاصِّيَّة ترسيب الزُّلال (الألبومين) من محاليله ومن قلويدات مُختلِفة، وتجعل الجلود غير قابلة للفساد. تُستعمَل في الدِّباغة.

- طَنْفيندن، طَنْفدن

TAT

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

<sup>(</sup>غ) التَّسمية لإدوار غالب.

- تَبْيُوكَة – تَبْيُوكَة

غذاء مُؤلَّف من حُبيبات صلبة مُشكَّلة من قُطيرات دقيق المَنْيُوك المُمَيَّهة التي تُجفَّف على صفائح معدنيَّة ساخنة.

- صَفْراوِينِ البَوْل – 136- Urobiline

خضاب يُوجَد في البول، تركيبه الكيميائيّ C33H42O6N4.

- فَرْنونِين – فَرْنونِين

مادّة تُستخرَج من جذور الرُّعْل أي الفَرْنُونِيَة (ع) Vernonia nigritiana.

- وِ نْتَر غرين (دهن) ، وَثير ، غُلْطارية بـ 138- Wintergreen (essence de)

هو دُهن الوَثير المَدّاد، سائل أصفر اللَّون يُستخرَج من أوراق النَّبات Gaultheria هو دُهن الوَثير المَدّاد، سائل أصفر اللَّون يُستخرَج من المتيل، وعلى ترياكونْتان، procumbens L. غُلطاروسيد، ألدّهيد خَمريّ.

- زَنْتوسترومارين - Tag- Xanthostrumarine

غلو كوسيد الشُبَيَّط السِّلَعيّ Xanthium strumarium.

- يُويُو (دُهن الـ) 140- You-you (essence de)

زيت دُهنيّ يُستخرَج من شجرة قريبة من الكافوريّة في فَرموزا. يحتوي على سينايول، كافور، أوجينول، سافرول، فورفورال، بيتا بينان، ديهُنْتان، ألفا تَرْبينايول. Oil tree.

- زَدْوار (دُهن الـ) – زَدْوار (دُهن الـ)

زيت دُهنيّ سائل كثيف، مُخضَرّ اللّون، كافوريّ الطّعم، يُستخرَج من ريزوم كُركُم زَدُوار .Curcuma zedoaria Rosc مزيج من السينايول ومن كحولات سَسْكي تَرْپانيكيّة.

# ٣- الوَصفات الطِّبِّيَّة

# فرنسي - إنجليزي - عَرَبيّ

1- Glycosurie (F) Glycuresis, Glycosuria (E)

بَيْلَةٌ سُكِّرِيَّة، بِيْلَة غلُوكُوزِيَّة، بَوْلُ السُّكَّر، بَوْلٌ سُكِّرِيّ

راجع مَرَض السُّكَّر، الداء السُّكَّرِيّ (في المُعجَم الرابع، صفحة ٢٩٤) Voir (٢٩٤

2- Goitre (F) Goitre, Goiter (E)

دُراق، سَلَعَة، جُوتَر

فَوْقَس حُوَيْصَلِيّ. استشارة طِبّيّة.

3- Goitre exophtalmique (F) Exophtalmic goitre (E)

دُرَاقٌ جُحُوظِيّ، سَلَعَةٌ جُحُوظِيّة (1)

خَرْبَق، زنبق الوادي. استشارة الطَّبيب.

4- Goutte, Rhumatisme goutteux (F) Gout, Gouty rheumatism (E)

نِقْرِس، رُوماتِيزم نِقْرِسِيِّ (۲)

كَاكَنْج، أرقطيون، بتولا، حِمحم، خَلَنْج، بَقْس، سُعَادَى، كِشمش أسود، كرز، شيكورية برِّيّة، سُورنجان، حلوة مُرّة، شومر، آس بَرِّيّ (لَعلّه السَّفَنْدَر)، فريز (الثِّمار، نصف ليبرة على الرِّيق ونصف ليبرة بعد الظُّهر)، مُرّان، غَيّاك أي عود الأنبياء (نقيع ٨٠ غرامًا من الخشب في ليتر ماء)، وَزّال (غير لُبنانيّ)، ثمار العرعر، جنطيانا، طوقريون، عُشبة الفُقراء، هَدال، سَفَنْدَر لاسِع، زنبق الوادي، أورْتُسِيفون مَا الرّاعي، حَوْر، صنوبر، هِنْدَب، إِجّاص، خِنشار، تفّاح، ملكة المروج، ندى البحر، قصب مكانس، فشاغ، صابونيّة، صفصاف، شَرُونة، قضيب المروج، ندى البحر، قصب مكانس، فشاغ، صابونيّة، صفصاف، شَرُونة، قضيب

<sup>(</sup>١) التَّسميتان للمُؤلَّف.

<sup>(</sup>٢) التَّسمية للمُؤلِّف.

الذُّهب، بَيلسان، عَراوة، أريغارون كندا، ڤيرونيكا.

- المُبَوِّلات البَوْليكيّة أي اليُوريكيّة.
  - مشروب شائع:

١٥	قِمام آسِيّ، وَرَق
١٥.	-
١٥	كُنباث
٠١٥	نعنع
٠١٥	بَيْلَسان، أزهار
٠٠٠٠٠	عَرَاوَة، أزهار
۲۰ غ	
¿ ٣•	صابونيَّة، ورق

٣٠ غرامًا من الخليط (كمشة) في ليتر ماء ساخِن يُغلى دقيقتين ويُغطّى ١٥.
 يُؤخذ منه قدر المُراد.

- يُنصَح بما يلي: أرضي شوكي، كرفس، جزر، سرفل، شيكورية بَرِّيّة، ملفوف، شومر، فول، لِفت، هِنْدَب، فجل، سَلْسَفيل، بندورة، قلقاس، كرز، ليمون حامض، فريز، كِشمش، أكي دنيا (ثمرة)، زيتون، إتجاص، تقاح، خوخ، عِنَب.

- نَصيحة أَلْبَرْنالي، ينقلها الدكتور جان ڤالني: «لكي تصون نفسك من النَّقْرِس، عِش بِشِلنِ واحدٍ في اليوم واكْسَبْه».

# دَاءُ الحَصَاة ، حُصَيَّة ، رَمْلُ بَوْلَى 5- Gravelle (F) Gravel (E)

راجع حَصاة Calculs: مسحوق الدَّليك (ثمار الورد البرّيّ)، قبضة في نصف كوب نبيذ أبيض، نتركها لفترة. نُحرِّكها ونشربها عند النَّوم حتّى الشَّفاء (قد يدوم ذلك طويلًا).

- نصف غرام إلى غرام واحد من جَداجِد الحَقْل المُجفَّفة المسحوقة في سائلٍ ما.

- يُنصَح بما يلي: أرضي شوكي، جزر، سرفل، شيكورية برِّيّة، فول، فاصولياء، لفت، بصل، بطاطا، فجل، بندورة، حامض، فريز، كشمش، توت، أكى دنيا، بندق، عنب.

ثوم، راسَن، حِمْحِم، بوصير أبيض، قرفة، كزبرة البير، قنطريون، شومر، أرطماسيا جبليّة، جابُورَنْدِي، كولا، غار، خُزامى، كَفْنَة، بصل، برتقال، صنوبر، براعم، تفّاح، زغدة، مريميَّة، حشيشة الجَرَب، بيلسان، زعتر، فرفارة، بنفسج.

- خليط بأجزاء مُتساوِية من المريميّة، الأبسنت، السُّوس، الڤيرونيكا المخزَنيّة. مِلْعَقة كبيرة في فِنجان أو كمشة في ليتر ماء غالٍ يُغطّى عشر دقائق ويُؤخذ منه فنجان مساءً للوقاية من الزّكام. مِلْعَقَة كبيرة كلّ ساعة ولمدّة يومين أو ثلاث للشّفاء.

- خليط مُضاد للزُّكام وصَدري:

۳۰	غافَث غُولاني
٠١٠	بوصير أبيض، أزهار
٠١٠	خشخاش منثور
۳۰	أرِيسيموم
۳۰	كَفْنة
٠٠٠	خُبّازة، أزهار
٠١٠	فرفارة، أزهار

يُؤخذ ٤٠ غرامًا من الخليط في ليتر ماء غالٍ يُغطّى ١٥ دقيقة، يُصفّى بقماش دقيق، يُسكّر بالعسل ويُؤخذ ساخنًا خلال النّهار.

- مشروبات ساخنة grogs بالقرفة، كبش القرنفل، الحامض والعسل.

- نظافة المجارى التَّنفُّسيّة مُهمّة.

7- Guêpes (F) Wasp (E)

راجع وَخْزُة Voir piqûres .

8- Haleine fétide (F) Bad breath (E) بخَر

مُعالَجة الكبد، المَعِدة، الأسنان.

مَشروبات باردة، مَشروبات قابِضة.

تُوت، كُنباث، عِنب. معالجات طِيِّية.

راجع رَضٌ، كدمة (في المُعجَم الثاني، صفحة ٣١١، والمُعجَم الرابع، صفحة ٧٥٠). Voir contusions . (٢٨٦)

# 11- Hématuries (F) Hematuria, Hematuresis (E) بَيْلَةٌ دَمَوِيّة، بَوْلٌ دَمَوِيّ، بَوْلُ الدَّم

كيس الرّاعي، عنب الدُّب، سلبين مريم، سَنفيتون، سرو، شربين، أرغوت، وزّال، عرعر (ثمار)، هَدال، همامليس، هِدْراستِس، عِرق الذّهب، قرّيص، خشخاش مُنوِّم، وِنكا، لسان الحمل، كنباث، راتانيا، ندى البحر، علّيق، سَكَب، مريميَّة، سرخس مخزنيّ، آذريون، تربنتين، ڤيرونيكا، رِعي الحمام.

- التَّشخيص الطِّبِّيّ ضروريّ.

# i 12- Hémophilie (F) Hemophilia (E) هِيمُونِيْلِيَة ، نَاعُوْر ، مِزَاجٌ نَزْفِيّ ، هِيمُوفِيْلِيَة

كيس الرّاعي، سَنْفيتون، وزّال (غير اللَّبنانيّ)، قرّيص، عَصا الرّاعي، لسان الحمل، كنباث، سَكَب، عشبة القوى.

- مُراقَبة طبّيّة.

# 13- Hémoptysie (F) Hemoptysis, Haemoptysis, Spitting of blood (E) نَفْتُ الدَّم، سُحَافُ الدَّم

- أبسنت، غافَث غُولانيّ، جيوم مُبارَك، كيس الرّاعي، بوصير أبيض، عَرْصَف، كاراغاهِين، سلبين مريم، سنديان، سَنْفيتون، سرو، شربين، ديجيتال، ورد برّيّ، أرْغوت، وزّال، عرعر، هَدال، همامليس، هِدراسْتِس، عِرق الذَّهب، لاميون أبيض، كَفْنَة، أمّ ألف ورقة، تُوت، أفيون، قرَّيص، خشخاش مُنوِّم، وِنكا، كنباث، راتانيا، عقيدة الطُّيور، فَرَنْدَل، صفصاف، سَرْخَس مخزنيّ، تَربئتين، عشبة القوى، ڤيرونيكا.
  - أَرْغُوت أي فطر الشَّيْلَم، غرامان من مسحوقه في اليوم.
  - پَرْ كلورور الحديد: عشر نقاط في كوب، ماء مُسَكِّر، ٣ مرّات في اليوم.
    - المُعالَجات الطِّيَّة لازمة.

### 14- Hémorragies (F) Hemorrhage, Hemorrhagia (E) نَرْف، إِدْمَاءُ وَ افِر

إِيْكُر، كَماليَة، أثينة عطريّة، جيوم مُبارَك، سلبين مريم، سرو، أرْغُوت، شيلك

(جذر)، وزال، رمّان، هدال، همامَليس، هِدراستِس، عرق الذَّهب، لاميون أبيض، خشخاش مُنوِّم، عَصا الرّاعي، وِنكا، عشبة القوى الوَزِّيّة، فرفحين، كنباث، راتانيا، ورد أحمر، تربنتين، كرمة (أوراق).

- پَرْكلورور الحديد: من الداخل ٢٠ إلى ٤٠ نقطة في كوب ماء بارد.
  - من الخارج مُخفَّف بالماء في كمادات.
- نَزْف مَعِدِيّ: إنجبار، كيس الرّاعي، كُوندورانْغُو، سنديان (ورق)، هَدال، لسان الحمل السّنانيّ، كنباث، عقيدة الطّيور، سَكَب.
- نَزْف رَحِميّ: كمالية، كيس الرّاعي، عنب الدُّبّ، سلبين مريم، شُوكران سامّ، سَنفيتون، سرو، بربريس، أرْغُوت الشَّيلم، وزال، جيرانيوم، هدال، همامليس، هِدراستِس، عِرق الذَّهب، لاميون أبيض، كستناء الخيل، قرّيص، خشخاش مُنوِّم، عَصا الرّاعي، ونكا، كنباث، راتانيا، فرندل، آذريون، تربنتين، عشبة القوى، أريغارون كندا، رباطيّة، كرمة حمراء.
- أَرْغُوت الشَّيْلَم: ٢ إلى ٣ غرامات في كوب ماء مُسَكَّر، يُؤخذ ثلث كوب كلّ نصف ساعة، يُكرَّر ذلك في اليوم التالي إذا لزم الأمر.

### - مُستحضر رَقوء:

	ماء وَرد
۱۲. غ	شُبّ نَقَيّ
٦غ	عَفْص
	يُوضع منه على الجروح.

- الاستشارة الطِّبِّيَّة تكون مُستعجلة بكشل عامّ.

### 15- Hémorroïdes (F) Hemorrhoid (E)

### بَاسُور، بَوَ اسِيْر

أخيليا، زهرة العُطاس، إنجبار، بوصير أبيض، كيس الرّاعي، سلبين مريم، سنديان، سرو، بربريس، عشبة البواسير، آس بَرِّيّ، هَدال، همامليس، هِدْراستِس، سَفَنْدَر، خلّود السُّطوح، لاميون أبيض، يبروح، كستناء الخيل، حشيشة الزُّجاج، بنفسج برِّيّ، عَصا الرّاعي، كنباث، عقيدة الطُّيور، بيلسان، رباطيّة، كرمة حمراء.

مُسَهِّلات قَويّة: بزور الكتّان أو الخردل. الألْوَة ممنوعة.

- بَواسير مُلتهِبة: أَرْقِطيون، بُوصير أبيض، سفرجل، عشبة البواسير، خُبّازة	
نيّة .	أرجوا
<ul> <li>بواسير دامِية: قِمام، إنجبار، سنديان، أمّ ألف ورقة، عَصا الرّاعي.</li> </ul>	
- مرهم مُسَكِّن مِن: دِهان الحَوْر	
مُستخلَص بلّادون غ	
مُستخلَص أَفْيُونيّ مائيّمُستخلَص أَفْيُونيّ مائيّ	
دُهن الزَّعتر قاط	
تُدْهَن به البواسير مرارًا.	
- التّشخيص الطِّبِّيّ مُفضَّل.	
16- Hépatisme (F) Hepatism (E) كَبِدِيّ، ضَعْف كَبِدِيّ، اضطراب كَبِدِيّ	اعْتِلال
راجِع كَبِد (في المُعجَم الخامس، صفحة ٣٠٧). Voir foie.	
17- Herpès des muqueuses (F) Mucomembranous herpes (E)	
لأغْشِيَة المُخاطِيّة، عُقْبُولَة الأغْشِيَة المُخاطِيّة	حَلاً ا
حِمْحِم، حلوة مُرّة، صابونيّة.	
حِمْحِم، حلوة مُرّة، صابونيّة. – خليط من:	
- خليط من:	
– خليط من: أَرْقِطيون، جذر غ	
– خليط من: أَرْقِطيون، جذر	
<ul> <li>خلیط من:</li> <li>أرْقِطیون، جذر</li> <li>صابونیّة، جذر</li> <li>وردار، قشرة</li> </ul>	
<ul> <li>خليط من:</li> <li>أرْقِطيون، جذر</li> <li>صابونيّة، جذر</li> <li>وردار، قشرة</li> <li>حلوة مُرّة، فروع</li> </ul>	
- خليط من: أَرْقِطيون، جذر	
- خليط من:  أَرْقِطيون، جذر صابونيّة، جذر وردار، قشرة حلوة مُرّة، فروع ننقع الكلّ في ليتر ماء غالٍ. نضيف ١٠٠ غرام من شراب الشاهترج. نأخذ	بكوب
- خليط من:  أَرْقِطيون، جذر صابونيّة، جذر وردار، قشرة حلوة مُرّة، فروع ننقع الكلّ في ليتر ماء غالٍ. نضيف ١٠٠ غرام من شراب الشاهترج. نأخذ ، خلال النّهار.  مُعالَجات طِبِّيَّة عديدة مُمكِنة.	بكوب
- خليط من:  أَرْقِطيون، جذر ٤ غ صابونيّة، جذر ٤ غ وردار، قشرة ٤ غ خلوة مُرّة، فروع ٤ ٤ غ ننقع الكلّ في ليتر ماء غالٍ. نضيف ١٠٠ غرام من شراب الشاهترج. نأخذ الكلّ النّهار. د، خلال النّهار مُعالَجات طِبِيّة عديدة مُمكِنة.	بكوب <b>حَاذُو</b> اً

# اسْتِسْقَاءً مِفْصَلِى، مَوَهُ المَفْصِل، اسْتِسْقاءُ المَفْصِل، فُصَالٌ اسْتِسْقائِي

مُراجَعة الطّبيب.

20- Hydropisie (F) Dropsy (E)

استشقاء

النَّباتات المُسهِّلة القويّة، النَّباتات المُبوِّلة.

كمالية، كاكنج، أرضي شوكي، راسن، بربريس، بَطُونيقا، بِيغينيان، بَتُولا، فاشرة، لِتَّين شائك، عنب الدُّب، غاليون، كرز، شِنداب، حنظل، ديجيتال، مُرّان، وزّال، عرعر، لَبْلاب كبير، لُصيقى، عشبة الفقراء، سَفَنْدر لاسِع، جَلَبَة، ذرة صفراء، نفل الماء، داذي، نبق، بصل، دردار، أورتُوسِيفُون، قرَّيص، حشيشة الزُّجاج، بقدونس، آذان الفأر، لسان الحمل، كنباث، خوخ شائك، ملكة المروج، ندى البحر، مريميّة، سَقَمُونيا، إِشْقِيل، قضيب الذَّهب، ستروفَنْتُوس، بيلسان، عَراوة، أريغارون كندا، رعى الحمام المخزنيّ.

#### 21- Hyperazotémie (F) Hyperazotemia (E)

فَرْطُ المَواد النَّيْتُرُوْجِينيَّة في الدَّم، فَرْط تَنتُرُج الدَّم (١)

راجِع تَبُوْلُن الدَّم. التَّشخيص والمراقَبة الطُّبِّيّان ضَروريّان.

### 22- Hyperchlorhydria (F) Hyperchlorhydria (E)

# فَرْط الكلُورِيدِيَّة، فَرْطُ حَمْضِ الكلُورْهِيدْرِيك، فَرْطُ الحُمُوضَة

بلّادون، بَطُونيقا، قنطريون، شومر، عَشْقَة، كَفْنَة، فراسيون أبيض، داذي، سُوس، مريميّة.

### 23- Hyperglycémie (F) Hyperglycemia, Hyperglykemia (E)

# فَرْط سُكِّر الدَّم، زِيَادَة سُكِّر الدَّم

راجع الدّاءُ السُّكَّريّ، الدَّيابِيْطِس (في المُعجَم الرابع، صفحة ٢٩٤) Voir (٢٩٤

### 24- Hyperhidrose (F) Hyperhidrosis, Hyperidrosis (E)

# تَعْرَاق، رُحَضَاء، فَرْطُ العَرَق

من الخارج: سرو، أو كالبِتُوس، جوز، صنوبر، كنباث، فَرْفارة.

<sup>(</sup>١) التّسمية للمُؤلّف.

# فَرْط التَّوَتُّر، ارْتِفَاعُ الضَّغْط، تَضْغَاطٌ شِرْيَانِي

فَرْط ضَغْط الدَّم الشِّرْيانِيّ: ثوم، زعرور، حِمْجِم، كيس الرّاعي، فاشيرة، كشمش أسود، عشبة الخطاطيف، شاهترج، هَدال، عَشْقَة، نبق، زيتون (أوراق)، أورتُوسيفُون، زهرة اللُّؤلؤ أي بَلِّيس، رُوْوُلفيا، سَقَمونيا، سُمْبُنْغ، شَرونة، زيزفون، ناردين.

- فريز، إجّاص.

– خليط من: زيتون، أوراق
زعرور، أزهارزعرور، أزهار
هَدال، أوراق
عِنب الدُّبّ، أوراقع
مريميَّة، أوراق
كنباث، النبات الكامل
صابونيّة، أوراق
سُوس به غ
وزّال (غير اللُّبنانيّ)، أزهار
أربع ملاعق كبيرة من الخليط في ليتر ماء يُغلى بهدوء لمدّة ٣ إلى ٤ دقائق
ويُغطَّى ٢٠ دقيقة. يُؤخذ منه قدر المُراد خلال النَّهار (مشروب حِمية المُتَوتَّرين).
– خليط من: مريميَّة، أوراق
ثیّل، رِیزوم ۲۵
سُوس، جذر ١٥٠ غ
جلهم، قشرة
كرمة حمراء، أوراق٢غ
كنباث ٣٥٠ غ
زيتون، أوراق
زوفا (غير لُبنانيّة)، رؤوس
ثلاث ملاعق كبيرة في نصف ليتر ماء يُغلى دقائق قليلة ويُغطَّى ١٥ دقيقة. قدر

المُراد خلال النَّهار.

- إلغاء التَّدخين، الكحول، الحَدّ من اللَّحوم والموادّ المُهيِّجة. مُراقَبة طِبِّيَّة.

# 26- Hypoacousie (F) Hypoacousia, Hypoacusis (E) ضَعْفُ السَّمَع، وَقُرٌ خَفِيْف

راجع طَرَش، صَمَم، وَقُر (ثِقَل في السَّمَع) Voir Surdité.

### 27- Hyposystolie (F) Hyposystole (E)

ضَعْفُ الانْقِباض

أدونيس رَبيعي، ديجيتال، وزّال (غير اللّبنانيّ)، دِفلي، زنبق الوادي، ستروفَنْتُوس، تيڤيتيا أي دِفلي صفراء؛ مُراقَبة طِبّية.

#### 28- Hypotension artérielle (F) Arterial hypotension (E)

# نَقْصُ الضَّغْطِ الشِّرْيانِين، هُبُوطُ التَّوَتُّر الشِّرْيانِين

سَلْبِينِ مريم، وزّال، مريميّة، نَدى البحر، رُشَيْمُ القَمْح.

### 29- Hystérie (F) Hysteria (E)

هِسْتِيْرِيَا، هُرَاع، هَرَع، هَوَس

أبسنت، أنجليك، فراسيون نتن، غاليون، قطرم، قنطريون، شوكة مُبارَكة، عرعر (ثمار)، خُزامى، مردكوش، مَليسَّة، نفل الماء، نيلوفر، برتقال، آلامِيَّة، ندى البحر، زعفران، مريميَّة، آذريون، حشيشة الشِّفاء، زيزفون، ناردين.

### 30- Ictère (F) Icterus, Jaundice (E)

يَرَقان، إِرْقَان، أُرَاق، صُفَار

راجع كَبِد (في المُعجَم الخامس، صفحة ٣٠٧). غافَث غُولانيّ، أرضي شوكي، جُوَيْسة عطرة، بربريس، ترنشاه، غاليون، كشمش أسود، شِنداب، ثيّل، شيكورية بَرِّيّة، كركم، شاهترج، لُصَيْقَى، سفندر لاسع، لَبْسانَة، فراسيون، ندى البحر، صابونيّة، آذريون، ڤيرونيكا.

- مُسَهِّلات لطيفة: أوراق درّاق، راوَنْد.
  - خليطات تتعاقب:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١- أنجذان رُومي
٠٢٠ غ	بربریس
ا	بتولا، قشرة
۱۰	أبسنت
٠٠٠٠٠٠	٢- بُلْدُس، شجرة الكبد

ع	ئيًّل
٠٢٠	فراسيون أبيض
۲۰	قنطريون
۱۰	٣- بَطُونيقا
۳۰	كرز، أعناق
٠١٠	أثينة عطريَّة
٠٢٠ غ	عرعر، ثمار
٠٢٠ غ	٤- بُلدُس٤
۳۰	هِنْدَبِهِ
٠١٠	غاليون
٣٠	شیکوریة، جذر
ي نصف ليتر ماء يُغلى حتّى انقباض نصفه ويؤخذ منه ٤	ستُّون غرامًا من الخليط ف
	اجين في اليوم.
۱۰	– خلیط من: زعرور
۱۰	
١٥غ	زوفا (غير لُبنانيّ)
١٥ غ	جُويسة عطرة
١٥. غ	سرخس مخزنتي
٥٢ غ	هليون
٥٢غ	غاليون
٥٢ غ	بربریس
٥٢ غ	آس بَرِّيِّ
٢٥	هِنْدَب
٢٥	بيلسان
,	

مِلْعَقة كبيرة في مقدار فنجان ماء يُغلى دقيقتين ويُغطَّى عشر دقائق ويُؤخذ منه فنجان قبل الوجبات بربع ساعة.

أَرْقِطْيون، بنفسج برِّيّ، فَرَنْدَل.

عَجْز، عِنَّة، عجز جِنْسِيّ (E) Impuissance (F) Impotence, Impotentia

راجع بُرُود جِنْسِيّ أو بُرُودَة جِنْسِيّة (في المُعجَم الخامس، صفحة ٣٠٩) Voir (٣٠٩ . frigidité

قَهَمٌ ، قَمَهٌ ، قِلَّةُ الشَّهْوَةِ لِلطَّعام 33- Inappétence (F) Inappetence (E)

راجع خَلْفَة (في المُعجَم الثالث، صفحة ٢٨٣). Voir anorexie.

34- Incontinence d'urines (F) Urinary incontinence = incontinentia (E) سَلَسُ النَّوْل، سَلَسٌ وَوْلِيَ

غَافَث غُولاني، كيس الرّاعي، عِنب الدُّبّ، غاليون، أرْغُوت الشَّيلَم. - إذا وُجد احتقان في الحَوْض: عَفْصيّة.

عُسْرُ الْهَضْم، سُوءُ الْهَضْم، تُخْمَة عُسْرُ الْهَضْم، سُوءُ الْهَضْم، تُخْمَة

بابونج، مَليسَّة، نعنع، زيزفون؛ راجع عُسْر الهضم الوَهْنِيّ ومَعِدة. Voir .dyspépsie hyposthénique et estomac

36- Infarctus du myocarde (F) Myocardial infarctus = infarct = infarction (E) احْتِشَاء عَضَلَة القَلْب، سُدَادُ عَضَلَةِ القَلْب

راجع ذُبحة صَدْرِيَّة، خُنَاقُ الصَّدْر (في المُعجَم الثالث، صفحة ٢٨٣ Voir (٢٨٣ . angine de poitrine

مُعْدِيَة (حالات)، إِنْتَانِيَّة (حالات) (F) Infectious states (E) (حالات)، إِنْتَانِيَّة (حالات). كَمْدِيَة (حالات)، وإنْتَانِيَّة (حالات) كرز، ثيِّل، طوقريون، فراسيون أبيض، كَنْكينا، زيوت دُهنيَّة عطريَّة.

38- Infection urinaire (F) Urinary infection (E)

# إِصَابَة بَوْلِيّة، خَمَجٌ بَوْلِيّ، إِنْتَانٌ بَوْلِيّ

قِمام، راسَن، بيغينيان، خَلَنْج، بُوشو، لِتَيْن، عِنَب الدُّبّ، كرز، ثيِّل، كَمُّون، شومر، فول المَناقع، قطران نباتيّ، ذرة صفراء، خبّازة أرجوانيّة، حَوْر، إجاص، قضيب الذَّهَب، تربنتين، زيوت دُهنيّة عطريّة عديدة.

- تحاليل مِخبريّة مطلوبة.

سَرْخَس، فاصولياء، خُزامى، نعنع، جوز، نعنع القَمْل، حشيشة الدُّود، بندورة.

- مُبيد حشرات: نمزج ١٠ نقاط من دهن الخزامي في ليتر بترول. نَدْهن الموبيليا، الأَسِرَّة، إلخ. بواسطة فرشاة؛ نقفل المنزل ٤ إلى ٥ ساعات.
- لكي نحمي الخيل من النُّعْرات Taons والذَّباب. . . نغسلها بنقيع ورق جوز مغليّ .
- لكي نحمي الكلاب من القَمْل، نغسلها بمحلول مائيّ بنسبة واحد إلى ألف  $\frac{1}{1 \cdot \cdot \cdot}$  من حامض الفينيك وعُشر كحول  $\frac{1}{1 \cdot \cdot \cdot}$ . نضع السَّرخس في فراشه.
- لكي نُبْعِد النَّمْل: نفرك أقدام المقاعد والكراسي وسواها بالطَّبشور الأبيض. نضع حامض مُتعفِّن في الخزائن.
- لكي نُبعِد النَّحْل والزَّنابير: نفرك المواضع التي نريد حمايتها بورق الجوز.
  - لكي نُبعِد العثّ: خزامي، نعنع، نَدْغ.

لكي نُبعِد الباعوض: نُعلِّق أوراق البندورة أو نبات الحَبق في سُبحات. ونضع باقة من الخزامي على رأس السَّرير.

- لكي نُبعِد القَمْل: لوسيونات من نقيع ٥ إلى ١٠ غرامات من زهر الأرنيكا في ليتر ماء يُغلى ١٠ دقائق. مسحوق بزور المُضَاض.
- لكي نُبعِد القَمْل والبَق: حشيشة الدُّود، سرخس، أوراق فاصولياء، أوراق جَوْز، أوراق نعنع، نضعها في عُدّة أسِرَّة حُجراتها، أي حُجْرات الكِلاب.

### أَرَق ، سُهْد ، سُهَاد (F) Insomnia (E)

جُوَيْسة عطرة، زعرور، فراسيون، حبق، بُلْدُس، بوصير أبيض، خشخاش منثور، لسان الكلب، شاهترج، جنجل، خسّ، غار كرزيّ، لوتُس قَرنيّ، مردكوش، حندقوق، مَليسَّة، نيلوفر، برتقال (أوراق أو أزهار)، آلامِيّة، خشخاش مُنوِّم (عُليبات)، تفّاح، زُغدة، صفصاف، سُمْبُتْغ، زعتر، زيزفون، ناردين.

ه غ			ین، جذر	تركيبة: نارد	-
۲ غ			امى، أزهار .	خز	
	فنحان عند الله	itles the	ماء غال رُفطّ	نه في ابت	

خَليطات:	_
) ناردين٥ غ	
زُغدة٥غ	
مَليسَّة٥غ	
زعروره غ	
لْعَقة صغيرة من الخليط في فنجان ماء غالٍ يُغطّى ويُؤخَذ عند المساء.	مِأ
٢) جُوَيْسة عطرة٢)	
قَلَمَنْت عَ	
نعنع مُفَلْفَل٢٠ غ	
مَليسَّة	
زعتر مَدّاد٠٠٠ غ	
ناردين٠٠٠ غ	
زعرور١٠ غ	
زهرة الآلام١٠٠	
لْعَقتان كبيرتان في فنجان ماء غالٍ يُغطّى عشر دقائق ويُشرَب عند النَّوم.	مِا
التَّسْلِيْبِ الكَهْرِبائيِّ Négativation .	-
أَرَقُ الأولاد:	-
أنجليك، بزورا	
زيتون، ورق۱٠	
برتقال، ورق	
زعرور، أزهار	
بَلْسَميَّة، رؤوس مُزهِرة	
نرجس المروج، أزهار	
مردكوش، رؤوس مُزهِرة ١٠. غ • • • أ س •	
ناردين، جذور مُقطَّعةفعها في ليتر ماء غالٍ نُغَطِّيه ٥ دقائق. أو نضع النّباتات المذكورة المخلوم	
علقها في ليتر ماء حالٍ تعطيه ٥ دفائق. أو تصبح أنتبانات المدلورة المناسوء	ت

نضعها في ليتر ماء غالٍ نغطيه ٥ دقائق. أو نضع النّباتات المذكورة المخلوطة بمقدار مِلْعَقة صغيرة لفنجان ماء غالٍ لمن هم دون الخامسة من العمر؛ ومِلْعَقة مُتوسِّطة من الخليط في الفنجان لمن كان عمره من الخامسة إلى العاشرة. 49V

41- Insuffisance hépatique (F) Hepatic insufficiency = insufficientia (E)

عَجْزٌ كَبِدِي، قُصُورُ الكَبِد

راجِع كَبِد (في المُعجم الخامس، صفحة ٣٠٧). Voir foie.

42- Insuffisance lactée (F) Milking insufficiency = insufficientia (E)

عَجْزٌ حَلِيبِيٍّ، قُصُورٌ دَرِّيّ

راجع دَرّ، إِرْضاع (في هذا المُعجَم). Voir lactation.

43- Intertrigo (F) Intertrigo (E)

تَسْمِيْط، بَثْرُ المَطَاوِي، مَذَح، وَذَح، سَحْج

فَرَنْدَل: Lythrum salicaria.

44- Intestins (F) Intestine (E)

مِعَى، مَصِير، مِصْران، مَعْي

راجع التهاب القُولُون، التهاب المِعَى. Voir côlites et entérites.

45- Intoxication (F) Intoxication, Intoxation (E)

تَسَمُّم، انْسِمام، انْذِئاف، تَسْمِيم

المُعالَجات الطِّبِّيَّة تكون مُلِحَّة بشكل عامّ.

46- Irritabilité (F) Irritability (E)

تَهَيُّجِيَّة ، اسْتِثارِيَّة ، قابِلِيَّةُ الإثارَة ، نَزَق ، سُرْعَة الفَضَب

راجِع عَصَبِيَّة، تَوَتُّر الأَعْصاب، تَنَبُّه عَصَبِيّ Voir nervosisme.

47- Ivresse (F) Drunkenness (E)

سُكْر، نَشْوَة

مُقَيِّئات، قهوة قويّة باردة.

- عشر نقاط من النُّشادر في كوب ماء مُحلِّي بالسُّكَّر.

- ملفوف، بصل، بَقدونس، كُرّاث.

48- Jambes (œdème) (F) Leg's œdema, Leg's edema (E)

أُودِيما السّاق، أُوْذِيما السّاق، وَذَمَهُ الرِّجْل، خَزَبُ الرِّجْل

أثينة عِطريّة، همامليس، سَفَنْدَر لاسِع، كستناء الخيل، قِمام آسِيّ، ثوم، بصل، كشمش أسود.

- خُمْر مُبَوِّل:

٢٤	نيترات البوتاس
	عرعر، ثمار
رِّة ٢٤ ساعة.  مِلْعَقتان كبيرتان قبل الوجبات.	نمرث في ليتر نبيذ أبيض لما
	- التَّشخيص الطَّبِّيّ مطلوب.
49- Jaunisse (F) Jaundice (E)	يَرَقان ، صُفار ، أُرَاق
لا المُعجَم). Voir ictère .	راجع يَرقان، صُفَيراء (في ها
50- Kératite (F) Keratitis (E)	الْتِهابُ القَرْنِيَّة
	راجع عَيْنان Voir Yeux.
51- Kraurosis (F) Kraurosis (E)	يَبَس، يُبُوسَة، نُشُوفَة، جَفَاف
Voir Troène commun.	جَنْبَةُ الرِّباط، يَاسَم مَعْرُوف.
مُقابِل Troène في بعض المَراجِع والمَعاجِم، وهو Vibur أي Viorne أي أُفْلُوس، بينما المقصود في (المُؤَلِّف).	
52- Lactation (F) Lactation (E)	دَرٌّ، إِرْضَاعٌ، دُرُوْرٌ، إِلْبَانٌ
انسون، كراويا، شجرة القُطن، كَمُّون، شومر، ، لاميون أبيض، شعير مُنْتَش، قرّاص، بيلسان،	
	- لِتَيْسِيرِ الدَّرِّ وتَحْسِينه:
٥٤ غ	مَغنيزيا إنكليزيّة
٤٦	قشرة برتقالة مسحوقة
٢غ	بزور شومر مسحوقة
١٢. غ	سُكَّر مسحوق
نه ١٨ صُرّة. يُؤخذ منها صُرّة في اليوم مع الماء.	نخلط الكُلّ جيِّدًا ونحضّر من
ك (جذور)، نعنع، بقدونس.	
ق (قُنْبُز) الطازج الحاصل من العَصْر البارد.	- مَسْح الثَّدْيَين بزيت الشَّنارِ

يُوضَع بكثرة بعد تسخينه الخفيف، ويُكرَّر ذلك كلّ ٣ ساعات. نُغطِّي الثَّدي

بالقطن. تُعطَى بالوقت عينه المُسهِّلات القويّة والمُعرِّقات.

- لَصُوقات بقدونس، داذي، ورق الونْكا.
  - مَسْح الثَّدْيين بزيت البابونج المُكُوْفَر.

### 53- Laryngite (F) Laryngitis (E)

### البهاب الحنجرة

أَكُونِيت، غَافَتْ غُولانيّ، كَمالِيَة، أَرْقِطيون، بَلسم الهيرو، بلسم تُولُو، جِرْجير حَقْليّ، نَدِيَّة، أَرِيسيمُوم، جيرانيوم روبرت، غرنديليا، خُبَّيزة، خزامَى، حزاز إسْلَنْدَة، عَشْقَة، حندقوق، صنوبر، لسان الحمل، حشيشة الرِّئة الوَردِيّة، تَنوب، مريميّة، قضيب الذَّهب، فرفارة، بصل.

- جزر، كرفس، سرفل، بقدونس.
  - خليطات تَتعاقَب:

٠٠٠	١) أُرِيسيموم
١٠	مريميّة
ا	سَكَبُ الغَرْبِ
ا	بنفسج، أزهار
١٠	زهرة العُطاس، أزهار
٤٢٠	سَنْفيتُون، جذر
٠٠	٢) أريسيمُوم
٢٠	خُبَّيزة، جذر
۱۰	فرفارة
٠١٠	زعتر مَدّاد
٠١٠	شاهترج
١٠	بنفسج بَرِّيّ
امًا في ليتر ماء يُغلى دقيقتين ويُغطّى ١٥،	يُؤخذ من الخليط ٣٠ إلى ٤٠ غرا
	ويُؤخذ منه ٤ أو ٥ فناجين في اليوم.
رة	٣) غَافَث غُولانيّ، رؤوس مُزهِ
	سَمَّارَة، رؤوس مُزهِرة
٠٠٠	عَشْقَة

۱۰	بُوصير أبيض، أزهار
١٠	خشخاش مَنثور، أزهار
۱۰ غ	
ا	فرفارة، أزهار
نر ماء غالٍ يُغطّى ٥ دقائق ويُؤخذ منه عدَّة	يُؤخذ ٣٠ غرامًا من الخليط في لية
	فناجين في اليوم.
الطِّبِّيِّ مطلوب.	- إذا استمرّ الالتهاب، فالتّشخيص
54- Leucorrhées (F) Leucorrhea, Leukorrh	n(o)ea (E)
	تَرِيَّة ، ثُرٌّ أَبْيَض ، سَيَلانٌ مَهْبِليّ أَبْيَض
Voir pertes blanches (F) Vaginal discha	راجع في التَّعْبير الفَرنسيّ: (arge (E
55- Lithiase biliaire (F) Biliary lithiasis (F	رُمَالٌ صَفْراوِي (٢
	رُمَالٌ صَفْراوِيّ راجع حَصَاة، حَصَى. Voir calculs.
	راجع حَصَاة، حَصَى. Voir calculs.
56- Lithiase urinaire (F) Urinary lithiasis	راجع حَصَاة، حَصَى. Voir calculs.
56- Lithiase urinaire (F) Urinary lithiasis	راجع حَصَاة، حَصَى. Voir calculs. راجع حَصَاة، حَصَى (E)
56- Lithiase urinaire (F) Urinary lithiasis	راجع حَصَاة، حَصَى. Voir calculs. راجع حَصَاة، حَصَى (E)  Voir Calculs. رَمَالٌ بَوْلِي راجع حَصاة، حَصَى
56- Lithiase urinaire (F) Urinary lithiasis	راجع حَصَاة، حَصَى. Voir calculs. رُمَالٌ بَوْلِيّ رُمَالٌ بَوْلِيّ رَمَالٌ بَوْلِيّ راجع حَصاة، حَصَى Voir Calculs. خُرْطُون
56- Lithiase urinaire (F) Urinary lithiasis 57- Lombric (F) Earthworm (E) 58- Lumbago (F) Lumbago, Lombago (E)	راجع حَصَاة، حَصَى. Voir calculs. رُمَالٌ بَوْلِيّ رُمَالٌ بَوْلِيّ رَمَالٌ بَوْلِيّ راجع حَصاة، حَصَى Voir Calculs. خُرْطُون
56- Lithiase urinaire (F) Urinary lithiasis (	راجع حَصَاة، حَصَى. Voir calculs. رُمَالٌ بَوْلِيّ رُمَالٌ بَوْلِيّ راجع حَصاة، حَصَى Voir Calculs. خُرْطُون خُرْطُون راجع دُودَة، دِیْدان. Voir Vers

تمسيدات مُتكرِّرة بمَروخ مركّب من أجزاء مُتساوِية من الكحول المُكوفَر ومن دُهن التربنتين.

ذَأَب، ذَأَبَة، لَوْشَب، قَرَّاض 59- Lupus (F) Lupus (E)

شِيكورية مُرّة، هِنْدَباء بَرِّيّة، بنفسج بَرِّيّ.

- لُوسيونات بنقيع الكُنباث المَغليّ.

60- Lymphangite (F) Lymphangiitis, Lymphangitis, Lymphangioitis (E) التهاك الوعاء اللَّمْفَاويّ

راجع التهاب الغُدّد، التهاب الغُدَّة اللِّمْفِيّة Voir adénite.

61- Lymphatisme (F) Lymphatism, Status lymphaticus (E)

# مِزَاجٌ لَمْفَاوِي، لِمْفَاوِيّة، حَالَةٌ لِمْفِيّة

إِنجبار، كَپُّوسين، كِشمش أسود، قُرَّة العَيْن، شاهترج، جنطيانا، طوقريون، جنجل، خميرة البيرة، جوز، فجل الخيل، عقيدة الطُّيور، زعتر.

فَحَافَة ، هُزَال ، ضُمور (E) Maigreur (F) Thinness, Leanness, Skinniness

راجع مُشَهِّيات ومقَوِّيات (في المُعجَم الثاني، صفحة ٣٣٧ و٣٥٢). حُلْبَة، رُشَيْم القَمْح، ذرة صفراء، شعير (مالْت).

- تشخيص طِبِّيّ.

63- Mains (entretien) (F) Hands (care) (E)

يَدَيْن، أَيْدٍ، يَد

ليمون حامض، جوز، بطاطا.

أَمْرِ اضٌ زُهْرِيَّة ، أَمْرِ اضٌ تَناسُلِيَّة (E) Wenereal disease (E)

راجع تَعْقيبة (في المُعجَم الثالث، صفحة ٢٨٨) وسِفْلِس. Voir blennorragie et . syphilis .

65- Mal blanc (F) White pain (E)

الْتِهابُ الإصْبَع

راجع خُرَاج، دُمَّل Voir abcès.

66- Mal de Bright (F) Bright's disease (E)

# دَاءُ برايْط، الْتِهابِ الكُلْيَة، مَرَضُ برايْت

التهاب الكُلية المُزمن: كرفس بَرِّي، أدونيس الرَّبيع، هدَال، جابُورَنْدِي، زنبق الوادي، أنواع الشنداب والقرص عنّة، لسان الحمل، كَنْكينا، إشقيل، بيلسان، عشبة القوى.

- مُعالَجات طِيِّيَّة .

67- Mal de tête (F) Headache (E)

صُداع، ألَّمُ الرَّأْس

راجع صُداع، رُؤاس (في المُعجَم الرابع، صفحة ٢٨٠).

4.4

راجع مِعَى، مَصِير، مِعَى غليظ، التهاب المِعَى، طَمث مؤلم، آلام حَوْضِيّة... والطَّبيب. Voir intestins, entérite, règles douloureuses, douleurs... والطَّبيب. pelviennes... et le médecin

#### 69- Mémoire (déficience) (F) Memory (deficiency) (E)

### ذَاكِرَة، حافِظَة (نَقْص، مُصُور)

راجع نَفَةٌ، نَهَكُ نَفْسانِيّ Voir psychasthénie.

سِحاءَة، أُمُّ الدِّمَاغ، أُمُّ الرِّأْس، سَحَايا، أَسْحِيَة وَاللَّمَاغ، أُمُّ الرِّأْس، سَحَايا، أَسْحِيَة م مُعالَجات طِيَّة.

#### 71- Ménopause (F) Menopause (E)

# انْقِطاعُ الحَيْض، الإياس، تَوَقُّف الشَّهْرِيَّة، انْقِطاعُ الطَّمْث، سِنُّ اليَأْس، الضَّهَى

- ثوم، زعرور، فراسيون نَين، كشمش أسود، سرو، هدال، همامليس، لاميون أبيض، نعنع، برتقال، قريص، زهرة الآلام، عَصا الرّاعي، مريميّة، زيزفون، آذريون، عشبة القوى، كرمة حمراء.

- المُسكِّنات العَصبِيّة.

### 72- Météorisme (F) Meteorism = Tympanism = Tympanites (E)

# انْتِفاخُ البَطْن، تَطَبُّل البَطْن، الحَبَط

راجع مَغْص مِعَوِيّ (في المُعجَم الرابع، صفحة ٢٨٣) Colique intestinales: يانسون، بَدْيان، كراويا، كزبرة، كمّون، شومر، فحم نَباتيّ.

يح: كزبرة، بزور١٥٠ غ	ماء طارد للرِّ
رردر	شومر، بزو
ي ١٥	جزر، بزور
رور١٥٠ غ	یانسون، بز
ور١٥٠ غ	کراویا، بز
ر	شِبْث، بزو
ء الحياة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	قنديد = ما

نمرث ٤ أيّام ونضيف ٣٧٥ غرام سُكّر قَنْد. ١٥ إلى ٦٠ غرامًا في اليوم: بَلْعُ الهواء، تَولُّد غازات.

۱٥غ	– خليط من: شومر
١٠	كراويا
١٥	كزبرة
١٥	أنجليك
١٥. غ	يانسون
٧٠	كمّون

مِلْعَقة صغيرة في فنجان ماء يُغلى دقيقتين ويُغطّى عشرة. فنجان بعد الوجبات.

# ٤ - المُصْطَلَحات الطِّيَّة

### فرنسي - إنجليزي - عربي

### 1- Abats (F) Offal, Variety meat (E)

ذَبْح، ذَبائِح

هي الأحشاء التي تُستعمل للتّغذية.

النّخاع، الكبد، الكِلى، لَوْزات العِجل Thymus، الطّحال، الأمعاء هي مُغذّية جدًّا، ولكنّها صعبة الهضم، إذًا لا يُنصح بها في الاضطرابات الهضميّة أو الكبديّة. وهي بالتالي غنيّة جدًّا بالأنْويَة الخليويّة وتحتوي على الكثير من الپروتينات النّوويّة التي يؤول إتلافها إلى حامض بَوْليّ ولهذا لا يُنصح بها للنّقرسيّين وفي كلّ الحالات التي يزيد فيها الحامض البوليّ والأوريا في الدّم.

# 2- Abcès chaud (F) Hot abscess, Hot abscessus (E) خُراج حادّ، خُراج الْتِهابيّ

إنّ الخُراج الذي يحصل تحت الجلد هو نموذج الخُراج الحاد بالذّات الذي يُترجَم سَريريًّا بالاحمرار، وحرارة موضعيّة ووجع نابض (نَأْز) يُرافِقه ورم أغشية الجِلد. إذا تفحَّصنا هذا الخُراج نرى تَموُّجًا يُشير إلى وجود القَيح، ويتَطوَّر طوعيًّا إلى تنسُّر غير كامل في أكثر الأحيان ينبجس منه القيح.

ترتكز مُعالَجة هذا الخُراج في تسهيل تجميع القيح بواسطة ضمادات ساخنة أو مُكَحْلَلَة، بتبخيرات مُطهِّرة، وضمادات، ومساعدة القيح على الخروج، إذا كان النّاسور لا يكفى، بالشَّق الجراحيّ.

### 3- Abcès froid (F) Cold abscess (E)

خُراج بارِد، لاطِئَة

هو تَجمُّع من القيح يتكوّن ببطء ومن دون تفاعل التهابيّ ظاهر. ويُحدث هذا الخراج انتفاخ الأنسجة غير المُؤلِم وتَرقيقًا مُبيض اللّون في البشرة التي ينبجس من تقرُّحها قيح مُصفر اللّون الأبيض ومُبرغَل. وتكون حوافي النّاسور خادرة، مُفكَّكة، لونها إلى البنفسَجيّ، ومن دون أيّ مَيل للالتئام، مُحدثة ناسورًا لا يجفّ في الغالب. الخُراجات الباردة العميقة لها الميزة الخادِرة ذاتها، وليس لها هي أيضًا، وفي

غالب الأحيان أيّ تفسير سَرِيريّ إلّا عندما تُسبِّب تلفًا هامًّا أو عندما تنتشر إلى البعيد. وهي تتسبَّب في أكثر الأحيان عن باسيل كوخ، كما أنَّها قد تتسَبَّب أيضًا عن ميكروبات أخرى، كباسيل أبَرُْث، أو عن فطور.

الخراجات الباردة تميل إلى إحداث نَواسير مُزمِنة لذلك يجب ألّا تُشَقَّ بل تُبْزَل عن بُعد أو تُزال بكلِّيتها. أمّا مُعالَجتها المُردية فتُعطى دائمًا عن طريق عامّ أو موضعيّ.

4- Abeille (F)

حشرة من رتبة غشائيّات الأجنحة، وخزتها سامّة كوخزة الزّنبور والدّبّور والطَّنّانة. في مُؤخّر بطن الأنثى حِمَّة طولها ٢ إلى ٣ ملم، مُزوَّدة بعقفات عِدّة وعلى صلة بغدّتين سامّتين. تبقى الحِمَّة في جرح الوخزة وتموت الحشرة بعدها بقليل.

لسمّ النّحلة خصائص حالّة للدّم، مُضادَّة للتَّخثُر وسامّة للأعصاب مُماثِلة لخصائص سمّ الحيّة. إنّ المناعة التي تُكتَسب بإلْقاحات مُتكرِّرة هي مناعة دائمة نسبيًّا، وقد يحلُّ التَّحسِيس محلّها أحيانًا.

وخزة النّحلة هي مُجرَّد حادث بسيط في أكثر الأحيان: آلام موضعيّة حادّة، ظهور بَثْرة قُرَّيْصِيَّة (١) Ortiee حَكَاكة تتمركز على الحِمَّة. وتكون الاضطرابات المتعلقة أكثر خطورة في بعض الأحيان. الوخزات المتعلقة قد تُحدِث أوديمات مُتَّسعة تصحبها الحُمّى والعوارض العصبيّة. وتُقدَّر الجرعة المُميتة بحوالى ٤٠٠ إلى ٥٠٠ وخزة. حوادث من النّوع العُواريّ (حساسية مُفرطة) قد تكون قاتلة في بعض الأحيان وعند بعض الأفراد.

انتزاع الحِمّة؛ وضع ماء جاڤيل. في حال وخزة في الفم: ابتلاع ماء مُمَلّع، وأُهمّ من ذلك هو حقن الوريد بالكورتيكويدات. في الحالات الخطرة: كورتيكويدات، أدرينالين، مضادّات الهستامين، المُقوِّيات العامّة تُعطى بإشراف الطَّبيب.

### 5- Acétonémie (F) Acetodemia (E)

# أْسِتُونيميا(١)، تَأْسُتُن الدَّم، تَخَلُّون الدَّم، خُلُّونِيَّة الدَّم

الأستُونيميا هي وجود أستون ومواد أُخرى سيتونيّة في الجسم. يُلاحَظ التَّأستُن في السُّكَريّ خاصّة، حيث يترافق مع الحُماض Acidose؛ كما يُلاحَظ في الطُّفولة في حالات مَرضيّة عديدة، عَداوئيَّة أو سامّة، كالإفراط في أكل الشوكولا أو الزُّبدة، أو

في حالات القُصور الكبديّ، حتّى الخفيفة منها، فتُؤدّي إلى استفراغات مُتكرِّرة تُدعى السنفراغات أستونيميَّة (١٠٠٠): Vomissements acétonémiques .

تَأَسْتُن الدّم، في السُّكَّريّ، الذي يكشفه وجود الأستون في البَوْل، يشير إلى درجة من خطورة المرض يُصبح معها التَّسْبيخ السُّكَّريّ قريبًا، وهذا ما يوجب الإسراع بمُعالَجة الأنسولين والقلويّات بإشراف طبِّيّ صارم.

أمّا استفراغات الولد الأستونيميّة فتستوجب استعمال القلويّات مثال بيكربونات الصوديوم، السُّكَّر (فيما عدا السُّكَّريّ الولّاديّ) ومنع الموادّ الدُّهنيَّة من التَّغذية، وهذا ما قد يفي بالغرض تمامًا في أكثر الأحيان.

#### 6- Alcoolémie (F) Alcoholemia (E)

# كُحُولِيمِيَا(١)، تَكَحْلُل الدَّم، تَغَوْلُن الدَّم، كُحُولِيّة

الكُحوليميا هي نسبة الكحول في الدَّم. هناك علاقة بين الظَّواهر والإشارات السَّريريّة والكحوليميا. يَصل الإنسان إلى درجة السُّكْر ébriété بين ٥٠، وغرام واحد في كلّ ليتر، وحتى عند هذه الكمِّيَّة من الكحول في الدَّم تبدأ فترة ردّة الفعل بالتّباطؤ؛ يظهر السُّكْر عند نسبة حوالى غرام واحد؛ والنَّشوة Ivresse عند غرامين، والتَّسْبيخ Coma عند ٤ غرامات، والموت عند ٥ غرامات. إنّ ابتلاع ثلث ليتر من النّبيذ يرفع الكحوليميا إلى ٥٠،٠ غرام كمُعدَّل وسطيّ. كلّ سائق في فرنسا تكون الكحوليميا لديه بين ٥٨، و ١٩٩٦ بالألف (أقلّ من ذلك بكثير عام ١٩٩٦) يُعتبر مُخالِفًا يستحقّ التَّغريم، ويَرتكب جُنحة أو جريمة اعتبارًا من ١,٢٠ بالألف.

### 7- Aménorrhée (F) Amenorrhea, Amenorhœa (E)

# انْقِطاعُ الطَّمْث، عَدَمُ الطَّمْث، الضَّهَى

هو غياب الانْدِفاق الطُّمْثِيِّ أو الحَيْضِيِّ.

إنّ انقطاع الطَّمث عند المرأة المُنظَّمة عادة بشكل جيّد، يَحثنا أن نفكّر قبل كلّ شيء بالحَبل. انقطاع الطَّمث خارج فترة الحَبل يعود إلى أسباب عديدة؛ ويكون ظاهرة عارضة épiphénomène خلال عدّة أمراض، كالإصابات التي تؤدّي إلى درجةٍ ما من الانحطاط الصَّحِّيّ العامّ، كالسِّل، السُّكَّريّ، الأمراض المُعدِية، والأمراض الأَصَمِّية endocriniennes، كالحَزَب أي الاستِسْقاء اللَّحْمِيّ Myxædème، ومَرَض بازدُو، ومرض أدِّيسُن، ومرض كاشِنْغ، والكَلْثَمَة أي ضخامة الأطراف بازدُو، ومرض أدِّيسُن، ومرض كاشِنْغ، والكَلْثَمَة أي ضخامة الأطراف

<sup>(</sup>١) التَّسعية للمُؤلِّف.

Acromégalie. كما تتعلّق بعض حالات الضّهى بأمراض الأعضاء التّناسُليّة: قُصور أو غياب قسم من أقسام الخطوط Tractus التناسُليّة، وبعض الإصابات المُلْحَقة، كالأَبُواق والمَبيضات، السِّلِ التّناسليّ، التصاقات داخليّة Synéchies تلي عادة عمليّات كَحْت الرَّحِم. وتُلاحَظ انقطاعات الطَّمث أيضًا بعد الخَصْي الجراحيّ أو الإشعاعيّ. وقد تظهر عند تغيير مناخيّ مُفاجئ، أو حَمّام بارد، أو صدمة عاطفيّة تُودِّي إلى خَلَل عَصبيّ نُبُوتيّ. إنّ اكتشاف سبب الضّهَى يَسمح بمُعالَجة شافية في أكثر الأحيان.

### 8- Amygdalite (F) Amygdalitis (E)

هو التهاب النَّسيج اللَّوزيّ على مستوى اللَّوزَتين الحَنَكِيَّتَين أو اللِّسانِيَّتَين. مُرادِف الكلمة الفرنسيّة هو Tonsillite، وهي تُشرَك حاليًّا مع كلمة Angine.

### 9- Analeptique (F) Analeptic (E)

نَعت واسم يُطلقان على مادّة تثير وظائف التَّغذية. يُشار بهذه الكلمة في أكثر الأحيان إلى أدوية بإمكانها إصلاح وإنعاش الوظائف التَّنفُسيَّة أو الدَّوْريّة. النَّواعِش التَّنفُسيَّة تسعى إلى إعادة نَظم وسِعة التَّنفُس إلى حالتهما الطَّبيعيّة؛ الأكثر استعمالًا منها الكَرْبُوجين، اللُّوبالين، الكافيين. أهم النَّواعِش الدَّوريّة هي الكافيين، الكافور، السبارتايين، النورأدرينالين. . . التي تُحَسِّن انقباض القَلْب الخائر القُوى.

مُلاحَظة: المُرادِفات العربيّة التي صادفناها في المراجع المُتخصِّصة هي التالية: مُنشِّط، مُقوِّ، مُنْعش، ناعِش؛ وهي بالتالي تُقابل بالتَّتابع ما يلي: ,Stimulant مُنشِّط، مُقوِّ، مُنْعش، ناعِش؛ وهي بالتالي تُقابل بالتَّتابع ما يلي: ,Rafraichissant tonique

# 10- Analgésique, Analgique (F) Analgesic, Analgetic (E) مُفْقِد الأَلَم، مُسَكِّن

نَعْت تعريفي أو اسم يُطلق على مُداواة تُؤدّي إلى فَقْد الحِسّ.

إِنَّ تأثير هذه الأدوية الأساسيِّ هو إلغاء أو أقلَّه تخفيف الظُّواهر المُؤلِمة من دون المساس بطرق الحِسِّ المَوضوعيّ الأخرى.

المورفين هو نموذج المُسكِّنات المركزيَّة: يؤثّر على قِشرة الدِّماغ، يُوهِن مركز الألم القِشْريِّ؛ المورفين ومُشتقاته يؤدّيان عاجلًا أم آجلًا إلى الإدمان. هناك مُسكِّنات أخرى أقل فَعالية من المورفين تُحدِثُ عملًا كابتًا في المجاري المُوصِلة للألم في الدّماغ المُتوسِّط؛ الأكثر استعمالًا منها: الأنلْجَازِين، حامض أستيل سالِسيليك،

الْتِهاكُ اللَّهُ رَة

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

اسْتِسْقاءٌ عام ، تَرَبُّل

انتفاخ عام للجسم مرده إلى وجود سائل في النَّسيج المَصليّ تحت الجلد (أوديمات)، وفي الأغشية المَصليّة، كغشاء الجَنْب أي غشاء الرِّئة المَصليّ (Hydropéricarde، وفي الشِّغاف أي التَّأمُور أي قميص القَلْب Hydropéricarde، وفي الصِّفاف أو الهُرْب Ascite، وفي الأعضاء بالذات أحيانًا كالأوديمات الدِّماغيّة.

### 12- Androgynie (F) Androgynism = Androgyneity = Androgyny (E)

# خُنْثُوِيَّة، خُنُوثَة، خُنْثِيَّة، خُنُوثَةٌ أُنْثُوِيَّةٌ كاذِبَة

وجود صفات أنثويّة عند أفراد لديهم في الواقع خِصيتين.

إنَّها خُنْيِّة كاذبة أو خُنْيِّة ظاهرة. إنّ الخُنْوِيِّين الذين يملكون بعض الخصائص الخارجيّة للمرأة هم في الواقع رجال، ولكن بما أنّ خِصيَتَيْهم ليستا ظاهرتين، وأنّ كيس الخصيتين غير مُلْتَحِم، فإنّ مظهر الجهاز التّناسليّ الخارجيّ عندهم يُذكِّر نوعًا ما بالتُّغْر. بالإضافة إلى ذلك، ولأنّ اختفاء الخصية Cryptorchidie عند هؤلاء الأفراد يؤدّي إلى إفراز داخليّ غير كامل للخصيتين، فإنّهم يكتسبون بعض المظاهر التي تُبرِز ما يُذكّر بمظهر المرأة، كاستدارة الأطراف، وضعف الوَبْر، وعرض الوركين.

# إِياسُ الذَّكَرِ، ضَعْفُ الذُّكُورَة [E] Andropause (F) Andropause (E)

مجموع المظاهر العضويّة والتَّفسيّة التي تُفاجئ الرَّجل بين سِنّ الخمسين والسَّبْعين (وُجد التَّعبير الفرنسيّ بالتَّشابُه مع إياس المرأة Ménopause).

إنّه من الصّعب عَزل هذه المظاهر عن التّطوُّر الإجماليّ للجسم نحو الشّيخوخة. وبالمُقابِل هناك ظواهر بيولوجيّة تسمح في بعض الحالات بإعطاء إياس الرَّجل معيارًا موضوعيًّا مثال نُقصان السيتُوسْتَارُويدات السَّبع عشرة Cétostéroïdes والزِّيادة المُوازِية له في الهرمون الجُريْبِينيّ المُنشِّط (F.S.H.)، وهو هرمون مَبيضيّ. إنّ انخفاض النّشاط الجنسيّ الذَّكريّ الذي ينجم عن هذه التّغييرات الإفرازيّة يتمّ بشكل تدريجيّ جدًّا وفي نمط يختلف تمامًا بين فرد و آخر. إنّ تكوين الحُويْنات المَنَوِيَّة يدوم لمدّة أطول بكثير من تكوين الهرمون الذَّكريّ.

### 14- Angine de poitrine (F) Angina pectoris, Angor pectoris (E)

# ذُبْحَةٌ صَدْرِيَّة، خُنَاقٌ صَدْرِيّ

ألم شديد في القلب لا صِلة له بذبحة البُلْعُوم.

ذُبحة الصَّدر هي تَناذُر يتميّز بنوباتٍ من الأوجاع التَّقليصيّة القابضة الشَّديدة تتمركز في المنطقة الأماقلبيَّة (أمام القلب) وتشعّ في الذّراع اليسرى وتترافق بإحساس بالقلق من موتٍ وشيك الوقوع.

#### 15- Angiocholite (F) Angiocholitis (E)

### التهاب قَنوات الصَّفْراء، ذات القناة الصَّفراوية

التهاب حادّ أو مُزمِن في المجاري الصَّفراويّة داخل وخارج الكبد.

أسباب هذا الالتهاب النّلاث الأكثر شيوعًا هي: الرُّمال الصّفراويّ، التَّضْييقات الوَرَميّة، الإصابات التيفيّة (تيفوئيد) ونظيرة التيفيّة. إنّ أعراض الأشكال الحادّة تُهيمن عليها الحُمّى التي تبرز بنوبات مُفاجِئة مُترافِقة بالارتعاش، ألم تحت الكبد، يرقان. وتختلف التَّرجمة السَّريريّة في الأشكال المُزمِنة حسب الأسباب، اليرقان هو أوّل ما يُلفت الانتباه ويَضع التشخيص أمام احتمال الرُّمال الصّفراويّ أو التهاب الكبد. إنّ بعض التهابات قنوات الصّفراء داخل الكبد قد تُسبِّب التَّشمُعات الصَّفراويّة الخطرة التَّطورُر.

#### 16- Antivenimeux (F) Antivenene, Antivenin, Antivenomous (E)

# مُضاد لِسَم الأفاعي، ضِدُّ الزَّبِيْب

ما يُقاوِم عمل السُّموم المُؤذي. يُحضِّر المَصْل المضادِّ لسَمّ الحَية وفق الطَّريقة المعهودة عن طريق الخيل المُمَنَّعة بشكل عالٍ بواسطة حقنة من ذيفان مُعَطَّل مُحضَّر اعتبارًا من ذيفان حيَّة سامّة؛ يجب أن يُحقَّن المصل بعد اللَّدغة بأسرع ما يُمكِن. إنَّ معهد باستور يُحضِّر الأمصال المُضادَّة لسموم الأفاعي وفق اللَّائحة التالية:

- فرنسا، المصل المُضادّ لسمّ الحيّة .E.R فعّال ضدّ لَدغ الأفاعي التالية: ,Aspis .ammodytes, berus
- أفريقيا الشّماليّة، مَصل مُضادّ لسمّ الحيّة A.N. فعّال ضدّ الحارِيّة .Xanthina, Lebetina
- أفريقيا الاستوائية الوسطى، المصل المُتعدِّد التَّكافؤ ضدَّ الأَفْعى العِبريّة، الشُّجاع والطُّفْيَة الحُرَّة، والصِّلِّ أي النّاجا، وهو المصل الذي أكثر ما يُنصَح به (فَعّال ضدَّ لَدْغ العِبريّة والشُّجاع والطُّفْيَة وِضدَّ لدغ الكوبرا أي النّاجا).
- البحر المتوسِّط الشَّرقي، أمْصال أُحادِيّة التَّكافؤ ضد أجناس الأفعى العِبريّة،
   الشُّجاع والطُّفْيَة، Lebetina، والحارِيّة من الأفاعى، وضد النّاجا من الكوبرا.
- آسيا الجنوبيّة الشّرقيّة، أمصال أحاديّة التّكافؤ ضدّ النّاجا، والصِّلّ الهنديّ (من

الكوبرا)، وضد agkistrodon (من Crotalidés).

المقادير: أَمْبُولَة واحدة للولد، أَمْبُولتان للبالغ، إذا أعطيت الحقنة بعد اللَّدغة فورًا. يجب أن نقوم أَوَّلًا بحقنة لـ ﴿إبطال التَّحَسُّسِ مقدارها ٠,١ مل، ومن ثمّ بعد مرور ١٠ دقائق، نحقن ما تَبقّى من الجرعة، نصفه قرب اللَّدغة، ونصفه الآخر في نقطة أخرى من الجسم.

إذا كان قد مضى على اللَّدغة أكثر من ساعة، فيستلزم ذلك مقادير أكبر (من ٢٠ إلى ٤٠ مل)، ويكون الاستشفاء مرغوبًا. أمّا في حال لدغة حَيّات استوائيّة ذات السَّمّ الأعنف (كوبرا، كروتال) يُصبح الاستشفاء ضروريًّا، ذلك أنّ المصل يجب أن يُعطى والحالة هذه بواسطة الحقن المتواصل ضمن الأوردة.

# قَلَق، هَمّ، ضِيْق، حَيْرَة (F) Anxiety, Anxietas (E)

القَلق هو شعور شاقّ بخطر داهم غير مُحدّد.

تُستعمل عِبارتي حَصَر Angoisse وقلَق Anxiété، مع بعض الفوارق، للإشارة إلى الاضطراب ذاته. فهناك بعض القلق عند كلّ فرد، وتكون كلّ الدَّرجات مُحتَملة بين القلق العاديّ والحَصَر المَرضيّ. ففي نَوبة القلق الشَّديدة تكون الحالة المُعاشة من المريض نوعًا من الخوف الشّديد ولكن من دون هدف لأنَّه لا يَتمكَّن من تحديد الخطر الذي يُرعبه. فهو يحسّ باضطراب وانطباع شاق بالعجز أو الضّعف أمام التهديد أو الخطر الذي يبدو فوريًّا. وقد يَتحدَّد الخوف أحيانًا بشكل أَدَق، خوف من المستقبل أو من الماضي، ولكته خوف لا تُبرِّره الظُّروف. فالمريض قد يضطرب ويثور، ويسير من دون هدف، وقد يَتجمَّد ويستمرّ في مكانه من خرّاء الذُّعْر الذي يستولى عليه.

### 18- Aphrodisiaque (F) Aphrodisiac (E)

# ناعُوظ، مُثِيْرٌ للشَّهْوَة، مُهَيِّج للشَّهْوة، مَغْلَمَة، مَنْعَظَة

نَعت تعريفي أو اسم يُطلَق على مادة تشتهر، بما يُبرِّر ذلك نوعًا ما، على أنها تُولِد شهوة الجنس وتسمح بمُمارَسته. إنّ الأطعمة المُفَلْفَلة، والتَّوابل والبَهارات والأفاويه، والكَمْء، والقِشريّات، وبنوع خاصّ الكحول بمقادير صغيرة هي مُنشِّطات جنسيّة دُنيا. أمّا الحامض الفوسفوريك والفوسفُورات: Phosphures، اليُوهِمْبِيْن، الهرمونات المُتماثِلة المُتجانِسة مع جنس الفرد، والمُستخلص الدَّرْقيّ بمقدار ضعيف يُمكِنها أن تُؤدِّي عملًا؛ ولكنّه عمل عابر وَقْتيّ، وهي مُعالَجات لا تمرّ من دون سَيّئات ولا من دون تأثيرات ثانويّة، قد تكون مشؤومة أحيانًا.

# فُصال، اعْتِلالٌ مَفْصلي، داء المَفاصِل، تَنكُسُ المَفْصِل، التَّعَضِّي، فُقاس، داء مَفْصِلِي فُصال، الفُصال هو إصابة حُؤولِيّة تَنكُسِيّة في المفاصل.

يُشار بهذا التَّعبير إلى أمراض مَفْصِليّة مُزمِنة ترتكز تَغْيِيراتها التَّشريحيّة بشكل أساسيّ على إصابات مُتْلِفة للغَضاريف المَفْصِليّة تَشترك وتُكاثِر النَّسيج العَظْميّ التَّحْتِيّ، فالغُدّة المَفْصِليّة (تفرز زُلال المفاصِل) ليست مركز التهاب مُزمِن سوى بشكل مُتقلِّب وغير ثابت. إنّ هذه الإصابات التَّنَكُسيّة الطّابع تُحقِّق نوعًا من الشَّيخوخة المَفْصِليّة المُبْكِرة. إنّ مواقع اعتلالات المفاصل الأكثر شيوعًا هي المفاصِل البَيْفَقْريّة، الوَرْكين، الرُّكبين، بعض مفاصل اليد والقَدم.

# حَبَن ، سِقْي ، اسْتِسْقاءٌ بَطْنِيّ ، اسْتِسْقاء و Ascite (F) Ascites (E)

من اليونانيّة Askos بمعنى قِرْبَة. الحَبَن هو انسكابُ سائلٍ في فَجوة الصِّفاف أي غشاء الكرش، باستثناء الانسكابات المُتقيِّحة (التهابات الصِّفاف الحادَّة) والدَّمويّة المُجرَّدة (نزيفات الصِّفاف). نادرًا ما يكون السّائل كَيْلُوسيّ الشَّكْل، أي حَلِيبيّ المُظهر. لا يُسبِّب الحَبَن اضطرابات وظيفيّة هامّة إلّا إذا كان غزيرًا.

# تَصَلُّب عَصِيديّ، عُصَاد، تَصَلُّب تَعَصُّدِيّ (E) Athérosclérose (F) Atherosclerosis

مرض شرياني مُعمَّم يضم رواسب دسِمة تَصَلَّبية تحت بِطانة الأوعية الدَّمويّة (تَعَصُّد الأوعية اللَّوعية المرض بنوع جانب تَصلُّب مُنتشِر في الجوانب الوعائيَّة (Athérome)، إلى جانب تَصلُّب مُنتشِر في الجوانب الوعائيَّة (Artériosclérose). يتمركز المرض بنوع خاص في شرايين القلب (عُصاد تاجيّ)، وفي الشِّريان الأورُطيّ (تَصَلُّب أورُطِيّ)، وفي أوعية الأطراف السُّفلي (التهاب شريانات الأطراف السُّفلي)، وفي شريان الكلية والدِّماغ. ونادرًا ما يَطال الجهاز الشِّريانيّ الرَّئويّ.

ترتكز مُعالَجته على اعتماد نمطٍ حياتي صحّي مُناسِب، يستوجب الاسترخاء النَّفسي المصحوب بنشاط جسدي مُعتدِل. ويُنصح بإلغاء التَّدخين. بعض قواعد الحِمية يجب أن يُطبَّق كخفض الكالوريات العامَّة، خاصَّة في حال بداية بَدانةٍ ما، وخفض كمَّيَة الدهون، خاصّة الحيوانيّة منها لغناها بالكولسترول، وعدم الإفراط في السُّكَريّات؛ تلافي الإفراط في الملح. مجال المُعالَجة الطبيّة ضيّق نسبيًّا.

وجود كمِّية من الأزوت في الدّم بشكل مُركّبات، ولكنّها لا تُشير عمليًّا إلّا إلى الأزوت الهَيُوليّ (أزوت هَيُولي) والأزوت الموجود في أجسام كيميائية أخرى (أزوت غير هَيُوليّ). إنّ الأزوت الهَيُوليّ هو أزوت الهَيُوليّات، والمُتعدِّد الأمين، والحوامض الأَمينيّة. أمّا الأزوت غير الهَيُوليّ هو الموجود في الأوريا، والنّشادر، والكرياتين، والكرياتين؛ إنّ نسبة هذا الأزوت العاديّة تختلف من ٢٠،٠ إلى ٢٠،٠ غرام في اللّيتر. إنّ زيادة الأزوتيميا المَرضيّة هي فَرط الأزوت في الدّم Hyperazotémie وهو تعبير يُستعمَل غالبًا كمُرادِف غير صالح للأوريميا Urémie أو تَبُولُن الدّم (الأوريا ليست المُسؤولة عن الحوادث).

### أزُوْتيريا، بَيْلَازُوْتِيَة<sup>(١)</sup>

23- Azoturie (F) Azoturia (E)

وجود كمِّيَة من الأزوت في البَوْل على شكل مُركّبات، باسْتِثناء الأزوت الهَيُوليّ (أزوت الهَيُوليّ الزوت الهَيُوليّ الأزوت اللَّيتر. تتركّب من أزوت الأوريا أي البَيْلَة ٨٨٪، أزوت النّشادر ٥,٥٪، أزوت الكرياتينين ٤,٤٪، أزوت الحامض البَوليّ ١٩٨٪، وبقيَّة غير مُعيَّرة تُقابِل القواعد البُوريكيّة وحوامض أمينيّة حُرّة.

تقلّ الأزوتيريا في حالات القُصور الكليويّ (Néphropathies)، ويتماشى هذا النَّقص مع زيادة في الأزوتيميا. كذلك تقلّ الأزوتيريا في إصابات الكبد الخطرة (اليرقان الخطر، الانحلال الدُّهنيّ).

وعلى عكس ذلك، تزيد الأزوتيريا (Hyperazoturie) في الأمراض الحُمِّية، وفي السُّكَّرِيّ المِعْقَديّ المصحوب بنقص واختلال في التَّغذية، وحالات الإثارة والتَّهيُّج، وفي بعض التَّسمُّمات (فوسفور، زرنيخ، أنْتيموان).

### 24- Bâillement (F) Yawn, Yawning (E)

تَثاوُب

التَّناؤب هو فَغْرٌ واسع لاإِراديّ للفم، مع زَفير كبير يليه شهيق طويل للهواء، وتَقلُّص عضلات الوجه. التَّناؤب ظاهرة ارتكاسِيّة طبيعيّة، تنتج عن التَّعب، الضَّجر، النُّعاس، أو التَّقليد والاقْتِداء. إنّ انسداد قناة أوستاكيوس المُؤقَّت (وهي مجرى اتَّصال للهواء الخارجيّ بين الفم وطبلة الأذن) يُؤدِّي إلى نقص مُؤقَّت للسَّمع يَتوقَّف مع حركةِ البَلْع. وقد ينتج التَّناؤب عن حالات مَرَضِيّة مُختلِفة، فيأتي بكمِّيَّة أكبر من

<sup>(</sup>١) التَّسميتان للمُؤلِّف.

الهواء إلى الرِّئة في حال تباطؤٍ أو انزعاج تنقُسيّ؛ وقد يُزامِن اضطرابًا هضميًّا أو معويًّا أو معويًّا أو مراديًّا أو حتّى قد يُزامِن إحساسًا بالجوع بكلّ بساطة.

25- Balsamique (F) Balsamic (E) تُلْسَمِيّ، بَلْسَمِيّة، بَلْسَمِيّة، بَلْسَمِيّة، بَلْسَمِيّة، بَلْسَمِيّة

نعت تعريفيّ واسم يُطلَقان على موادّ راتنجيَّة طبيعيَّة تحتوي على حامض بنزويك أو على حامض عَبْهَريّ.

تَتمثّل البَلسميّات بالبلاسم التي من أهمّها البنجوان وبسلم البيرو وبلسم تولو؛ وهي بلاسم تحصل كلّها من جرّاء حزّ طوعيّ أو اصطناعيّ للأشجار الراتنجيَّة التي تحتوي عليها. ويدخل في فئة البلسميّات، إلى جانب البلاسم، صموغ راتنجيَّة كصمغ الأمُّونياك، وتربَنْتِينات كتربَنْتِين الصَّنوبر أو التَّنّوب والقطران النَّباتيّ، وبعض الراتنجات الأُخرى كالكبّابة والماتيكو، ومواد عطريّة كالأوكالپتُول. إنّ هذه المواد هي مُبدّلة أو مُغيِّرة للأغشية المخاطنة القصية الشُعبيّة.

# 26- Basedow (maladie de) (F) Basedow's desease, Exophtalmic goitre (E) مَرَض بازْدُو ، سِلْعَة جُحُوظِيَّة

مرض يَتسبَّب عن إفراطٍ في وظيفة الغدَّة الدّرقيّة.

يعود اسم هذا المرض إلى الطبيب الألماني كارل فون بازدو الذي وصفه عام ١٨٤٠، وهو مرض يَتميَّز سَريريًّا بالسَّلَعَة أي تَضخُّم الغدَّة الدَّرقيَّة إذ إنَّها تفرز الهرمون الدَّرقيِّ بكثرة، وبجحوظ للعين مصحوب ببريق مأساوي للنَّظرة التي تُضفي على البازْدَوِي (١) Basedowien مظهرًا خاصًّا مُتميِّزًا جدًّا، وبخفْقة دائمة تزداد وتتعاظم عند الانفعالات والتَّوبات التَّطَوُّريَّة، وبارْتِجاف عام لكنَّه أكثر ما يُلاحظ في الأطراف، وبهزال بالغ في أكثر الأحيان يتناقض مع احتفاظ المريض بشهيَّته للطَّعام. إلى هذه الإشارات الكبرى تُضاف اضطرابات الطَّبع (انفعاليَّة، تَأثُّريَّة، نَزَق، سرعة الغضب، تقلُّب، لااستقراريَّة)، اضطرابات وعائيَّة مُحرِّكة (تَعرُّقات، هَبُوات)، تُعُوبيّة واضطرابات تناسليَّة (عجز، برود، تَوقُف الطَّمث).

### 27- Benzolisme (F) Benzolism, Benzole poisoning (E)

# بَنْزُولِيّة (١)، تَبَنْزُن، انسِمام بالبنزين

مجموع اضطرابات سريريَّة وبيولوجيَّة يُحدِثها البنزين أو مثيلاته كالتولويان والأَّكْزيلان. . وهو مَرَض مِهَنيِّ .

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

الحَيْوَنَة هي سلوك جنسي غير طبيعي، يَتميَّز بمُمارَسة الجنس مع الحيوانات. والمقصود هو أمران، إمّا استمناء الحيوان أو مُجامَعته الفعليَّة حيث يكون الشَّريك حيوانًا أليفًا بشكل عام . توجد الحيونة عند الرَّجل والمرأة على السَّواء . وهي تشيع في الأرياف عند المُتخلِفين العقليِّين، والكحوليِّين أو الأشخاص الفَظيِّن والمُنعزِلين. أمّا في المُدُن فالحيونة وقف على مُختلي العقل أو المُنحرِفين وفاسدي الأذواق الذين يشتاقون إلى التَسليات المُثيرة للغرائز الجنسيَّة .

## تَعْقيبَة ، سَيَلان مُخاطِي ، سَيَلَان صَاعِي ، سَيَلان مُخاطِي ، سَيَلان مُخاطِي ، سَيَلان مُخاطِي ، سَيَلان

هي إصابة زُهرية المصدر بشكل دائم تقريبًا، تُحدِثها مُكَوَّرَة نَايْسَر Neisser. تُحدِث التَّعقيبة سيلانًا قَيْحيًا على مستوى الأغشية المُخاطيَّة المُصابَة. تَتمركز عند الرَّجل على مستوى الإخليل عادةً. وتَتسبَّب عند المرأة بإصابات في العنق الرَّحميّ، والتهاب المَهْبل. وتكون إصابة الأعضاء التَّناسليَّة عند الجنسين سببًا للعقم. علاج التَّعقيبة يجب أن يتم بإشراف الطبيب، وهو مرض يَستوجب النَّظافة الدَّقيقة التامَّة والتَّعقيبة الصارم.

## داءُ برايْط، الْتهابُ كُلْيَة مُزْمِن (E) Bright (mal de) (F) Bright's disease (E)

داء برايط هو الاسم القديم لالتهاب الكلية المُزمِن Néphrite chronique. الطَّبيب الإنكليزي ريشارد برايط (۱۷۸۹ – ۱۸۵۸) برز ما بين ۱۸۲۷ و۱۸۳٦ بأبحاثه التي أجراها على التهاب الكلية المُزمِن، وهي إصابة لازمَت اسمه لفترة طويلة من الزَّمن. إنّ «داء برايط» قد تَقسَّم فيما بعد إلى أمراض عديدة مُختلِفة.

# 31- Broncho-pneumonie (F) Bronchopneumonia, Bronchopneumonitis (E) الْتِهاب شُعَبِي رِثَوي، ذاتُ الرِّئَة القَصَبِيّة، الْتِهاب القَصَبَات والرِّئَة

هو التهاب القُصَيبات Bronchioles والفُلَيْقات Lobules الرَّثويّة. إنّ هذا الالتهاب يتنامى في الإصابات الڤيروسيَّة كالكريب والحميراء... أو في الإصابات البكتيريَّة كالشُهاق. أمّا الجراثيم الأكثر تَسبُبًا له فهي باسيل بفايْفَر، باسيل فريدلانْدَر، المُكوَّرة الرِّئويّة، المُكوَّرة العِقديّة... ويُلاحَظ في العمرين الضِّدَيْن، عند الرَّضيع والشَّيخ، وعند الموهنين المُضْعَفِين أو عند أصحاب العاهات (كحوليِّين). إنّ مراكز الالتهاب القصبيّ النُّخروبيّ أو بؤراته هي محصورة ومُنفصِلة عن بعضها بواسطة نسيج الرِّئة الإسفنجيّ العاديّ ومُنتشِرة نوعًا ما في الرِّئتين.

إنّ معالجة هذا الالتهاب تستوجب، بالإضافة إلى المُرْدِيات والسولفاميدات والأوكسيجين، إعادة تمييه الجسم، والمُقوِّيات القلبيَّة إذا لزم الأمر.

# 32- Bronchorrhée (F) Bronchorrhea (E) مَنَّ قَصَبِيّ ، ثَرُّ قَصَبِيّ ، ثَرُّ قَصَبِيّ

السَّيَلان القَصَبيّ هو زيادة مَرَضيّة في إفراز المُخاط الشُّعبيّ. يُترجَم هذا السَّيلان سريريًّا بتَقشُّع وافر من بُصاق عديم اللَّون، شفّاف، راغٍ، مُزيِد. يُلاحظ هذا السَّيلان في حال البرونشيت المُزمِن.

# سُحَار قُطْنِيّ، بُوْصِيَّة، تَتَرُّب الرِّئَة القُطْنِيّ (E) Byssinose (F) Byssinosis (E)

سِل الحَلاجين أو مَرض القُطْن هو إصابة رئويَّة تُصيب العمّال الذين يَتنشّقون غبائر القُطن والقنّب والكتّان. تُلاحَظ هذه الإصابة خاصَّة عند الأشخاص الذين يعملون في الدَّرْس (فَصل الحَبِّ عن السَّنابل) أو الذين يعملون في نَدْف الصوف ونفشه، وتَنكشف بزُلَّة ربويّة الشَّكل. ويبدو أنّ هذا الأمر يعود إلى ظواهر حساسيّة تُترجَم بجفف الحلق وبضيقٍ تَنفُسيّ وإحساس بالاخْتِناق يَبرز فجأة عند استعادة العمل بعد فترة من التَّوقُف كالراحة الأسبوعيَّة مثلًا. إنّ الزُّلَّة قد تَتمركز بعد سنوات.

# 34- Calcémie (F) Calcemia (E)

وَرَدت لها الأسماء التالية: تَكلُّس الدّم، كِلْسِيَّة الدّم، كِلْسِمِيَّة، زِيادَة كِلْس الدّم. هي كمِّيَّة الكلسيوم في الدّم. الكلسيميا العاديَّة هي ١٠٠٠ غرام أي مقدار Hypercalcémie جزأين من الألف من الجُزيْئة الغرامِيّة في كلّ ليتر. زيادتها Hypocalcémie كما نقصانها Hypocalcémie يُؤدِّيان إلى ظواهر مرضيَّة مُختلِفة.

# 35- Charbon (F) Anthrax, Malignant anthrax, Malignant carbuncle (E) جَمْرَة خَبِيْثَة

مرض مُعدٍ يُصيب الحيوان بنوع خاص والإنسان نادرًا، تُسبّبه البكتيريا الفَحْمِية أو الجَمْرِيّة. الإصابة أصبحت نادرة حاليًّا. إنّ الضَّأْنِيّات والبَقَرِيّات هي الحيوانات الأكثر عرضة للجمرة. تنتقل العدوى إلى الإنسان عن طريق البشرة، ونادرًا عن طريق الغشاء المخاطيّ، بمُلامَسة الحيوان المُصاب أو منتوجاته المُلوَّثة. علاجها بالمُرْدِيات وخاصَّة البَنيسلين.

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

### الْتِهَابُ المَرارَة، الْتِهَابُ حُوَيْصَلَة الصَّفْراء (E) Cholecystite (F) Cholecystitis (E)

التهاب المرارة الحاد أو المُزمِن. إنّ ٩٠ بالمئة من الإصابات يكون سببها حَصَويًّا. يَنكشف الالتهاب الحاد بأوجاع في الخاصرة اليمنى، وحُمّى مُرتفِعة، وتَقيُّؤات أحيانًا. ويَنكشف الالتهاب المُزمِن بأوجاع قد تكون تألُّمًا بسيطًا في المنطقة التَّحْضِلْعِيَّة اليمنى أو ألمًا نموذجيًّا للمغص الكبديّ - وجع شديد يشعّ في الظَّهر، يعيق التَّنفُس العميق، يهدأ بمُضادّات التَّشنُّج.

# كُوْليرا، هَيْضَة، هَواء أَصْفَر 37- Choléra (F) Cholera (E)

إصابة مِعويَّة تَسمُّميَّة حادّة تقتصر على الجنس البشريِّ، تُسبِّها الضَّمَّة الهَضْمِيَّة Vibrio comma .

تسبَّبت الكوليرا بفتكات مُرعبة على مَرّ الزَّمن. مهدها آسيا حيث تُوجَد بحالة محصورة، ومن حيث انتشرت بمَوْجات وبائيَّة كبيرة اعتبارًا من القرن التاسع عشر نحو أوروبًا وأفريقيا وصولًا إلى أمريكا. إنّ بؤرة الكوليرا الوبائيَّة الأساسيَّة حاليًّا هي في الهند وفي بعض مناطق جنوب شرق آسيا.

الكوليرا مُعْدِية جدًّا وتنتقل عن طريق الفم فقط بشرب المياه أو أكل الأطعمة المُلوَّثة بالبراز الهَيْضيّ، كما إنَّها تنتقل بواسطة الأيدي الوسخة أو أيّ وعاء مُلوَّث. علاجها السولفاميدات والمُرديات وإعادة تمييه كثيفة أساسها بلاسما، ومَصْل مُسَكَّر ومُملًح يجب أن يُعطى فورًا.

# 38- Chorée (F) Chorea, Saint Vitus's dance (E)

مرض عَصَبيّ يَتميَّز بحركات لاإراديَّة وغير مُنتظِمة.

إنّ حركات الكوريا هي حركات لاإراديَّة، غير مَوْزونة، غير مُوقَّعة، سريعة، عنيفة، نَزِفة، واسعة، مُشَوَّشة وفاقدة النّظام. وهي مُذهِلَة للمُشاهَدة بقدر ما تَستقرّ غالبًا في جذر الأطراف وتقذف بها في كلّ اتّجاه. تختفي الحركات خلال النَّوم. من أنواع الكوريا: الشَّلَل الرَّعْشِيّ، الرَّقْص الحَمْلِيّ، الرَّقْص النَّصْفِيّ، الرَّقْص الوراثيّ، الرَّقْص القَفْزِيّ. الأسباب عديدة، ولكن مُعظَم الحالات المُعايَنة تندرج في إطارين:

### - كُورِيا سِيدَنْهام، رَقْص سَنْجِي Chorée de Sydenham, Danse de Saint-Guy

مرض مُعدٍ سببه المُكوَّرة العِقْديّة تمامًا كما في الروماتيزم المفصليّ الحادّ الذي يُشاركه بالتالي خطر التعقيدات القلبيَّة. يُصيب هذا المرض الولد والمُراهِق. يُعزَل المرض. مُعدِّئات الأعصاب تُخفِّف الحركات الرَّقْصِيّة. مُعالَجات أخرى يُبرِّرها

#### • Chorée de Huntington

### - كُوريا هَنْتِنْغَتُن

نموذج الرَّقْص المُزمِن الذي يكون عائليًّا (وراثيًّا) في غالب الأحيان ويبرز عند البالغ. يشترك هذا المرض عمومًا مع اضطرابات في الطَّبْع والمِزاج والفكر والعقل، ممّا يَطرح مشاكل نفسانيَّة. علاجه بالمُسكِّنات، ومُهدِّئات الأعصاب، والثيتامينات.

# 39- Chromothérapie (F) Chromotherapy (E) مُدَاوَاة بالأَلُوان

هي طريقة علاج بعض الأمراض بوضع إشعاعات مُلوَّنة. يبدو أنَّ الضَّوء الأحمر يَتَّصف بخصائص مُضادَّة للكآبة والاكتِئاب، بينما يبدو الضَّوء الأزرق أو البنفسجيّ على أَنَّهما مُسَكِّنان.

### عِلَ، ناشِر، کُوبْرا (E) Cobra, Cobrah (F) Cobra (E)

حيّة سامّة تُدعى أيضًا ناجا Naja من الصّليّات. لدغتها تُحدِث انتفاخًا موضعيًّا مُؤلمًا، وتُحدِث بنوع خاصّ انزعاجًا ووهنًا عامًّا يُرافِقه استرخاء وفتور، وضيق تَنفُسيّ، وتَعرُّقات، وشلل اللّسان والفم. يلي ذلك موتُ الملدوغ على أثر شلل تَنفُسيّ خلال ٤ إلى ٦ ساعات.

من الواجب استعمال مِضْغَطَة Garrot تُرْفَع بعد مرور نصف ساعة، ومن الواجب عدم الحرّ والشّق والشَّرْط الجرحيّ إلّا سطحيًّا، كما أنّه يُمنَع القَطْع والبَتْر والجَدّ والاستئصال وكذلك الكَيّ. هناك مَصل من تحضير معهد پاستور يُحقن تحت الجلد حول الجرح بمقدار ١٠ سنتمترات تُجدَّد إذا لزم الأمر. ويُتابَع العلاج الباقي بإشراف الطَّبيب.

#### 

قسم من الغلاف الخارجيّ للقسم العُلويّ والخلفيّ للرَّأس والرَّقبة، يكون فيزيولوجيًّا مَكسوًّا بالشَّعر. فروة الرَّأس طَريّة تجمد عادة على الجمجمة، ويتجدَّد عليها الشَّعر باستمرار بمُعدَّل ٣٠ إلى ٥٠ شعرة في اليوم. إنّ تساقط عدد مُماثِل من الشَّعر هو أمر طبيعيّ عند الفرد المُشْعِر بشكل جيِّد.

إنّ فروة الرَّأس قد تَتغيَّر من جرّاء تَساقُط الشَّعر خلال صَلْعات مُختلِفة، عن طريق العدوى مثلًا كالحَصَف، أو بتنامي حالة قِشريَّة كالنُّخَاليَّة Pityriasis التي تنكشف بظهور قشرة الرَّأس الجافَّة أو الدُّهنيّة التي تُلاحَظ في السَّيَلان الزَّهَمِيّ.

المَثَن هو أوجاع مثانيَّة وحُرْقات عند التَّبوُّل. تُخصَّص عبارة مَثَن للحالة التي لا يُبيِّن فيها مَبحث الأعراض أيِّ إصابة في المثانة أو يشرحها. إنّ حالات المَثن هي عاديَّة ومُتكرِّرة عند المرأة تنحَسِر بالمُعالَجة الطِّبِيَّة واتِّباع بعض قواعد النَّظافة والحمية.

#### 

يتمّ تلف الخلايا فيزيولوجيًّا من دون أن يفطن له أحد عندما تنتهي من إتمام دورها أي عندما تُسْتَنْفَذ. تُتْلَف الكريات الحمر مثلًا في الطِّحال خلال ١٠٠ إلى ١٢٠ يومًّا تقريبًا؛ وتكون مُعظَم ظِهارات التَّكْسِيَة وبعض الأنسجة الحَشَويّة موضع تبديلات مُستمرَّة بإزالة الخلايا المُسْتَهْلَكَة عن طريق الحَلّ الخليويّ واستبدالها بخلايا حديثة التَّكُونُ.

إِنّ بعض الأدوية أو بعض السُّموم يُحدث تلف الخلايا، فيُطلَق عليها اسم «حالَّة الخليَّة» Cytolytiques. كذلك هو الأمر مع بعض العناصر الفيزيائيَّة (كالقنابل الذَّرِيَّة).

### 44- Cytolytique (F) Cytolytic (E)

حَالَ الخَلِيَّة

نعت تعريفيّ يُطلَق على ما يُحدِث تلف الخلايا. يُستعمَل هذا التَّعبير للسُّموم أو الأدوية التي تُحدث تلفًا خلويًا إمّا بعملها على الجِبْلَة أو على النَّواة أو على مُجمَل الخليَّة. يُقابل هذا التَّعبير النَّعْت Caryolytique الذي يُحدِّد الموادّ التي تُتلِف انتخابيًّا نواة الخلايا فقط. إنّ سمّ الأفاعي مثلًا وفطر الأمانيت القَضِيبيّ (١) Amanite phalloïde هي من هذه الموادّ، كذلك هي أصناف الخردل المُنتْرَج. إنّ استعمال حالّات النَّواة في المُعالَجة هو أسهل من استعمال حالّات الخليّة.

#### 

نعت تعريفي واسم يُطلقان على بعض الموادّ التي لها خاصّة توقيف العَمَل أو الاصطناع أو التَّكاثر الخَلُويّ. إنَّ موادّ كهذه تُستعمَل عادة في مُعالَجة السَّرطان.

# d6- Daltonisme (F) Daltonism (E)

الدَّلْتونيَّة هي أحد اضطرابات رؤية الألوان يكون فيه المُصابون عميانًا بالنِّسبة للَّون الأحمر ولا يُمكِنهم تفرقة الأشياء الحمراء من الأشياء الخضراء.

<sup>(</sup>١) التَّسمية للمُؤلِّف.

نعت تعريفي يُطلَق على حِمية غذائيّة خالية تمامًا تقريبًا من كلورور الصوديوم، أي حمية من دون مِلح أو حِمية عن المِلح.

تُخصَّص هذه الطَّريقة العلاجيَّة لتخليص الجسم من الصوديوم الذي يُسبِّب الانتضاح الأوديماتيّ إذا حوى منه الجسم كمِّيَّة فائضة. ولقد أثبتت التَّجربة أنَّ إِيُون الصوديوم هو المسؤول عن الأوديما، ويُقال اليوم بتعبير أكثر عِلمِيّة: حِمية مُزالة الصوديوم.

في حال إصابة كليويَّةٍ ما فإنّ كمِّيَّة كلورور الصوديوم التي تُزال كلّ ٢٤ ساعة تقلّ تبعًا لخطورة الإصابة، وإذا كانت الكمِّيَّة المُبتلَعة أكثر من ذلك، فإنّ تراكم الملح يؤدِّي إلى إمساك البول لكي يبقى تركيز الملح في الأخلاط مُساوِيًا لنسبة ٨%، وبذلك ينقص البُوال. إنّ المُعالَجات «المُزيلة للكلورور» تنصح بحمية مُزالَة الصوديوم لفترة من الزَّمن، وبهذه الطَّريقة يَتحسَّن البُوال على حساب الأوديمات، بينما ينقص مُنْحَنِ الوزن البيانيّ، بسبب الإزالة التَّدريجيَّة للملح المُتراكم.

### 48- Dépuratif (F) Depurative (E)

مُنَقّ، مُرَوِّق

نعت تعريفيّ واسم يُطلَقان على ما هو خاصّ بتنقية الدّم والأخلاط.

كانت هذه التَّسمية تَضم في الماضي عددًا كبيرًا من الأدوية التي كانت بمُعظَمها نباتيَّة المصدر، والتي كانت تُنسَب إليها صفات تخليص الجسم من الانسمام وإزالة الأخلاط الفاسِدة والمُعيبة Peccantes.

مُجِّدت في هذا الصَّدد تأثيرات أجسام أو مواد أو طُرُق مُختلِفة جدًّا: كالمُبوِّلات، المُسهِّلات القويَّة، المُقيِّئات، المُعرِّقات، اليودور، الكبريت... وحتى الفَصْد. إنَّ عبارة «مُنَقِّ» لم تعد تُستعمَل اليوم لأنَّها عامَّة جدًّا.

### 49- Diurétique (F) Diuretic (E)

مُدِرّ للبَوْل، مُبِيْل، مُبَوّل

نعت تعريفيّ واسم يُطلَقان على أيّ دواء يزيد الإفراز البوليّ.

إنّ الدّم يرشح في كُبيْبات الكلية بمُعدَّل ١٠٠ إلى ٢٠٠ ملل كلّ دقيقة تبعًا لحجم الصَّبيب النِّسبيّ. إنّ هذا الرَّشح يَمتصُّه الأنبوب الكلويّ بكامله تقريبًا، ويُشكِّل البول الكمِّيَّة غير المُمتصَّة. إنّ دواء مُبوِّلًا ما لا يُمكنه التَّأثير إذًا سوى بإحدى هاتين الإواليَّتين: إمّا بزيادة الرَّشح الكُبَيْبِيّ، وإمّا بمُعارَضة الامتصاص الأنبوبيّ للماء وبعض المركّبات الألكتروليتيّة الموجودة في الرُّشاحة.

<sup>(</sup>١) التَّسميتان للمُؤلِّف.

نعت تعريفي واسم يُطلَقان على مُسهِّل شديد جدًّا يُهيِّج أَغشية الأمعاء المخاطيَّة ويُحدِث مغصات حادَّة تُؤدِّي إلى إطلاق تَغوُّطات سائلة عديدة وغزيرة. يُنصَع بالماسطات إذا أردنا الحصول على تأثير إخراج قويّ، ولكنَّها قد تُؤدِّي، بسبب عملها هذا الفعّال جدًّا، إلى تَوعُّكات وانزعاجات حيث تلعب فيها الاضطرابات الإلكتروليتيَّة دورًا هامًّا. وهي مُضادَّة للاستطباب في حال إصابة الأمعاء، كما يجب تحاشيها أثناء الحمل.

من بين أهم الماسطات نذكر الجَلَبَة والنَّبْق التي يُشكِّل خليطها ما يُسمّى كلاسيكيًّا «قنديد ألمانيّ»؛ السَّقمونيا، الألوة، السُّورنجان تُسبِّب غالبًا تَهيُّجًا طارئًا في الأمعاء أثناء مُعالَجة النِّقرس: زيت الخروع هو الأَقلّ عنفًا.

### 51- Duodénite (F) Duodenitis (E)

التِهاب العَفَج، عُفاج

يكشف التهاب العَفَج أسبابًا مُختلِفة: إخلال في القواعد الصَّحِيَّة والحِمْيِيَّة، إصابات سِنِّيَة أو إصابات المجاري الهوائيّة العليا، إصابات غذائيَّة المصدر، قرحة عَفَجيّة، طفيليّات مِعويَّة، ابتلاع مواد كاوية. إنّ التهاب العَفَج قد يَنكشف بمظاهر مُختلِفة: حُرقات شُرسُوفيّة بعد الوجبة، أو شعور بسيط بالثِّقل، اضطرابات هضميَّة مُختلِفة. النَّزيفات نادرة وبسيطة في أكثر الأحيان، كالتَّقيُّوات والتَّغَوُّطات الدامية.

إزالة مُسبِّب الالتهاب عندما يُمكن ذلك. اتَّباع القواعد الصِّحِيَّة والحمييَّة من وجبات مُنتظِمة ومُعتدِلة الكمِّيَّة، تُؤكَل على مهل؛ إلغاء الأطعمة المُهيِّجة والكحول والتَّبغ...

#### 52- Dysentérie (F) Dysentery (E)

دِيسنْتِيرِيا، زُحار، إِسْهال

يُنصَح في المرحلة الحادَّة بالحمية المائيَّة الحليبيَّة المُطلقَة. تُعطى مُضادّات التَّشنُّج كالبلّادون، والماصّات كالفحم والبيزموت؛ مُعالَجة نوعيَّة بالمصل، يُفَضَّل عليها اليوم المُعالَجة الكيميائيَّة بواسطة السولفاميدات وسواها...

### 53- Dysphonie (F) Dysphonia (E)

بُحَّة ، جَشَر ، عُسْرُ التَّصْوِيت

البُحَّة (الصَّوت المُكَسَّر، المخنوق، الأَجَشّ) هي إشارة إلى التهاب الحنجرة أو إلى إصابتها أو إصابة أعصابها. إذا برزت البحَّة فجأة، مصحوبة بالحمّى، وبانزعاج

عام، يجب التَّوجُّه بالفكر إلى التهاب الحنجرة الحاد العادي الهَيِّن، أو إلى التهاب الحنجرة الدفتيري أي الخُناق Croup. يجب وهذه الحالة الإسراع في التَّشخيص والمُعالَجة المصليَّة. إذا تَمركزت البحّة بمكر وحيلة يجب التَّفكير بالتهاب الحنجرة المُزمِن (سِلّ، التهاب حنجرة تَسمُّميّ عند المُدخِّنين والكحوليِّين)، والتَّفكير كذلك بورم هيِّن أو بورم خبيث يُصيب الأوتار الصَّوتيَّة ممّا يَستدعي استشارة الطَّبيب المُختَص وفي كلّ مرَّة تطول فيها البحَّة أكثر من أسبوعين.

# ٥- بيوغرافيا

# فرنسي - عربي

#### Paracelse (Philippus Aurelius Theophrastus Bombast Von Hohenheim -)

پَارَ اسَلْس (فيليبوس أوريليوس تيوفر استس بومباسْت ڤون هوهَنْهايم -)

ولد پاراسَلْس في آيْنسِيدَلْن ١٤٩٣، وهو طبيب وخيميائيّ سويسريّ. كانت حياته مُضطربة جدًّا. عُيّن أستاذ الطبّ في «بال» بعد أن كان قد جال في كلّ أنحاء أوروبّا. وكان تعيينه ثورة حقيقيَّة، إذ إنَّه كان يُدرّس بالألمانيَّة، ممّا استمال إليه عددًا كبيرًا من الطُّلَاب. ولكنّ نقده المُتكرِّر لكبار أطبّاء التاريخ القديم قاده بسرعة إلى استعادة حياته كطبيب جَوَّال. ويُعتقد أنَّه تُوفّي في الفقر المُدقِع، مُتسمَّمًا، في سالزبورغ ١٥٤١.

بالرَّغم من كلّ ما كُتِب فيه وعنه، كان باراسلس «الدَّجّال» طبيبًا كبيرًا. فهو أبو الطِّب السِّحريّ، مارس الخيمياء الاخْفائيّة واكتشف الخصائص العلاجيَّة الشِّفائيَّة الشَّفائيَّة التَّداوي استعمال المُركِّبات الكيميائيَّة، واكتشف الخصائص العلاجيَّة الشِّفائيَّة لعدد كبير من الموادّ: أفيون، زئبق، كبريت، أنْتيموان، أرسنيك، الخ. ولكنَّه اشتهر خاصَّة كمُؤسِّس للطِّب السِّحريِّ عن طريق نظريّاته على العلاقة بين الروح والجسد والعالم الخارجيّ. فالروح تُمثِّل الله، والأجساد تُمثِّل العالم التَّحْقَمَرِيِّ أي الأرض، والسائل يُمثِّل الكواكب. . . وكان باراسلس بالتالي بطل التَّظريَّة الشَّهيرة التي تَنسب إلى النَّباتات خصائص شفائيَّة تبعًا لأشكالها أو تبعًا لروائحها أو ألوانها وما إلى ذلك: نظريَّة التَّواقيع Théorie des signatures.

Le ادّعى باراسلس أنه صنع المَسْخ والقَزم Homunculus، وأنَّه اخترع الإكسير - Opus paragranum (1565) ، أعماله الرَّئيسيَّة : spécifique anodyn - Liber paramirum (1575)

باریه أُمْبرواز Paré Amboroise

(١٥١٧–١٥٩٠)، ولد پاريه في بورغ هَرْسَنْت قرب لاڤال. جرَّاح ملوك فرنسا

الشَّهير: هنري الثاني، فرنسوا الثاني، شارل التاسع، هنري الثالث، رافقهم غالبًا مع الجيوش، وسُجن وأُطلِق سراحه، وكان قد بدأ كحلاق بسيط. لُقِّب «أبو الجراحة» على أثر اكتشافه الكبير استبدال كيّ Cautérisation الأطراف الرَّهيب على أثر عمليّات البَتْر، برَبْط الشّرايين Ligatures des artères. ولقد عرض طريقته واكتشافاته التَشريحيّة الجراحيّة في عدد من الكتابات والدِّراسات التي حققت إصدارات عديدة في كلّ اللُغات الأوروبيَّة.

ولقد حاولت كلِّيَة الطِّبِ في باريس بكل الوسائل، أن تُعيق تأثير أمبرواز پاريه، الذي لم يكن من أعضائها، على الملك. فكان دائمًا يُردِّد: Je le pansay, Dieu le» «guarist» أي: «أنا أُضَمِّده، الله يشفيه». ومن المُحتمَل جدًّا أنّ پاريه كان هوغونوتيًّا (Huguenot، أي يروتسْتانْتيًّا فرنسيًّا. مُؤلَّفاته الطَّبِيَّة:

- La manière de traîter les playes (1545)
- La méthode curative des playes et fractures de la teste humaine (1562)
- L'anatomie universelle du corps humain (1564).

باتان غي پاتان غي

وُلد غي پاتان في هُودَانْس أَن بْرَايّ، طبيب وأديب. عميد كلِّية الطِّب في باريس زمن العصر الكبير (١٦٠١-١٦٧٢). طبيب مُمارِس عاطِل، مُتَحَرِّب لطريقة في التَّداوي تبسيطيّة ومُعارضة للتَّقدُّم. برز غي پاتان دائمًا كخصم شرس وعدو أزْرَق للنَّظريّات الحديثة وللمُنتَجات الجديدة التي دخلت فرنسا على أثر اكتشاف أميركا. بقي طوال حياته مُتعلِّقًا بالأدوية والعقاقير النَّباتيَّة الأكثر بدائيَّة. وكان بالكاد يقبل بشراب سُكَّريّ من أزهار الدُّرَاق والهندباء والحامض والريباص. وقد كان لطبعه النَّزِق الغَضوب فرصة لكي يبرز بكلّ حِدَّته خلال «حرب الأنتيموان» الشَّهيرة (١٩٦٦-١٩٦١)، والتي شقَّت أعداء مُستميتين، بعضهم مع الأنتيموان، العزيز على قلب پاراسلس، والباقون ضدّه. وكان پاتان ضدّه بالتَّأكيد، فلقي في ذلك الجَدَل مادّة غلَبَ بُوراسلس، والباقون ضدّه. وكان پاتان ضدّه بالتَّأكيد، فلقي في ذلك الجَدَل مادّة غلَبَ لمُهاجَمة خصومه التَّقليديِّين الدائمين: أطبًاء مدرسة مونيوليه.

مُحازِب الطُّرق العلاجيَّة التَّقليديَّة الجامدة والعقيمة، ممّا جعل زملاءه يستهزؤون به ويدعونه: «طبيب الـ S الثلاث»، وذلك بسبب مُعالَجاته الأكثر بدائيَّة التي لم تكن تلجأ سوى للفَصْد Saignée والسَّنا Séné والتّخالة Son.

غي پاتان مُؤلِّف «رسائل» لطيفة النُّكتة، مُسلِّية، كاوية ولاذعة، نُشرت من ١٦٩٢ إلى ١٧١٨. مُشاحَناته المُسلِّية عن استعمال الكينا والأنتيموان كانت سببًا

لتدخّل البرلمان. هذا، وبما أنَّه كان أبدًا في مُقاضاةٍ مع واحد أو مع آخر، فإنَّ نزاعاته وشتائمه وذمّه بسواه، وبسبب سخريته وتَهكُماته السَّيِّئة النَّيَّة، إضافة إلى مزاجه اللاذع النَّزِق، كلّ هذا أكسبه وعن حقّ، عددًا من الأعداء واستحقّ جيِّدًا القصيدة الهجائيَّة الانتقاميَّة التي وضعها تيوفراستس رينودوت، طبيب الفقراء آنذاك ومُؤسِّس أوَّل جريدة طبيبًة، يقول فيها:

Nos docteurs de la Faculté,

Aux malades s'ils rendent la santé

Ont besoin de l'apothicaire.

Mais Patin, plus adroit, de par la charité

Avec «3 S» les enterre.

أي ما معناه: أَطبّاؤنا الجامعيّون في الكلّيّة، يحتاجون إلى الصّيدليّ لكي يشفوا المرضى. ولكنّ پاتان، الأجدر، وبدافع المحبّة، يدفنهم بحروفه «S» النّلاثة.

پاتان شارل، ابن غي، ١٦٣٣ - ١٦٩٣، وُلِد في باريس وهو طبيب كذلك وعالِم بالمَسْكوكات والمِداليّات Numismate.

Paul d'Égine پول داجين

عالِم نبات وطبيب يوناني من القرن السابع للمسيح، وُلد في Égine أجين. عرف مدرسة الإسكندرية. كان جرّاحًا جسورًا مِقدامًا جدًّا. وقد بقي مُؤلَّفه Abrégé de مدرسة الإسكندرية. كان جرّاحًا جسورًا مِقدامًا حدًّا. وقد بقي مُؤلَّفه médecine عمليًّا المرجع الجراحيّ لجامعة باريس حتّى القرن الثامن عشر.

پولّي سيمون پولّي سيمون

طبيب دانماركي من القرن السابع عشر، درس تقريبًا كلّ النّباتات الطّبيّة، وخاصّة المريميّة التي ترك عنها دراسة كاملة.

### Platine de Crémone (Baptiste) پلاتِين دو کرِيمون

مُؤلِّف واحدة من أهم دراسات المطبخ في عصر النَّهضة التي صَدَرت في إيطاليا سنة ١٤٧٤، وكان عنوانها: De homesta voluptate et valetudine .

تُرجِمت هذه الدِّراسة إلى الفرنسيَّة منذ العام ١٥٠٥. وكان ذلك المُؤلَّف، الذي يستند إلى كاتون وكُولُومَل وأَپيسيوس، يبدو قبل كلّ شيء، وكأنَّه دراسة في فَنّ

العَيْش السَّعيد، حيث يَنسب المُؤلِّف إلى المطبخ الدَّور الذي يجب أن يكون له في هذا المضمار، وهو أنّه يُوفِّر الصِّحة الطَّبِيَّة ويَشفي، بالتالي، من بعض الأمراض. ومُجمَل القول أنّ ذلك الإيطاليّ من عصر النَّهضة كان يَستشعر منذ ذلك الحين بالحِمْيَة العذائيَّة العزيزة الوقع عند المُؤلِّفين المُعاصِرين: فكان پلاتين دوكرِيمون ينصح بالمَشاوي والسِّيْخ، وكان يَهب بعض الأطعمة خصائص رائعة؛ ولكنَّه، وعلى عكس تقاليد القرون الوسطى، كان ينصح دائمًا باستعمال البَهارات والتَّوابل بعض الرَّوية والاعتدال.

## Pline l'Ancien (Caius Plinius Secundus), dit: «le Naturaliste» بِلْيْن الْقَديم

كاتب لاتينيّ، وُلِد في كُوْم أو في ڤيرونا (٢٣-٧٩م.). نشأ پلين من عائلة غنيّة، وأصبح جنديًّا، وشارك في معركة جرمانيا بصفته قاضٍ عسكريّ. عند عودته إلى روما أصبح مُحاميًا، ولكنّه تابع دراسة العلوم والآداب. كان شغفه بالمعرفة خارقًا: يستيقظ في مُنتصَف اللَّيل، يُطالِع، يَكتب أو يُمْلي حتّى المساء ومن دون أيّ انقطاع، حتّى خلال وجباته وتنقُلاته التي كان يقوم بها على مِحَفَّة. جمع پلين بهذه الطَّريقة ما يُقدَّر بأكثر من ١٦٠ مُجلَّدًا من المُلاحَظات أو من المُلخَصات. أرسله الأمبراطور ڤشباسيان كوالٍ رومانيّ لكي يَحكم إسبانيا المُوالِية له. ومن ثمّ عَهد إليه طيطُس قيادة الأسطول البحريّ الرّاسي في مِيسَان Misène. وكان أن لقي هناك مصرعه خلال الهيجان الشَّهير لبركان الڤيزوڤ في ٢٤ آب ٧٩ للمسيح، بينما كان يُحاوِل مُراقبة ذلك الحَدَث عن لبركان الڤيزوڤ الحَد النَّ المُوالِية في رسالتين شهيرتين إلى تاقيطُس Tacitus، المُؤرِّخ اللاتينيّ الذي عالج التاريخ الرومانيّ؛ وكان عمر پلين ٥٦ عامًا.

وضع پلين القديم مُؤلَّفات عديدة تَناوَلت الفنّ العسكريّ والتاريخ وعلم البلاغة وفنّ الخطابة والعلوم الطبّيعيَّة، من مُؤلَّفاته: دراسة كاملة في رَمي الرُّمح عن ظهر الحصان، حياة پومْپُونيوس الذي كان قائده فيما مضى؛ عشرون مُجلَّدًا عن الحروب الجرمانيَّة؛ واحد وثلاثون مُجلَّدًا في التاريخ المُعاصِر؛ ثلاثة مُجلَّدات في مهنة المُحاماة؛ دراسة كاملة في قواعد اللَّغة، تقع في ثمانية مُجلَّدات؛ وكتب التاريخ الطَّبيعيّ الذي وصل إلينا وحده وبكامله. ويُشكِّل هذا التاريخ نوعًا من الأنسيكلوبيديا الحقيقيَّة عن مُجمَل المعارف عند القدامى؛ قُسِم هذا المُؤلَّف إلى ثلاثة أقسام وجاء في سبعة وثلاثين مُجلَّدًا. من هذه المُجلَّدات: خصَّص الكتاب السابع للإنسان، ودَرَس الثامن والتاسع المملكة الحيوانيَّة، ومن الثاني عشر إلى التاسع عشر كان دور المملكة النَّباتيَّة والزِّراعة؛ الكتب الثلاثة عشر التالية خصّصها التاسع عشر كان دور المملكة النَّباتيَّة والزِّراعة؛ الكتب الثلاثة عشر التالية خصّصها

يلين لدراسة الأدوية والعِلاجات التي تُوفِّرها مَمْلَكَتا الحيوان والنَّبات. أمَّا الكتب الخمسة الأخيرة فكانت للمَعادِن والفنون.

إنّ نظرة العصور القديمة إلى عمل پلين كانت نظرة احترام، حتى من قِبَل الأديب الفرنسيّ العالم بالطَّبيعيّات بوفون. ولكنّ علمه لم يعد يُشكِّل اليوم سوى فائدة تاريخيّة أو مُسْتَنَدِيّة؛ فهو بالواقع عملُ جَمّاعٍ ومُصَنِّفٍ للنُّخَب وكاتب موهوب أنيق العبارة. پلينُس الأكْبَر.

#### Pline le Jeune (Caius Caecilius)

## يليئس الأصْفر

كاتب وأديب لاتينيّ وُلِد في كُوْم ٦١ أو ٦٢ م، اتَّخذ، بعد تَبَنِّيه من عمَّه پلين القديم، الاسم التالي: Caius Plinius Caecilius Secundus

حصل پلين الأصغر على مَناصب سياسيَّة وإداريَّة وعسكريَّة مُهمَّة. وعيَّنه تراجان أو ترايانُس الأمبراطور الرومانيِّ حاكمًا على بيثينيَه حوالي ١١١م.

### Plumier (Le Père Charles)

# بلُومييه (الأب شارل)

عالم نباتيّ فرنسيّ قدير (١٦٤٦ - ١٧٠٦)، قام بثلاث سفرات إلى أمريكا، منها سفرتان بصفته بوتانيّ الملك. وضع الأب شارل مواصفات مئات الأنواع النّباتيّة الأمريكيّة التي كرَّس بعضها تقديرًا لمشاهير علماء النّبات مِثال البوتانيّ والطّبيب ليونهارت فُوشس، فأطلق اسمه على نبات ال فُوشيا Fuchsia.

# فيتأغُورس فيتأغُورس

فيلسوف وعالم رياضيّات يُونانيّ وُلِد في ساموس في القرن السادس قبل الميلاد (٥٨٠ - ٥٠٥) وبقيت حياته غامضة المَعالِم. أقام في مِصر لفترة طويلة، درس خلالها مجموعات الكواكب والخريطة الفلكيّة، ومن ثمّ استقرّ في اليونان حوالى ٥٣٥ ق.م. حيث يُعتقَد أنَّه أسَّس مدرسة فلسفيَّة هي كناية عن بدعة الفيتاغوريّين التي كانت تُلزِم أتباعها بنظام حياتيّ قاسٍ جدًّا (كان يمنع اللُّحوم، من بين ما كان يمنع)؛ وكان أتباعه يتَلقَّنون «الأسرار الكبرى» بواسطة رموز يُحظَّر عليهم كشفها. وكان فيتاغورس يُعلِّم بأنّ التَّعبير عن كافَّة الكائنات الطَّبيعيَّة يتمّ بواسطة الأرقام؛ فالأرقام هي عناصر كلّ شيء، والعالَم برمَّته ليس إلّا تَناسُق وحساب!

أَقرَ فيتاغورس بالتَّقمُّص، أي بعبور الروح من الجسد الذي أحيته إلى جسد آخر، وهو مفهوم يُلجِق مدرسته بالدَّرويديّة Druidisme (دين الغاليّين) والبَرَهْمانيّة

(الهندوسيّة). أوجَد علوم الرِّياضيّات ويُقال إنَّه استشفّ حركة الأرض على نفسها وقال بكرويَّتها وانعزالها في الفضاء.

#### Rabelais (François)

### رابوليه فرانسوا

أديب فرنسيّ من عصر النّهضة. وُلد قرب شينون، تُوفِّي في باريس (١٤٩٤ - ١٥٥٣). أرسله والده إلى دير الفرنسيسكان حيث كان طالبًا مُتفوِّقًا. رُسم كاهنًا في العام ١٥١١. شرع رابوليه بدراسة العلوم الطّبيعيَّة بالرَّغم من أنظمة الدَّير التي كانت تمنعه من ذلك، من ثمّ تَعلّم اللاتينيّة واليونانيّة والعبريّة. أثارت سِعة معارفه شبهات رؤسائه فهرب من الدَّير. عام ١٥٣٠ درس الطِّب في مُونبولييه حيث كانت أطروحته لنيل الدُّكتوراه عن الأعشاب. عام ١٥٣٢ أصبح طبيبًا في أحد المُستشفيات حيث دَرّس التَّشريح. حينها نشر مُؤلَّفه Pantagruel الذي منعته كلِّيَّة اللاهوت، وكان باسم مُستَعار. كان رابوليه طبيبًا مُمتازًا وصف أدوية عديدة عالج بها أمراضًا مُختلِفة وعلى الأَخص داء السِّفلس الرَّهيب في وقته.

#### Raspail (François)

### رَسْبَايِ فرانسوا

كيميائي ورجل سياسي وُلد في كَرْبَنْترا، تُوفِّي في أركويل (١٧٩٤ - ١٨٧٨) وكان من دُعاة الانتخابات العامَّة. دَرّس الفلسفة في مدرسة أڤينيون الإكليركيَّة حيث كان طالبًا بارزًا قبل ذلك. لكنّ أفكاره الطَّليعيّة اضطرَّته لترك التَّدريس الدينيّ. بعد ذلك عمل في الصَّحافة. ومن ثمّ جذبته المواضيع العلميّة، فاهتمّ بالطِّب واكتسب شهرة واسعة بين الفقراء الذين كان يُعالِجهم مجّانًا في باريس. إلّا أنّه لم يكن مُتمكِّنًا من الأسس العلميّة، ولم يكن بالتالي يُعالِج المرضى بشيء سوى الكافور، فاشتهر أيّام الأمبراطوريَّة الثانية بلقب «بطل الكافور».

### Récamier (Joseph Claude Anthelme)

# ريكامييه (جوزف كلود أنْثَلم)

طبيب فرنسيّ وُلد في روشفور وتُوفّي في باريس (١٧٧٤ - ١٨٥٢). دَرّس الطّبّ في كلّيَّة فرنسا وفي كلّيّة الطّبّ. ولقد أشاع استعمال المِنظار الطّبّيّ Speculum.

#### Roger de Salerne

#### روجيه دي ساليرن

جَرّاح بارز وُلِد في ساليرن حوالى ١١٨٠. لمّا قامت، أوائل القرن الثالث عشر، مدرسة جراحيّة كبيرة ورأت النور على يد كلّ من شُولياك، لانْفْران ومونْدَڤيل، كان ذلك بفضل تأثير روجيه دي ساليرن إلى حَدّ كبير. وكانت الجراحة قبل ذلك تُمارَس على يد الحَلّاقين الذين كانوا يملكون بعض المهارة!

تُظهِر مخطوطة روجيه المُمتازَة في الجراحة La Rogérine مدى حسّه التَظريّ وبراعته التّقنيّة كطبيب مُمارس في الوقت عينه. وقد استهوى روجيه العالَم الطّبيّ بشدّة وأثار عددًا كبيرًا من الشُّروحات والتّفسيرات التي انتشرت في جامعات الطّبّ الأوروبيّة، وبخاصة في مونبولييه، وكانت سببًا في انطلاق الجراحة وازدهارها. مدرت أشهر شروحاته في كتاب عنوانه La Glose des Quatres maîtres.

#### Rosier (Abbé Jan François)

روزييه

بَحَّاتْ زراعيّ وعالم نباتيّ فرنسيّ، وُلد وتُوفّي في ليون (١٧٣٤ - ١٧٩٣).

#### Ruellius (Jean Ruel)

رواليوس (جان روال)

وُلد رواليوس (الاسم اللاتينيّ لجان روال) في سُواسون وتُوفِّي في باريس وُلد رواليوس (١٥٠٨). شغل مَنْصب عميد كلِّيَة باريس عام ١٥٠٨، كان واحدًا من الأطبّاء المُفضَّلين من الملك فرنسوا الأوَّل. تَخلّى رواليوس عن مناصبه لكي يُكرِّس نفسه بكلِّيَّها لعلم النَّبات العزيز على قلبه، والتحق بالرَّهبنة. وضع ترجمة لأعمال ديوسقوريدس، وهذا ما أكسبه لقب: "نَسْر المُترجِمين». ألَّف دراسة شاملة مُميَّزة عنوانها De natura Stirpium وهي فهرس حقيقيّ جامع للمعارف البوتانيّة المُكتسبة حتى ذلك الوقت. أهداه الأب يلوميه فيما بعد جنس Ruellia من الأقَنتيّات.

### ساليرن (مدرسة -) Salerne (école de -)

مدرسة طبيّة قرب نابولي، لاقت شهرة كبيرة في القرون الوسطى ولم يبق لها أيّ أثر في يومنا سوى ذكرى بارزة لما كان يُطلَق عليه اسم Regimen Sanitatis.

لم يُعرَف تاريخ هذه المدرسة المجيدة في زمنها لولا اكتشاف المجموعة المخطوطة في مكتبة Breslau عام ١٨٣٧، وهي مجموعة مُؤلَّفات مدرسة ساليرن الأساسيّة للطَّبيب البروفسور هَنْشَل Henschel. وإلى ذلك يبدو أنّ أقدم مُؤلَّف لتلك الممدرسة كان بعنوان Passionarium للمدعوّ واربود غاريوبونْتُس Warbod سيّى وهو أوَّل كتاب طبّيّ بعد نهاية العصور القديمة، وهو بالتالي كتاب سيّى تنحصر فائدته الوحيدة في اعتماده العبارات الطبّيّة باللَّغة اللاتينيّة لأوَّل مرَّة في التاريخ بدلًا من اليونانيّة المُتَبعة دائمًا إلى ذلك الحين.

أَمَّا أَوَّل مَن أكسب مدرسة ساليرن الشُّهرة البارزة فكان قسطنطين الأفريقي الذي

لُقّب بِالْمُعلِّم الشَّرق والغرب ، وهو لبناني مسيحي وُلد حوالي عام ١٠٢٠ وتُوفِّي عام ١٠٨٧. تقول الأسطورة أَنَّه وصل بحرًا إلى ساليرن حوالى العام ١٠٧٥ بعد غرق سفينته على الأرجح. ويُعتقَد أنَّه كان تاجرًا عاديًّا وليس طبيبًا، ولكنّه كان يُتقِن اللاتينيّة جيِّدًا إلى جانب لغته العربيّة. وبالرَّغم من أنّ مُساهَمته الشَّخصيَّة في المدرسة الساليرنيّة كانت معدومة، إلّا أنّ ترجماته الماهرة للنُصوص اليونانيَّة (قام بها مُترجِمون عَرَب عند الخليفة المأمون) وضعت أخيرًا بتَصرُّف الغرب النُصوص الصَّحيحة. أضف إلى ذلك أنّ الطِّب العَربيّ بدأ بفضله ولأوَّل مرّة أن يُؤثّر في الطِّب الغَربيّ.

في أواخر القرن الحادي عشر تألّقت أيضًا في ساليرن عائلة Platearius، وتروتولا Rebecca و Abella Calenda ومثال Trotula ومساء طبيبات أخريات مثال Trotula وموروس، الشهوديّة. كما برز عددٌ من المُعلِّمين مثال فرّاريوس، موناكوس، موروس، إلخ. إنّ الكتابات المجهولة للمُؤلِّفين هي التي أرسَت مجد ساليرن بنوع خاصّ. ولكنّ أشهر تلك الكتابات قاطبة كان عنوانه Regimen Sanitatis Salernitanum، وهو مُؤلَّف تلك الكتابات قاطبة كان عنوانه بفقي طوال خمسة قرون مُتوالِية من الزَّمن بمثابة المَرجِع الوحيد للأَطبّاء.

كان أرنو دو ڤيلنُوڤ أفضل مُجدِّد لذلك الكتاب المَرجع، وهو تلميذ ساليرن وأحد أَلمع مُثقَّفي القرن الثامن عشر الذي أصبح فيما بعد بروفسور في مونبولييه. أمّا الجراحة في القرون الوسطى فكان رائدها من ساليرن أيضًا وهو Roger de Salerne ممّا أوصل المدرسة إلى ذروة مجدها، فدامت شهرتها حتّى القرن الرابع عشر الذي بدأ فيها تأثيرها على الأفكار يتراجع.

إنّ فضل ساليرن الكبير هو أنّها شَرَعت بتعليم الطّبّ لأُوَّل مَرَة في التاريخ (قبل بولونيا ومونبولييه) بينما لم يكن أحد سواها يهتمّ بنشر المعرفة إلى الآخرين. صمدت مدرسة ساليرن قدر المُستَطاع إلى أن أطلق عليها نابوليون الأوَّل رصاصة الرَّحمة فألغاها بمرسوم ٢٩ تشرين الثاني ١٨١١.

سَيرَ (أوليڤييه دو) Serres (Olivier de -)

مُؤسِّس البحث الزِّراعي الفرنسيّ، «أبو الزِّراعة» الحقيقيّ، وُلد أوليڤييه وتُوفِّي في أملاكه في پرادَل Pradel (١٦٦٩ - ١٦٦٩). كانت الزِّراعة أيّام الملك هنري الرابع من أهمّ أهداف فرنسا المُرهَقة من الحرب الأهليَّة. وكان سُلِّي Sully مُنظِّر الزِّراعة وأوليڤييه مُنفِّذُها. أدخل أوليڤييه عددًا كبيرًا من الأنواع الجديدة إلى فرنسا، منها التوت مثلًا، واستبدل نظام البور بنظام الزِّراعات المُتعاقِبة أي ما نعرفه اليوم بالدَّورة الزِّراعيّة. يوجز أوليڤييه عمله الضَّخم بكتابه الرائع: Théâtre d'agriculture بالدَّورة الزِّراعيّة. يوجز أوليڤييه عمله الضَّخم بكتابه الرائع: et mesnage des champs، الذي يُعتبر أحد فصوله نموذجًا حقيقيًّا في الطِّب والصَّيدلة المنزليّة.

كانت حديقة پرادَل آية زراعيَّة أنشأ فيها أوليڤييه، إلى جانب حديقة الأزهار، وبستان الفاكهة، وبستان الخضار، «حديقة طبيّة» مُستوحِيًا من حديقة مونبولييه البوتانيَّة. في القرن السابع عشر الخالي من الأطبّاء عمليًّا، كان أوليڤييه يقوم بدور «الهاوي المُستنير» بكل غيرة وجدِّيَّة، وهو دور كان وقفًا على الذين يَتمتَّعون ببعض المعارف الكتابيَّة أي الكهنة وأبناء القصور.

إنساني جدًّا ومُتجرِّد، كان يهمه أن يكون فاعل خير للفقراء وذلك عن طريق مُعالَجتهم والتَّخفيف من شقائهم، يُعاوِنه في ذلك بشكل رائع زوجته مرغريت وبناته الثَّلاث اللَّواتي كُنَّ يَجمعن الأعشاب الطَّبِيَّة بأيديهن ويُحضِّرنها ويَجعلن منها الأدوية.

#### Sévigné (Marquise de)

### سافینیه (مرکیزة دو)

وُلدت في باريس وتُوفِّيت في غرينيان (١٦٢٦-١٦٦١). اشتهرت برسائلها الرائعة إلى ابنتها مدام دو غرينيان وريثة مالِكات قصور القرون الوسطى اللَّواتي كُنّ يَجمعن الأعشاب ويُحضِّرنها لمُعالَجة الفرسان الجرحى أو لمُعالَجة حاشية قصورهنّ. وقد برهنت مدام دو ساڤينييه عن نزعة طبيّة حقيقيّة في عصرٍ لم يكن فيه لسيّداته الكبيرات سوى الانشغالات الطائشة، وبالتالي لم يكن للأطبّاء أيّ شهرة أو وزنٍ بسبب معرفتهم وعلمهم المحدودين. وكان وراء نزعتها أكثر من سبب: فصحّتها المُتردِّية جعلتها تهتم تلقائيًا بالمرضى ومُداواتهم؛ حبُّها للطَّبيعة علَّمها التَّعرُّف إلى الأعشاب؛ أملاكها الواسعة في بريتانيا وقَرت لها الأعشاب الضَّروريَّة (وهي أعشاب الأعشاب الضَّروريَّة (وهي أعشاب كانت في حينه معروفة جيِّدًا ومُستعمَلة في تلك المنطقة التي احتفظت بالمعارف المُتناقَلة عنها من أيّام الدَّرويد). وكان فاغون Fagon، وهو طبيب الملك، يُساهِم بنصائحه الذَّكيَّة الحكيمة في زيادة معارف المركيزة.

وإنَّه من غير المعقول ألَّا تكون هذه السَّيِّدة المُثقَّفة قد استوحت من الدِّراسات التي كانت تصدر أيّامها عن المُداواة والشَّفاء. طبيبة مَجّانيَّة أغدقت نصائحها على كافّة صديقاتها وأفراد عائلتها وخَدَمها ومُزارِعيها. . . ولم تكن في أيّ حال تترك أملاكها من دون أن تكون قد جَدّدت مخزونها من الأعشاب الطبيَّة التي كانت تجمعها بعناية فائقة.

Soins August سُوَان أُوغُسْت

طبيب ريفيّ وعالم نباتيّ من القرن التاسع عشر، واضع طريقة مُعالَجة احتقان البول والروماتيزم بواسطة الكاكنج. أنسِيّ ذات شخصيّة طريفة جدًّا، فهو الذي عَمَّد التَّداوي بالنَّبات، حوالي ١٨٦٥، بكلمة لم تزل تُستعمَل حتّى يومنا: Phytothérapie (من اليونانية Phuton نبتة، Therapeia علاج، شفاء)؛ وكان قد اقترح قبل ذلك كلمة (عن اليونانية Botaniâtrie)، ولم تُحفَظ.

شتُورْك Storck

طبيب اختصاصي بالسُّموم من ڤيينا ومن القرن الثامن عشر، اهتم بنوع خاص بالنَّباتات السَّامة. درس نبات البنج في مُعالَجة الصَّرع والأمراض العصبيّة، ودرس الداتورة في مُعالَجة الأمراض العقليّة، والسّورنجان في مُعالَجة النَّقرِس. ولم يَتردَّد ستورك من أن يُجرِّب أعشابه المُختلِفة على نفسه.

## سِيدِنْهام توماس Sydenham (Thomas)

طبيب إنكليزيّ شهير وُلد في وِنْدُورف إيغل، تُوفِّي في لندن (١٦٢٤ – ١٦٨٩)، درس الأفيون بعمق. وضع تركيبة اللّودانُم، وهو دواء سائل أساسه الأفيون.

Théophraste تَيُوفراست

فيلسوف يونانيّ وُلد في أرسُوس Eresos في جزيرة لَسْبُوس، تُوفِّي في أتينا (حوالى ٣٧٢-٢٨٧ ق.م.). اسمه الحقيقيّ تيرتام Тугтате، لُقِّب تَيوفراسْت أي المُحدِّث الرائع المُبدِع. تتلمذ على يد أفلاطون ومن ثمّ على يد أرسطو الذي خَلَفه في إدارة المدرسة المَشّائيّة أي مدرسة أرسطو. كان تيوفراست بَحَّاثة أكثر منه مُفكِّرًا، كما كان مُؤلِّفًا غزيرًا، أحصى له ديوجان أكثر من ٢٢٩ بحثًا كان أشهرها بحثه عن السَّجايا والطباع، وأبحاثه عن النباتات.

يُعتبر تيوفراست عن حقّ «أبو علم النّبات»، ذلك أنّه دَرَس ووصَف أكثر من ألف نبتة، مُصنّفًا لها حسب اختلاف أعضائها الخارجيّة: كالجذور، الساق، الورقة، الزّهرة والثّمرة. مع تيوفراست ظهرت أوّل حديقة بُوتانيّة كان قد زرعها بيديه واستخلص منها مُلاحَظات مُباشَرة.

# تُورْنَفُور (جوزف) Tournefort (Joseph Pitton de)

عالم نبات ورحّالة فرنسيّ وُلد في أكس أون پروڤانْس ومات في باريس (١٦٥٦- ١٢٠٨). كان أستاذ علم النّبات لفترة طويلة في حديقة النّباتات، وزار قسمًا من

أوروبًا. إنّ تصنيفه للملكة النّباتيَّة جعل منه سابقًا للعالم لينَّيُوس. من النَّباتات اللُّبنانيَّة الشّعبيّة التي تحمل اسمه تخليدًا له أذكر على سبيل المثال العَكّوب Gundelia . tournefortii

تروتو لا Trotula

طبيبة بارزة من القرن الثاني عشر تَمتَّعت بهيبة ونفوذ هائلين حتى القرن الخامس عشر، وكانت إحدى ركائز مجد مدرسة ساليرن الشَّهيرة. مُتخصِّصة في علم أمراض النِّساء وعلم القِبالة. وضعت كتابًا عالجت فيه أمراض النِّساء وعلم الجَمال وطبّ الأطفال على السَّواء، عنوانه Eas maladies des femmes avant, pendant et après عنوانه المُلقَّب الأطفال على السَّواء، مُؤرِّخو الطِّبِ جعلوا تروتولا زوجة پلاتياريوس، المُلقَّب بالقديم، وهو سَلَف عائلة طبَّية لامعة من ساليرن ضَمّت بين أفرادها خمسة من مشاهير الأطبّاء. ولكن ليس هناك ما يُثبِّت صحَّة كونها زوجة پلاتياريوس.

ابنها المزعوم جان الثاني، هو مُؤلِّف كتب طبَّيَة وأخ لمتّى الطَّبيب أيضًا والذي أنجب بدوره ولدًا دعاه ماتيو الثاني (أي مَتّى)، وكان واحدًا من ألمع الأطبّاء السالرنيتانيَّين. ألَّف مَتّى الثاني حوالى سنة ١١٥٠، وهو كتاب يذكر الأعشاب وبعض الأدوية البدائيَّة بالتَّرتيب الأبجديّ الألف بائيّ. بقي هذا الكتاب مرجع الأطبّاء والصَّيادلة والعَطّارين المُفَضَّل حتّى القرن الخامس عشر.

لُقِّبَت تروتولا عن حقّ بالعالمة، وكان لها عدد كبير من التَّلامذة وساهمت في وضع أشهر كتاب صدر عن مدرسة ساليرن، وهو شِعر طبِّيّ مُنظَّم كان مرجعًا للأطبّاء طوال خمسة قرون مُتوالِية، عنوانه: Regimen Sanitatis Salernitanum.

### تروسو أرمان Trousseau Armand

طبيب فرنسيّ شهير وُلد في تُور، مات في باريس (١٨٠١ - ١٨٦٧). طبيب سريريّ لامع، أعدَّ طلّابًا مُميَّزين وشغل منصب عميد العيادة الطَّبِيَّة بين ١٨٥٢ وضع تركيبه النبيذ المُبوِّل الذي زاع صيطه. أصدر بحثًا في التَّداوي وثلاثة مُجلَّدات عن عيادات أوتيل ديو الطبِّيَّة، وهي ثلاث روائع حقيقيَّة في الأدب الطبِّيّ. أُصيب تروسو بالسَّرطان، وأعلن عن موعد وفاته بدقَّة مُدهِشة.

### Van Swieten (Gérard) فان سویتَن (جیرار)

طبيب هولَّنديّ وُلد في لايْد ومات في شُوْن برونّ (١٧٠٠ - ١٧٧٢). طبيب موهوب ولكنَّه بالتالي لم يَتحلَّ بأخلاق واسعة إذ إنَّه مَنع وحَظَّرَ عددًا كبيرًا من الكتب

المُعاكِسة لمَذاهبه الفكريَّة، وهذا ما أكسبه لقب طاغية العقول والمُستَبدَّ بها. ندين له بتركيبة عُرِفت باسمه: ليكور ڤان سويتَن.

# مسارد / Glossaries / مسارد

- ۱- مُسرد عربيّ
- ٧- مُسرد إنجليزي
- ٣- مَسرد فرنسيّ
- ٤- مُسرد ألمانيّ
- ٥- مُسرد لاتينيّ

# ١ - مسرد عربيّ

	أرِسْتُولُوخِيَة زَوْرَقِيّة٩٦	آذان القِسِّيس
	أرِسْتُولُوخِيَة نَتِنَة٩٦	
		آلامِيَّة مُضَلَّعَة١٧
	أَرْغَمُونَ المَكْسِيكِ٥	أبُو قابسا١٥
	أَرْغُوت	أَيُّوزام مُسَهِّل ا
		أَثْلأَثْل اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّالِي اللَّا
	أرُورُوت كوِيْنزلانْد٨	أَثْمَان تُرْبُدأَثْمَان تُرْبُد
	أَسْتَر إيزُوأُمِيليُودهيدريك٨	أثير برومهيدريك٩
	أَسْتَر برومهيدريك٩	أجسام دَسِمة
	أَسْتَر مَتيل سالِسيليك١٠	أَجِيْرَاتُوم كُوْشَانِيّ٢
	أَسْطراغالُوس إكْرِيتيّ١١	أُخِيلِيا أَيْقَة ٣
	أَسْطُراغَالُوس كُثَيْراء١٢	
	أَسْقُوردِيُونَ مَائتي١٤٣	
	أَشْرَانأ	أخِيليا ظَرِيْفَة٣
	أَشْرَان أَصْفَر	أخِيليا عَذُّبَة
	أَشْرَان سُرِّيِّ١٣	أَخِيلِيا مُدَوَّرَة
	أُفْلُوس غارِيّ١٥	أخِيليا مُنْعِشَة ٣
	أَقَاسِيا دُمَّاعَةً	أخِيليا نَبِيْلَة٣
	أقاسيا عَسَلِيَّة١٢٤	
٣٣٧	أَقاسِيا العَنْبَرِ	
	2	- J.

أكاجُوأكاجُو	إقْرِيْطَشِيَّة
أكُونِيْت مُبَرُقَشأ	إكْسيراتا
أكُونِيْت مُوَشَّمأ	إكسير ريكامييه
أَلْبِيزيَة غِدِّيَّة٧	إكسير سَوْلعيّ طارد للحمّى١٦
أَلْبِيْزِيَة مُتَشَبِّكَة النِّمار٧	إكسير طارد للدود١٦
ألْغ أَخْمَرالله	إَمْرُوسَ عَقْرَبِيِّ١
<b>أَلَّعْ أُخْضَر</b> أَلِّعْ أُخْضَر	إهْلِيْلَج لَوْزِيّ٢٣
أَلْغ أَزْرَقأ	اڭستراناز۲۹
أَلْغ بَحْرِيّأَلْغ بَحْرِيّ	باتُور الجَمايِيْك١٦٨
ٱلَّغ بُنِّيِّأَلَّغ بُنِّيٍّ	پَاوْپِرِيْرَا٢٥
أَلْوَة أَيْثَةأُو	بَبَاظ زراعيّ٢٥
أَلْوَة الحَبَشة	المنتقة
أمّ غِيلانأ	بَخُّور الماء
أَنْثِليس الجُرْحا	بَخُّور مَرْيَم٢٦
أَنْدروبُوغُن أَهْلَبا	بَدْيان فلُورِيدا
أَنْدَرُوسَامُنأ	بَرْباتيماو أَنَرْتِيمُو٢٧
أنْس النَّفْسأ	بَرْبَاتيماو البرازيل٧٧
أَيْسُونَ فَلُورِيدا النَّجْمِيِّ	بِرْكِيَّة١
أنيلينا	پَرْهيدْرُول٢٠٥
أُوراشِيْت مُثْتَصِب	بَرُواق أَبْيَض٢٧
أُورِيْغَانُم سُوْرِيَاا	بَرُّواق ناسُورِي۲۸
أوزارا	برومهيدرات السيكوتين۲۸
إِزْدَرَخْتا	برومهيدرات الكُونيسِين۲۸
إِشْقِيل بَحْرِيّ	برومهيدرات الكُونين٢٨
إشْنَان القَلي	برومور الأثيل٩
إعداد عِطري	برُوميلايِيْن
إعداد اللوزا	بزْر قَطُونا

بَلْسَم مُضادّ للهِسْتيريا٣٥	بِزر قَطُونا الرِّمَال٣١
بَلْسَم يُودُورِيّ٣٥	بزور حامِيَة ١٥٣
بَلُّوط أَخْضَر١٢٣	بزور طارِدة للريح ١٥٣
بَنْج المَغْرِب	بسكويت بالبزور المُضادَّة للديدان ٣٢
بَنَدُوْرَة٣٦	بسكويت ستوراي طارد للديدان ٢٢
بَنْزُوَاتِ اللِّيتِيْنِ٣٧	بسكويت طارد للديدان٣٢
بَنْزُوَاتِ اللِّيْتيومِ٣٧	بسكويت طارد للديدان بالكالومل ٢٢٠٠
بَنَفْسَج آذار	بِسِلَّة الكُوْنْغُو١٨١
بَنَفْسَج عَطِر	بِسِلَّة هِنْدِيَّة١٨١
بَهْرَ مانَة مارِدَة٣٩	بَطْباط نِيْلتِي
بَهْشِيّة كاسِّيْن	بَعَيْثُران ٣
بُوْرَات الصُّوديُوم٤٠	بَقْدُونس بَرِّيّ
بُوْرَق	بُقْلا مُس٢٦
بُوركيبَة	بُقْلامُس الرَّبيع
بُوْط عَرِيْض الوَرَق١	بَلاذُر غَرْبِيّ
بُوْلُوغَالِن ڤيرجِينيا	بَلاسِم
بُوْلِيْغَالا سَنِيْغَا	بَلَّان غَيَّاردُوت
يُولِّينِيا	بَلَّان مُنْدَمِج
پُولِّینِیا کُوپانا	بَلَح الصَّحْراء ٢٤٧
بيْلا	بَلْسَم خَلِّي مُكَوْفَر٣٤
بِيْلُوكَرْبِيْن وأملاحه ٤٣	
	بَلْسَم سَمْعِيِّب
	بَلْسَم شِيرُونبـ۳٤
بيلُولات ألْوَتِيَّة نَتِنَة ٤٩	بَلْسَم عَيْنِيّبه٥
بيلُولات أو خَشَب الكُوباهو	
بالماتيكو	
بيلُولات بَرْكلورور الحديد ٤٤	بَلْسَم مائيوديّ

بيلُولات مُبَوِّلة مُدِرَّة للسّوائل٥	بيلُولات بزُبدة الكاكاو (لانسلوت) ٤٤
بيلُولات نيترات الفِضَّة المُركَّبة٤٩	بيلولات البلّادون المُركَّبة ٤٤
بيلُولات نيترات الفِضَّة والفُوسفور .٤٩	بيلُولات بلانْكارد
بيلُولات يُودُور البُوتاسيوم ٤٩	بيلُولات بَلُّوسْت
بيلُولات يُودُور الحديد	بيلُولات حَديديّة
بيلُولات يُودُور الرَّصاص	بيلُولات خَشَب أو جَرابات
بيلُولات يُودُور الزِّئبقه	الكُوباهُو والبيسين والبيزموت ٤٥
بيلُولات يُودور الكلورور الزِّئبقيِّ٥	بيلُولات الدّيجيتال والسَّقَمونيا
بَيُّوت	والعُنْصُل٤٥
تَارُوتارُو	بيلُولات ذَوّابَة (بورداش) ٤٥
تَايُوْيا	بيلُولات زَرْنيخات الحديد ٤٥
تبخير السائل الاستخراجيّ٢١٧	بيلُولات زَرْنيخيّة (بازان)٤٥
تَبْغ تَبَاكُم٥٢	بيلُولات زَرْنيخيّة مُركّبة (وِلْسُن) ٤٥ ٤٥
تُرْبُد تُرْبُد	بيلُولات زِئبَقِيَّة مُسهِّلة قَويَّة٤٥
تَشْوِيْزَج٥	بيلُولات ضِدّ البرونشيت المُزْمِن ٤٦
تَمْر هِنْديّ٥٥	بيلُولات ضِدّ السَّرطان٤٦
تُوْيا عِقْدِيّة	بيلُولات ضِدّ النِّقْرِس٤٦
تُوْيَا مَفْصِلِيّة	بيلُولات ضِدّ النِّقْرِس (لومازورييه) ٤٧
تِين آدم۲۳۲	بيلُولات طارِدة للحُمّى (مارك)٤٧
ثِمار طارِدة للريح١٥٣	بيلُولات طارِدة للحُمّى (مَايْتْزِنْجَر) ٤٧.
ثَمَرَة العَرْعَرِ الشَّائعِ٥٧	بيلُولات قَالَيه
ثُوْم الحَيَّة	بيلُولات فرانك
ثُوْم مُعَمَّر	بيلُولات كَربُونات حديدي
جَذر ذات الأجراس ٤١	بيلُولات الكُوباهو والكبابة
جَذَر الكرُوتال	والتربنتين٤٨
جرجير الماء	بيلُولات مُبارَكة
خروعات٩٥	سلُولات مُسَوِّلة

جَلَب مُتَصَبِّع	جروع أستات الأمونيوم ٥٩
جَلَبة أُوْرِيْزَابا١١٧	جروع أو جلّاب ضدّ الخناق ٦١
جَلْجان	جروع بلسم الكوباهو ٥٩
جُلْجُلان	جروع تربنتينيّ ضدّ التينيا ٥٩
جِنْسَن أَبْيَض (جذر)	جروع السّورنجان ٥٩
جَنْطيَانا صَفْراء (جَذْر)٦٤	جروع شوبّار البلسميّ٩٥
جَوْز أَرْمَانِيُوس٢٠٣	جروع ضدّ التَّشنُّج
جَوْز الجَماييك	جروع ضدّ الحامض
جَوْز القَيْء ٢٣٢	جروع ضدّ زلال البَوْل٠٠٠
جَوْز الهِنْد	جروع ضدّ عرق النَّسا (شنايدر) ٦٠
جَوْزَة الشِّرْك٢٥٤	جروع ضدّ النَّزلة ٢٠
جَيُوم كَنَدِيّ	جروع ضدّ النَّشاط ٢٠
جَيُوم مُنْتَصِب	جروع الكودايين وبلسم تولو ٢٠
حامِض بَوْلِيْك	جروع لوڤاشّييه ضدّ الدودة
حامِض الحامِض	الوحيدة٩٥
حامض غلطاري	جروع ماص
حامِض غلُوتامِيك ٢٧	جروع مُؤَثْيَر ٢٠
حامِض كِينِيْك	جَرُوع مُسَهِّل١
حامِض اللَّيْمون ٦٨	جروع مُضادّ خناقيّ
حامِض لَيْمُونِيك ٦٨	جروع مُضادّ للتَّعقيبة١٦
حَبِّ الزُّلَمِ١١٦	
	جروع مُطهِّر مُكُوْفَر11
حَبِّ الْعَرُوسِ١٧٩	
حَبِّ الْعَزِيزِ	_
حَبّ المُلُوك١٦٧	
	جروع مُقيِّئ مُسهِّل قويِّ ٢٢
حَبَق التَّمْساح	جَلَب تَمْبِيْكُو

حُقْنَة الصّابُون٧٣	حَبَق عَذْبِ الرّائِحة
حُقْنة قِبَالِيّة	حَبَق عَذْب مُتَشَجِّر
حُقْنَة مُبَوِّلة٧٣	حَبَق قَرَنْفُليّ
حُقْنَة مُليَّنَة٧٣	حَبَق الماء
حُقْنَة مُلَيَّنَة (بيطريّة)٧٣	حَبَق وَبِر
حِكْمَة الجَرَّاحِيْن	حُبُوب الدّكتور فرانك الصِّحِّيَّة٤٧
حَلُّوسِيا١٢	حَدِيْد (التَّداوي بال)٧٠
حَليب عُود الأنبياء	حَزاز عِطْرِيّ٧١
حَماحِم	حَزاز مَأْكُول٧١
حَمّام حامِض ٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	حَزاز المَنّ٧١
حَمَّام قِلَوِيّ	حَسَاء الدكتور بَايِّي الصَّدْرِيِّ ٢٢
حَمَّام قِلَوِيِّ حَديديِّ٧٤	حَساء الدكتور نُوش الصَّدْرِيّ٧٢
حَمّام كادِيّ (بالْزَر)٧٤	حَساء صَدْرِيّ٧٢
حمّام مُقوِّ٧٤	حساء طبِّي٧٢
حَمَّام مُلَيِّن٧٤	حِشْرِج
	حَشْيْشَة الأَفْعَى
حَمَّام نشاء٧٤	حَشِيْشَة البَراغِيْث
حَمَّامات (مُستحضّرات لله) ٢٣	حَشِيشَة البِلَّوْرِ١٤٦
	حَشِيْشَة الجُرْح
خَمْسة جُذور مُشهِّية١٥٣	حَشيشة الخَنازِيرِ٨٢
خَمْسة عقاقير مُشهِّية١٥٣	حَشِيْشَة الدُّبِ
حُمَّيض الحَقْل الشَّرقيّ٧٤	حُقَن
حُمَّيْض شُرْقتي٧٤	حُقْنَة الأرْغُوتِيْن٧٢
حُمَّيْض طَرِيْف٧٦	حُقْنَة بِالنِّخالَة٧٢
حَوْدَان آسْيَوِيّ٧٦	حُقْنَة التَّبْغ
حَوْر بَلْسَمِيّ٧٧	حُقْنَة سُولفات الكينا٧٢
حَوْر كارولينا٧٧	حُقْنَة الشَّيْلَم المُؤَرْغَت٧٣

۸٤	دِقْتَمُونَ أَبْيَض	00	حَوْمَو
781	دَقِيْق	٧٧	حَيِّ العالَم الحِرِّيْف
۸٥	دَلُوك		حَيّ العالَم الصَّغِيْر
۸٥	دُهن البَقْدُونس	<b>YV</b>	حَيُّوْن حِرِّيْف
FA	دُهْن الزَّعْتَر الشَّائِعِ	۱٤٧	خالِف وَالِدَيْه
۲۸	دُهْن كِبْش القَرَنْفُل		خامادَرِيُوس
184	دُهْن مُضادّ للهستيريا		خُبْز طبّي
۸۳	دُهُون		خُبْز الغُراب
۲۳٤	دو لَابَار		خُبْز القَاق
	دواء عَسَلتي		خُبْز المَشايخ
	دَواء عَسَليّ مُنَظِّف أسنان	Y . o	خَثيرات
<b>AV</b>	دِيجِيْتَال أَرْجُوَانِيَّة		خُرَيْس
۸٩	ذُؤنُون خَفِيّ	۱۳۲	خشب بَرْنُود
778	رَاتِنْج المُصْطَكَاء	٧٩	خَشُب (حَوادِث يُسبِّبها الـ -)
<b>A1</b>	راحَة الأُسَد	۸٠	خَشْخَاش أَرْغَمُونِيّ
<b>۲۳</b> ۸	رَانِج	٥	خَشْخاشِيَّة
٩٠	راوَنْد		خَمَل
٩٢	راوَنْد راحِيّ	۸١	خُميرة الدار
91	راوَنْد القُصْبان	۸۲	خَنَازِيرِيّة المَناقِع
٩٢	رَاوَنْد كَفِّيّ	787	خَيْرِبُوَا
10	رَبَاطِيَّة غارِيَّة	٦	دابِرَة
787	رِجْل الأَرْنَبِرِجْل الأَرْنَبِ	٤١	دَادي
184	رِجْل القُبَّرَة	۸۳	داذِي مَخْزَنِي
٩٣	رُذَيْداتُ عِلاجِيَّة	۲٥	دَبّاء الهند
197	رَقَائِق جِرَاحِيَّة	174	دَرَام
۸١	رَقَف	۸۳	دُسُم
<b>۲</b> ٦	رِ كْفَة	90	دَسَمُ الكَريتَه

زَهْرَة الآلام المُرَبَّعَة١٧	رُمَّان الأنْهار٨٣
زَيْت الألْوَة المُحْتَرّ	رُوحِ العَسَلِرُوحِ العَسَلِ
زَيْت أَلْويّ باتاڤيّ١٠٨	رُوحِ القرفة
زَيْت أَلْويّ هو لّندِيّ١٠٨	رُوح مُضادّة لليَرقان١٨١
زَيْت البَابُونَج	رُوح مِلْح مُلَطَّف٢٣٠
زَيْت البابُونَج المُتَرْبَن١٠٦	رُوح مِلْح النُّشادِر الخَمريّ٢٣٠
زَيْت البابُونَج المُكَوْفَر١٠٦	رُوم
زَيْت البَاسِيّة الطُّوِيْلة الوَرَق٩٥	رَوَنْد٩٠
زَيْت الجِراء	رَيْحَانَ قَرَنْفُليّ
زَيْت الزَّعْتَر الشَّائِعِ الدُّهْنِيِّ٨٦	زُبْدَة البَاسِيَّة الطَّويْلة الوَرَق٩٥
زَيْت الزَّيْتُون١٠٤	زُبْدَة الكَريتَه٥٩
زَيْت شَابَرت الطارد للدُّود١٠٨	زَرَاوَنْد البرازِيل٩٦
زَيْت كَبد المُورَة المُركّب١٠٧	زَرَاوَنْد نَتِن٩٦
زَيْت كَبِد المُورَة المُفَسْفَر١٠٧	زَرْنِیْخ٩٧
زَيْت كَبِد المُورَة اليُوديّ المُحدَّد١٠٧	زَعْتَر
زَيْت كِبْش القَرَنْفُل الدُّهْنِيِّ٨٦	زَعْتَر رَسْمِيّ
زَيْت النَّخْلِ	زُعْرُور عادِيّ
زُيوت طبيَّة	زُعْرُور مالِس
زُيُوت مُحْتَرَّة	زِفْت أبيضز
سالِسيلات المتيل	زِفْت أصفرزِفْت أصفر
سالينُم المَناقِع	زِفْت بُورغُونيه
سَبُوْل صَغِيْر	زَكُون
سَبُوْلَة	زَلائِف المُلُوك١٢
ستريڭئوس جَوْز القَيْء١٣٢	زُلَم
سَحْلَبِ أَبْقَع	زَلُّوع صَغِيْر١٣٦.
سِدْر	زِنْزَلَخْت
سُذاب	زَهْر المَسِيح٢٦

سَمَّارَة الحِكْمَة	سُذاب مَخْزَنِيّ
سُمَّاق ثُلاثيِّ الوَرَق١١٨	سِرَاجِ الغُوْلَةِ الخَرِيْفِيِّ١٢٥
سُمّاق سامّ	سُرَّة ١٢
سُمّاق شائِك	سُرَّة الأرْض١٣
سُمّاق مُتَجَذِّر السّاق١١٩	سُرَّة البُّرْتُغال١٢
سَمْسَق	سِرْ فِل بَرِّي ١١٣
سِمْسِم	
سَمَن كُونْترا	سِرْ فِل الغابِ ١١٣
سَنْدَرُوْس رُباعِي المَصارِيْع ١٢٢	سِرْ فِل لِفْتَيّ١١٤
سِنْدِي ١٢٣	
سنديان (المركبات والاستعمال) ١٢٢	
سِنْدِيان أَخْضَر	سَطاخيس الغاب
سِنْدِيان إِسْبانيّ١٢٣	سَطاقِس دَرَنِيّ١١٤
سِنْدِيان صِباغِيّ ١٢٣	سَطاقِس الغابا١١٥
سَنْط دَمّاع١٢٤	سَطاقِس اليابان١١٤
سَنْط صَمْغِيّ١٢٤	سَعْتَر شَائِع٩٧
سَنْط عَسَلتي١٢٤	سُعْد الخُصْر
سَنْط العَنْبَر	سُعْد مَأْكُول
سُوْرَنْجان الخَرِيْف١٢٥	سَفَرْجَل هِنْدِيّ
سُوْس غُدِّي١٢٦	سَفَرْجَلَةُ البَنْغال
سَوْلَع خَيْلِيّ١٢٧	سَقَمُونيا المَكْسِيك١١٧
سُولْفُون الشُولْمُوغْرا ١٢٧	سكابيُوزَه فِلَسْطِينِيَّة١١٧
سَيال ١٢٤	سُكَع٢٦
سَيْسَم أَرُنْسِيُوم١٢٨	سُكَع جَزِيْرَة القُصّ١٣٠
سَيْسَم هَجِيْن	سِلْق١١٨
سِيْسَنْبَرْيُوْن الحِكْمَة١٢٩	سَلْق كبير النَّمَر١١٨
سِيكلامَن فَارِستي٢٦	سَمار حُلُوا

شَمْع حَيُوانِيّ١٣٧	سِيكلامَن القُصّ١٣٠
شُوارِب عَنْتَر١٧٢	سِيُوم عَرِيْض الوَرَق١٨٦
شَوْك مُبَارَك١٧١	شاطِرِيّة٢٣٩
شُولْمُوسُولْفُون١٢٧	شاهْبَلُّوط١٨٨
شِيْح صِينيِّ	شَاهَتْرَج بَصَلَتي صُلْب١٧٠
صابُون مفصليّ۲۱۶	شاي كارولينا
صامُور شائِك	شَبَطباط
صَبّار وِلْيَمْز٥٠	شَبّه شائِك١٣١
صَبْر الخَيْل١٢٧	شُبُهان شائِك١٣١
صِبْغَة إيلاتَرين مُورُّوس٢٣٠	شُجَر أَدْرِيْس٧٠٧
صِبْغَة السِّنْكُونِين٢٣٠	شُجَرَة الأَبْسَنْت١٣٢
صِبْغَة المُورفين٢٣٠	شُجَرَة جَوْز القَيْء١٣٢
صُرَيْمة الجَدِي الجَبَلِيّة١٣٨	شُجَرَة الشَّيْطان
صَعْتَر سُوْرِيا١٣٨	شُجَرة الصَّابُون١٩٠
صَعْتَر شَائِع٩٧	شُجَرَة النَّبْقِ
صُمُوغ مُخْتَلِفَة١٣٩	شُحُوم۸۳
ضُبَيْباتُ عِلاجِيَّة٩٣	شراب اللَّيمون١٣٤
ضَيْمُرَان	شَراب لَيمون حامِض١٣٤
طارْطَقَة١٦٧	شَرَاب لَيْمون سيتريك١٣٤
طبّ أَسُود	شَراب لَيْمُون كلورهيدريك١٣٤
طُخْلُب بَحْرِيّ	شرابات۱۳٤
طُحْلُب كُوْرسِيكا	شيرْش ناعِظ١٣٦
طَحِیْن الزُّرُوع١٤٢	شَشَم
طَحِيْن الشُّوفان (أو الخَرْطال،	شُعْصُور
أو الهرطمان)	شَعِيْر مَعْرُوف١٣٥
طَرَخْشَقُون أَسْنَان الأَسَد٢٤٧	شَقَائِق النُّعُمان٧٦
طَرَخْشَقُون مَخْزَنِيّ٢٤٧	شُلْطَة الحَرَمُوْن١٣٦

تمجينة صَدريّة برئة العجل وخَرَز	طُرْ فاء١
الصّخور١٤٩	طُغْلُق
عَجينة صَدريّة بَلْسَميَّة١٤٩	طُغْلُق مُنْتَصِب ٢٢
عَجينة عُصارة الخَسّ	طلّع
عَجينة كالُوت	طَماطم
عَجينة للألَكْترودات (مُخَطَّطُ القَلْب	طِمْخَة ذَهَبِيَّة الوَرَق
الكهربائي)ا١٤٩	طُوْقَرْيُون ثُومي١٤٣
عَجينة مَخزَنيّة ببَلْسَم تُولُو	طُوْقَرْيُون الماء١٤٣
والكُودايين	طُوْقَرِيُون مَخْزَنِيّ١٤٤
عُدَيْن ثُلاثيّ التَّذَلُّق١٥٠	ظُبُّةظُبُّة
عُدَيْن جاڤا	ظَفْراء
عَرْصَف جنيڤ	ظَفِيْرَة
عَرْطَنِيْتَا٢٦	ظَهِيْرَة بِلَّوْرِيَّة١٤٦
عِرْق الذَّهَب المَخْزَنتي١٥٢	عارِشَة الوَردِيَّة١٣٥
عَرِيْنَة ٨٣	عاثِق الحُقُول١٤٧
عَسْلَج الأسد ٨١	عَبْد اللَّاوِي١٤٨
عُشْبَة البَراغِيْث	العَبْس
عُشْبَةُ البَراغِيْثِ الرَّمْلِيَّة٣١	غَبْل
عُشْبَة الحصاة ١٦١	عَجائن
عُشْبَة الرَّحِم	عَجُّور
عُشْبَة القِدِّيْسَة صُوْفيا١٢٩	عَجّور أَفْرِيقيّ٢٥
عُصْبَة السُّوس1٣٥	عَجِينَة
عَصَوِيَّة المَناقِع	عَجينة التِّينعَجينة التِّين
عَفَتْ المُروجِ١٦١	عَجينة جيلاتين قَرْن الأيِّل١٤٨
عقاقير طاردة للريح ١٥٣	عَجينة الحَلَزُون أو البَزّاق١٤٨
1. M	
عقاقير مُبوِّلة١٥٣	عجينة راقو السوداء١٤٩

غَسُول تَجميليّغَسُول تَجميليّ	عقاقير مُليِّنة١٥٣
غَسُول سُولْفُو - صابونتي١٦٠	عقاقير نباتيَّة١٥٣
غَسُول سُولْفُوريّ١٦٠	عقَّيْدَة الدَّغْل١٧١
غَسُول كريُوزُوت١٦٠	عَكْنَة
غَسُول مُخَلَّل	عِلْمُ المُداواة الحَدِيديّة٧٠
غَسُول مُكَبْرَت أو كَبريتيّ١٦٠	عَلُوبِعُلُوبِ
غَسُول مُهَيِّج	عُنَّابِغُنَّابِ
غَفَث أُرْجُوانيّ	عُنَّابَةغُنَّابَة
غَفَث المُروج	عِنَاقِيَّة لُبُنَانِيَّة
غَلَنْتَامِيْن برومْهِيْدْرات٢٤٤	عِنَب هِنْديّ
غَمْبِير مُكَعَب	عُنْبُوبِ كَبِيرِ الثَّمَرِ
غوارانا	عَيْنِ الدِّيكِ
غَوْلان طُبَاقِتِي	غَرْغَرَة١٥٧
غَيَّاكُول١٦٢	غَرْغَرَة كلورهيدريكيَّة١٥٧
فَارُولا مَبْذُولة١٦٥	غَرْغَرَة مُغَلْسَرَة - مُبَورقة (أو،
فَاصُولِيا الكاپ	رورك)
فَاصُولِيا لِيما	غَرُور
فاصُولية التشاد	غَرور ببورات الصوديوم١٥٧
فَاقُوع فِلَسْطينيّ١١٧	غَرور ضدّ الحُناك١٥٧
فانيل أمُونياك	غَرور ضدّ الرّيالة١٥٧
فانيلامين	غَرور ضدّ شَلَل اللِّسان١٥٧
فَتِيَّة بَرْنُو فِيَّة٢	غَرور مُصَفْصَف١٥٨
فُجْلِ الخَيْلِ	غَرور مُضادّ لداء الحَفَر (١٨٦٦)١٥٨
فَحْم خَشَب مُفَعَّل	غُرَيّاء
فَحْم مُقَوًّى١٦٦	غَسول
فَحْم مُنشَط١٦٦	غَسُول أَلِيْبَرْت التَّجميليِّ١٦٠
فَرْ بِيُوْن لَسِيرُس١٦٧	غَسُول بَيْطَرِيّ ضِدّ تَعَفُّن الظُّلْف ١٦٠

	1 • 9	قِرْطقِرْط	177	فَرْبِيُوْن مُتَصالِب
	177	قَرْطَم بَرِّي	٦٩	فَرَنْجَمُسْك
	177	قَرْطُم صُوْفِيّ	٦٩	فَرَنْجَمَشْك
	177	قَرْع سُكَّرِيّ	١٦٨	فُشاغ الجَمايِيْك
	177	قَرْع مِسْكِيّقرْع	179	فَقُوس
	174	قُرْنُوْس فلُوريدا	۲٥٤	فُلْفُل السُّودان
	١٨١	قُرَيْناء	Y08	فُلْفُل غِیْنیا
	١٨٨	قَسْطَل	737	فُوْتَنْج الماء
	١٨٩	قَسْطَل قَزَم	737	فُودَنْج الماء
	17	القِسِّيْسالقِسِّيْس	1 & 1	فَوْقَس طارِد للدُّود
	174	قِشْطَة سكاموزا	١٧	ڤيتامين الذَّكاء
	174			فَيْجَن
	١٧٤	قِشْطَة شَبَكِيّة	111	فَيْجَن نَتِن
	١٧٤	قَصْعِيْنقَصْعِيْن	17	فينول صُودِيّ سائل
	Y08	قَضَابِ لُبْنانِيّ	١٦٨	فينول صُودِيّ محلول
	١٣	قَضِيْبِ الرَّيِّ	174	فينول مُكَوْفَر
	140	قُطْن يُودِيّ	170	قاتِل الكَلْبِ
	1 V E	قَلْبِ النَّوْرِ	787	قَاقُلَّة ذَكَرِيَّة
		قُلْقاس زِرَاعِتي	787	قَاقُلَّةَ مُتَوَسَّطَةً
	100	قُلْقاس القُدامَى	14	قُبَّرِيَّة صُلْبَة
		قُلْقَاس مَأْكُول		قُبَّرِيَّة لُبْنان
	10	قَليقلي	179	قِثَاء
	\ <b>VV</b>	قِمام عُثْكُولِيّ	179	قِتْي
	٣٩	قُنَّب مَكْسِيْكِيِّ	179	قُرَّاص قَصِف
		قَنْبَر قَصِيْر الفَصّ		قَرَانِيا فلُورِيدا
	170	قِنَّةَ مَبْذُولة	١٧١	قَرْبانِيَة مُبارَكَة
789	٣٦	قُوْطَة	١٧١	قَرْدَبِ العِيْصِ

كِرْشكِرْش	قُوَّيْسَة تُفَّاحِيَّة١٧٤
<u>نَّ</u> کَرَ فْسَ لِفْتِ <b>ي</b>	
كَرَفْس الماء العَرِيْض الوَرَق١٨٦	قُوَيْسَة قَاسِيَة١٧٧
كَرْمَةَ أَرْجُوانِيَّةكُرْمَة	قُوَيْصَة قَاسِيَة١٧٧
كَرْمَة حَمْراء	قَيْصُوم جَبَليّ
كُرْمَة الصَّبَّاغِيْنكُرْمَة الصَّبَّاغِيْن	كَاشُو غَمْبِيْر
كرُوتُن الزَّيْت١٨٧	كَانَنْغا عِطْرِيَّة٢٥٦
كرُوسْن اليابان١١٤	كاهِنْسَة١٧٩.
كرِيْزارُوبِيْن	كاهِنْكَة
كَرِيْكَة بَبَّايا٢٥	كايِنْسَة
كَسْتَنَة	كبابة
كَسْتَنَة صَغِيْرة	كَبِيْكَج٧٦
كَسْتَنِيَّة ذَهَبِيَّة الوَرَق١٨٩	كُثَيْراء كُنَيْراء
كُشْبُر	كَجْنُوس كاجَن
كَفّ الدُّبّ	كَجْنُوس هِنْدَتِي
كَفّ السَّبْع٧٦	كُحول كلورهيدريك
كَفّ الضُّبْع	كُحول نُشادِريّ عَنْبريّ٢٣١
كِلْاجَه الصَّابُون	
كَلادِيُون ثُنَائِيِّ اللَّون	كُحُولَةُ العَسَلِ المُركَّبة١٨٢
كِلَّايا الصَّابُون	كُحولة القرفة
كَلْغ	كُحُولَة مُضادَّة للحَفَر١٨٢
كلُورُور حَدِيْدِيّ	كُحُولَة المِلْعَقِيَّة المُركَّبَة١٨٢
كِمادات بَيْطَريَّة	كُحولَة نُشادِريّة نَتِنَة
كَمادرِيُوسكمادرِيُوس	كُحُولَتُور شُقّار الفِصْح١٨٣
کمکام ۲۲٤	
كُنْسُوْدَة مَلَكِيَّة	كَرَز بَرِّيِّكَرَز بَرِِّيِّ
كَنْكِيْنا صَفْراء مَلَكِيَّة١٩٣	كَرَز الطَّيْركَرَز الطَّيْر

لَعُوق تَرْبَنْتينتي (كَرْمَايْكل) ٢٠٠	كَنْكِينا كَالِيْزايا كَالِيْزايا
لَعُوق طارِد للدّود	الكَنْكِيْنا (وخَصائصها الطِّبِّيَّة)١٩١
لَعُوق الفُسْتُق	كُورُونِيلًا عَقْرَبِيّة٢١
لَكَ (راتِنْج) ٢٠٠	كُوْرِي سَن ٦٣
لُوْبِيَاء سُوْدانِيَّة١٨١	كُوْشِيَة المَكَانِسِ١٩٤
لُوْتِيا نافِعَةلاعتان	كِينُو
لُودانُم صُلْبلات	كِينُو (أصناف الـ)١٩٤
لَوْز هِنْدِيّ٢٣	كِيْنُو أَمْبُوَان١٩٥
لِيكُور النُّشادِر الخَمريّ٢٣٠	كِيْنُو مَلَبَار
لِيْنَارِيَة عَادِيَّة ٢٠٣	كِيْنُو الهِند ١٩٥
ماء بَلُّوسْت ٢٣٣	لاصُوْق
ماء الدّكتور أومِيَارا ٢٣٣	لاَلَة٢٧
ماء رَقوء بالشَّيْلُم المُصاب	لَامِينَارِيا جِرَاحِيَّة١٩٦
بالأرْغُوت٢٣٤	لُبّلُبّ
ماء سَابُورُو ٢٣٤	لَحْلَاحلام
ماء سَفِيريّ	لِحْيَة مار الياس١٩٤
ماء شُرْقِيَّة٢٣٤	لزقة١٩٧
ماء ضدّ التَّدعُّص (بوفور) ٢٣٤	لَزْقَة بُنِّيَّة اللَّون١٩٧
ماء ضدّ الجَرَب (رَنْك) ٢٣٤	لَزْقَة مُحروقة١٩٧
ماء ضِدّ الشَّقيقة	لِسَانُ الحَمَلِ السِّنانِيِّ١٩٧
	لصوق بلّادونتي١٩٩
	لصوق قابض
ماء القَرَبينة (تادَن)	لصوق قابض ضدّ سخونة الأوتار ١٩٩٠
ماء قَطْران (دستور ۱۹۳۷) ۲۳۵	لَصُوقات طُبِيَّة بَيْطَرِيَّة١٩٩
ماء كَرْسِتان ضِدّ التَّعْقِيبَة٢٣٥	لُعَابِ النَّباتات١٩٩
ماء لازَوَرْدِتِي٢٣٦	لَعُوقلغوق
ماء مار يُوحنّا	لَعُوق أخضرلغوق أخضر

مَرْهَم دُهْنِ النِيَاوْلِي٢٠٩	ماء مُتَأَكْسِج (مُذَابَة - مُركَّزة) ٢٠٥
مَرْهَم زِنْجَفْر شَمْعِيّ٢٠٩	ماء هِيدرومُكَبْرَت۲۳٦
مَرْهُم زِئْبَقِيّ شَمِعيّ٢٠٩	مَتِيل أورتُودِيوكُسي بَنْزُول١٦٢
مَرْهَم سِيْرِيْلُو٢٠٩	مُجمَّدات
مَرْهَم شَمْعِيّ أَحْمَر	مُجمَّدة حَزاز إسْلَنْدَة٢٠٥
مَرْهَم شَمْعِيّ باللُّودَانُم ٢١٠	مُجَمَّدَة حَزاز مُرَّة٢٠٥
مَرْهَم شَوْكَران	مُجَمَّدة ضِدّ السَّلَعَة٣٥
مَرْهَم ضِدّ الأكزيما٢١٠	مُحبَّبات
مَرْهَم ضِدّ تَساقُط الشُّعر ٢١٠	مُحَبَّبات ذات تحرير مُعَدَّل٢٠٦
مَرْهَم ضِدّ السَّيَلان الزَّهَميّ البَسيط ٢١١.	مُحَبَّبَات ذات تَلبيس مُقاوِم مِعَويّ ٢٠٦.
مَرْهَم القَطْران (أمَرِي)۲۱۱	مُحَبَّبات فائرة
مَرْهَم كالُوت٢١١	مُحَبَّبات مُلبَّسَة
مَوْهَم مُكُوفَر٢١١	مَحْلَب ٢٠٧
مَرْهَم مُيَوَّد٢١٢	مُحلَّيات ٢٠٧
مَرْهَم يُودور البُوتاسيوم٢١٢	مُحَلَّيات السُّوس
مَرْهَم يُودور كلورور زِئبقيّ٢١٢	مُحَلَّيات الفِلْفِل المُرَكَّبَة٢٠٨
مَروخ	مُخَلِّصة ٢٠٣
مَرُوخ ریشاردان۲۱۲	مُذَابَة فينول صُوديّ مُرَكَّزة١٦٨
مَرُوخ ضِدّ التهاب الأذن٢١٢	مُذابَة المُورفين الكُحوليّة٢٣٠
مَرُوخ ضِدّ الزُّونا٢١٣	مُرَّانِيَّة بَيْضاء٨٤
مَرُوخ ضِدّ النَّقْرس٢١٣	مَراهِم
مَرُوخ طارِد للدّود٢١٣	مَرْجانِيَّة سَوْداء١٤١
مَرُوخ مُبَوِّل٢١٣	مَرَق طبِّي٧٢
مَرُوخ مُتَرْبَن مُؤَفْيَن٢١٣	مَرْهَم پروتو يُودور الزِّئبق٢٠٨
مَرُوخ مُحَوِّل (بيطريّ)٢١٣	مَرْهَم بيودور الزِّئبق٢٠٨
مَرُوخ مُصَرِّف ٢١٤-٢١٣	مَرْهَم جياكوميني
مَرُوخ مُفَسْفَر	مَرْهَم دَالِيبُور

مُستخلَص الكوكا المائع ٢٢٢	مَرُوخ مُنَفِّط٢١٤
مُستخلَص الكُولا (جافّ) ٢٢٠	مَرُوخ وِيلكِئْسُن٢١٤
مُستخلَص الكُولا المائع٢٢٢	مَزيج
مُستخلَص مُضاض أسود٢٢١	مَزيج بهيتُوسُولفِيت الصّوديوم٢١٤
مُستخلَص نَبْق سَغْرادا	مَزيج بُونَان
مُستَخْلَصات كُحوليَّة أو	مَزيج بُونان المُبَنِّج٢١٥
مُستَخْلَصات هيدرو كحوليَّة٢١٨	مَزيج السَّنْط
مُستَخلَصات مائعة٢٢٢	مَزيج صَمْغيّ
مُستخلَصات مائيَّة	مَزيج عِرْق الذَّهَبِ والطَّبشُورِ٢١٤
مشكطرا ٢٤٣	مَزيج مُدِرّ السُّوائل٢١٥
مشكطرا مشيرزور ٢٤٣	مَزيجات
مُصْطَقَى	مُزِيلِ الشَّعْرِ
مُصْطَكَاء ٢٢٤	مُسْتحلَب بَلْسَم تُولُو٢١٦
مُضَاض أَرْجُوانيّ٢٢٥	مُستَحلَب راتِنج الغَيّاك٢١٦
	مُستحلَب عَربتي
مُضَاض أورُوبِّي	مُسْتحلَب مُهَدّئ ٢١٦
مُضَاض مَبْذُول	مُسْتَحْلَبات ٢١٦
مَضْمَضَة ١٥٧	مُستخرَج ٢١٧
مَعَاجِيْنِ الأَفْيُونِ٧٢٧	مُستخلَص ٢١٧
مَعْجُونَ أَفْيُونَ طَارِدِ للحُمَّى مُسَهِّل	مُستخلَص الأفْيُون ٢٢٣
قوتي	مُستخلَص جَوْز القَيء دستور
مَعْجُونَ أَفْيُونَ طَارِدِ لِلدُّودِ٢٢٨	Y1A1989
مَعْجُون أَفْيُون مُضادّ للتَّعْقِيبة	مستخلص الحنظل المركّب ٢١٨
(کابي)	مُستخلِص الرّاتانيا ٢٢٣
معجون أفيون مُضادّ للتَّعقيبة	مُستخلَص العُنْصُل أو الإِشْقِيْل ٢٢٠
(كليرك)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
مَعْجُونَ أَفْيُونَ مُنَظِّفَ أَسنانَ٢٢٨	مُستخلص کَسْکارا سَغْرادا

TOT

مَنِيُوكَ خُلُو٢٣١	معجون عَسَلتي
مَنِيُوك مُرّ	مَعْجُون عَسَليّ عِطريّ٢٢٩
مِهْماز الجَوْدَر	مَعْجُون الكُوباهُو الأَفْيُونيّ٢٢٩
مَوادّ دهنيَّة٨٣	مَعْجُونَ اللَّوزِ العَسَليِّ المُعَلَّبِ ٢٢٩
مُورِيات الحديد١٩١	مُعَسَّل
مَوْز أَثْيُوبِيا	مُغَلْسَرَة
مَوْز الجَنّة	مُغَلْسَرة بكلورات البُوتاسيوم٢٢٩
مَوْز الحَبَشَة	مُغَلْسَرَة كادِيَّة خفيفة٢٣٠
مياه عِلاجيّة مُختلِفة	مُغَلْسَرة كادِيَّة (دكتور بروك)٢٢٩
مِياه مَعْدِنيّة اصْطِناعِيّة٢٣٦	مُغَلْسَرة كلسِيَّة٢٣٠
مِيْمُوزا العَنْبَر١٢٤	مُغَلْسَرة مُكُوْفَرَة٢٣٠
ناتفناتف	مُغَوَّل
نَاتِف مارتانناتِف مارتان	مُغَوَّل الإيلاترين
نَارَجِيْل مَعْرُوف٢٣٨	مُغَوَّل الحامِض الكلورهيدريك ٢٣٠ مُغَوَّل السِّنْكُونِين٢٣٠
نَبْق المَسيح	مُعُونُ السَّحُولِينَمُغُونُ السُّحُولِينَ٢٣٠
نَدْغ إِكْرِيتتي	مُغَوَّل النُّشادِر٢٣٠
نَدْغ بَرِّي	مُغَوَّل النُّشادِر العَنْبَرِيِّ٢٣١
نَدْغ الجَبَل	
نَدْغ صَعْتَرِيّ٢٣٩	مِقْتَى
نشاء	مَكْلُوْرَة كاليدونيا١٥١
نَشَاءُ الذُّرَةَ الصَّفْراء٢٤٢	مِكْنَسَة٢٠٣
نُطُول٥٨	مُلَبَّس بالسُّكَّر
نَعْنَع أَطْحَل٢٤٢	مَنِيْهُوت٢٣١.
نَعْنَع بَرِّيّ٢٤٢	مَنِيْهُوت حُلو٢٣١.
نَعْنَع الماء	مَنِيهُوت مُرّ٢٣٢
نَفَل البَرِّنَفَل البَرِّ	مَنِيُوك ٢٣١

نِقاطنِقاط
نقاط أقُونِيطُن٢٤٤
نقاط إنكليزيَّة غير ناجعة٢٤٤
نِلْكنِلْك
نَمْوَارُونَ أَنِيسُونِيّ١٣٢
نَمْوَارُون قِيْيَارْد١٣٢
نِيْقُالِيْننِيْقُالِيْن
النَّيْل
نِيْلَة صينِيّة
هال ذَكر
هَالْ سِيْلَانْ٢٤٦
هال طَوِيْل
هال كَبِيْرِ
هَال مُتَوَسِّط
هَجْلِيْجِ٢٤٧
﴿ هَلُج٧٤٧
هَلِيْج٧٤٧
هِنْدَب أَسْنَان الأَسَد
هِنْدَبِ مَخْزَنِيّ٢٤٧
هُوْرا مُفَرْقِعَة٢٤٩
هُوْشِيْرًا أَمْرِيكيَّة
هَيْثُم المَكانِس

# ٧- مسرد إنجليزي

Absinth tree	127	Big cranberry	. 100
Abyssinian aloe	Y •	Birthwort of Brasil	97
Abyssinian banana	777	Biting stonecrop	٧٧
Adam's fig	777	Black milfoil	۳۲
African pepper tree	307	Black spindle tree	. 770
All Saint's - wort	۸۳	Blessed carbenia	171
Alpine caprifoly	124	Bloody finger	Α٧
Alun root	789	Blow - ball	7 2 7
American heuchera	789	Blue weed	ξ
Aniline		Brook	۸۲
Animal wax	120	Brook mint	. 727
Aphrodisiac prangos	177	Brushwood persicaria	171
Arborescent scented basil	. 79	Bulbous corydalis	
Argemone poppy	<b></b>	Bullock's heart	178
Arsenic	97	Butter and eggs	
Asiatic crowfoot	V٦	Cajan - pea	141
Asse's pepper	72.	Calf's snout	. 174
Autumn crocus	170	Calidonian maclura	101
Azedarach	1.4	Canadian avens	70
Azerole tree	1	Candian savory	. 749
Bael tree	٤٢	Candle plant	
Balsam	٣٤	Candy	. 771
Barley	150	Canker - wort	. Y & V
Bastard blue agrimony	۲	Cap bean	. 170
Bead tree	140	Caper - spurge	. 177
Bean of Malacca	22	Cashew - nut tree	٣٣
Beautiful sorrel	V7	Cassia	. 178
Beet	111	Cat's - tail	٤١
Belote oak	174	Celery	. 110
Belvedere	198	Chate of Egypte	. 181
Rig hogherry	100	Chicocke tree	114

Chineese wormwood	Dyer's vine
Chirurgical lamina 197	Earth almond\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Chlorophyceae	Edible cyperus \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Christ's thorn	Egyptian arum \V\
Clary	Egyptian balsam Y & V
Cocoanut palm YTA	Egyptian colocasia \V7
Colchicum	Elegant aloe Y.
Colocasia eatable arum ۱۷٦	Elixir\7
Common custard - apple \V &	English plantain 19V
Common germander \ \ \ \ \ \ \ \ \	Ergot
Common horse - radisch Yo.	Ethiopian banana YTT
Common rue \\\\	European spindle tree ۲۲٦
Common tooth - wort A9	Evergreen oak \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Congo - pea	Field clover YET
Corsian alsidium \ \ \	Field larkspur \ \ \ \ \ \ \ \
Corsian moss 181	Finger flower
Corydalis of Lebanon \V•	Fish mint YET
Corymbiferous cranberry \VV	Fistulous asphodel YA
Cos's cyclamen 17.	Flea - wort ٢٩
Cotyledon.	Florida cornelberry\\Y
Country almond ٢٣	Florida dogberry \VY
Cow parsley ۱۱۳	Florida dogwood \VY
Cow weed	Florida star anis tree YY
Creeping Jack VV	Floss blue flower Y
Cretan astragal	Foxtail sedge \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Crotalus milk - weed {\	Fragile nettle
Croton - oil plant	Fraxinella
Cubeb pepper \\\9	Garden thyme 9V
Culin chive	Garland thorn 181
Curving cucumber	Gas plant A&
Cuspidate cudrania	Gean cherry ١٨٤
Cuspidate maclura 10.	Geneva bugle 101
Custard - apple \VT	Giant fennel \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Cyanophyceae	Gingelly \\\
Dandelion 7 EV	Gingili \\\4
Devil's fig	Glandular albizzia \\V
Diamond ficoïdes 127	Glasswort
Distaff thistle	Goat's thorn\Y
Doll NAY	Goat blue weed
Dragon - bushes Y•W	Goldenleaves chestnut \A9

Grain of paradise YET	Love apple	٣٦
Gravel grass	Macassar - oil tree	
Great ben plant\9V	Mandioc plant	۲۳۱
Great reed - mace	March flower	
Ground oak \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Margosa tree	1.4
Guarana 171	Marocco gum tree	
Guinea pepper ٢٥٤	Marschpestle	٤١
Gum - tragacanth plant \Y	Marsh samphire	
Hairy cucumber\ \ \ \ \ \ \	Mat sedge	
Hare's foot clover YET	Meadow saffron	
Hedge - berry \A\$	Medicinal bread	
Herb of grace \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Mediterranean medlar	۱۰۰
Holly oak	Meleguetta pepper	r37
Holm oak\\Y\	Melon tree	Yo
Ice plant \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Mock - cypress	198
Indian almond tree ٢٣	Mountain savory	
Indian jujube \0 &	Musky gourd	177
Inga YV	Myrtle spurge	177
Intertwine fruit albizzia \V	Nabk tree	111
Java cudrania	Naked ladies	١٢٥
Jelly Y • 0	Navelwort	18-18
Jerusalem thorn\\T\	Neapolitan medlar	1 • •
Jujube tree	Nicotiana	o Y
Kidney - vetch Y•Y	Nux vomica tree	127
Kidneywort 17	Opiate	<b>۲۲۷</b>
King's consound \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Orange melon	181
King's rod fistulosous YA	Orbicular cyclamen	15.
Knight's - spur \ \ \ \ \ \	Oriental patience	¥
Lady's fingers Y•Y	Palestine scabious	117
Lanceolate plantain 19V	Pao - Pereira	Yo
Latifoliate water celery \\7	Papaw apple	<b>۲</b> ٥
Laurestine 10	Papaya	Yo
Lavender cotton ٣	Paradise banana	۲۳۲
Lebanon periwinkle ۲0 ξ	Park - leaves	۸۳
Lesser snapdragon \\YA	Parsnip chervil	118
Lima bean	Paullinia	
Lion's - leaf	Pennywort	1٣
Lion's - turnip	Perfumed cherry	Y•V
Little chestnut tree\	Pernod's wood	188
Lotions\17•	Persan cyclamen	۲۲

Persian buttercup V7	Shittim wood \Y \xi
Peyotl	Showy milfoil
Phaeophyceae \ \ \ \ \ \	Smooth hawthorn 1.1
Pigeon - pea	Smooth May tree
Popinac 178	Snake cucumber
Possumwood Y £ 9	Snake flower
Pot - herb thyme 9V	
Prangos of Hermon \\T\	Soft haired basil
Prick - wood YYo	Sour - cherry
Prickly avens	Spanish oak
Prickly poppy	Spiny sumach\\\\
Priests'cap YY7	Sponge tree ۱۲٤
Purle grape vine \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Ste Lucie cherry Y•V
Purple crocus\\Yo	Stinking worm - killer 97
Purple spindle tree YYo	Stone clover Y & T
Quadrangular passion flower \V	Strong corydalis
Radicant sumac \\9	
Rattlesnake milk - wort	Sugar - apple
Red grape vine \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Sugar gourd
Rhodophyceae	Summer - cypress 198
Rhubarb 4.	Sweet - sop \\Y
Rib - grass. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Sweet chestnut. \\
Ribwort	Sweet scented basil 19
Rosery pea	Sweet violet
Rough sage	Syrian organy ١٣٨
Rue	Tamarinde
Sage apple \V\$	Tamarind tree 00
Sainte Sophie's grass \ Y 9	
Saltwort	Tamarisk
Sand's flea - wort	Tamarisk salt tree
Sandarach tree	Tayuyaor
Sandbox YE9	Thirsty thorn
Sarsaparilla of Jamaïque \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Thorn tree Y & V
Savory of Crete ۲۳۹	Three foliate sumach
Scammony of Mexico	Thyme 4V
Scordium \\ \text{\gamma}	Tinctorial oak
Scorpioïd coronilla Y	Toad - flax Y•Y
Sesame \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
Shea butter 40	Tobacco o Y
Shittah tree \Y5	Tomato

Tomentous germander	188	White asphodel YV
Trumpet grass	171	White dittamy A &
Tuberous stachys	311	White fraxinella
Turban	۲۷	White ginseng root 37
Turbeth	0 &	White king's rod YV
Turnip roated chervil	118	Wild baie tree\0
Turnip rooted celery	110	Wild caper \ \\\
Tutsan	۸۳	Wild chervil\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Variegated aconite	17	Wild liquorice 170
Venomous sumach	119	Wild mint YEY
Venus's navelwort	۱۲	Wilhelm's milfoil
Violet	۸۳	Wisdom hedge mustard 179
Viper's bugloss	ξ	Wolly safflower \VY
Wahoo	770	Wood ۲۲٥ ، ۷٩
Wall germander	188	Wood stachys\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Wall pepper		Woolly milfoil §
Water betony		Worm - killer of Brasil 47
Water figwort		Wound - wort Y•Y
Water germander	184	Yellow navelwort \Y
Water mint		Yellow thistle
Water parsley		Ylang - ylang tree ٢٥٦
Water parsnip		Zachum oil tree Y & V
Wayfaring tree		Zizyphus \\o \tag{\dagger}

## ٣- مسرد فرنسي

Airelle à gros fruits 100 Alangilan 707 Albizzie à fruits entrelacés 1V Albizzie glanduleuse 1V Alcoolat ammoniacal fétide 1A7
Albizzie à fruits entrelacés V Albizzie glanduleuse V Alcoolat ammoniacal fétide VAT
Albizzie glanduleuse
Alcoolat ammoniacal fétide ۱۸۳
1 1
Alcoolat antiscorbutique \AY
de l'essence de
térébenthine \\\\\
lcoolat de cannelle\\AY
decoolat de cochléaria composé. NAY
clcoolat de miel composé ۱۸۲
lcoolature d'anémone
pulsatille ۱۸۳
lcoolature de valériane
stabilisée ۱۸٤
lcoolé ۲۳۰
dcoolé d'acide chlorhydrique ۲۳•
Icoolé d'ammoniaque ۲۳۰
lcoolé d'ammoniaque ambré YT1
lcoolé d'élatérine ۲۳.
lcoolé de cinchonine ۲۳.
lcoolé de morphine ۲۳.
lgues bleues
lgues brunes
lgues marines \V
lgues rouges
lgues vertes
loès caballin
loès d'Érythrée Y•
loès élégant Y •
mande de terre 117

Amandier des Indes ٢٣	Astragale de Crète\\
Ambrevade\\\\\\\	Attier\VY
Amidon de maïs Y £ Y	Aubépine azérolier
Anacardier à pommes TT	Aubépine lisse
Anacardier occidental	Aurone femelle
Andropogon hérissé ۲۱	Azédarach \.\"
Andropogon hirsute Y\	Azérolier
Androsème AT	Badamier YY
Aniline YY	Badianier de Floride ۲۲
Anone cœur de bœuf \V &	Bain cadique V &
Anone écailleuse	Bain émollient V &
Anthrisque des bois	Bain fortifiant V &
Anthyllide Y•Y	Bains (Préparations pour)
Anthyllide vulnéraire Y•Y	Balanite Y & V
Antirrhine	Balanite d'Egypte Y & V
Apozème purgatif	Ballote \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Appétit \ • ٩	Bananier d'Abyssinie YTT
Arbre absinthe	Bananier d'Ethiopie YTT
Arbre à chapelet	Bananier du paradis YTY
Arbre à gomme	Barbadine \V
Arbre à savon	Barbatimao du Brésil
Arbre d'huile de Macassar ٢٥٦	Barbotine ۱۲۰
Arbre de melon	Barigoule 9V
Arbre du diable Y & 9	Basilic en arbre
Argémone 0	Basilic suave
Argérolier	Basilic velu
Argolou \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Bâton royal fistuleux YA
Aristoloche cymbifère 97	Baume acétique camphré ٣٤
Aristoloche du Brésil 47	Baume acoustique ٣٤
Aristoloche fétide 97	Baume antihystérique
Aristoloche Mil - Homens 97	Baume contre le goitre
Armoise de Chine	Baume conyzoïde Y
Arrow - root de Queensland A	Baume d'eau YET
Arrow - root de Guyane V	Baume de Chiron ٣٤
Arsenic	Baume de Goulard ٣٥
Arum colocasie	Baume de Saturne ٢٥
Arum d'Egypte \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Baume hydriodaté ۲٥
Asphodèle blanc YV	Baume ioduré
Asphodèle fistuleux YA	Baume ophtalmique ٣٥
Astragale adragant \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Baumes 78

Bela	Cahinca
Belvédère 198	Caïnça \V9
Benoîte de Canada	Caju ***
Benoîte dressée	Caladium bicolore
Benzoate de lithine TV	Calament des marais YET
Benzoate de lithium TV	Canang des Molluques ٢٥٦
Berle à feuilles larges \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Candis YT1
Bétoine d'eau	Canneberge à gros fruits
Bette à gros fruits \\A	Canne de jonc {\}
Beurre d'illipé	Canon Y•V
Beurre de Karité 90	Cardamome de Ceylan 7 8 7
Biguarreau \ \\ \X	Cardamome grand YET
Biscuits vermifuges ٣٢	Cardamome long 727
Blette	Cardamome moyen 7 £ 7
Bois (accidents)	Carthame laineux\VY
Bois à lardoire	Cassave YT1
Bois de Chili	Cassave amère
Bois de Panama	Cassie \Y &
Bois de sable Y & 9	Cassier \\Y \E
Bois Pernod	Castanopside à feuilles dorées \ \ \ \ \ \ \
Bonnet carré ۲۲٦	Cataplasmes vétérinaires 199
Bonnet de prêtre ٢٢٦	Catapuce\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Borate de sodium ٤٠	Catherinette
Borax	Céleri - navet
Bouillon pectoral VY	Céleri - rave
Bouillon pectoral du docteur	Célestine conyzoïde
Bailly VY	Cérat de minium Y • 9
Bouillon pectoral du docteur	Cérat laudanisé Y1.
Nauche VY	Cérat mercuriel (F.H.P.) Y • 9
Bouillons médicinaux VY	Cerfeuil bulbeux 118
Bromélaine Y9	Cerfeuil des bois\\\\\
Bromhydrate de cicutine YA	Cerfeuil sauvage \\\\
Bromhydrate de conicine YA	Cerfeuil tubéreux \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Bromhydrate de conine YA	Cerisier des bois
Bromure d'éthyle 9	Cerisier des oiseaux
Bugle de Genève \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Cerisier mahaleb Y•V
Caboué	Cerisier noir
Cachiman \V &	Cerisier Sainte Lucie Y • V
Cachou Gambir 198	Cerisier sauvage
Cactus LSD 0	Chandelle 5 \

Chanvre mexicain٣٩	Cocotier YTA
Charbon activé \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Cocotier commun YTA
Charbon de bois activé \77	Cœur de bœuf
Chardon bénit \VY , \V\	Colchique d'automne \\Yo
Chardon bénit des Antilles o	Collodion
Chardon bénit des parisiens \VY	Collutoires
Chardon des champs You	Colocase comestible
Chardon jaune ۱۷۲	Colocase des Anciens ۱۷٥
Chardon santo	Concombre chaté \ \ \ \
Chasse - sièvre \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Concombre d'Egypte \ \ \ \
Chasse - venin Y•٣	Concombre flexueux 179
Châtaigner \\	Concombre serpent \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Châtaigner nain \\\\	Consoude royale \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Chaulmosulfone\\	Coquelicot argemone A.
Chêne (composants et	Coralline de Corse\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
usage) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Coralline noire \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Chêneau\{ \	Cori - sen
Chêne d'Espagne 177	Cornouiller de Floride\\Y\T
Chêne noir	Coronille scorpioïde ۲۱
Chêne quercitron	Corossol écailleux\VT
Chênette\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Corps gras
Chêne vert	Corydale à lobe court \V•
Chénopode à balais	Corydale bulbeuse \V•
Chérimolier \V &	Corydale du Liban ۱۷.
Chérophylle 117	Corydale solide \V•
Chèvrefeuille alpestre ١٣٨	Coton iodé\Vo
Chèvrefeuille des Alpes ١٣٨	Cotyle
Chincapin	Cotylédon ١٣ ، ١٢
Chlorophycées ۱۷	Cotylédon ombiliqué ۱۳
Chlorure ferreux 191	Cotylet ١٣ ، ١٢
Chrysarobine\	Cotylet du Portugal \Y
Chrysocolle £ •	Cotylet jaune 17
Ciboulette 1 • 9	Courge musquée \VY
Cicourlier 108	Courge sucrière \VY
Cires animales ۱۳۷	Couronne de moine Y & V
Citrate normal	Cran de Bretagne Yo.
Citrouille sucrière 1VY	Cranson Yo.
Civette	Cristalline 187
Clandestine	Crosne du Japon ۱۱٤
Cochléaria de Bretagne Yo.	Croton

Cubèbe	Esprit de cannelle	111
Cudranie de Java 101	Esprit de miel	111
Cudranie tricuspide	Essence antihystérique	115
Cyanophycées \\A	Essence de girofle	۲۸
Cyclamen à larges feuilles ٢٦	Essence de persil	10
Cyclamen de l'île de Cos \\".	Essence de thym	
Cyclamen de Perse ٢٦	Ester bromhydrique	
Cyclamen printanier ۱۳•	Ester isoamyliodhydrique	
Cyprès à sandaraque 177	Ester méthylsalicylique	
Cytise des Indes \A\	Ether bromhydrique (1937)	
Dauphinelle consoude\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Eupatoire bleue conyzoïde	
Dauphinelle des blés \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Eupatoire pourpre	
Dauphinelle pied - d'alouette \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Euphorbe épurge	
Delile	Evaporation du liquide	
Dent de lion Y & V	extractif	717
Dentelle de Vénus \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Extrait d'agaric blanc	
Dépilatoire	Extrait d'Evonymus	
Dictame blanc A &	atropurpureux	771
Dictame fraxinelle A	Extrait d'opium	
Digitale pourprée	Extrait de cascara sagrada	
Dragon	Extrait de coloquinte	, ,
Eau de miel adorante \\AY	composé	711
Eaux minérales YTT	Extrait de fusain noir pourpré	
Eaux minérales artificielles 777	Extrait de kola (sec)	
Ecorce de Panama	Extrait de noix vomique	' '
Ecorce de Quillaya 19.	Codex 1949	X 1 X
Eléctuaire YY9	Extrait de ratanhia	
Élixirs	Extrait de scille	
Embrocations Ao	Extrait fluide de coca	
Emplâtre 19V	Extrait fluide de kola	777
Emulsions 717		717
Encens d'eau \\.\	Extraits alcooliques ou Hydro -	
Épiaire des bois	•	Y 1 A
Épiaire tubéreuse \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	•	777
Épine du Christ ۱۳۱ ، ۱۱۱		777
Épine noire	Extrait thébaïque	
Épurge \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Farigoule	
Ergots	Farine d'avoine	
Espèces \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Farines de céréales	127
Esprit antiictérique \\\\\	Faux muflier	171
Labrit antificienduc	I GUA IIIUIDEL	11/1

Fécules 7 £ \	Gouttes Y & &	
Férule commune 170	Graine d'Alger \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
Figuier d'Adam YTY	Graine de Zédoaire ۱۲۰	
Figuier des îles	Graines de paradis YET	
Figuier infernale	Graisses AT	
Figuiers des nègres 70	Grande digitale AV	
Fleur de mars	Grande scrofulaire AY	
Floridées	Grand raifort Yo.	
Florin d'or Y & V	Granulés Y.7	
Fourcrée gigantesque ٣٩	Guarana 171	
Fraxinelle	Gueule de lion jaune Y • ٣	
Fraxinelle blanche	Guigne	
Frigoule 4V	Guindanlier 10 &	
Fusain commun	Hagueleg Y & V	
Fusain d'Amérique YYo	Haricot de Lima \70	
Fusain d'Europe YY7	Haricot de mer	
Fusain noir YYo	Haricot du Cap\10	
Fusain pourpré ۲۲٥	Haricot du Tchad	
Gaïacol\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Hasard V7	
Galanthamine bromhydrate Y & &	Helminthocorton\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
Gambir cubique 198	Herbe à cinq côtes\\9V	
Garde - robe ٣	Herbe à cinq coutures 19V	
Gargarismes\	Herbe à la couleuvre {	
Gelées Y • o	Herbe à la gravelle \7\	
Génépi en deuil 🏲	Herbe à la matrice	
Genièvre ov	Herbe à la reine o Y	
Gentiane Jaune (Racine de) 78	Herbe à la trompette 171	
Germandrée aquatique \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Herbe à tous les maux o 7	
Germandrée d'eau \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Herbe aux plaies\VV	
Germandrée officinale \ { {	Herbe aux poux \ \ \ \ \ \ \ \	
Germandrée petit - chêne \ { }	Herbe aux puces ٢٩	
Germandrée tomenteuse \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Herbe aux vipères {	
Gingeolier \\ \o \{	Herbe cachée	
Ginseng blanc (Racine de) ٦٣	Herbe de grâce \\\\	
Glaciale 187	Herbe de Sainte Sophie 179	
Glycéré YY4	Herbe des prairies	
Gobelets\\	Herbe de Ste - Croix o Y	
Gomme 198	Herbe de St Julien Y & •	
Gomme laque Y • •	Herbe du grand - prieur 0 Y	
Gommes diverses \\T4	Herbe sicilienne	

Heuchère Y & 9	Kino d'Amboine	90
Hilang - hilang ٢٥٦	Kino de l'Inde	90
Huile aloétique batave ۱۰۸	Kino de Malabar	90
Huile anthelminthique de	Kinos	98
Chabert \ \ \ \ \ \	Kochia	98
Huile d'aloès pyrogénée \ . A	Lacca Y	• •
Huile d'olive	Laitue de chien Y	٤٧
Huile de camomille \•٦	Laminaires chirurgicales	97
Huile de camomille camphrée \ \ \ \ \	Laque (Résine) Y	• •
Huile de camomille	Lathrée	19
térébenthinée \ • ٦	Lathyris\	77
Huile de foie de morue	Laudanum solide Y	22
composée \ \ \ \ \	Laurier tin	10
Huile de foie de morue iodo -	Lavements	٧٢
ferrée\\\\\\\\\\\\\	Léontice	۸١
Huile de foie de morue	Léonure	۸١
phosphorée 1 • V	Liane à réglisse	40
Huile de palme \ • 0	Lichen comestible	٧١
Huile de petits chiens 1.7	Lichens odorants	٧١
Huile essentielle de girofle A7	Limonade	37
Huile essentielle de thym	Linaire commune Y	. ٣
Huiles médicinaux \ \• ٦	Linaire vulgaire Y	. ٣
Huiles pyrogénées \ • V	Liniment Y	11
Hure Y & 9	Lin sauvage Y	.4
Hydromellés AA	Lipides	۸۳
Hyoscyamine (bromhydrate d') YoY	Lok Y • • •	09
Ilang - ilang ٢٥٦	Looch	09
Iode et ses dérivés YoV	Lotions	7.
Ipécacuanha officinal\\0 Y	Maclure Calidonienne	01
Jalap d'Orizaba\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Maclure tricuspide	0 +
Jalap de tampico 17	Madère ۱۷٦ ، ١	VO
Jalap digité 17	Madrate	19
Jéquirity 170	Mahaleb Y	٠٧
Jugeoline \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Malaguette ٢	13
Jujubier \o &	Maniguette Y	23
Jujubier d'orient ۱۱۱	Manihot Y	71
Jusquiame d'Atlas ٣٦	Manioc Y	71
Kentrophylle\VY	Manioc amer Y	44
Kickxie bätarde ۱۲۸	Manioc doux Y	41
Kino 195	Margousier	. *

Massette £ Narcisse d'automne \ Nastic \ Matières grasses \ A* Nivaline \ Y \ Néré \ Nivaline \ Y \ Nocotiane \ Noix vomique \ Noix vomique \ Y \ Nombril de Vénus \ Y \ Nombril de la Jamaïque \ Y \ Nombril de Vénus \ Y \ Y \ Origin de Syrie \ Y \ Nombril de Vénus \ Y \ Y \ Origin de Syrie \ Y \ Y \ Origin de Syrie \ Y \ Y \ Orpin âcre \ Menthe sauvage \ Y \ Y \ Orpin âcre \ Menthe sauvage \ Y \ Y \ Orpin brûlant \ Merisier \ Y \ Y \ Ortie puante \ Y \ Y \ Ortie puante \ Y \ Millefeuille noble \ Y \ Ortie puante \ Y \ Y \ Ortie puante \ Y \ Nombril de Vénus \ Y \ Nombril de Vénus \ Y \ Y \ Origin de syrie \ Y \ Y \ Orpin âcre \ Y \ Nombril de Vénus \ Y \ Y	Marronnier	۱۸۸	Nabka\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Mastic. YY & Néré \ Matières grasses A' Nivaline Y Médecine noire Nocotiane Noix vomique \ Mélange anesthésique de Noix vomique \ Méléguette Y Noyer d'acajou \ Méléguette Y Noyer d'acajou \ Méliguette Y Noyer d'acajou \ Méliguette Y Noyer de la Jamaïque Y \ Mellites AA Opiats Y \ Mellites AA Opiats Y \ Mellon serpent \ 19 Orchis tachetée \ Mentha aquatique Y Orcille de lièvre \ Menthe aquatique Y Orge \ 10 Orge \ 10 \ Menthe blanche Y Y Organ de syrie \ 10 \ Menthe sauvage Y Y Orpin âcre \ Menthe sylvestre Y Y Orpin brûlant \ Merisier A Ortie fragile \ 10 \ Méllefeuille noix AA Ortie puante \ 10 \ Millefeuille noire Y Orymellites \ 10 \ Millefeuille noire Y Oxymels \ Millemosa farnêse Y Y Pain d'oiseau \ Mimosa farnêse Y Y Pain d'oiseau \ Mimosa farnêse Y Y Pain d'oiseau \ Mixture de Bonain Y 10 Paliure \ 10 \ Mixtures Y 12 Paliure épineux \ 10 \ Mousse de Corse Y 12 Paliure épineux \ 10 \ Mousse de Mene Y 12 Paliure épineux \ 10 \ Moutarde des Allemands Y 0 Passiflore à tige carrée \ Moutarde des Corse Y 12 Papayer \ Moutarde des Romins Y 0 Passiflore à tige carrée \ Moutarde des moines Y 0 Pastilles de poivre composées Y \ Mufflier linaire Y Pâte de lactucarium \ 10 \ Mufflier linaire Y Pâte de limaçons ou d'escargots \ 10 \ Mutirate de li	Masse	٤١	Nabqa\\
Matières grasses  Médecine noire  Médecine noire  Mélange anesthésique de  Bonain  Tho Nombril de Vénus  Mélèguette  Tê Noyer d'acajou  Méliguette  Mé	Massette	٤١	Narcisse d'automne
Médecine noire       \ Notive vomique       \ Noix vomique         Mélange anesthésique de       \ Noix vomique       \ Y         Bonain       \ Y \ \ Nombril de Vénus       \ Y         Méléguette       \ Y \ Y       Noyer de la Jamaïque       \ Y         Méliguette       \ Y \ Y       Noyer de la Jamaïque       \ Y         Mellites       \ \ \ \ \ Opiats       \ Y         Mellites       \ \ \ \ \ \ Opiats       \ Y         Mellites       \ \ \ \ \ \ \ \ \ Orpiats       \ Y         Mellites       \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Mastic	377	Néré
Mélange anesthésique de Bonain Y 10 Nombril de Vénus N° Méléguette Y 2 Noyer d'acajou Méliguette Y 2 Noyer de la Jamaïque Y Mellites A Opiats Melon serpent Mentastre Y 2 Orcille de lièvre Menthe aquatique Y 2 Orge Menthe blanche Y 2 Orgin de syrie Menthe suvage Menthe sylvestre Y 2 Orgin brûlant Merisier Note in fargile Méthylorthodioxybenzol Millefeuille noire Millefeuille noire Millefeuille noire Mimosa farnèse Mimosa mellifère Mixture de Bonain Mort chien Mousse de Corse Mousse de Mere Moutarde des moines Mixeles Millefeuille de lièvre Menthe sauvage Mimosa de Paliure Mixture de Bonain Mixtures Mixture Mousse de Corse Mousse de Corse Mousse de Menthe Mixeles Millefeuille noire Mousse de More Moutarde des Allemands Moutarde des moines Mixeles Mixeles Mixeles Moutarde des moines Moutarde des moines Mixeles Mixeles Mixeles Mixeles Moutarde des moines Moutarde des moines Mixeles Mixeles Mixeles Mixeles Moutarde des moines Moutarde des moines Mixeles Mixeles Mixeles Mixeles Mixeles Mixeles Moutarde des moines Moutarde des moines Mixeles Mix	Matières grasses	۸۳	Nivaline Y & &
Bonain 7 10 Nombril de Vénus 17 Méléguette 7 1 Noyer d'acajou 7 Noyer d'acajou 7 Méléguette 7 1 Noyer de la Jamaïque 7 Mellites 7 Noyer de la Jamaïque 7 Mentastre 7 Noyer de la Jamaïque 7 Norchis tachetée 7 Norchis 8 Norchis 1 Norchis	Médecine noire	١	Nocotiane o Y
Méléguette       7 £ 7       Noyer d'acajou         Méliguette       7 £ 7       Noyer de la Jamaïque       7         Mellites       AA Opiats       7         Melon serpent       1 7 4       Orchis tachetée       1         Mentastre       7 £ 7       Oreille de lièvre       1         Menthe aquatique       7 £ 7       Orge       1         Menthe blanche       7 £ 7       Origan de syrie       1         Menthe sauvage       7 £ 7       Orpin âcre       1         Menthe sylvestre       7 £ 7       Orpin brûlant       1         Merisier       1 A £ 0       Ortie fragile       1         Méthylorthodioxybenzol       1 7 7       Ortie puante       1         Méthylorthodioxybenzol       1 7 7       Ortie puante       1         Millefeuille noble       7       Orvale       1         Millefeuille noble       7       Orvale       1         Millefeuille noble       7       Oxymellites         Millegertuis androsème       A 7       Oxymels         Milmosa farnèse       1 7 2       Pain d'oiseau         Milmosa farnèse       1 7 2       Pain médicinaux         Mimosa mellifère       1 7 2 <t< td=""><td>Mélange anesthésique de</td><td></td><td>Noix vomique</td></t<>	Mélange anesthésique de		Noix vomique
Méliguette       Y E T       Noyer de la Jamaïque       Y         Mellites       AA Opiats       Y         Melon serpent       174 Orchis tachetée       1         Mentastre       Y E T Oreille de lièvre       1         Menthe aquatique       Y E T Orge       1         Menthe blanche       Y E T Orgen de syrie       1         Menthe sauvage       Y E T Orpin âcre       1         Menthe sylvestre       Y E T Orpin brûlant       1         Merisier       1 A E Ortie fragile       1         Méthylorthodioxybenzol       1 T Ortie puante       1         Millefeuille noble       Y Orvale       1         Millefeuille noble       Y Oryale       1         Millefeuille noire       Y Oxymellites       1         Millefeuille noire       Y Oxymels       1         Millefeuille noire       Y Oxymels       1         Millegertuis androsème       1 Y E Pain d'oiseau       1         Millegertuis androsème       1 Y E Pain d'oiseau       1         Mimosa farnèse       1 Y E Pain d'oiseau       1         Mimosa farnèse       1 Y E Pain d'oiseau       1         Mixture de Bonain       Y 1 P Paliure       1         Mon <td< td=""><td>Bonain</td><td> ٢١٥</td><td>Nombril de Vénus ١٣ . ١٢</td></td<>	Bonain	٢١٥	Nombril de Vénus ١٣ . ١٢
Méliguette       Y E T       Noyer de la Jamaïque       Y         Mellites       AA Opiats       Y         Melon serpent       174 Orchis tachetée       1         Mentastre       Y E T Oreille de lièvre       1         Menthe aquatique       Y E T Orge       1         Menthe blanche       Y E T Orgen de syrie       1         Menthe sauvage       Y E T Orpin âcre       1         Menthe sylvestre       Y E T Orpin brûlant       1         Merisier       1 A E Ortie fragile       1         Méthylorthodioxybenzol       1 T Ortie puante       1         Millefeuille noble       Y Orvale       1         Millefeuille noble       Y Oryale       1         Millefeuille noire       Y Oxymellites       1         Millefeuille noire       Y Oxymels       1         Millefeuille noire       Y Oxymels       1         Millegertuis androsème       1 Y E Pain d'oiseau       1         Millegertuis androsème       1 Y E Pain d'oiseau       1         Mimosa farnèse       1 Y E Pain d'oiseau       1         Mimosa farnèse       1 Y E Pain d'oiseau       1         Mixture de Bonain       Y 1 P Paliure       1         Mon <td< td=""><td>Méléguette</td><td>r37</td><td>Noyer d'acajou ٣٢</td></td<>	Méléguette	r37	Noyer d'acajou ٣٢
Mellites	Méliguette	۲٤٦	Noyer de la Jamaïque Y & 9
Mentastre 7 £ 7 Oreille de lièvre 1 Menthe aquatique 7 £ 7 Orge 1 Menthe blanche 7 £ 7 Origan de syrie 1 Menthe sauvage 7 £ 7 Orpin âcre 1 Menthe sauvage 7 £ 7 Orpin âcre 1 Menthe sylvestre 7 £ 7 Orpin brûlant 1 Merisier 1	Mellites	ΛΛ	Opiats
Menthe aquatique  Menthe blanche  Menthe blanche  Menthe sauvage  Menthe sylvestre  Menthe sylvestre  Merisier  Méthylorthodioxybenzol  Milles médicinaux  Millefeuille noble  Millefeuille noire  Millefeuille noire  Mimosa farnèse  Mimosa mellifère  Mixture de Bonain  Mixtures  Mixtures  Mon  Mon  Mort chien  Mousse de Corse  Mousse de mer  Moustarde des Allemands  Moutarde des Allemands  Moutarde des Capucins  Moutarde des moines  Mixture  Mixture  Mixtures  Moutarde des moines  Moutarde des moines  Moutarde des moines  Mixture  Mixtures  Moutarde des moines  Moutarde des moines  Moutarde des moines  Moutarde des feglisse  Mucilages  Mufflier linaire  Mixture Pâte de figues  Mufflier linaire  Mufflier oronce  Muriate de limaçons ou d'escargots	Melon serpent	179	Orchis tachetée
Menthe blanche  Menthe sauvage  Menthe sylvestre  Menthe sylvestre  Méthylorthodioxybenzol  Miels médicinaux  Millefeuille noble  Millefeuille noble  Millepertuis androsème  Mimosa farnèse  Mixture de Bonain  Mixtures  Mixtures  Mon  Mort chien  Mousse de Corse  Mousse de Meradicinaus  Moutarde des Allemands  Moutarde des Corse  Moutarde des Allemands  Moutarde des Corpe  Moutarde des Allemands  Moutarde des Allemands  Moutarde des Copucins  Moutarde des Allemands  Moutarde des All	Mentastre	727	Oreille de lièvre ۱۹۷
Menthe blanche  Menthe sauvage  Menthe sylvestre  Menthe sylvestre  Méthylorthodioxybenzol  Miels médicinaux  Millefeuille noble  Millefeuille noble  Millepertuis androsème  Mimosa farnèse  Mixture de Bonain  Mixtures  Mixtures  Mon  Mort chien  Mousse de Corse  Mousse de Meradicinaus  Moutarde des Allemands  Moutarde des Corse  Moutarde des Allemands  Moutarde des Corpe  Moutarde des Allemands  Moutarde des Allemands  Moutarde des Copucins  Moutarde des Allemands  Moutarde des All	Menthe aquatique	727	Orge
Menthe sauvage 7 £ 7 Orpin âcre  Menthe sylvestre 7 £ 7 Orpin brûlant  Merisier NA Ortie fragile N  Méthylorthodioxybenzol 17 Ortie puante 17 Ortie puante 18 N  Milles médicinaux NA Ortie puante des bois 18 N  Millefeuille noble 7 Orvale N  Millefeuille noire 7 Oxymellites N  Millepertuis androsème N7 Oxymels N  Mimosa farnèse 17 £ Pain d'oiseau N  Mimosa mellifère 17 £ Pains médicinaux N  Mixture de Bonain 7 10 Paliure 17 N  Mixtures 7 1 £ Paliure épineux 17 N  Mon 17 Pamelier 17 Pamelier 17 Panacée des laboureurs 18 N  Mousse de Corse 18 1 Papayer N  Mousse de Mer 18 1 Papayer N  Moutarde des Allemands 70 Pastilles 70 P			Origan de syrie ١٣٨
Menthe sylvestre  Méthylorthodioxybenzol  Méthylorthodioxybenzol  Miels médicinaux  Millefeuille noble  Millefeuille noble  Millefeuille noire  Moxymellites  Millefeuille noire  Moxymellites  Millefeuille noire  Moxymellites  Millefeuille noire  Moxymellites  Millefeuille noire  Millefeuille noire  Moxymellites  Millefeuille noire  Millefeuille noire  Moxymellites  Millefeuille noire  Millefeuille noire  Millefeuille noire  Millefeuille noire  Millefeuille noire  Moxymellites  Millefeuille Bailer  Millefeuille noire  Mil	Menthe sauvage	737	Orpin âcreVV
Méthylorthodioxybenzol. 177 Ortie puante 178 Miels médicinaux 179 Ortie puante 179 Millefeuille noble 179 Oryale 179 Millefeuille noire 179 Oxymellites 179 Millefeuille noire 179 Mill	/		Orpin brûlantVV
Méthylorthodioxybenzol. 177 Ortie puante 1 Miels médicinaux 177 Ortie puante des bois 1 Millefeuille noble 177 Oryale 177	Merisier	١٨٤	Ortie fragile
Miels médicinaux  Millefeuille noble  Millefeuille noble  Millefeuille noire  Millefeuille noire  Millefeuille noire  Millefeuille noire  Millefeuille noire  Mimosa farnèse  Mimosa farnèse  Mimosa mellifère  Mimosa mellifère  Mixture de Bonain  Mixture de Bonain  Mon  Mon  Mort chien  Mort chien  Mort chien  Mousse de Corse  Mousse de Mer  Mousse de Boure  Moutarde des Allemands  Moutarde des Capucins  Moutarde des Capucins  Moutarde des moines  Moutarde des des des laboureurs  Moutarde des moines  Moutarde des des laboureurs  Moutarde des des laboure	Méthylorthodioxybenzol	177	Ortie puante
Millefeuille noble  Millefeuille noire  Millefeuille noire  Millepertuis androsème  Mimosa farnèse  Mimosa mellifère  Mixture de Bonain  Mixture de Bonain  Mon  Mort chien  Mort chien  Mousse de Corse  Mousse de Mer  Moutarde des Allemands  Moutarde des Capucins  Moutarde des Capucins  Moutarde des moines  Moutarde des moines  Moutarde des moines  Moutarde des figues  Mufflier bâtard  Mufflier oronce  Mufflier oronce  Mufflier oronce  Mufflier oronce  Mufflier linaire  Mufflier oronce  Mufflier oronce  Mufflier linaire  Mufflier oronce  Mufflier linaire  Mufflier linaire  Mufflier oronce  Mufflier linaire  Mufflier l			Ortic puante des bois
Millepertuis androsème  Mimosa farnèse  Mimosa mellifère  Mixture de Bonain  Mixture de Bonain  Mon  Mort chien  Mousse de Corse  Mousse de mer  Moutarde des Allemands  Moutarde des Capucins  Moutarde des capucins  Moutarde des moines  Moutarde des des laboureurs  Moutarde des laboureurs  Moutarde des laboureurs  Moutarde des laboureurs  Moutarde des des laboureurs  Moutarde des des laboureurs  Moutarde des laboureurs  Moutarde des laboureurs  Moutarde des des laboureurs  Moutarde des laboureurs  Moutarde des laboureurs  Moutarde des des laboureurs  Moutarde des laboureurs  Moutarde des des laboureurs  Moutarde des laboureurs  Mouta	Millefeuille noble	۲	Orvale\\VV
Mimosa farnèse  Mimosa mellifère  Mixture de Bonain  Mixtures  Mixtures  Mon  Mort chien  Mousse de Corse  Mousse de Mer  Moutarde des Allemands  Moutarde des capucins  Moutarde des moines  Moutarde des des laboureurs  Moutarde des laboureurs  Moutarde des laboureurs  Moutarde des laboureurs  Moutarde des des laboureurs  Moutarde des laboureurs  Moutarde des laboureurs  Moutarde des des laboureurs  Moutarde des laboureurs	Millefeuille noire	۳	Oxymellites
Mimosa mellifère  Mixture de Bonain  Mixtures  Mixtures  Mon  Mon  Mort chien  Mousse de Corse  Mousse de mer  Moutarde des Allemands  Moutarde des capucins  Moutarde des moines  Moutarde des moines  Mucilages  Mûflier bâtard  Mûflier oronce  Muriate de fer  Muriate de fer  Mixture  Mixture  Mon  Mixture  Mon  Mon  Mon  Mon  Mon  Mon  Mon  Mo	Millepertuis androsème	۸۳	Oxymels
Mixture de Bonain  Y 10 Paliure  Y 12 Paliure épineux  Y 12 Pamelier  Mon  Y 10 Pamelier  Y 10 Pamelier  Mort chien  Y 10 Pamelier  Y 10 Pamelier  Y 10 Pamelier  Y 11 Pamelier  Mousse de Corse  Y 12 Pao - Pereira  Mousse de mer  Y 12 Papayer  Moutarde des Allemands  Y 10 Passiflore à tige carrée  Moutarde des capucins  Y 10 Passiflore à tige carrée  Pastilles  Y 10 Pastilles  Y 11 Pastilles de poivre composées  Y 11 Pate de figues  Y 11 Pâte de figues  Y 12 Pâte de gélatine du corne de cerf  Muflier oronce  Y 11 Pâte de lactucarium  Muriate de fer  Y 11 Pâte de limaçons ou d'escargots	Mimosa farnèse	178	Pain d'oiseauVV
Mixtures  Mon  Non  Non  Nort chien  Mort chien  Mousse de Corse  Nousse de mer  Moutarde des Allemands  Moutarde des Capucins  Moutarde des capucins  Moutarde des moines  Noutarde des moines  Noutarde des moines  Non  Pastilles  Pastilles de poivre composées  Mucilages  Naglier bâtard  Nor  Pâte de figues  Muflier oronce  Noutarde des capucins  Nor  Pâte de lactucarium  Muriate de fer  Naglier bâterd  Naglier oronce  Naglier limaire  Naglier oronce  Naglier oronce  Naglier oronce  Naglier de lactucarium  Naglier de limaçons ou d'escargots	Mimosa mellifère	178	Pains médicinaux V9
Mon. 177 Pamelier. 1 Mort chien. 170 Panacée des laboureurs. 1 Mousse de Corse. 181 Pao - Pereira. 181 Papayer Moutarde des Allemands. 170 Passiflore à tige carrée. 182 Moutarde des capucins. 170 Pastilles. 183 Pastilles de poivre composées. 183 Pastilles de réglisse. 184 Pastilles de réglisse. 184 Pâte de figues. 184 Pâte de gélatine du corne de cerf 185 Muflier oronce. 185 Pâte de lactucarium. 185 Pâte de limaçons ou d'escargots.	Mixture de Bonain	٢١٥	Paliure ۱۳۱
Mon. 177 Pamelier. 1 Mort chien. 170 Panacée des laboureurs. 1 Mousse de Corse. 181 Pao - Pereira. 181 Papayer Moutarde des Allemands. 170 Passiflore à tige carrée. 182 Moutarde des capucins. 170 Pastilles. 183 Pastilles de poivre composées. 183 Pastilles de réglisse. 184 Pastilles de réglisse. 184 Pâte de figues. 184 Pâte de gélatine du corne de cerf 185 Muflier oronce. 185 Pâte de lactucarium. 185 Pâte de limaçons ou d'escargots.	Mixtures	317	Paliure épineux ۱۳۱
Mousse de Corse  Mousse de mer  Moutarde des Allemands  Moutarde des capucins  Moutarde des moines  Moutarde des moines  Mucilages  Mufilier bâtard  Mufilier linaire  Mufilier oronce  Muriate de fer  Muriate de fer  Muriate de fer  Muriate de fer  Musse de Corse  Papayer  Passiflore à tige carrée  Pastilles  Pastilles  Pastilles de poivre composées  Y  Pâte de figues  Y  Pâte de gélatine du corne de cerf  Pâte de lactucarium  Muriate de fer  NA  Pâte de limaçons ou d'escargots	Mon	۲۷۱	Pamelier\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Mousse de mer  Moutarde des Allemands  Yor Passiflore à tige carrée  Moutarde des capucins  Yor Pastilles  Yor Pastilles  Yor Pastilles de poivre composées  Yor Pastilles de réglisse  Yor Pâte de figues  Yor Pâte de gélatine du corne de cerf  Muflier oronce  Yor Pâte de lactucarium  Yor Pâte de limaçons ou d'escargots	Mort chien	170	Panacée des laboureurs\\0
Moutarde des Allemands  Yo. Passiflore à tige carrée.  Moutarde des capucins  Yo. Pastilles  Yo. Pastilles de poivre composées  Yourilages  Yourilages	Mousse de Corse	181	Pao - Pereira Yo
Moutarde des Allemands  Yo  Passiflore à tige carrée  Moutarde des capucins  Yo  Pastilles  Yo  Pastilles de poivre composées  Yo  Mucilages  Yo  Pastilles de réglisse  Yo  Pastilles de réglisse  Yo  Pate de figues  Yo  Pâte de gélatine du corne de cerf  Muflier oronce  Yo  Pâte de lactucarium  Yo  Pâte de limaçons ou d'escargots	Mousse de mer	181	Papayer Yo
Moutarde des capucins  Yo  Pastilles  Yo  Pastilles  Yo  Pastilles de poivre composées  Yo  Mucilages  Yo  Pastilles de poivre composées  Yo  Pastilles de réglisse  Yo  Pâte de figues  Yo  Pâte de gélatine du corne de cerf  Muflier oronce  Yo  Pâte de lactucarium  Yo  Pâte de limaçons ou d'escargots  Yo  Pastilles  Yo  Pâte de limaçons ou d'escargots	Moutarde des Allemands	Yo.	Passiflore à tige carrée
Moutarde des moines.  Yo. Pastilles de poivre composées.  Yourilages.	Moutarde des capucins	Yo.	Pastilles Y•V
Mucilages  \( \)  \text{Pastilles de réglisse}  \text{Y} \\ \text{Mûflier bâtard}  \text{Y \cdot \text{Y}} \\ \text{Pâte de figues}  \text{Y} \\ \text{Mûflier linaire}  \text{Y \cdot \text{Y}} \\ \text{Pâte de gélatine du corne de cerf} \\ \text{Muflier oronce}  \text{Y} \text{N} \\ \text{Pâte de lactucarium}  \text{Y} \\ \text{Muriate de fer}  \text{N} \\ \text{Pâte de limaçons ou d'escargots}  \text{N} \\ \text{Pâte de limaçons ou d'escargots}  \text{N} \\ \text{N}  \text{Pâte de limaçons ou d'escargots}  \text{N} \\ \text{N}  \text{Pâte de limaçons ou d'escargots}  \text{N} \\ \text{N}  \text{Pâte de limaçons ou d'escargots}  \text{N} \\ \end{align*}			
Mûflier bâtard       Y · Y       Pâte de figues       N         Mûflier linaire       Y · Y       Pâte de gélatine du corne de cerf N         Muflier oronce       NAN       Pâte de lactucarium       N         Muriate de fer       NAN       Pâte de limaçons ou d'escargots       N	Mucilages	199	
Mûflier linaireY 'YPâte de gélatine du corne de cerf \Muflier oronce\Y\LambdaPâte de lactucarium\Muriate de fer\A\LambdaPâte de limaçons ou d'escargots\			Pâte de figues \\ \ \ \ \ \ \ \
Muflier oronce 17A Pâte de lactucarium 141 Pâte de limaçons ou d'escargots 15			
Muriate de fer			
THE POST OF THE PO	Nabca		Pâte noire de Ravaut \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Pâte officinale au baume de	Pimprenelle compacte	. TT
Tolu et à la codéine \0.	Pimprenelle Gaillardot	. 44
Pâte pectorale de mou de veau \ \ 9	Pissenlit commun	787
Pâte pour électrodes (électro -	Pissenlit officinal	787
cardiogramme) 189	Plantain des sables	. 37
Pâtes \ \ \ \ \ \ \	Plantain lancéolé	194
Patience gracieuse V7	Plantain psyllium	. 79
Patience orientale V &	Poireau de chien	. **
Paullinia 171	Poirée	111
Pavot du Mexique 0	Pois cajan	141
Pavot épineux	Pois d'ambrevade	111
Pébré d'aï Y & •	Pois d'Angole	111
Pédiveau bicolore \ \A9	Pois de Congo	111
Pentanoldioïque - méthyloïque 7A	Pois de sept ans	170
Perhydrol Y • 0	Pois du Cap	170
Persicaire des broussailles \V\	Pois pigeon	111
Persicaire indigotier ٣٢	Poivre à queue	149
Persil des marais	Poivre d'âne	7 2 .
Persil laiteux	Poivre d'Ethiopie	307
Persil sauvage		307
Pervenche du Liban ٢0 ٤	Poivre de muraille	. VV
Petit - chêne \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Poivre de Provençaux	78.
Petite catapuce	Poix blanche	
Petite joubarbe VV	Poix de Bourgogne	1 . 1
Petit plantain ۱۹۷	Poix jaune	
Petit zallou'a	Polygale de Virginie	. ٤1
Pétun o Y	Pommades	
Peuplier balsamique VV	Pomme cannelle	۱۷۳
Peuplier baumier VV	Pomme d'acajou	44
Peuplier de la CarolineVV	Pomme d'amour	
Peuplier tacahamaca	Pomme d'or	77
Peyote 0 •	Porte - chapeau	171
Phénol camphré \\\\\	Pote	94
Phénol sodé liquide \\\	Prangosier aphrodisiaque	177
Phénol sodique dissous	Prangosier de l'Hermon	
Phénylamine YY	Psyllion	
Phéophycées \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Psyllium des sables	
Pied de lièvre YET	Psyllium vrai	
Pilocarpine et ses sels £٣	Psylliun	
Pilules 55	Pucière	44

Pucière des sables٣١	Safran bâtard	170
Pulicaire ۲۹	Safran d'automne	170
Quenouille d'eau ٤١	Safran des prés	170
Quercitron 177	Sagesse des chirurgiens	179
Quillaja 14.	Salade de taupe	Y & V
Quillaya\	Salicorne	10
Quinquina (et usage	Salicorne d'Europe	10
thérapeutique)	Salicorne herbacé	10
Quinquina calisaya 197	Salicylate de méthyle	1 •
Quinquina jaune royal 197	Salsepareille de la Jamaïque	171
Quiquisque \Vo	Santoline	۳
Racine alumineuse Y & 9	Sarrète des champs	408
Racine de la Grande Gentiane 78	Sarriette de Crète	
Racine de serpent à sonnettes {\)	Sarriette des montagnes	78.
Radis de cheval Yo.	Sarriette sauvage	
Raifort Yo.	Sarriette vivace	
Raifort sauvage Yo.	Sauge écarlate	177
Réglisse d'Amérique ١٣٥	Sauge pommifère	148
Réglisse glanduleuse 177	Sauge sclarée	
Régule d'arsenic 9V	Savourée	78.
Renoncule asiatique V7	Scabieuse de Palestine	117
Renoncule d'Orient	Scammonée du Mexique	114
Renoncule des fleuristes	Science du chirurgien	
Renoncule des jardins V7	Scille	14
Renouée des buissons \V\	Sclarée	177
Résine de mastic YY &	Sclareiam (1795)	177
Rhodophycées ١٨	Scordium	124
Rhubarbe 4.	Scrofulaire aquatique	۸۲
Rhubarbe à baguettes 4 \	Sédum âcre	<b>VV</b>
Rhubarbe palmée 4Y	Sélin des marais	1.9
Rhue 111	Semen - contra	17.
Rhum 4 £	Semence sainte	17.
Roseau de la passion ٤١	Semencine	17.
RoumaV7	Semencontre	17.
Rue\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Senega	٤١
Rue des jardins \ \ \ \	Serratule hémorroïdale	307
Rue fétide\\\\\	Sésame	119
Rue officinale ۱۱۱	Sirops	148
Rum	Sisymbre sagesse	179
Sablier 789	Soluté concentré d'eau	

oxygénée Y • o	Toute bonne	. 177
Soluté concentré de	Toute saine	۸۳
peroxyde d'hydrogène Y • 0	Tragacanthe	17
Soluté concentré de phénol	Trèfle des champs	737
sodique \\\\	Trèsle jaune des sables	. 4.4
Songe 1Vo	Triolet jaune	. 7 . 7
Souchet à nattes 117	Tue chien	. 170
Souchet comestible ۱۱٦	Turbith	0 8
Soump ou Sump Y & V	Turbith végétal	0 &
Stachys des bois 110	Typha à larges feuilles	٤١
Stachys tubéreux 118	Unone odorant	. 707
Strychnos vomiquier 177	Uréchite dressée	۲۳
Suc ou Extrait de Kinos 198	Uzara	Y E
Sumac épineux ۱۱۸	Varech vermifuge	. 181
Sumac radicant 119	Veilleuse	. 170
Sumac trifolié\\	Veillote	. 170
Sumac vénéneux 119	Vermiculaire âcre	<b>VV</b>
Tabac or	Vigne des teinturiers	781.
Tabac commun oY	Vigne pourpre	. 117
Tabac de la Havane or	Vigne rouge	TAI.
Tales ۱۷٥	Violette	۳۸
Talictron 179	Violette de mars	TA
Tamarin	Violette des haies	<b>T</b> A
Tamarinier	Violette odorante	۳۸
Tamaris	Violier commun	۳۸
Taro ۱۷٦ (۱۷٥	Viorne tin	10
Tayuia o Y	Vipérine	ξ
Tayuya o Y	Vipérine commune	<b>٤</b>
Tête-de-mort\YA	Vomiquier	. 127
Tetraclinis articulé\YY	Vulnéraire	. ۲ • ۲
Thé de Caroline Yoy	Xylopie d'Ethiopie	307
Thérapeutique martiale V•	Yaupon	YOV
Thuya arcticulé 177	Yeuse	. 174
Thym 4v	Ylang - Ylang	107
Thym commun 9V	Zaccon	Y & V
Tomate ٣٦	Zacon	Y & V

# ٤ - مسرد ألماني

Abessinischaloë	Y •	Blaubalsam	۲
Abessinischbanane	۲۳۳	Bocksdistel	17
Absinthbaum	141	Brasilianisch hohlwurz	97
Acajoubaum	٣٣	Brasilianisch Osterluzei	97
Adamfeige	444	Brechnussbaum	144
Adragant	17	Breiter merk	117
Agyptische melone	184	Breiter rohrkolben	٤١
Ägyptischer zahnbaum	Y E V	Breitwassersellerie	117
Agyptisches arum	۱۷٦	Buntakonit	17
Alpen Geissblatt	171	Bushwerk Knöterich	171
Alunwurzel	789	Canadischer Gebenedeite	70
Angolische erbse	141	Canangabaum	707
Antillen - akasie	178	Candische saturei	749
Arabische kukumer	181	Capbohnen	170
Argemone mohn	А •	Catappenbaum	۲۳
Arsen	<b>٩٧</b>	Catjang.	141
Asiatischer hahnenfuss	۲۷	Chinesische beifuss	٥
Äthiopischbanane	۲۳۳	Christdorn 171	111
Athiopischer pfefferbaum	708	Christdornbrustbeere	111
Aufputschendwurzel	127	Colocasie	177
Azarolbaum	1 • •	Cretisch astragel	11
Azaroldorn	1 • •	Cubebenpfeffer	
Balsam	٣٤	Cypressengarbe	٠ ٣
Barett	۲۲7	Doldenheidelbeere	177
Beete	114	Doppelklappen	0
Benedikten carbenia	171	Dornigesumach	114
Berberische akazie	178	Dreilaubsumach	111
Bergsaturei	72.	Drüsenalbizziabaum	17
Bhelbaum	27	Ebenhagedorn	1 . 1
Bisamkürbis	177	Echte blattwarz	177
Blauageratum	ΥΥ	Echte Kastanie	۱۸۸

Echte kuhblume Y & V	Gerste	140
Echte löwenblatt A\	Giftsumach	119
Echter diptam A &	Glattes weissdorn	1 . 1
Echter gamander \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Goldblatt kastanie	119
Echte schuppenwurz A9	Grosser moosebeere	100
Echtes glasschmalz \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	Grosses johanniskraut	۸۳ .
Edelgarbe	Grundheil	. 14
Edle garben	Gustardappfel	148
Eiskraut - Mittagsblume \ \ \ 7	Haarigbasilienkraut	
Erdmandel \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Harngriebgras	
Erdmandelzypergras\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Hasenklee	
Eselpfefferkraut Y & •	Hasenpfötchenklee	737
Europaïsche spindelbaum ۲۲٦	Heilbrot	
Farbereiche	Heiltrank	. 17
Feldklee YET	Herbstzeitlose	170
Feldrittersporn\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Hermonischprangos	177
Feldwürze	Holz	
Fester kletternder\V•	Honigapfel	
Fingerhut	Hornkümmel	
Fistelartig Kaïseraffodill YA	Indianischer nussbaum	747
Fistelartig kaïserscepter YA	Inga	. 77
Flackskraut	Jamaïque stechwinde	
Flohwegerich Y9	Jujubebaum	
Florida badianenbaum YY	Kainzawurzel	
Florida Hornstrauch ۱۷۲	Kalberkerbel	115
Florida kornelbaum \VT	Kastanienbaum	۱۸۸
Florida korneliuskirschbaum \\\	Kirschentomaten	. 47
Florida sternanisbaum YY	Klapperschlange weissen	
Forstziest \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	kreuzblume	. ٤١
Frauenflachsleinkraut Y.T	Kleine kastanienbaum	119
Gartenquendel	Kleines löwenmaul	١٢٨
Garten raute ۱۱۱	Kletternder der Libanon	١٧٠
Gebirgpsesserkraut Y & •	Knoll - sellerie	110
Gelber hasenklee Y•Y	Knollige ziest	118
Gelber nabelkraut\Y	Kochie	198
Gelee Y.o	Kohlrabiselleri	110
Gemeiner natterkopf		747
Gemeines nabelkraut	Korsischmoos	181
Gemeines steckenkraut		17.
Genfer günsel 101		749
0		•

Lauch	Rahmapfel \V &
Lauchgamander \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	RanunkelV7
Leber balsam Y	Raute
Leinkraut Y.T	Rhabarber 4.
Libanesin sinngrün ٢0 ξ	Rittersporn\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Limabohnen	Rotminze Y & T
Lorbeerschlinge	Rübenkälberkropf \\ \ \ \ \ \ \
Löwentrapp A\	Salbeiäpfel \V &
Löwenzahn Y & V	Salzkraut\0
Lucienholz Y•V	Sandarachbaum
Malaguetta Y £ ٦	Sandbücksenbaum Y & 9
Malaguettapfeffer Y & ٦	Sandflohwegerich ٣١
Manioka YT1	Scharfe fetthenne VV
Margoza \. \. \. \. \. \. \.	Schlaugengurke \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
März - veilchen TA	Schmuckaloë
Mauerpfeffer VV	Schnittlauch 1 • 9
Meer - rettig	Schwammbaum \\Y\\
Melonenbaum 70	Schwarzspindelbaum YY0
Mohrenpfeffer Yog	Selleriak \\^o
Moschuskürbis	Sesam 119
Motten safran 170	Seyal akazie \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Muskateller salblel NVV	Skordion 187
Muskatsalvei \\VV	Skorpionkronwicke Y
Mutterkorn 7	Sommer - cypresse 198
Nabelkraut \\Y	Sophia wegerauke \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Nierenbaum	Spanischereiche 177
Ollinge 119	Spitzwegerich 14V
Orangen melone YEA	Springwolfsmilch\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Palästina skabiose \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Stachelmohn
Papayabaum Yo	Stecheiche 177
Paradiesbanane YTY	Steifgebenedeite 70
Paternosterkraut \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Steinweichsel 7 · V
Pernodholz 177	Stinkende Osterluzei 47
Persisch cyclamenveilchen 77	Südlicher stechdorn \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Pfaffenhütchen Y77, Y70	Süssbaumartig basilienkraut 19
Porree	Süsses basilienkraut 79
Priester kappe. YY7	Süsskirsche \\\X
Purgierkroton \AV	Syriendost. 177
Purpurspindelbaum YYo	Tabak oY
Purpurveintebe \\All	Talchhaum

Tamarindenbaumo	O Weichselkirsche Y•V
Tamariske	۱ Weinrebe۱۸٦
Tayuya	Y Weisser diptam Λξ
Thymianquendel	۷ Weissergensangwurzel ۱۳
Tomaten ٣	7 Weisserkaïseraffodill YV
Traubenförmige \V	9 Weisserkaïserscepter YV
Trauergarbe	Wilder kälberkropf\\\\
Turbith	٤ Wilder Kerbel ۱۱۳
Übelriechend hohlwurz 9	7 Wildminze Y & Y
Veilchen ٣	A Wilhelmgarbe ξ
Venusnabelkraut	Υ Wolligergarbe ξ
Verflochtenfrücht albizzia	V Wolliges spornblatt 1VY
Verstandgras\	9 Wundklee Y.Y
Viereckigpassionsblume	V Wurzelstielsumach \ \ 9
Viperblume	ξ Zachunbaum ΥξV
Wacholder strauch	V Zederach
Waldziest \\	o Zerbrechlichnessel 179
Wasserbraunwurz	Y Zuckerapfel\VY
Wassergamander \ \ \ \ \ \	Zuckerkürbis ۱۷۲
Wasser minze Y &	Zypergras١١٦
Wasser peterlein	٦

#### ٥- مسرد لاتينيّ

Abrus precatorius	Andira araroba \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Acacia farnesiana ۱۲ 8	Andropogon hirtus Y \
Acacia gummifera ۱۲ ξ	Andropogon hirtus var.
Acacia mellifera ۱۲ ξ	pubescens Y \
Acacia seyal\Y &	Androsæmum officinale AT
Achillea atrata ٣	Anhalonium Lewinii 0 •
Achillea eriocarpa £	Anhalonium Williamsii 0 •
Achillea fragrantissima ٣	Annona reticulata \V &
Achillea krascheninnikovii {	Annona squamosa
Achillea nobilis ٣	Anthriscus sylvestris \ \\T
Achillea santolina {	Anthyllis prior Y•Y
Achillea teretifolia §	Anthyllis vulneraria Y•Y
Achillea Wilhelmsii	Antirrhinum orontium \YA
Aconitum variegatum	Antirrhinum spurium \YA
Aegle marmelos	Apium graveolens var. rapaceum. \\0
Agave fœtida٣٩	Argemone Mexicana
Ageratum conyzoides	Aristolochia cymbifera 97
Ajuga genevensis\o\	Aristolochia fœtida 97
Albizzia glandulosa\	Arsenicum 9V
Albizzia streptocarpa \V	Artabotrys odoratissimus ۲0٦
Allium schænoprasum 1 • 9	Artemisia chinensis
Aloë abyssinca Y•	Artemisia species ۱۲۰
Aloë camperi Y•	Asphodelus albus YV
Aloë elegans Y•	Asphodelus fistulosus
Aloe linguæformis \YV	Astragalus creticus\\
Aloë peacockii Y	Astragalus massiliensis
Alsidium helminthocorton \ \ \	Astragalus tragacantha
Amomum granum paradisii 727	Balanites ægyptiaca Y & V
Amomum meleguetta 7 £ 7	Bassia longifolia
Amylum maydis Y & Y	Benthamia florida \VY
Anacardium occidental	Beta bourgæi \\\

Beta macrocarpa	Convolvulus turpethum o {
Bryonia tayuyia o Y	Cornus florida \VY
Butyrospermum Parkii	Coronilla scorpioides ۲۱
Cajan inodorum\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Corydalis bulbosa \V•
Cajanus cajan \A\	Corydalis libanotica \V•
Cajanus indicus\\	Corydalis solida var. brachyloba \V.
Caladium bicolor ۱۸۹	Cotyledon\Y
Caladium esculentum \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Cotyledon lusitanica\Y
Callitris quadrivalvis 177	Cotyledon lutea \Y
Cananga odorata	Cotyledon umbilicus ١٣
Carbenia benedicta	Cotyledon umbilicus - Veneris \ Y
Cardamomum longum Y & 7	Crassula minor VV
Cardamomum medium Y & ٦	Cratægus azarolus
Cardamomum zeylanicum ۲٤٦	Cratægus lævigita \•\
Carica papaya Yo	Croton tiglium\\
Cartamus lanatus\\Y\	Cryophytum crystallinum \ \ \ \ \ \
Cassuvium pomiferum TT	Cubeba officinalis
Castanea pumila\	Cucumis chate \\ \\ \X
Castanea sativa \\	Cucumis flexuosus
Castanea vulgaris\	Cucumis melo var. Chate \ \ \ \
Castanopsis chrysophylla\	Cucumis melo var.flexuosus \ 14
Cerasus avium \\\\\\\\\	Cucumis sativus var. flexuosus \74
Cerasus mahaleb Y • Y	Cucurbita moschata\VY
Chamædrys \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	Cucurbita pepo
Chærophyllum bulbosum \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Cudrania Javanensis
Chenopodium scoparium 198	Cudrania tricuspidata \ 0 •
Chicocca anguifuga ۱۷۹	Cyanophyceae
Chicocca brachiata	Cyclamen coum
Chlorophyceae \V	Cyclamen hederæfolium ٢٦
Cinchona calisaya 197	Cyclamen latifolium ٢٦
Cirsium arvense Yo	Cyclamen macrophyllum ٢٦
Cnicus arvensis	Cyclamen persicum
Cnicus benedictus	Cyclamen punicum ٢٦
Cochlearia armoracia	Cyclamen pyrolæfolium ٢٦
Cocos nucifera	Cyclamen vernum \٣•
Colchicum autumnale ۱۲٥	Cyperus alopecuroides\\\\
Collutoria\\0V	Cyperus esculentus
Colocasia antiquorum ۱۷٦ , ۱۷٥	Cytisus cajan ۱۸۱
Colocasia esculenta	Dactylorhiza maculata \ \ •
Consolida regalis	Delphinium consolida \\\$V

Descurainia Sophia	Illicium floridanum YY	
Dictamus albus	Ipomœa orizabensis\\\\	
Dictamus fraxinella	Ipomœa simulans	
Digitalis purpurea	Ipomœa turpethum 0 {	
Echinocactus Lewinii 0 •	Kickxia spuria ۱۲۸	
Echinocactus Williamsii 0 •	Kochia scoparia 198	
Echium vulgare	Lathræa clandestina A9	
Elettaria major Y ٤٦	Lecanora affinis V\	
Euonymus atropurpureus YYO	Lecanora esculenta V	
Eupatorium purpureum \71	Leontice leontopetalum	
Euphorbia lathyris\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Leontodon officinale Y & V	
Euphorbia lathyrus \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Leontodon taraxacum Y & V	
Euphorbia spongiosa	Linaria spuria\\\\\\\\\\\	
EverniaV1	Linaria vulgaris Y.T	
Evonymus atropurpurea ۲۲٥	Lonicera alpigena\\YA	
Evonymus europæus ۲۲٦	Lonicera webbiana\\YA	
Evonymus vulgaris ۲۲٦	Lophophora Williamsii 0 •	
Fecula Y E \	Lycopersicum esculentum ٣٦	
Ferula communis	Maclura aboinensis	
Fumaria bulbosa var. solida \V•	Maclura tricuspidata	
Furcræa gigantea ٣٩	Majorana syriaca ۱۳۸	
Galanthus Y & &	Manihot	
Geissospermum vellozii ۲٥	Manioc aipi YT1	
Gentiana Lutea 18	Manioc utilissima	
Geum canadense	Melia azedarach ۱۰۳	
Geum strictum	Mentha aquatica YET	
Gigartina helminthocorton \ \ \	Mentha canescens Y & Y	
Glycyrrhiza glabra var.	Mentha hirsuta YET	
glandulifera \ Y 7	Mentha microphylla Y & Y	
Glycyrrhiza glandulifera \ \ \ \ \ \ \	Mentha rotundifolia YET	
Gossypium iodatum ۱۷٥	Mentha sieberi Y & Y	
Gummi laccae Y • •	Mentha sylvestris var.	
Halzebia æthiopica Yo §	stenostachya Y & Y	
Heuchera americana Y 8 9	Mesembryanthemum crystallinum \ \ \ \ \	
Hordeum vulgare ١٣٥	Micromeria thymbra ٢٣٩	
Hura crepitans Y & 9	Mimosa farnesiana ١٣٤	
Hyoscyamus Falezlez ٣٦	Musa ensete YTT	
Hyparrhenia hirta Y \	Musa paradisiaca YYY	
Hypericum Androsæmum AT	Muscus marinus \ \ \	
Ilex cassine YoV	Nemuaron Vieillardii \٣٢	

Nicotiana tabacum o Y	Quercus hispanica 177
Ocimum pilosum 79	Quercus ilex \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Ocimum suave	Quercus tinctoria ۱۲۳
Origanum maru \\\\\\\\\\	Quercus velutina\\Y\\mathfrak{Y}\mathfrak{T}
Origanum syriacum \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Quillaja saponaria molina 19.
Ornithopus scorpioides ۲۱	Quillaja smegmadermos 19.
Oxycoccos macrocarpa	Ranunculus asiaticus V7
Paliurus aculeatus \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Resina lentisci YYŁ
Paliurus australis ١٣١	Rhamnus paliurus ۱۳۱
Paliurus spinachristi ۱۳۱	Rhamnus spina - Christi \\\
Panax ginseng	Rhamnus tripartita\\\
Papaver argemone	Rhamnus Zizyphus \o &
Papaya carica	Rheum
Passiflora quadrangularis \V	Rheum palmatum 9Y
Paullinia cupana\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Rheum palmatum L. var.
Paullinia sorbilis\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	tanguticum maxim 97
Pereira Yo	Rheum rhabarbatum L 91
Peucedanum palustre 1 • 4	Rhodophyceae
Phaeophyceae\	Rhus oxyacantha ۱۱۸
Phaseolus lunatus 170	Rhus radicans 119
Piper cubeba	Rhus tripartita\\\\
Pithecolobium anareinotemo YV	Rumex orientalis ٧٤
Plantago afra L. 1762	Rumex patientia ssp. orientalis V &
Plantago arenaria waldst. et	Rumex pulcher V7
kit٣1	Ruta ۱۱۱
Plantago lanceolata ۱۹۷	Ruta graveolens \\\\
Plantago psyllium ۲۹	Ruta hortensis \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Polygala senega	Salicornia europæa\0
Polygonum dumetorum \V\	Salicornia herbacea\0
Polygonum tinctorium YY	Salvia pomifera ۱۷٤
Populus balsamiferaVV	Salvia sclarea
Poterium compactum TY	Satureia montana Y & •
Poterium gaillardoti	Satureia thymbra YT9
Prangos Hermonis 177	Scabiosa palaestina\\\\\\\\\\\
Prangos meliocarpoides	Scrofularia aquatica
var. trachonitica ١٣٦	Secale cornutum
Prunus avium	Sedum acre VV
Prunus mahaleb Y • V	Sedum anglicum VV
Quercula \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Sedum tertium
Ouercus ballota 177	Selinum palustre \ \ • 4

Serratula arvensis Yo &	Thymus graveolens YY	
Sesamum indicum 119	Thymus tragoriganum YY	
Sesamum orientale	Thymus vulgaris 9V	
Sesamum radiatum 119	Tithymatus lathyris \ \\\	
Sisymbrium Sophia 179	Trianosperma tayuya o Y	
Sium latifolium ۱۸٦	Trifolium arvense Y & Y	
Smilax sp\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Typha latifolia { \	
Solanum lycopersicum ٣٦	Umbilicus 17	
Sphærococcus helminthocorton \ \ \	Umbilicus erectus\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
Stachys sieboldii \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Unona æthiopica ٢٥٤	
Stachys sylvatica	Unona odorantissima Yoʻ	
Stachys tuberifera\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Unona piperita Yo &	
Strychos nux vomica 177	Urechites suberecta ٢٣	
Tamarindus indica	Urtica fragilis \ \ 7 9	
Tamarindus officinalis	Vaccinium corymbosum \VV	
Tamarix gallica	Viburnum tinus	
Taraxacum dens leonis Y & V	Vinca herbacea var. libanotica Yo &	
Taraxacum kurdiciforme Y & V	Vinca libanotica Yo &	
Taraxacum laxum Y & V	Viola odorata ٣٨	
Taraxacum officinale Y & V	Vitis vinifera (vigne) var.	
Taraxacum officinarum Y & V	purpurea (Teinturier) ١٨٦	
Taraxacum vulgare Y & V	Ximenia ægyptiaca Y & V	
Terminalia catappa ٢٣	Xylopia æthiopica ٢0 ٤	
Tetraclinis articulata ۱۲۲	Zizyphus jujuba 108	
Teucrium chamædrys \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Zizyphus officinarum \o &	
Teucrium scordium ssp.	Zizyphus sativa 108	
palustre 187	Zizyphus spina - Christi \ \ \ \	
Thuya articulata 177	Zizyphus vulgaris \0 {	

#### مسارد الملاحق

- ١ مسرد عربيّ
- ۲- مسرد فرنسي
- ٣- مسرد إنجليزي
  - ٤- مسرد لاتيني

### ۱ - مسرد عربيّ

آجيسارين	770	الْتِهابُ الإصْبَع٣٠٢	
آلامُ المَعِدَة	4.4	الْتِهابِ الحَنْجَرَةِ	
آلاميّات	171	الْتِهَابُ حُوَيْصَلَة الصَّفْراء٣١٧	
أَثْلِيَّاتأَثْلِيَّات	1771	الْتِهاب شُعَبيّ رِئَويّ	
أَخْدَريّة زَعْفَرانيّة (دهن الـ)	YV9	التِهاب العَفَجالتِهاب العَفَج	
أخيليا ظريفة (دُهن)	770	الْتِهَابُ القَرْنِيَّة٢٩٩	
أخيليا مُنعِشة (دهن الـ)	7.7	الْتِهابِ القَصَبَاتِ والرِّئَة٣١٥	
أُرَا <b>ق</b> أ	799 , 797.	التهاب قَنُوات الصَّفْراء ٣١٠	
أَرَالِيًّاتأَرَالِيًّات	771	الْتِهابِ الكُلْيَةِ	
أرْغُوت (زيت الـ)	777	الْتَهَابُ كُلْيَةَ مُزْمِن٣١٥	
أَرَ <b>ق</b> أَرَق	Y97	الْتِهَابُ اللَّوْزة	
أريغارون (دُهن الـ)	777	الْتِهَابُ المَرارَة٣١٧	
أزُوْتيرياأ	۳۱۳	التهابُ الوِعاء اللِّمْفَاوِيّ٣٠٢	
أزُو تِيمِيا	414	أَلَمُ الرَّأْسِ	
أَسِتُونيمياأ		أَلَمُ القَطَنأَلَمُ القَطَن	
أَسْحِيَةأَسْحِيَة	٣٠٣	أَلَمُ قَطَنِيِّأَلَمُ قَطَنِيِّ	
أسود الدّرّاقة	YA •	ألْوِينأ٢٦٨	
أطُومأ	<b>TVT</b>	أُمُّ الدِّمَاغِ	
أقاسيا	۲٦٥	أُمُّ الرَّأْسِ٣٠٣	
أكونيتأكونيت	Y70	أَمْبَريالين	۳۸۳

إِنْتَانِيَّة (حالات)	أَمْراضٌ تَناسُلِيَّة٣٠٢
إِهْلِيلَجِيَّات ٢٦١	
الإياس	أُمُودُول٢٧٢
إِياسُ الذَّكَرِ	أمُودين
إيلانْتِين٢٦٧	أمُورفيجانين٢٦٨
احْتِشَاء عَضَلَة القَلْبِ ٢٩٥	أمُورفِين٢٦٨
ارْتِفَاعُ الضَّغْطِ٢٩٢	أنيمونين٢٦٨
اسْتِثارِيَّة٢٩٨	أهْوايين
اسْتِسْقَاءقاء ٢١٢ ، ٢٩١	أَوْجَاعُ المَعِدَة
اسْتِسْقاءٌ بَطْنِيّ	أُودِيما السّاق
اسْتِسْقاءٌ عام م	أُوْذِيما السّاق
اسْتِسْقاءُ المَفْصِلِ	أورِين
اسْتِسْقَاءٌ مِفْصَلِيّ٢٩١	أوليانْدرين بُوارِنْجَر
اضطراب كَبِدِيّ	أولِيَنْدرين
اعْتِلال كَبِدِيّ	أَيْدٍأيْدٍ
اعْتِلالٌ مَفْصليّ٣١٢	أيلاتَرينُوسيد
انْتِفاخُ البَطْن	أَيْلَكُٰزَنْتين٢٧٥
انْحِلالُ الخَلِيَّة٣١٩	أَيْلَكْسِيك
انْذِئاف٢٩٨	إِدْمَاءَ وَافِرِ
انْسِمام	
انسِمام بالبنزين ٣١٤	إِرْضَاعٌ
انْقِطاعُ الحَيْض	إِرْقَان٢٩٣
انْقِطاعُ الطَّمْث ٣٠٧، ٣٠٣	إزْدَرَخْتِيًّات
پاتان غيپاتان غي	إِسْهال
باتيفُولين	إصَابَة بَوْلِيَّة
بَاذِنْجَانِيًّات	إِلْبَانٌ
پَارَاسَلْس (فیلیبوس أوریلیوس	إِنْتَانٌ بَوْلِيّ١٩٥

پلاتین دوکرِیمون۳۲۵	تيوفراستس بومباست ڤون
بَلْسَمِيّ	هوهنهایم
بَلْسَمِيّة	پارِیه أَمْبرواز
پلُو مبيه (الأب شارل) ٣٢٧	بَاسُور۲۸۹
پلِیْن القَدیم۳۲٦	بَايونِين
پلينُس الأَصْغَرالأَصْغَر علينُس	بَباظين
بَنْزُولِيّة٣١٤	بَبَّاياوِيَّات٢٦١
بَنَفْسَجِيَّات	يّيايين
بَهْشِيًّات	بَتْشُولي (دُهن ال)
بَوَاسِيْر۲۸۹	بَتُولا (قشرة)٢٦٨
بُوْصِيَّة	بَثْرُ المَطَاوِي٢٩٨
بُوْطيَّات٢٦١	بُحَّة
پول داجين	بَخَر
بَوْلُ الدَّم	بَدَح (شَمْع اله)
بَوْلٌ دَمَوِيّ٢٨٨	پَرافِين
بَوْلُ السُّكَّرِ	بَرْبَرِيسِيًّات
بَوْلٌ سُكَّرِيّ٢٨٥	برغاميول
بُولُوغالِنيَّات	برغَموت (دُهن الـ)٢٦٨
پوٽي سيمون	پَرْقِنْسِين
بَيْلَازُوْتِيَة ٣١٣	بِرْ كِيَّات
بَيْلَةٌ دَمَوِيّة٢٨٨	
بَيْلَةٌ سُكَّرِيَّة٢٨٥	بَرِيلًا (دهن الـ)
بِيْلَة غلُوكُوزِيَّة٢٨٥	بَرِيلًا (زيت الـ) ٢٨١
بَيْلَسان صغير (دهن أوراق الـ) ٢٧٥	بَصَل (دُهن الـ)
بَيْلُون	بَطْبًاطِيًّات
تَأَسْتُن الدَّمتأسَّتُن الدَّم	بُطْمِيَّات٢٦١
تَبَنْزُنتا	پَلَاتيارِين

	تَبْيُوكَة٢٨٤
تَيُوفراست٣٣٢.	تَتَرُّب الرِّئَة القُطْنِيِّ٣١٦
ئرٌّ أَبْيَض	تَثَاوُب تَثَاوُب تَثَاوُب تَثَاوُب تَثَاوُب تَثَاوُب تَثَاوُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَي
	تَخَلُون الدَّمتخَلُون الدَّم
جَشَر	تُخْمَة ٢٩٥
جَعْفِيْلِيًّات٢٦١	تَرَبُّلتَرَبُّل
جَفَاف	تروتولا
	تروسّو أرمان
	تَرِيَّةترِيَّة
	تَسَمُّم
	تَسْمِيْط
	تَسْوِيم٢٩٨
	تَصَلُّب تَعَصُّدِيتَصَلُّب تَعَصُّدِي
حَازُوقَة٢٩٠	تَصَلُّب عَصِيديِّت
حاسِم	
حافِز	
حافِظَة (نَقْص، مُصور)٣٠٣	
حَالَ الخَلِيَّة	
حَالَةٌ لِمْفِيَّة	
حامِز	تَغَوْلُن الدَّمتعَوْلُن الدَّم
حامِض ٢٦٥	تَكَحْلُل الدَّم
الحَبُط	
حَبَن	تَنْتُرُجُ الدُّم
حِرّيف۲٦٦	تَنَكُّسُ المَفْصِلِ
حَشَرات	تَهَيُّجِيَّة
حَصَف	
حُصَيَّة	تُورْنَفُور (جوزف)

<ul> <li>فَيْمِيّات</li> <li>المُ برايْط</li> <li>۲۸۲</li> <li>المَفاصِل</li> </ul>	حَمَلِيّات
اءُ برايْط	حُلْباء (زیت ال) ۲۷۳ م حِمْحِمِیَّات ۲۲۱ م حَمَلِیّات ۲۲۱ م حِنطة (زیت ال) ۲۲۹
اءُ الحَصَاة	حِمْحِمِيَّات
اءُ الحَصَاة	حِمْحِمِيَّات
اءُ المَفاصِلا	حَمَلِيّات
اءٌ مَفْصِلِيّا۳۱۲	
اتورة (زیت ال)	حَوْذَانِيَّات (سبط شَقِيقِيَّات) ٢٦١
اذِيًّات	حَيْرَة٣١١
اغلیناغلین	حَيْوَنَة٣١٥
الُوزِينا	ختّ أَسْفَع٢٦١
بِباغ ۲۸۳	خُثَيًّات حُمْر
وِبْسَاسِيًّات	خُراج بارِد
اِبْغ	
799	خُراج حادّ
يُراق	خُرْطُون
ذُرَاقٌ جُحُوظيّ	خَزَبُ الرِّجْلِ٢٩٨
	خَزْرَة
دُرَّاقَةَ (دُهن الـ)دُرَّاقَة (دُهن الـ)	خَشْخَاشِيَّات
	خَلَنْجِيًّات
دريوفَنْتِيندريوفَنْتِين	خُلُّونِيَّة الدَّم
دِفْلِيَّاتدِنْ لِيَّات	خَمَجٌ بَوْلِيّ
_	خَنَازِيْرِيَّات٢٦٢
	خُنَاقٌ صَدْرِيّ
	خُنْثَوِيَّة
	خُلْشِيَّة
	خُنُوثَة
دهن أقاسيا	خُنُوثَةٌ أُنْثَوِيَّةً كاذِبَة٣٠٩

YAY

رَ قُص	دهن أقاسيا كاذبة
	دهن البرغموت الاصطناعيّ٢٦٨
رُكُود خَلَوِيّ	دُهن الشمار
رُ مَالٌ بَوْلِيّ	دهن عشبة الشمار
رُمَالٌ صَفْر اوِي	دُهن النّارَنْج
رَمْلُ بَوْلَيّ٢٨٦	دِيبًّل (زيت - الحيوانيّ)۲۷۲
رواليوس (جان روال)	دِيتامِين
روجيه دي ساليرن	دِيسْتِيرِيا
روزىيه	دِيكا (زېدة)
رُوماتِيزم نِقْرِسِيّ	دِيُوْسْقُورِيَّات٢٦٢
ریکامییه (جوزف کلود أنْثَلم) ۳۲۸	ذَأَبِذَأب
زالِخَة (زيت)	ذَأَبَةذُر
زُحار	ذاتُ الرِّئَة القَصَبِيّة
زَدْوار (دُهن الـ)	ذات القناة الصَّفراويّة٣١٠
زَرَاوَ نُدِيًّات٢٦٢	ذَاكِرَة
زَفَن	ذَبائِح
زُكَامزُكَام	
زُلالتي (ماء)	
زُلَّخَةزُلَّخَة	رابولیه فرانسوا
زَنْبُقِيّات٢٦٢	راتافیا
زُنبُور	راسَن دَبِق
زَنْتُوسترومارين۲۸٤	راسَن عِطريّ (دُهن الـ)
زَنْجَبِيْلِيًّات ٢٦٢	رافَنْسارا عِطريّة (دهن)۲۸۲
زِنْزَلَخْتِيّات ٢٦٢	رَبِيْعِيَّات
زِيَادَة سُكَّر الدَّم٢٩١	رُحَضَاء
زيت النَّبْق	رَسْبَايّ فرانسوا
زَيْتُونِيَّات٢٦٢	رَغَسْترول

سَلْسُولين٢٨٣	سَابَنْدِيّات٢٦٢
سَلَعَة٠٠٠	سائحو
سَلَعَةٌ جُحُوظِيَّة٣١٤، ٢٨٥	ساڤینییه (مرکیزة دو)۳۳۱
سَلْقَان٢٨٣	سالِسيلات۲۸۲
سَمْبُوسِين٢٨٣	ساليرن (مدرسة)
سَمْسَقِيًّات٢٦٢	سَبُّوْ تِيَّات٢٦٢
	سْتُورْك
سَنْتَالِين ٢٨٣	سِحاءَة
سَنْط	سُحَار قُطْنِيِّ
سَنْطِيَّات (قبيلة)	سُحَافُ الدَّمِ
سُهَاد۲۹٦	سَحَايا ٢٠٣
سُهْد۲۹٦	سَخْج٢٩٨
سُوءُ الهَضْم٢٩٥	سَحْلَبِ
سْوَان أوغُسْت	سَحْلَبِيَّات٢٦٢
سَوْمَلِيَّات٢٦٢	سُدَادُ عَضَلَةِ القَلْبِ ٢٩٥
سِيدِنْهام توماس٣٣٢	سَذَابِيًّات
سَيرَ (أُوليڤييه دو) ٣٣٠	سُرْعَة الغَضَب
سَيَلَانن۳۱۵	سَرْ مَقِيًّات٢٦٢
_	سَرْوِيًّات٢٦٢
سَيَلان مُخاطِيّ٣١٥	سَرْوِيَّة٢٦٢
سَيَلانٌ مَهْبِليّ أَبْيَض	سُعْدِيّات
شَحْمِيًّات	سَفْرَسِيَّات٢٦٢
شراب الأكونيت	سِقْي
شَفُوِيًّات٢٦٢	سُکْر۲۹۸
شَمار ۲۷۳	سَلْجَم (زیت ال)
شُمرة	سَلَسُ البَوْل
شَوَاة	سَلَسٌ بَوْلِيّ٢٩٥

790	شُومار (ماء الـ) ٢٧٣ عَجْر
ز جِنْسِيّ	شُيْلُك (زيت ال)
زٌ حَلِيبيّڙُ حَلِيبيّ	صابُونِينمابُونِين عُجْ
زٌ كَبِدِيّ	صَبّارِيَّات ٢٦٢ عَجْ
	صبغة الأكونيت ٢٦٦ عَدَهُ
ن (صمغ)	
رُ التَّصْوِيترُ	
رُ الْهَضْمرُ الْهَضْم	صُفَّار ٢٩٣ عُسْر
ادا۲۱۲	
ر	
ج	صُقْلابِيَّات ٢٦٣ عُفا
ص ٢٨٣	صِلّ ٣١٨ عَفْم
ولَة الأغْشِيَة المُخاطِيّة٢٩٠	صَلبِيّات
ى لَوْنِيّ	صَنْدَلِينمئد
٣٠١	
Y 9 o	
د ثِقاب ۲٦٧	•
ون العِطر (دهن)۲۷٤	ضَعْفُ السَّمَع ٢٩٣ عَيْهُ
قَدِيَّات٢٦٣	ضَعْف كَبِدِيّ ٢٩٠ غَرْةَ
يًّات (قبيلة مُركَّبات)۲٦٣	ضُمور غَفْثِيْ
طارية	الضَّهَى ٣٠٧، ٣٠٣ غُلْم
سويتَن (جيرار)	ضِيْق ٣١١ ڤان
ل الخيل (زيت)	طَنَّغِين ٢٨٣ فجا
يُوْنِيَّات٢٦٣	طَنْغِينِينظُغِينِين
لَمْ تَنَتَّرُجِ الدَّملا تَنَتَّرُجِ الدَّم	طَيُّون (دهن الـ)ظيُّون (دهن الـ)
ط التَّوَتُّرط	ظُهْرِيَّاتظُهْرِيَّات
لُم حَمْضِ الكلُورْهِيدْرِيك٢٩١	ظَهِيْرِيَّات هي الظُّهْرِيَّات٢٦٣ فَرْمُ

	فَرْطُ الحُمُوضَة٢٩١
قُوْ نُوْسِيًّات٢٦٣	فَرْط سُكِّر الدَّم٢٩١
	فَرْطُ العَرَق
قِشْدِيًّات ٢٦٣	فَرْط الكلُورِيدِيَّة٢٩١
	فَرْطُ المَوادّ النَّيْتُرُوْجِينِيَّة في الدَّم ٢٩١
	فَوْ نُو نِين ٢٨٤
	فَرْوَة الرّأس
قُصُورُ الكَبِد	فُصال ۳۱۲
قُطان	
قِلَّةُ الشَّهْوَةِ لِلطَّعامِ٢٩٥	فُقاسفُقاس
قَلَققَلَق	فِلْفِلِيَّاتِ ٢٦٣
قُلْقَاسِيَّات ٢٦٣	فُوَاق
قَمْح	فَوْ قَسِيَّات٢٦٣
قَمَةُ٥٩٢	فُوِّيًات ٢٦٣
قَنْتاريدين	في صِحَّتك ٢٨١
قَنُوِيّات ٢٦٣	فيتاغُورس
قَهُمُّ ٢٩٥	
قُوْ باء ٢٩٥	قَابِلِيَّةُ الْإِثَارَة٢٩٨
قَيْءُ دَم٢٨٧	قَاتِيًّات
قَيْقَب (سُكّر الـ)	قارِيَة (زيت الـ)
کار ابین	قُرَّ اصِیَّات۲٦٣
كافور الأنيمون	قَرَّ اض
كامازولان	قَرْع
كامَلِّين	قَرْعِيَّات٢٦٣
كاملين (زيت الـ)	قِرْفَة بيضاء (دهن) ٢٧٠
كاميليا (زيت ال)	قرفة (دهن الأوراق)٢٧٠
كَبْراشو (مُستخلَص)	قِرْفَة (دهن قشور الـ)٢٧٠

لَبْلابِيًّات٢٦٣	كِبْريتَة٢٦٧
	كُثيراء
	كُحولتور الأكونيت٢٦٦
	كُخُولِيّة
لَوْشَبلوْشَب	كُحُولِيوِياً
لُوْغَانِيًّات٢٦٣	کراپین
مارْزُوَ انِيًّات٢٦٣	كَرْساتِينكُرْساتِين
ماسِط	كَرْمِيًّات٢٦٣
مامیثا صفراء (زیت ال)	كِلْسِيميا
مُبَوِّل	كَمْبَستارول
مُبِيْل	کناري (زیت)
مَثَن	كناريوم (دُهن)
مُثِيْرٌ للشَّهْوَة	كندا (بَلْسَم) ٢٦٩
مَحْرُوم المِلْح	کندا (معجون)
مَخْزَن	
مَخْزَنتي	گوراساو
مُخَلِّدَات٢٦٣	
	كُورِيا سِيدَنْهام
مُدِرَ للبَوْلمُدِر للبَوْل	كُورِيا هَنْتِنْغَتُنكُورِيا هَنْتِنْغَتُن
مَذُح٨٩٢	كُوْليرا
مُرّان (زیت ال)	لادَن
مَرْدَكُوش (دُهن الـ)٢٧٨	٧٤٠٠ ٢٧٢
مَرَض بازْدُو ٣١٤	لأذَن (دهن الـ)٢٧٦
مَرَضُ برایْت	٧٠٥
مَرْغُوزا (زيت الـ)	لامِيْنَارِيًّات٢٦٣
مَرْغُوزِيك	لانُولايين٧٧٧
مَوْغُوزين٢٧٧	لانُولين٧٧٧

مُهَيِّج للشَّهُوة٣١١	مُرَكِّبَات٢٦٣
مَوْزِيَّات٢٦٣	مُوْكِدٌ خَلَوِيّمُوْكِدٌ خَلَوِيّ
مُوْنِيْمِيَّات٢٦٤	
مَوَهُ المَفْصِل	
ناريودُورايين	
نارِييننارِيين	
ناشيرناشير	مُسَكِّن
ناعِشناعِش	مُسَهِّل عنيفمُسَهِّل عنيف
نَاعُوْرناعُوْر	مِصْران۲۹۸
نائحوظنائحوظ	مَصِير
نَبْق مُسْهِل	مُضادّ لِسَمّ الأفاعي ٢١٠
نَبْقِيًّات٢٦٤	
نَجِيْلِيَّات ٢٦٤	مِعَى٢٩٨
نَحَافَه ٣٠٢	
نَحْلَة	
نَخْلِیَّات٢٦٤	مَعْنُولِيَّات٢٦٣
	مُفْقِد الأَلَم
نَرْقَال (بَلْسَم) ٢٧٩	مَكّة (بَلْسَم) ۲۷۷
نَزْفنزْف	مَنّ الأشترغار
نَزَقنَزَق	مَناسِين
نَزْلَة وَافِدَة٧٨٧	مَنْجِيفارين
نَسَمَة نَتِنَة	مَنْدراغورين
نَشْوَة٢٩٨	
نُشُوفَة	مَنْزُوعِ الكلُورورِ ٣٢٠
نِصْفِيّات الجَنَاح٢٦٤	مَنْعَظَة
نَعُورِيَّة٨٢	
نَفْتُ الدَّمِ	مُنَقِّمُنَقِّ

وَذَح٩٢	نَفَس نَتِننَفَس نَتِن
وَذَمَةُ الرِّجْلِ	نِقْرِس۲۸٥
وَرْدِيَّات٢٦٤	نَقْصُ الضَّغْطِ الشِّرْيانيِّ٢٩٣
وَرَمٌ دَمَوِيّ	نُكْلايين
وِقاعُ البَهائم	هَالِيَّات (قبيلة زَنْجَبِيلِيّات) ٢٦٤
وَقُرُّ خَفِيْف٢٩٣	هُبُوطُ التَّوَتُّرِ الشِّرْيانيِّ٢٩٣
وِنْتَرغرين (دهن)	هَدَرِيك
يابان (شَمْع ال)	هُرَاع
ياسمين (دُهن ال)	هَرَع
يَبُّرُوحين	هُزَالهُزَال
يَبَس	هِسْتِيْرِيَا٢٩٣
يُبُوسَة	هُلاميّ (مادّة)
يَد	هَمّ
يَدُيْن	هَواءَ أَصْفَر
يَرَقان	هَوَس
يقطين (زيت الـ)	هُومُولُون٥٧٧
يَقْطِينِيَّات٢٦٤	هَيْضَة
يَلانج (دُهن) ٢٧٠	هَيْضَمان
يَنُون	هِيمُوفَيْلِيَة
يُويُو (دُهن الـ)	وَثير
	وَجَعُ الْمَثَانَة

## ۲- مسرد فرنسي

Abats	٣٠٥	Anacardiacées	
Abcès chaud	۰۰۰ ۳۰۵	Analeptique	۸۰۳
Abcès froid	۰۰۳	Analgésique	٣·٨
Abeille	۲۰۳	Analgique	٣٠٨
Acacia	٢٦٥	Anasarque	۳٠٩
Acacia (Ecorce)	٢٦٥	Androgynie	۳٠٩
Acacia (Essence)	770	Andropause	۳٠٩
Acétonémie	۲۰۲	Anémonine	۸۶۲
Achillée noble (Essence)	770	Angine de poitrine	۳٠٩
Aconit	770	Angiocholite	٠ ٣١٠
Acre	٢٦٦	Annonacées	۲7٣
Aden (gomme d')		Antivenimeux	٠٠٠٠٠ ٣١٠
Adragante	٢٦٦	Anxiété	٣١١
Aegicérine	٢٦٦	Aphrodisiaque	٣١١
Ahouaïne	٢٦٦	Apocynacées	777
Aigre	٢٦٦	Aracées	777
Ailanthine	۲٦٧	Araliacées	177
Albumineuse (eau)	۲٦٧	Aristolochiacées	777
Alcoolature d'aconit	770	Arthrose	٣١٢
Alcoolémie	٣·٧	Ascite	٣1٢
Alhagi (manne d')	VF7	Asclépiadacées	777
Alkanna (teinture d')	٧٢٧	Athérosclérose	٣١٢
Allumette	V77	Aurine	YA.
Aloïne	۸۶۲	Azotémie	٣١٣
Amaryllidacées	377	Azoturie	٣١٣
Aménorrhée	٣·٧	Bâillement	٣١٣
Amomées	377	Balsamique	٣1٤
Amorphigénine	۲٦٨	Baptifoline	۲٦٨
Amorphine	۸۶۲	Basedow (maladie de)	٤١٣
Ampélidacées	۲7٣	Benzolisme	٣12
Amygdalite	T. V	Berbéridacées	177

490

Bergamiol Y7A	Cobra TIA
Bergamote (Essence) YTA	Cobrah٣١٨
Bestialité ٣١٥	Combrétacées ۲٦١
Bétula (écorce de) YTA	Composées ۲٦٣
Blé (huile de) Y79	Convolvulacées ۲٦٣
Blennorragie ٣١٥	Cornacées YTT
Boehringer (oléandrine de) 779	Courge (huile de) YV \
Borraginacées ۲71	Crassulacées ۲٦٣
Bright (mal de) Tho	Crépine YV \
Broncho - pneumonie ٣١٥	Crucifères ۲٦٣
Bronchorrhée ٣١٦	Cucurbitacées ٢٦٤ ، ٢٦٣
Byssinose ٣١٦	Cuir chevelu ٣١٨
Cactacées Y77	Cupressinées YTY
Calcémie ٣١٦	Curação YV \
Camazulène Y79	Cypéracées ۲٦٢
Caméline (huile) ٢٦٩	Cystalgie ٣١٩
Camellia (huile de) ٢٦٩	Cytolyse ٣١٩
Camelline Y74	Cytolytique ٣١٩
Campestérol	Cytostatique ٣١٩
Canada (baume du) ٢٦٩	Daltonisme٣١٩
Canada (mastic du)	Danse de Saint - Guy ٣١٧
Cananga odorato (Essence) YV•	Datura (huile de) YV \
Canari (huile de) YV•	Déchloruré ٣٢٠
Canarium (essence de)	Dégueline YV \
Cannacées YTT	Délosine ۲۷۱
Cannelier (essence d'écorces) YV	Delphisine YV\
Cannelier (essence de feuilles) YV •	Dépuratif
Cannelle blanche (essence) YV•	Dika (beurre de) YV\
Cantharidine YV \	Dioscoréacées YTY
Caprifoliacées Y7Y	Dippel (huile animale de) YVY
Caricacées Y71	Dipsacées ۲٦٢
Célastracées	Ditamine YVY
Charbon ٣١٦	Diurétique TY.
Chénopodiacées Y7Y	Drastique ٣٢١
Cholécystite TVV	Dryophantine YVY
Choléra TIV	Dugong (huile de) YVY
Chorée TIV	Duodénite ٣٢١
Chorée de Huntington ٣١٨	Dysentérie
Chorée de Sydenham TV	Dysphonie ٣٢١
Chromothéranie Y\A	Élatérinoside

Émodine	777	Hépatisme	44.
Émodol	777	Herpès des muqueuses	79.
Encrivore	777	Hickory (huile d')	377
Érable (sucre d')	777	Hièble (essence de feuilles d')	440
Ergot (huile d')		Hoquet	79.
Éricacées	777	Houblon (essence d')	200
Erigeron (essence d')	777	Huile de nerprun	277
Essence d'herbe de fenouil	777	Humulone	740
Essence de fenouil	777	Hydarthrose	197
Eupatoriées	777	Hydropisie	191
Euphorbiacées	777	Hyperazotémie	791
Fagacées	777	Hyperchlorhydrie	791
Fenouil (eau de)	777	Hyperglycémie	197
Fenugrec (huile de)	777	Hyperhidrose	191
Ficoïdacées		Hypericacées	777
Fraise (huile de)	274	Hypertension artérielle	797
Frêne (huile de)	377	Hypoacousie	794
Fucacées	777	Hyposystolie	794
Gatillier (essence de)	TVE	Hypotension artérielle	794
Gelsémine		Hystérie	794
Géranium (essence de)	377	Ictère	797
Glycosurie	440	Ilexanthine	740
Goitre	TAO	Ilexique	240
Goitre exophtalmique	440	Ilicacées	177
Gondang (cire de)	377	Impérialine	740
Goutte	440	Impétigo	790
Graminées	377	Impuissance	790
Gravelle	717	Inappétence	790
Grippe	YAY	Incontinence d'urines	790
Guêpes	YAY	Indigestion	790
Haleine fétide	YAY	Infarctus du myocarde	790
Hédérique	TVE	Infectieux (états)	490
Hématémèse	YAY	Infection urinaire	790
Hématomes	444	Insectes (éloigner)	797
Hématuries	YAA	Insomnie	797
Hémiptères	478	Insuffisance hépatique	191
Hémophilie		Insuffisance lactée	191
Hémoptysie		Intertrigo	191
Hémorragies		Intestins	191
Hémorroïdes		Intoxication	191
	•		

Inule odorante (essence d')	200	Mal blanc	. 4.1
Inule visqueuse (essence d')	440	Mal de Bright	. 4.1
Irritabilité	187	Mal de tête	4.1
Ivresse	APY	Manacine	771
Jambes (œdème)	191	Mandarine (essence de)	171
Japon (cire du)	777	Mandragorine	. 441
Jasmin (essence de)	777	Mangiférine	. 771
Jaunisse	799	Margosa (huile de)	TVI
Karabine	777	Margosine	TVV
Kératite	799	Margosique	TVA
Kermès	777	Marjolaine (essence de)	TVA
Kraurosis	799	Maux de ventre	4.4
Labdanum	777	Méliacées Y7Y	177
Labiées	777	Mémoire (déficience)	4.4
Lactation	799	Méninges	4.4
Lactucérol	777	Ménopause	7.7
Ladanum	777	Mesembryanthémacées	777
Ladanum (essence de)	777	Météorisme	4.4
La Mecque (baume de)	777	Mimosées	777
Laminariacées	777	Monimiacées	778
Lanoléine	<b>Y Y Y</b>	Moracées	771
Lanoline	777	Morées	771
Laryngite	۳.,	Musacées	777
Lécanoracées	777	Naucléine	TVA
Lécanorées	777	Nériine	TVA
Légumineuses	775	Nériodoréine	TVA
Leucorrhées	۲.۱	Néroli (essence de)	TVA
Liliacées	777	Nerprun	
Lithiase biliaire	۳.۱	Nerval (baume)	779
Lithiase urinaire	4.1	Noir de pêche	
Loganiacées	777	Œnanthe safranée (essence)	779
Lombric	۳.۱	Officinal	
Lumbago	4.1	Officine	779
Lupus	4.1	Oignon (essence d')	779
Lymphangite	4.4	Oléacées	777
Lymphatisme	4.4	Oléandrine	779
Magnoliacées	777	Ombellifères	777
Maigreur	۲.۲	Orchidacées	777
Mains (entretien)	4.4	Orchidées	777
Maladies vénériennes		Orobanchacées	177

Palmacées Y18	Pythagore T	77
Palmiers Y78	Québracho (extrait) Y	
Papaïne YV9		
Papavéracées		
Papayacées Y71		
Paracelse (Philippus Aurelius Theo-		۸١
phrastus Bombast von Hohen-	Ravenelle (huile de)	۸١
heim YYY		۸۲
Paradis (huile de noix de) YV9	,	٨٢
Paraffine YV4		
Paré Amboroise TYT		44
Passifloracées Y71	Régastrol Y	AY
Patchouli (essence de) YA.	Renonculées Y	
Patin Guy ٣٢٤	Rhamnacées	
Paul d'Égine YYo	Rhodomélacées Y	
Paulli Simon ٣٢٥	Rhumatisme goutteux Y.	۸٥
Pavot cornu (huile de)	Roger de Salerne ٣	
Pêche (essence de) YA.	Rosacées	
Pêcher (huile de) YA.	Rosier (Abbé Jan François) ٣	
Pectique (matière) YA.	Rubiacées	
Pédaliées Y7Y	Ruellius (Jean Ruel) ٣	
Pédalinées. YTY	Rutacées	
Pelletiérine ۲A.		۸۲
Péonine YA•		٨٢
Périlla (essence de)		٨٢
Périlla (huile de)		79
Perloline YA1		75
Pervincine YA1	Salicylate Y.	۸۲
Phœophycées	Salsoline Y	
Pipéracées	Salvène	۸۳
Plantaginacées Y71		۸۳
Platine de Crémone (Baptiste) **Yo		۸۳
Pline l'Ancien (Caius Plinius	Santoline (essence de)	۸۳
Secundus)	·	77
Pline le Jeune (Caius Caecilius). TTV	Saponine	
Plumier (Le Père Charles) TYV	1	۸۳
Polygalées. Y71		77
Polygonacées Y71		77
Primulacées Y77	The second secon	71
Pseudo - acacia (Essence) Y70		۳.

Sévigné (Marquise de) Trotula Trotula	1
Sirop d'aconit	4
Soins August	1
Solanacées YTI Urobiline YA	18
Storck TTY Urticacées Y7	14
Sydenham (Thomas)	4
Tamaricacées	1
Tanghine YAY Violacées Y	11
Tanghinine YAY Violariacées Y7	11
Tanin	3
Tannin YAY Xanthostrumarine YA	٤
Tapioca YAŁ You - you (essence de) YA	3
Teinture d'aconit	. ٤
Théophraste	1
Thyméléacées YT Zygophyllacées YT	
Tournefort (Joseph Pitton de) TTY	

## ٣- مسرد إنجليزي

Acetodemia ٣٠٦	Arterial hypertension Y 9 Y
Alcoholemia Y•V	Arterial hypotension Y 97
Amaryllidaceæ ۲٦٤	Arthrosis ٣١٢
Amenorhœa ٣.٧	Ascites ٣١٢
Ampelidaceæ ۲٦٣	Asclepiadaceæ ۲٦٣
Amenorrhea ٣•٧	Atherosclerosis ٣١٢
Amygdalitis ٣·٨	Azotaemia ٣١٣
Anacardiaceæ	Azotemia ٣١٣
Analeptic ٣٠٨	Azoturia ٣١٣
Analgesic ٣٠٨	Bad breath YAV
Analgetic ٣٠٨	Balsamic T18
Anasarca	Basedow's desease ٢١٤
Androgynism = Androgyneity =	Benzole poisoning ٣١٤
Androgyny ٣•٩	Benzolism ٣١٤
Andropause ٣•٩	Berberidaceae
Angina pectoris ٣•٩	Bestiality ٣١٥
Angiocholitis ۲۱۰	Biliary lithiasis ٣٠١
Angor pectoris ٣٠٩	Blennorrhagia ٣١٥
Annonaceæ Y ٦٣	Borraginaceæ Y71
Anthrax ٣١٦	Bright's disease 710 ( T.Y
Antivenene	Bronchopneumonia ٣١٥
Antivenin "1.	Bronchopneumonitis ٢١٥
Antivenomous ۲۱.	Bronchorrhea. T17
Anxietas ٢١١	Byssinosis ٣١٦
Anxiety ٣١١	Cactaceæ
Aphrodisiac ٣١١	Calcemia
Apocynaceæ YlY	Cannaceæ YTT
Araceæ	Caprifoliaceæ ٢٦١
Araliaceae	Caricaceae
Aristolochiaceæ ٢٦٢	Celastraceæ ۲٦٣
Aroidaceæ ۲٦٣	Chenopodiaceæ Y7Y

1 . 3

Cholecystitis TV	Goitre	. 440
Cholera ٣١٧	Gonorrhea	710
Chorea ٣١٧	Gout	. 410
Chromotherapy TIA	Gouty rheumatism	440
Cobra ٣١٨	Graminaceæ	
Cold abscess Y.o	Gravel	
Combretaceae	Grip	
Compositæ ۲٦٣	Grippe	
Convolvulaceæ Y7	Haematoma	. ۲۸۸
Cornaceæ YTY	Haemoptysis	. ۲۸۸
Crassulaceæ ۲٦٢	Hands (care)	. 4.4
Cruciferæ ۲٦٣	Headache	. 4.4
Cucurbitaceæ ۲٦٤ ، ۲٦٣	Hematemesis	. ۲۸۷
Cyperaceæ ۲٦٢	Hematoma	. ۲۸۸
Cystalgia ٣١٩	Hematuresis	YAA.
Cytolysis ٣١٩	Hematuria	YAA
Cytolytic ٣١٩	Hemiptera	377
Cytostatic ٣19	Hemophilia	
Daltonism ٣١٩	Hemoptysis	
Dechlorurate	Hemorrhage	
Depurative	Hemorrhagia	
Dioscoreaceæ Y77	Hemorrhoid	
Dipsaceæ	Hepatic insufficiency =	. ,,,,
Diuretic	insufficientia	191
Drastic 771	Hepatism	
Dropsy Y91	Hiccough	
Drunkenness Y9A	Hiccup	
Duodenitis 771	Hot abscess	
Dysentery TT1	Hot abscessus	
	Hypericaceæ	
Dysphonia		
	Hydarthrosis	
Ericacea	Hyperazotemia	
Euphorbiaceæ	Hyperchlorhydria	
Exophtalmic goitre ٣١٤ ، ٢٨٥	Hyperglycemia	
Fagaceæ Y17	Hyperglykemia	
Ficoidaceæ ۲٦٣	Hyperhidrosis	
Fucaceæ Y1	Hypericaceæ	
Glycosuria YAO	Hyperidrosis	
Glycuresis YAO	Hypoacousia	
Goiter YAO	Hypoacusis	794

Hyposystole	794	Magnolaceæ	777
Hysteria	۲۹۳	Malignant anthrax	717
Icterus	۲۹۳	Malignant carbuncle	717
Ilicaceæ	177	Meliaceæ ۲٦٢ .	157
Impetigo	790	Memory (deficiency)	4.4
Impotence	790	Meninges	4.4
Impotentia	790	Menopause	4.4
Inappetence	790	Meteorism = Tympanism =	
Indigestion	790	Tympanites	4.4
Infectious states	790	Milking insufficiency =	
Insects (to move away)	797	insufficientia	191
Insomnia	۲97	Mimosa	777
Intertrigo	۲۹۸	Monimiaceæ	778
Intestine	۲۹۸	Moraceæ	177
Intoxation	۲۹۸	Mucomembranous herpes	79.
Intoxication	Y9A	Musaceæ	777
Irritability	Y9A	Myocardial infarctus =	
Jaundice ۲۹	9 . 794	infarct = infarction	790
Keratitis	799	Offal	4.0
Kraurosis	799	Oleaceæ	777
Labiatæ	777	Orchidaceæ	777
Lactation	799	Orobanchaceæ	177
Laminariaceæ	YTY	Papaveraceæ	777
Laryngitis	٣٠٠	Passifloraceæ	157
Leanness	٣.٢	Pedaliæ	777
Lecanoraceæ	777	Piperaceæ	777
Leg's edema	۲91	Plantaginaceae	117
Leg's œdema	Y9A	Polygaleæ	177
Leguminoseæ	YTY	Polygonaceæ	177
Leucorrhea	٣.1	Primulaceæ	777
Leukorrh(o)ea	٣•١	Rhamnaceæ	357
Liliaceæ	777	Rosaceæ	377
Loganiaceæ	777	Rubiaceæ	777
Lombago	٣•1	Rutaceæ	777
Lumbago	٣.1	Saint Vitus's dance	411
Lupus	٣•1	Salicaceæ	777
Lymphangiitis	٣•٢	Sapindaceæ	777
Lymphangioitis	٣.٢	Sapotaceæ	777
Lymphangitis	٣.٢	Saxifragaceæ	777
Lymphatism	4.4	Scaln	414

Scrophulariaceæ	٢٦١	Urinary infection	۲۹٥
Skinniness	٣٠٢	Urinary tithiasis	۰۰۰۰ ۳۰۱
Solanaceae	٢٦١	Urticaceæ	۲7۳
Spitting of blood	۲۸۸	Variety meat	٣٠٥
Status lymphaticus	٣•٢	Venereal disease	<b>٣•</b> ٢
Stomach pains	۳۰۳	Violaceæ	۲٦١
Tamaricaceæ	٢٦١	Wasp	YAY
Thinness	٣٠٢	White pain	<b>۳•</b> ۲
Thymeleaceæ	٢٦٣	Yawn	٣١٣
Typhaceæ	٢٦١	Yawning	٣١٣
Umbelliferæ		Zingiberaceæ	۲7۲
Urinary incontinence =		Zygophyllaceæ	۳۲۲
incontinentia	790		

## ٤- مسرد لاتيني

Amaryllidaceæ ٢٦٤	Fucaceæ ۲٦٣
Ampelidaceæ ۲٦٣	Graminaceæ Y78
Anacardiaceæ ۲٦١	Hemiptera ٢٦٤
Annonaceæ ۲٦٣	Hypericaceæ ۲٦٢
Apocynaceæ ۲٦٢	Ilicaceæ ۲٦١
Araceæ	Labiatæ Y77
Araliaceae Y71	Laminariaceæ Y77
Aristolochiaceæ ۲٦٢	Lecanoraceæ Y7Y
Aroidaceæ ۲٦٣	Leguminoseæ ۲٦٣
Asclepiadaceæ ۲٦٣	Liliaceæ ۲٦٢
Berberidaceae Y71	Loganiaceæ ۲٦٣
Borraginaceæ YT1	Magnolaceæ ۲٦٣
Cactaceæ Y1Y	Meliaceæ YTY (YT)
Cannaceæ ۲۲۳	Monimiaceæ ٢٦٤
Caprifoliaceæ YTY	Moraceæ
Caricaceae	Musaceæ ۲٦٣
Celastraceæ YTT	Oleaceæ
Chenopodiaceæ Y77	Orchidaceæ ٢٦٢
Combretaceae	Orobanchaceæ ۲٦١
Compositæ	Papaveraceæ ۲٦٢
Convolvulaceæ ۲٦٣	Passifloraceæ ۲٦١
Cornaceæ ۲٦٣	Piperaceæ Yl
Crassulaceæ Y77	Plantaginaceae ۲٦١
Cruciferæ ۲٦٣	Polygaleæ ۲٦١
Cucurbitaceæ ۲٦٤ ، ٢٦٣	Polygonaceæ ۲٦١
Cyperaceæ ۲٦٢	Primulaceæ Y7Y
Dioscoreaceæ ۲٦٢	Rhamnaceæ ٢٦٤
Dipsaceæ ۲٦٢	Rosaceæ ٢٦٤
Ericacea	Rubiaceæ ۲٦٣
Euphorbiaceæ ۲٦٣	Rutaceæ ۲٦٢
Ficoidaceæ ۲٦٣	Salicaceæ Y17

Sapindaceæ ۲٦٢	Typhaceæ ٢٦١
Sapotaceæ	Umbelliferæ ٢٦١
Saxifragaceæ	Urticaceæ ٢٦٢
Scrophulariaceæ	Violaceæ ٢٦١
Solanaceae	Zingiberaceæ
Tamaricaceæ	Zygophyllaceæ Y ٦٢
Thymeleaceæ ٢٦٣	7.0



مِ بَور المُعجب المُلوّنة





































































